





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1789/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1789/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1789/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1789/A

1789 (2)
A/2

pp 777-790
wanting

1550



95300

PEDANI DIOSCORIDIS

ANAZARBEO

de Medicinali materia, Librer
sex, Ioanne Ruellio Sueis-
sionensi interprete.

*Cuiuslibet capiti additæ Annotationes,
ditæ & compendiarie, è selectiori Me-
dicorum promptuario.*



LVGDVNI
Apud Balthazarum Arnolletum.
M. D. XXX.

Cum Privilegio Regis quinquennium.

Permis à Balthazar Arn
Imprimeur de la
ner ou faire imprimer, exposé
Dioscoride trāslate de grec en l
pays, avec les Annotatiōs adio
ce en vertu du Priuilege obt
tant pour ledit Dioscoride c
es liures mētionnez en icelluy
defences à tous autres Libra
de n'imprimer ou faire imprimer, & expo
le ledit Liure cy dessus mentionné, Jus
ans prochainement venans, à compter
date de l'impression dudit Liure. Et ce
amende arbitraire, de confiscation des
ts, & des dommages & interests dudit
Et autrement: comme plus amplemēt est
dict Priuilege. Donné à Fontainebleau
e iour de Feburier. Lan mil cinq cens
euf. Par le Roy,

uesque de Bayonne Maistre des Requestes ordi
de son hostel present.

Hurau

Compte auue

PRAESTANTISSIMO ET
peræque eruditissimo uiro,
D. Francisco Sangelasio,
Engolismæ eccle-
siæ Decano.

H. B. P. Medicus. S. D.



VANDO QVIDEM id ælutum a
me statuerim, uir ornatissime, præ omnibus ex-
tendum, ut ablegata protensis machinis ignavia,
eo memet industria dedere, quatenus & genius
& temporum ratio præbuerint, futurum ut admonenti ma-
num, nonnusquam deop illud in subsidium accurrat: & per-
inde id iamdiu non uulgaribus indicys conceperim ad iatricen
probe natum & efficiendum, nec secus decreui, uni me studio &
opera permittere, quo & natura propellerer, & diutius inge-
nium exercuissem. Atenim quo mei amicissimis, huius rei nihil
arte dissimulans, quin & exerta & breui manu argumentum
præberem, uisum est rudiori initio in auras prorumpere, quo pau-
latim ad editiora subueherer. Nec ignoras quantum id ego ho-
minū genus pro nihilo ducam, qui sublata lampade, necdum
permeante prætoria buccina sonitu, uires suas omnes in arenam
ipsumque discrimen proijciunt, cunque sufferendo æstui impares
sint, aut nondum præbito de se specimine, aut non expectata præ-
conia uoce, sese è carceribus ingenti suo dedecore subducunt, ac-
tum desperabundi doctorum diligentia nullo delectu persequun-
tur, & quod aperto Marte non audent, id occulta obirectatio-
ne & subdolis machinamētis quæ possunt, subruunt, nō robusto-
quosque, at delicatulos quosque impetentes, donec per tēpus pere-
uersitate propalata, unā & à proposito & ab existimatione
a a 2 concid

concidunt. Et sane ea mihi causa fuit sustinenda aditionis scho-
liorum, quæ antiquissima in adibus tuis in sylvam congesse-
ra. Ea Lugduni scholaster in Dioscoridem agens, in cõpendiũ redi-
gi, depresso ex industria stylo, quo imperitiores, quibus hæc scri-
am, & medicinam faciunt, ad studiose legendum Diosco-
ricendere, quo ab indiligentia quo summe premuntur veter-
itati, sciant dum hæc rudiora legunt, quæ simplicia citius
impta, quæ ignota, aut alia quavis ratione non satius perspe-
ctaque, & quo loci perquirenda. Porro hoc in negotio non
orari dicastẽ egi, verũ in exprimẽdis simplicium facultati-
& forma, Galenũ secutus sum: in priuata uero simplicium cẽ-
ximini illũ & eruditione & perspecta diligetia Matthio-
liã reddidi, præcipue cũ in cẽfendo Dioscoride hic & operã naua
in singulare, atque adeo Colophonẽ addiderit. Verũ enim uero,
uir dotibus ingenij omnibus præcellẽtissime, cũ te ut totius philo-
sophia, ita Medicinæ studiosum penitus persenserim, ac can-
doris tui memor, quo me, & τὸν ἴσον ἐν ἀπορίᾳ, exceperis, id o-
mnino committẽdũ duxi, ut hæc industriæ initia tibi dedicarem,
quo te mihi manũ porrigẽte, chordæ uice, uel sine cortice, in am-
plissimo hoc iatrites sinu, pernatem ἀνιδυvᾶν, ad ipsius por-
tus angustias. Iam iam enim Deo duce ad reddendos Latinitate
Arabes accingor, quos à barbarie & mendis queri scitent as-
sertos, id appungam discernendi quã cum Græcis uaria aut di-
uersa scripsere, totiusque & uelis & remis enitar, ut doctis illo-
rum Lectio à Galenica & Hippocratica minimũ dissideat. Tu
interim præcellentis. V. Hæc initia boni consule, ab eo nimirum
profecta, qui in literis per te supramodum promouisse testatur,
quatum quantunque est hoc Dioscoridis scholion & tuere, &
lege. Vale Lugduni, sexto à Liberalibus die. 1550.

Et Hora & genio.

Index

INDEX OMNIVM QVAE
in Dioscoride continentur. Prior
numeri librum, Posterior
caput indicat.

| | | | |
|---------------------|----------|-----------------|--------|
| A Brotonum | 3.25. | Aeris flos | 5.43. |
| Abſinthium | 3.23. | Aerugo rafa. | 5.45. |
| Abſinthium marinū | 3.24. | Aerugo ſcolecia | 5.45. |
| Abſinthium ſātonicū | 3.24. | Aes uſtum | 5.42. |
| Acacalis | 1.100. | Aethiopis | 4.90. |
| Acacia | 1.114. | Aëtites lapis | 5.93. |
| Acanthus | 3.17. | Agallochon | 1.21. |
| Acanthus ſylueſtris | 3.17. | Agaricum | 3.1. |
| Acanthium | 3.16. | Ageraton | 4.49. |
| Acetum | 5.11. | Agnus | 1.115. |
| Acetum Muſſum | 5.12. | Amiga | 3.150. |
| Acetum ſcilinum | 5.15. | Alabaſtites. | 5.93. |
| Acetum e Stæchade. | 5.36. | Alcea | 3.140. |
| Achillea. | 4.28. | Alcibiadion | 4.21. |
| Achras | 1.131. | Aleyonium | 5.83. |
| Acidamuria | 5.13. | Alyſma | 3.144. |
| Acinos | 3.41. | Allium | 2.145. |
| Acorum | 1.2. | Aloe | 3.22. |
| Acontium | 4.66.77. | Alſine | 4.75. |
| Adarces | 5.84. | Althæa | 3.139. |
| Adeps omnis | 268. | Alumen | 5.72. |
| Adeps ſampsuchi | 2.68. | Alumen ſciſſile | 5.72. |
| Adianton | 4.120. | Alyſſon | 3.87. |
| Agilops | 4.123. | Amaracum | 3.38. |
| Aeris ſquamma | 5.44. | Ambroſia | 3.109. |
| | | aa 3 | Amian |

INDEX

| | | | |
|--------------------------------------|----------|----------------------------|------------|
| <i>Amiantus lapis</i> | 15.93. | <i>Apium</i> | 3.62. |
| <i>Ammi</i> | 3.59. | <i>Apocynon</i> | 4.69. |
| <i>Ammoniacum</i> | 3.80. | <i>Apollinaris</i> | 4.59. |
| <i>Amomum</i> | 1.14. | <i>Apriecur</i> | 2.39. |
| <i>Ampelitis terra</i> | 5.94. | <i>Apum ictus curatio</i> | 6.40. |
| <i>Ampeloprasen</i> | 2.143. | <i>Aqua</i> | 5.9. |
| <i>Amphisbanae ictus, nota, cura</i> | | <i>Aqua frigida</i> | 6.33. |
| 110 | 6.38.40. | <i>Aqua marina</i> | 5.9. |
| <i>Amurca</i> | 1.119. | <i>Aqua mulsa</i> | 5.8. |
| <i>Amygdala amara</i> | 1.138. | <i>Arabicus lapis</i> | 5.93. |
| <i>Anilum</i> | 2.93. | <i>Araneus</i> | 2.55. |
| <i>Anagallis</i> | 2.171. | <i>Arbutus</i> | 1.137. |
| <i>Anayrus</i> | 3.142. | <i>Arction</i> | 4.91. |
| <i>Anchusa</i> | 4.21. | <i>Arction</i> | 4.92. |
| <i>Androsaces</i> | 3.127. | <i>Arcturon</i> | 4.91. |
| <i>Androsemon</i> | 3.148. | <i>Arena</i> | 5.93. |
| <i>Anemone</i> | 2.169. | <i>Argemone</i> | 2.170. |
| <i>Anethum</i> | 3.56. | <i>Argenti recrementum</i> | 5.51. |
| <i>Anguim senectus</i> | 2.16. | <i>Argenti scoria</i> | 5.51. |
| <i>Anisum</i> | 3.54. | <i>Argenti spuma</i> | 5.52. |
| <i>Anonis</i> | 3.18. | <i>Argentum uiuū</i> | 5.60.6.28. |
| <i>Anserinus adep</i> | 2.68. | <i>Arisarum</i> | 2.160. |
| <i>Anthemis</i> | 3.131. | <i>Aristolochia</i> | 3.4. |
| <i>Anthyllis</i> | 3.130. | <i>Armeniaca mala</i> | 1.130. |
| <i>Antipathes</i> | 5.86. | <i>Armenius lapis</i> | 5.55. |
| <i>Antirrhinon</i> | 4.117. | <i>Aron</i> | 2.159. |
| <i>Antispoda</i> | 5.41. | <i>Arrhenogonon</i> | 3.120. |
| <i>Aparine</i> | 3.86. | <i>Artemisia</i> | 3.108. |
| <i>Aphaca</i> | 2.142. | <i>Arundo</i> | 1.96. |
| <i>Apiastrum</i> | 3.99. | <i>Asarum</i> | 1.9. |
| <i>Apies</i> | 4.157. | <i>Asclepias</i> | 3.88. |
| | | <i>Ascyron</i> | |

INDEX

| | | | |
|---|------------|-------------------------------------|--------------|
| <i>Ascyron</i> | 3.147. | <i>Blatta pristimaria</i> | 2.34. |
| <i>Asius lapis</i> | 5.88. | <i>Bliton</i> | 2.110. |
| <i>Aspalathus</i> | 1.19. | <i>Botrys</i> | 3.110. |
| <i>Asparagus</i> | 2.118. | <i>Brassica</i> | 2.113. |
| <i>Asplenon</i> | 3.128. | <i>Brassica marina</i> | 2.115. |
| <i>Aspidis ictus nota & cura-</i> | | <i>Brassica sylvestris</i> | 2.114. |
| <i>tio</i> | 6.38.48. | <i>Britanica</i> | 4.2. |
| <i>Aster Atticus</i> | 4.105. | <i>Bromus</i> | 4.123. |
| <i>Astragalus</i> | 4.52. | <i>Bryon</i> | 1.20. |
| <i>Athamanticum</i> | 1.3. | <i>Buccina</i> | 2.3. |
| <i>Athera</i> | 2.84. | <i>Buglossum</i> | 4.112. |
| <i>Atractylis</i> | 3.89. | <i>Bulbus esculentus</i> | 2.162. |
| <i>Atramentum librarii</i> | 5.96. | <i>Bulbus uomitorius.</i> | 2.163. |
| <i>Atramentum sutorii</i> | 5.64. | <i>Bunio</i> | 2.109.4.111. |
| <i>Atriplex</i> | 2.112. | <i>Buprestis</i> | 2.53.6.3. |
| <i>Auellana nux</i> | 1.141. | <i>Buphthalmos</i> | 3.133. |
| <i>Avena</i> | 2.86. | <i>Butyrum</i> | 2.64. |
| <i>Auricula muris</i> | 2.176. | <i>Butiri fuligo</i> | 2.64. |
| <i>Auripigmentum siue Ar-</i> | | <i>Cacalia</i> | 4.108. |
| <i>nicon</i> | 5.70.6.29. | <i>Cadmia</i> | 5.40. |
| B <i>Accæ Lauri</i> | 1.89. | <i>Caciliæ ictus, nota, curatio</i> | |
| <i>Baccharis</i> | 3.42. | | 6.38.40. |
| <i>Balaustium</i> | 1.126. | <i>Calamus odoratus</i> | 1.17. |
| <i>Ballote</i> | 3.98. | <i>Calamintha</i> | 3.34. |
| <i>Balsamum</i> | 1.18. | <i>Calcestraga</i> | 4.161. |
| <i>Barbula hyrci</i> | 2.137. | <i>Calx uua</i> | 5.80.6.29. |
| <i>Basilisci ictus, nota, & cura-</i> | | <i>Cantamum</i> | 1.23. |
| <i>tio</i> | 6.38.48. | <i>Canceri</i> | 2.9. |
| <i>Bdellium</i> | 1.68. | <i>Canis rabiosi nota</i> | 6.35. |
| <i>Beta</i> | 2.116. | <i>Canis rabiosi morsus curatio</i> | |
| <i>Betonica</i> | 4.1. | | 6.36. |
| <i>Bitumen</i> | 1.82. | | |

INDEX

| | | | |
|---|------------------------|---------------------------|------------|
| <i>Cane demor. uel. ratio. 6. 37</i> | <i>Ceruinum seuum.</i> | 2.68 | |
| <i>Cannabis.</i> | 3.141 | <i>Cerussa.</i> | 5.53.6.22 |
| <i>Cantharides.</i> | 2.52.6.1 | <i>Cestron.</i> | 4.1 |
| <i>Capnos.</i> | 4.95 | <i>Chalcitis.</i> | 5.65 |
| <i>Capparis.</i> | 2.166 | <i>Chama.</i> | 2.6 |
| <i>Cardamomum.</i> | 1.5 | <i>Chamaacle.</i> | 4.155 |
| <i>Cardamina.</i> | 2.121 | <i>Chamaecissos.</i> | 4.110 |
| <i>Carduus.</i> | 3.14 | <i>Chamaedaphne.</i> | 4.132 |
| <i>Carpasi succus.</i> | 6.13 | <i>Chamadrys.</i> | 3.94 |
| <i>Cariota.</i> | 1.124 | <i>Chamaleo albus.</i> | 3.8 |
| <i>Carum.</i> | 3.55 | <i>Chamaleo niger.</i> | 3.9 |
| <i>Casus recens.</i> | 2.63 | <i>Chamaepeuce.</i> | 4.111 |
| <i>Casus equinus.</i> | 2.63 | <i>Chamaepitys.</i> | 3.150 |
| <i>Cassia.</i> | 1.12 | <i>Chamaefyce.</i> | 4.151 |
| <i>Castanea.</i> | 1.121 | <i>Chamaelea.</i> | 4.153 |
| <i>Castorium.</i> | 2.22 | <i>Chelidonium maius.</i> | 2.173 |
| <i>Catanance.</i> | 4.118 | <i>Chelidonium minus.</i> | 2.174 |
| <i>Caucalis.</i> | 2.133 | <i>Chia terra.</i> | 5.94 |
| <i>Cedrus.</i> | 1.88 | <i>Chrysanthemon.</i> | 4.48 |
| <i>Celicum Nardum.</i> | 1.7 | <i>Chrysocolla.</i> | 5.54 |
| <i>Cechriict. not. rem. 6. 38. 40</i> | | <i>Chrysocome.</i> | 4.45 |
| <i>Cetaurium magnu.</i> | 3.6 | <i>Chrysogonon.</i> | 4.46 |
| <i>Centaurium minus.</i> | 3.7 | <i>Cicada.</i> | 2.43 |
| <i>Cepa.</i> | 2.144 | <i>Cicer satium.</i> | 2.96 |
| <i>Cepa.</i> | 3.143 | <i>Cicer Arietinum.</i> | 2.96 |
| <i>Cera.</i> | 2.75 | <i>Cicer sylvestre.</i> | 2.96 |
| <i>Cerasia.</i> | 1.128 | <i>Cichorion.</i> | 2.126 |
| <i>Cerast. iclus, nota, curatio. 6.</i> | | <i>Cici.</i> | 4.145 |
| 38.40 | | <i>Cicuta.</i> | 4.67, 6.11 |
| <i>Cervi genitale.</i> | 2.36 | <i>Cimices</i> | 2.32 |
| <i>Ceruinum cornu.</i> | 2.50 | <i>Cimolia.</i> | 5.94 |
| | | | Cypa |

INDEX

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|-------|
| Cyparissias. | 4.146 | Cos Noxia. | 5.93 |
| Cinis sarmentitius. | 5.82 | Costus. | 2.15 |
| Cinnabaris. | 5.59 | Cotonea mala. | 1.130 |
| Cinnamomum. | 1.13 | Crateogonum. | 3.119 |
| Cionia. | 2.3 | Crithmum | 2.122 |
| Circaea. | 3.114 | Crocodilion. | 3.10 |
| Cirsium. | 4.104 | Crocomagma. | 1.25 |
| Cistus. | 1.108 | Crocum. | 1.25 |
| Citria mala. | 1.130 | Croton. | 4.145 |
| Clematis. | 4.6 | Cucurbita. | 2.127 |
| Clinopodium. | 3.91 | Cucumis sativus. | 2.128 |
| Clymenon. | 4.11 | Cucumis sylvestris. | 4.136 |
| Cnicus. | 4.168 | Cuminum sativum. | 3.57 |
| Coagulum. | 2.67 | Cuminum sylvestre. | 3.58 |
| Coccum Guidium. | 4.154 | Cunila. | 3.28 |
| Coccum insectorium. | 4.39 | Cupressus. | 1.85 |
| Cochlea. | 2.8 | Curmi. | 2.80 |
| Cæruleus. | 5.56 | Cyclaminus una. | 2.156 |
| Colchicon. | 4.72 | Cyclaminus altera. | 2.157 |
| Colocasia. | 2.98 | Cydonomeli. | 5.18 |
| Colocynthis. | 4.158 | Cymia. | 4.170 |
| Colymbades oleæ. | 1.100 | Cynocrambe. | 4.170 |
| Conyza. | 3.116 | Cynoglosson. | 4.113 |
| Corallium. | 5.86 | Cynoforchis. | 3.121 |
| Coriandrum. | 3.60.6.9 | Cyparissias Tithym. | 4.146 |
| Coria ueramentaria. | 2.116 | Cyphi. | 1.24 |
| Coriarius frutex. | 1.123 | Cypirus. | 1.4 |
| Coris. | 3.149 | Cytinus. | 1.126 |
| Coronopus. | 2.123 | Cytisus. | 4.98 |
| Cornus. | 1.133 | D Amescena. | 1.136 |
| Corruda. | 2.118 | D Damasonium. | 3.144 |
| | | aa 5 | Daph |

INDEX

| | | | |
|--|------------|------------------------|------------|
| <i>Daphnoides</i> | 4.131. | <i>Eleoselinon</i> | 3.62. |
| <i>Daucus</i> | 3.67. | <i>Elichryson</i> | 4.47. |
| <i>Delphinium</i> | 3.68. | <i>Empetron</i> | 4.161. |
| <i>Dedroides Tithyma.</i> | 4.146. | <i>Ephemeron</i> | 4.73. 6.5. |
| <i>Deuteria</i> | 5.5. | <i>Epimedin</i> | 4.7. |
| <i>Dictamnium</i> | 3.31. | <i>Epimelis</i> | 1.13. |
| <i>Dictamnū Cretense</i> | 3.31. | <i>Epipactis</i> | 4.94. |
| <i>Diphryges</i> | 5.69. | <i>Epirotica mala</i> | 1.130. |
| <i>Dipsacum</i> | 3.11. | <i>Equisetum</i> | 4.38. |
| <i>Dipsadis morsus, notæ, curatio.</i> | | <i>Eretria terra</i> | 5.94. |
| | 6.38.40. | <i>Erica</i> | 1.99. |
| <i>Dorycnion</i> | 4.64. 6.6. | <i>Erinaceus</i> | 2.1. |
| <i>Draba</i> | 2.149. | <i>Eriner</i> | 1.145. |
| <i>Draco marinus</i> | 2.12. | <i>Erinus</i> | 4.25. |
| <i>Draconis marini, ictus, remedia</i> | 6.40. | <i>Eruca</i> | 2.134. |
| <i>Dracunculus</i> | 2.158. | <i>Eruca olerum</i> | 2.51. |
| <i>Dryini ictus, notæ</i> | 6.38.40. | <i>Eruca Pinorum</i> | 6.53. |
| <i>Dryopteris</i> | 4.167. | <i>Eruum</i> | 2.101. |
| <i>Dulcis radix</i> | 3.5. | <i>Eryngium</i> | 3.21. |
| E <i>Benus</i> | 1.110. | <i>Erysimon</i> | 2.150. |
| E <i>Ebulum</i> | 4.155. | <i>Eupatorium</i> | 4.33. |
| <i>Ebur</i> | 2.48. | <i>Euphorbium</i> | 3.78. |
| <i>Echinus</i> | 2.1. | F <i>aba</i> | 2.97. |
| <i>Echinus terrestris</i> | 2.1. | <i>Faba Aegyptia</i> | 2.98. |
| <i>Echium</i> | 4.23. | <i>Fax</i> | 5.79. |
| <i>Elaphoboscon</i> | 3.64. | <i>Fagus</i> | 1.120. |
| <i>Elaterion</i> | 4.136. | <i>Farina crassior</i> | 2.82. |
| <i>Elatine</i> | 4.32. | <i>Fel</i> | 2.70. |
| <i>Electrum</i> | 1.92. | <i>Ferrirubigo</i> | 5.46. |
| <i>Elaomeli</i> | 1.31. | <i>Ferula</i> | 3.73. |
| | | <i>Festuca</i> | 4.123. |
| | | <i>Fibri</i> | |

INDEX

| | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------------------|------------|
| <i>Fibrini testes</i> | 2.22. | <i>Galien</i> | 4.81. |
| <i>Ficus</i> | 1.144. | <i>Galiopsis</i> | 4.80. |
| <i>Ficus sylvestris</i> | 1.144. | <i>Garum</i> | 2.300. |
| <i>Ficus Lixivium</i> | 1.145. | <i>Genitale Cerni</i> | 2.36. |
| <i>Filicula</i> | 4.166. | <i>Gentiana</i> | 3.3. |
| <i>Filix mas</i> | 4.165. | <i>Geranion</i> | 3.111. |
| <i>Filix fœmina</i> | 4.165. | <i>Geodes Lapis</i> | 5.93. |
| <i>Fimum</i> | 2.72. | <i>Gingiberis</i> | 2.152. |
| <i>Flos Aceris</i> | 5.43. | <i>Gingulion</i> | 2.131. |
| <i>Flos salis</i> | 5.77. | <i>Gith</i> | 3.75. |
| <i>Flos Punica.</i> | 1.126. | <i>Gladiolus</i> | 4.18. |
| <i>Flos sylvestris Punici</i> | 1.126. | <i>Glans</i> | 1.120. |
| <i>Fœniculum</i> | 3.65. | <i>Glans Ioni</i> | 1.121. |
| <i>Fœniculum erraticum</i> | 3.66. | <i>Glans Sardiana</i> | 1.121. |
| <i>Fœnum gracum</i> | 2.94. | <i>Glans unguentaria</i> | 4.141. |
| <i>Fraxinus</i> | 1.91. | <i>Glastum sativum</i> | 2.177. |
| <i>Fuligo è Myrrha, Resina, Sty-</i> | | <i>Glastum sylvestre</i> | 2.177. |
| <i>race</i> | 1.72. | <i>Glaucium</i> | 3.82. |
| <i>Fuligo liquida picis</i> | 1.79. | <i>Glaux</i> | 4.124. |
| <i>Fuligo pictoria</i> | 5.95. | <i>Gluten piscium</i> | 3.84. |
| <i>Fuligo resina</i> | 1.76. | <i>Glutinium</i> | 3.83. |
| <i>Fuligo Thuris</i> | 1.72. | <i>Gnaphalion</i> | 3.112. |
| <i>Fumaria</i> | 4.95. | <i>Gobius</i> | 2.28. |
| <i>Fungi</i> | 4.71. | <i>Gramen</i> | 4.26. |
| G <i>Agates Lapis</i> | 5.92. | <i>Gramen arundinaceu</i> | 4.26. |
| <i>Galaclites lapis</i> | 5.93. | <i>Gramen Parnasi</i> | 4.26. |
| <i>Galbanum</i> | 3.79. | <i>Grossi</i> | 1.145. |
| <i>Galerita</i> | 2.46. | <i>Gypsum</i> | 5.81.6.24. |
| <i>Galla</i> | 1.122. | <i>Hematites</i> | 5.90. |
| <i>Gallina</i> | 2.41. | <i>Hæmorrhoi, nota,</i> | 6.38.40. |
| <i>Gallina cerebellum</i> | 2.41. | <i>Halica</i> | 2.88. |
| | | <i>Hali</i> | |

INDEX

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------|-------------|
| <i>Halicacabū solanū</i> | 4.61. | <i>Hirundines</i> | 2.47. |
| <i>Halimus</i> | 1.102. | <i>Hirudo</i> | 6.32. |
| <i>Harundo</i> | 1.96. | <i>Hordeum</i> | 2.78. |
| <i>Harundo Cypria</i> | 1.96. | <i>Horminum</i> | 3.123. |
| <i>Harundo uallatoria</i> | 1.96. | <i>Hyacinthus</i> | 4.53. |
| <i>Hastula regia</i> | 2.161. | <i>Hydromeli</i> | 5.8. |
| <i>Hedera</i> | 2.172. | <i>Hydromelon</i> | 5.19. |
| <i>Helenium 1.</i> | 1.26. | <i>Hydropiper</i> | 2.153. |
| <i>Helenium alterum</i> | 1.26. | <i>Hyoſcyamus</i> | 4.59. 6.15. |
| <i>Helioscopus</i> | 4.146. | <i>Hypecoon</i> | 4.58. |
| <i>Heliotropiū magnum</i> | 4.171. | <i>Hypericum</i> | 3.146. |
| <i>Heliotropium parū</i> | 4.171. | <i>Hypocistis</i> | 1.108. |
| <i>Helleborum album</i> | 4.133. | <i>Hyſſopus</i> | 3.26. |
| <i>Helleborum nigrū</i> | 4.134. | I <i>Aſpis</i> | 5.93. |
| <i>Helxine</i> | 4.31. 74. | <i>Iberis</i> | 1.147. |
| <i>Hemerocallis</i> | 3.117. | <i>Idæa radix</i> | 4.36. |
| <i>Hemionitis</i> | 3.129. | <i>Ilex</i> | 1.120. |
| <i>Herba Sabina</i> | 1.87. | <i>Indicum</i> | 5.57. |
| <i>Hieracium magnum</i> | 3.61. | <i>Inguinalis</i> | 4.105. |
| <i>Hieracium paruum</i> | 3.61. | <i>Intybus</i> | 2.125. |
| <i>Hippace</i> | 2.63. | <i>Irio</i> | 2.150. |
| <i>Hippocampus</i> | 2.2. | <i>Iris</i> | 1.1. |
| <i>Hippoglosson</i> | 4.116. | <i>Iſopyrum</i> | 4.106. |
| <i>Hippolapathon</i> | 2.107. | <i>Iudaicus Lapis</i> | 5.93. |
| <i>Hippophaës</i> | 4.143. | <i>Iuncus</i> | 4.42. |
| <i>Hippophaëſton</i> | 4.144. | <i>Iuncus odoratus</i> | 1.16. |
| <i>Hippopotami teſtes</i> | 3.21. | <i>Iuniperus</i> | 1.86. |
| <i>Hippofelinon</i> | 3.62. | <i>Ius piſcium</i> | 2.31. |
| <i>Hirci barbula</i> | 3.137. | <i>Ixia</i> | 3.8. 6.21. |
| <i>Hircinum ſeum</i> | 2.68. | L <i>Abrū Veneris</i> | 3.11. |
| <i>Hirculus</i> | 1.7. | <i>Labruſca</i> | 5.1. |
| | | <i>Lac</i> | |

INDEX

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------|------------|
| <i>Lac</i> | 2.62. | <i>Lepus marinus</i> | 2.17.6.30. |
| <i>Lac coagulatum</i> | 6.26. | <i>Lepus terrestris</i> | 2.17. |
| <i>Lac humanum</i> | 2.62. | <i>Leucacantha</i> | 3.19. |
| <i>Lacerta</i> | 2.56. | <i>Leucanthemon</i> | 3.131. |
| <i>Laeluca satina</i> | 2.129. | <i>Leucas</i> | 3.95. |
| <i>Laeluca sylvestris</i> | 2.130. | <i>Leucoion</i> | 3.18. |
| <i>Ladanum</i> | 1.109. | <i>Lichen</i> | 4.43. |
| <i>Lagopus</i> | 4.15. | <i>Lignorum marcor</i> | 1.95. |
| <i>Lampsana</i> | 2.108. | <i>Ligusticum</i> | 3.49. |
| <i>Lana</i> | 2.65. | <i>Ligustrum</i> | 1.106. |
| <i>Lana cremata</i> | 2.65. | <i>Lilium</i> | 3.97. |
| <i>Lanaria herba</i> | 2.155. | <i>Lilium sylvestre</i> | 3.117. |
| <i>Lappa</i> | 4.122. | <i>Limonium</i> | 4.14. |
| <i>Lapathum</i> | 2.107. | <i>Lingua bubula</i> | 4.112. |
| <i>Lasfer</i> | 3.76. | <i>Linozostis</i> | 4.169. |
| <i>Laserpitium</i> | 3.76. | <i>Linum</i> | 2.95. |
| <i>Lathyris</i> | 4.148. | <i>Lithocolla</i> | 5.93. |
| <i>Lauer</i> | 2.120. | <i>Lithospermon</i> | 3.135. |
| <i>Laurus</i> | 1.89. | <i>Locusta</i> | 2.44. |
| <i>Laurus Alexadrina</i> | 4.130. | <i>Lolium</i> | 2.92. |
| <i>Lauri bacca</i> | 1.89. | <i>Lonchitis</i> | 3.138. |
| <i>Lemnia terra</i> | 5.63. | <i>Lora</i> | 5.5. |
| <i>Lens</i> | 2.99. | <i>Lotus arbor</i> | 1.133. |
| <i>Lens palustris</i> | 4.76. | <i>Lotus Aegyptia</i> | 4.99. |
| <i>Lentiscus</i> | 1.74. | <i>Lotus sylvestris</i> | 4.97. |
| <i>Lentiscina resina</i> | 1.76. | <i>Lotus urbana</i> | 4.96. |
| <i>Leontopetalon</i> | 3.92. | <i>Lupinus sativus</i> | 2.102. |
| <i>Leonum pingua</i> | 2.68. | <i>Lupinus sylvestris</i> | 2.102. |
| <i>Leontopodion</i> | 4.115. | <i>Lychnis coronaria</i> | 3.96. |
| <i>Lepidium</i> | 2.167. | <i>Lychnis sylvestris</i> | 3.96. |
| <i>Leptocarya</i> | 1.141. | <i>Lycium</i> | 1.113. |
| | | <i>Lycio</i> | |

INDEX

| | | | |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| <i>Lycopsis</i> | 4.22. | <i>Medulla</i> | 2.69. |
| <i>Lygos</i> | 4.115. | <i>Mel Ponticum</i> | 2.74. |
| <i>Lyncis urina</i> | 2.73. | <i>Mel</i> | 2.74. |
| <i>Lyfimachia</i> | 4.3. | <i>Mel Saccharum</i> | 2.74. |
| M <i>Acer.</i> | 1.93. | <i>Mel Sardoum</i> | 2.74. |
| M <i>Mana</i> | 2.37. | <i>Mel Heraclion</i> | 6.74. |
| <i>Magnes</i> | 5.93. | <i>Melampsithium</i> | 5.5. |
| <i>Malabathrum</i> | 1.11. | <i>Melanteria</i> | 5.67. |
| <i>Malicorium</i> | 1.126. | <i>Melanthium</i> | 3.75. |
| <i>Malua</i> | 2.111. | <i>Melia terra</i> | 5.94. |
| <i>Malum</i> | 1.130. | <i>Melilotos</i> | 3.39. |
| <i>Malum Armeniacū</i> | 1.130. | <i>Melimela</i> | 3.130. |
| <i>Malum Cotoneum</i> | 1.130. | <i>Melissophyllon</i> | 3.99. |
| <i>Malum dulce</i> | 1.130. | <i>Melitites Lapis</i> | 5.93. |
| <i>Malum Epiroticum</i> | 1.130. | <i>Melomeli</i> | 5.18. |
| <i>Malum Medicum</i> | 1.130. | <i>Memphites</i> | 5.93. |
| <i>Malum orbiculatum</i> | 1.130. | <i>Mentha</i> | 3.36. |
| <i>Malum Persicum</i> | 1.130. | <i>Mentastrum</i> | 3.36. |
| <i>Malum praeox</i> | 1.130. | <i>Meon</i> | 1.3. |
| <i>Malum Punicum</i> | 1.126. | <i>Mercurialis</i> | 4.169. |
| <i>Malum Sylvestre</i> | 1.130. | <i>Mespilus</i> | 1.132. |
| <i>Mandragora</i> | 4.65. | <i>Milium</i> | 2.89. |
| <i>Manna Thuris</i> | 1.71. | <i>Millefolium</i> | 4.100. |
| <i>Marcor lignorum</i> | 1.95. | <i>Millepeda</i> | 2.33. |
| <i>Maron</i> | 3.40. | <i>Misy</i> | 5.66. |
| <i>Marrubium</i> | 3.100. | <i>Mituli</i> | 2.4. |
| <i>Marrubium nigrum</i> | 3.98. | <i>Moly</i> | 3.45. |
| <i>Mastiche</i> | 1.74. | <i>Molybdæna</i> | 3.50. |
| <i>Mecomum</i> | 6.17. | <i>Molybdoides lapis</i> | 5.48. |
| <i>Medica mala</i> | 1.130. | <i>Morochthus</i> | 5.93. |
| <i>Medion</i> | 4.16. | <i>Morus</i> | 1.142. |
| | | <i>Mul</i> | |

INDEX

| | | | |
|--|----------|------------------------------|-------------|
| <i>Mallus</i> | 2.20. | <i>Nepeta</i> | 3.34. |
| <i>Mulsim</i> | 5.7. | <i>Nitrum</i> | 5.78. |
| <i>Muralis herba</i> | 4.74. | <i>Nitri spuma</i> | 5.78. |
| <i>Muria</i> | 5.76. | <i>Nux Anellana</i> | 1.141. |
| <i>Mures</i> | 2.61. | <i>Nux iuglans</i> | 1.140. |
| <i>Muris Auricula</i> | 2.176. | <i>Nux Pineæ</i> | 1.73. |
| <i>Mus Araneus</i> | 2.60. | <i>Nymphaea</i> | 3.126. |
| <i>Muris Aranei ictus, nota, cura- ratio</i> | 6.38.40. | <i>Ochra</i> | 5.58. |
| <i>Muscus</i> | 1.20. | <i>Ocimastrum</i> | 4.24. |
| <i>Muscus marinus</i> | 4.84. | <i>Oenanthe</i> | 3.115. 5.3. |
| <i>Mustela</i> | 2.23. | <i>Ocypum</i> | 2.66. |
| <i>Myagron</i> | 4.102. | <i>Olea</i> | 1.117. |
| <i>Myosotis</i> | 2.176. | <i>Olea sylvestris</i> | 1.117. |
| <i>Myrica</i> | 1.98. | <i>Oleaster</i> | 1.117. |
| <i>Myrrha</i> | 1.66. | <i>Olea Aethiopica</i> | 1.117. |
| <i>Myrrha Bæotica</i> | 1.66. | <i>Olei uires</i> | 1.27. |
| <i>Myrrhis</i> | 4.101. | <i>Oleum Amygdalinū</i> | 1.33. |
| <i>Myrtidanium</i> | 1.127. | <i>Oleum Balaninum</i> | 1.34. |
| <i>Myrtus sativa</i> | 1.127. | <i>Oleum candidum</i> | 1.28. |
| <i>Myrtus sylvestris</i> | 4.129. | <i>Oleum Carynum</i> | 1.34. |
| N <i>Naphtha</i> | 1.84. | <i>Oleum Cicinum</i> | 1.32. |
| <i>Napus</i> | 2.104. | <i>Oleum Gnicinum</i> | 1.35. |
| <i>Narcaphthon</i> | 1.22. | <i>Oleum commune</i> | 1.27. |
| <i>Narcissus</i> | 4.142. | <i>Oleum è Gnidio grano</i> | 1.35. |
| <i>Nardi genera</i> | 1.6. | <i>Oleū Hyoscyaminum</i> | 1.35. |
| <i>Nardum Celticum</i> | 1.7. | <i>Oleum Laurinum</i> | 1.37. |
| <i>Nardum montanum</i> | 1.8. | <i>Oleum Lentiscinum</i> | 1.38. |
| <i>Nardinum unguentum</i> | 1.63. | <i>Oleum Mastichinum</i> | 1.39. |
| <i>Nasturtium</i> | 2.147. | <i>Oleum Melanthinum</i> | 1.35. |
| <i>Natricis ictus</i> | 6.38.40. | <i>Oleum Myrteum</i> | 1.36. |
| | | <i>Oleū Olivæ sylvestris</i> | 1.18. |
| | | <i>Oleum</i> | |

INDEX

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|--------|
| <i>Oleum Omphacinum</i> | 1.27. | <i>Paliurus</i> | 1.103. |
| <i>Oleum Picinum</i> | 1.78. | <i>Palma</i> | 1.124. |
| <i>Oleum Raphaninum</i> | 1.35. | <i>Palma Elate</i> | 1.125. |
| <i>Oleum Sesaminum</i> | 1.34. | <i>Palma Thebaica</i> | 1.124. |
| <i>Oleum Sicyonium</i> | 1.29. | <i>Panaces Asclepy</i> | 3.47. |
| <i>Oleum Sinapinum</i> | 1.35. | <i>Panaces Chironium</i> | 3.48. |
| <i>Omphacinum</i> | 1.27. | <i>Panaces Heracium</i> | 3.46. |
| <i>Omphacium.</i> | 5.4. | <i>Pancration</i> | 2.165. |
| <i>Omphacomelites</i> | 5.20. | <i>Panicum</i> | 2.90. |
| <i>Onagra</i> | 4.103. | <i>Papauer corniculatum</i> | 4. |
| <i>Ononis</i> | 3.18. | 56.6.18. | |
| <i>Onosma</i> | 3.125. | <i>Papauer erraticum</i> | 4.54. |
| <i>Onyx</i> | 2.7.5.93. | <i>Papauer sativum</i> | 4.55. |
| <i>Ophioscorodon</i> | 2.145. | <i>Papauer spumeum</i> | 4.57. |
| <i>Ophites</i> | 5.93. | <i>Papyrus</i> | 1.97. |
| <i>Opium</i> | 4.55. | <i>Pardorum pinguis</i> | 2.68. |
| <i>Opobalsamum</i> | 1.18. | <i>Paronychia</i> | 4.44. |
| <i>Opopanax</i> | 3.46. | <i>Parthenium</i> | 3.132. |
| <i>Orbiculata mala</i> | 1.130. | <i>Pastinaca herba</i> | 3.50. |
| <i>Oreoselinon</i> | 3.62. | <i>Pastinaca marina</i> | 2.18. |
| <i>Origanon</i> | 3.28. | <i>Pastinaca marina</i> | 6.38. |
| <i>Origanum Sylvestre</i> | 3.28. | <i>Peplis</i> | 4.150. |
| <i>Ornithogalum</i> | 2.138. | <i>Peplos</i> | 4.149. |
| <i>Orobancha</i> | 2.136. | <i>Pepo</i> | 2.128. |
| <i>Oriza</i> | 2.87. | <i>Periclymenon</i> | 4.12. |
| <i>Ostracites</i> | 5.93. | <i>Persea</i> | 1.146. |
| <i>Osyris</i> | 4.126. | <i>Persica mala</i> | 1.130. |
| <i>Othonna</i> | 2.175. | <i>Personata</i> | 4.92. |
| <i>Otorum natura</i> | 2.42. | <i>Petasites</i> | 4.93. |
| P <i>Ouellugeseum</i> | 2.68. | <i>Petroselinon</i> | 3.62. |
| <i>Aconita</i> | 3.134. | <i>Peucedanon</i> | 3.74. |
| | | <i>Pha</i> | |

INDEX

| | | | |
|---------------------------------------|--------|-------------------------|-----------|
| <i>Phalangium</i> | 3.103 | <i>Polygala</i> | 4.125 |
| <i>Phalangij ictus, nota, curatio</i> | | <i>Polygonatum</i> | 4.5 |
| 6.38.40 | | <i>Polygonon</i> | 4.4 |
| <i>Phalaris</i> | 3.136 | <i>Polypodion</i> | 4.166 |
| <i>Phasioli</i> | 2.100 | <i>Pompholyx</i> | 5.41 |
| <i>Phoenix</i> | 4.35 | <i>Populus alba</i> | 1.92 |
| <i>Phrygius</i> | 5.87 | <i>Populus nigra</i> | 1.92 |
| <i>Phu</i> | 1.10 | <i>Porrum capitatum</i> | 2.143 |
| <i>Phycus marinus</i> | 4.85 | <i>Portulaca</i> | 2.117 |
| <i>Phyllon</i> | 3.120 | <i>Potamogeton</i> | 4.86 |
| <i>Phyteuma</i> | 4.114 | <i>Poterion</i> | 3.15 |
| <i>Picea</i> | 1.73 | <i>Propolis</i> | 2.76 |
| <i>Pingua</i> | 1.60 | <i>Prunus, pruna</i> | 1.136 |
| <i>Pinorum Eruc.</i> | 6.53 | <i>Pseudobunon</i> | 4.109 |
| <i>Pinus</i> | 1.2 | <i>Psoricon</i> | 5.65 |
| <i>Piper</i> | 2.151 | <i>Psyllion</i> | 4.60.6.10 |
| <i>Pissasphaltos</i> | 1.83 | <i>Ptarmica</i> | 2.154 |
| <i>Pistacia</i> | 1.139. | <i>Pulegium</i> | 3.30 |
| <i>Pitydes</i> | 1.73 | <i>Pumex</i> | 5.74 |
| <i>Pityusa</i> | 4.147 | <i>Purpura</i> | 2.3 |
| <i>Pix liquida</i> | 1.78 | <i>Picnocomon</i> | 4.156 |
| <i>Pix sicca</i> | 1.80 | <i>Pyrethrum</i> | 3.69 |
| <i>Plantago</i> | 2.119 | <i>Pyrites</i> | 5.89 |
| <i>Platyphyllos</i> | 4.146 | <i>Pyrorum genera</i> | 1.131 |
| <i>Plumbago</i> | 5.50 | <i>Qercus</i> | 1.120 |
| <i>Plumbum elotum</i> | 5.47 | <i>Quinquefoliū</i> | 4.34 |
| <i>Plumbum ustum</i> | 5.48 | <i>Radicala</i> | 2.155 |
| <i>Pnigitis terra</i> | 5.94 | <i>Radix</i> | 2.105 |
| <i>Polemonia</i> | 4.7 | <i>Rana</i> | 2.24 |
| <i>Polion</i> | 3.105 | <i>Rana palustris</i> | 6.31 |
| <i>Policnemon</i> | 3.90 | <i>Ranunculum</i> | 2.168 |
| | | <i>Rapum</i> | |

bb

INDEX

| | | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|-----------|
| Rapum | 2.103 | Salamendra | 2.54.6.4 |
| Recrementum Argenti | 5.51 | Salix | 1.116. |
| Resinae varia | 1.76 | Salvia | 3.32 |
| Rha | 3.2 | Sambucus | 4.155 |
| Rhamnus | 1.101 | Samia terra | 5.94 |
| Raphanus | 2.105 | Samius lapis | 5.94 |
| Rhodiaradix | 4.37 | Sampsuchum | 3.38 |
| Rhododendron | 4.70 | Sandaracha | 5.61.6.29 |
| Rhus | 1.123 | Sanguinaria | 4.4 |
| Ricinus | 4.145 | Sanguinaria foemina | 4.4 |
| Rosa | 1.111 | Sanguis | 2.161 |
| Rosci pastilli | 1.112 | Sanguis Tauri | 6.61 |
| Rosmarinus | 3.70 | Sapphirus | 5.92 |
| Rosmarinum | 3.71 | Sarcocolla | 3.81 |
| Rubeta | 6.31 | Sardianae glandes | 1.121 |
| Rubia | 3.137 | Sardonias | 6.14 |
| Rubigo ferri | 3.46 | Sarmentitius cinis | 5.82 |
| Rubrica fabrilis | 5.62 | Satureia | 3.36 |
| Rubrica Sinopica | 5.61 | Satyrion | 3.122 |
| Rubus | 4.29 | Satyrion Erythrionion | 3.122 |
| Rubus canis | 1.105 | Scammonia | 4.152 |
| Rubus Idens | 4.30 | Scandix | 2.132 |
| Rumex | 2.107 | Schistum lac | 2.62 |
| Ruscum | 4.129 | Schistos lapis | 2.91 |
| Ruta | 3.43 | Scilla | 2.164 |
| Ruta Sylvestris | 3.44 | Scolopendra | 2.13 |
| Sacra herba | 4.51 | Scolopendrea ictus, nota, cura- | |
| Sagapenum | 3.77 | no | 6.38.40 |
| Sal | 5.75 | Scordion | 3.106 |
| Salis flos | 5.77 | Scorodoprasum | 2.145 |
| Salis spuma | 5.75 | Scoria ferri | 5.46 |
| | | Scoria | |

INDEX

| | | | |
|-------------------------------------|-------|----------------------------|--------------|
| <i>Scoria plumbi</i> | 5.48 | <i>Silurus</i> | 2.25. |
| <i>Scorpioides</i> | 4.171 | <i>Silybum</i> | 4.140 |
| <i>Scorpius marinus</i> | 2.11 | <i>Sinapi</i> | 2.146 |
| <i>Scorpius</i> | 2.10 | <i>Sion</i> | 2.120 |
| <i>Scorpij ictus, notæ, curatio</i> | 6. | <i>Sifer</i> | 2.106 |
| 38.40 | | <i>Sifon</i> | 3.53. |
| <i>Securidaca</i> | 3.124 | <i>Sisymbrium utrunque</i> | 2.121 |
| <i>Sedum magnum</i> | 4.77 | <i>Smarides pisces</i> | 2.26 |
| <i>Selenites lapis</i> | 5.93 | <i>Smilax hortensis</i> | 2.140 |
| <i>Selinusia terra</i> | 5.94 | <i>Smilax arbor</i> | 4.68.6. |
| <i>Semperuiuum maius</i> | 4.77 | 12.68 | |
| <i>Semperuiuum minus</i> | 4.77 | <i>Smilax aspera</i> | 4.127 |
| <i>Senecla anguuum</i> | 2.16 | <i>Smilax lauis</i> | 4.128 |
| <i>Senecio</i> | 4.82 | <i>Smyris lapis</i> | 5.93 |
| <i>Sepia</i> | 2.19 | <i>Smyrnion</i> | 3.63 |
| <i>Seps</i> | 2.57 | <i>Solanum hortense</i> | 4.61 |
| <i>Seris</i> | 2.125 | <i>Solanum manicum</i> | 4.63 |
| <i>Serpillum</i> | 3.37 | <i>Solanum somniferum</i> | 4.62 |
| <i>Sertula campana</i> | 3.39 | <i>Sonchus</i> | 2.124 |
| <i>Serum Lactis</i> | 2.62 | <i>Sorba</i> | 1.135 |
| <i>Sesama</i> | 2.91 | <i>Sory</i> | 5.68 |
| <i>Sesamoides</i> | 4.135 | <i>Sparganion</i> | 4.19 |
| <i>Seseli</i> | 3.51 | <i>Spartion</i> | 4.139 |
| <i>Seseli Aethiopicum</i> | 3.51 | <i>Spondylion</i> | 3.72 |
| <i>Seseli Creticum</i> | 3.52 | <i>Spina acuta</i> | 1.104 |
| <i>Seseli Peloponnense</i> | 3.51 | <i>Spina alba</i> | 3.12 |
| <i>Sicyonium oleum</i> | 1.29 | <i>Spina Arabica</i> | 2.13 |
| <i>Sideritis</i> | 4.27 | <i>Spongiæ</i> | 5.85 |
| <i>Sidium</i> | 1.126 | <i>Spongiarum lapides</i> | 5.7. |
| <i>Siligo</i> | 2.83 | <i>Spuma Argenti</i> | 5.52 6.72 |
| <i>Siliquæ</i> | 1.129 | <i>Spuma Nitri</i> | 5.78 |
| | | <i>Spuma Salis</i> | 5.75 |
| | | bb 2 | <i>Squam</i> |

INDEX

| | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|-------|
| <i>Squamma eris</i> | 5.44 | <i>Testis</i> | 5.94 |
| <i>Squāma ex acie decussa</i> | 5.44 | <i>Testiculus canis</i> | 3.121 |
| <i>Stachys</i> | 3.101 | <i>Teucrion. Teucris</i> | 3.93 |
| <i>Stacle</i> | 1.61 | <i>Thalassomeli</i> | 5.10 |
| <i>Staphis agria</i> | 4.137 | <i>Thaliētron</i> | 4.83 |
| <i>Stibium</i> | 5.49 | <i>Thapsia</i> | 4.138 |
| <i>Stimmi</i> | 5.49 | <i>Thlaspi</i> | 2.148 |
| <i>Stæbe</i> | 4.10 | <i>Thracias lapis</i> | 5.93 |
| <i>Stæchas</i> | 3.27 | <i>Thunnus</i> | 2.29 |
| <i>Stomoma</i> | 5.44 | <i>Thus</i> | 1.69 |
| <i>Stratiotes</i> | 4.87 | <i>Thuris cortex</i> | 1.70 |
| <i>Stratiotes Millefoliū</i> | 4.88 | <i>Thuris fuligo</i> | 1.72 |
| <i>Strigmenta balnearum</i> | 1.30 | <i>Thuris manna</i> | 1.71 |
| <i>Strigmenta gymnasiōrū</i> | 1.30 | <i>Thyites Lapis</i> | 5.93 |
| <i>Strigmenta palaestrica</i> | 1.30 | <i>Thymalea</i> | 4.154 |
| <i>Strobili</i> | 1.73 | <i>Thymoxalme</i> | 5.14 |
| <i>Struthion</i> | 2.155 | <i>Thymus</i> | 3.35 |
| <i>Styrax</i> | 1.67 | <i>Tilia</i> | 1.108 |
| <i>Suillus adeps</i> | 2.68. | <i>Tithymali</i> | 4.146 |
| <i>Suillus Pulmo</i> | 2.35 | <i>Torpedo piscis</i> | 2.14 |
| <i>Sulphur</i> | 5.73 | <i>Toxicon</i> | 6.20 |
| <i>Sycomorus</i> | 1.43 | <i>Tragacantha</i> | 3.20 |
| <i>Symphiton</i> | 4.8. | <i>Tragium</i> | 4.40 |
| T <i>Amarix</i> | 1.198 | <i>Tragoriganum</i> | 3.29 |
| <i>Taxus</i> | 4.68.6.12 | <i>Tragos</i> | 2.85 |
| <i>Taurorum pingua</i> | 2.68 | <i>Tribulus</i> | 4.13 |
| <i>Telephion</i> | 2.178 | <i>Trichomanes</i> | 4.121 |
| <i>Tellina</i> | 2.5 | <i>Triphyllon</i> | 3.104 |
| <i>Terebinthus</i> | 1.75 | <i>Tripolion</i> | 4.119 |
| <i>Terra</i> | 5.94 | <i>Trissago</i> | 3.94 |
| <i>Terra fornacum</i> | 5.94 | <i>Triticum</i> | 2.77 |
| | | <i>Tuber</i> | |

INDEX

| | | | |
|-------------------------------|-------|--------------------------------|--------------|
| <i>Tuber</i> | 2.139 | <i>Vinum Cydonites</i> | 5.18 |
| <i>Tussilago</i> | 3.107 | <i>Vinum Daucites</i> | 5.39 |
| <i>Typha</i> | 5.113 | <i>Vinum Diſſamnites</i> | 5.36 |
| V <i>Enenata</i> | 6.34 | <i>Vinum ex Fœniculo</i> | 5.39 |
| <i>Venerisumbilicus</i> | 4. | <i>Vinum è Flore Salis</i> | 5.39 |
| 78. | | <i>Vinum Heleborites</i> | 5.39 |
| <i>Veratrum album</i> | 4.133 | <i>Vinum Hyſſopites</i> | 5.35 |
| <i>Veratrum nigrum</i> | 4.134 | <i>Vinum ex Iride</i> | 5.38 |
| <i>Verbascum</i> | 4.89 | <i>Vinum Juniperinum</i> | 5.32 |
| <i>Verbenaca</i> | 4.50 | <i>Vinum Lentiſſinum</i> | 3.27 |
| <i>Vermes terreni</i> | 2.59 | <i>Vinum Mandragorites</i> | 5.39 |
| <i>Vesparum ietus curatio</i> | 6.40 | <i>Vinum Marathrites</i> | 5.39 |
| <i>Vini natura</i> | 5.5 | <i>Vinum marinum</i> | 5.17 |
| <i>Vinum Abſinthites</i> | 3.23. | <i>Vinum è Marrubio</i> | 5.36 |
| 5.34 | | <i>Vinum Melites</i> | 5.18 |
| <i>Vinum Acorites</i> | 5.39 | <i>Vinum Melitites</i> | 5.6 |
| <i>Vinum Adynamon</i> | 5.5 | <i>Vinum Melomeli</i> | 5.18 |
| <i>Vinum Album</i> | 5.5 | <i>Vinum è Myrrha</i> | 5.38 |
| <i>Vinum Anethinum</i> | 5.39 | <i>Vinum Myrſinites</i> | 5.26 |
| <i>Vinum Apytes</i> | 5.21 | <i>Vinum Myrtites</i> | 5.25. |
| <i>Vinum Aromatites</i> | 5.37 | <i>Vinum è Nardo ſylueſtri</i> | 5. |
| <i>Vinum Aſarites</i> | 5.38 | 38. | |
| <i>Vinum è Betonica</i> | 5.36 | <i>Vinum Neſſarites</i> | 5.38 |
| <i>Vinum Bunites</i> | 5.36 | <i>Vinum Oenanthinum</i> | 5.22 |
| <i>Vinum Calaminthites</i> | 5.36 | <i>Vinum Omphacites</i> | 5.5 |
| <i>Vinum Catorchites</i> | 5.29 | <i>Vinum Origanites</i> | 5.36. |
| <i>Vinum Cedrinum</i> | 5.32 | <i>Vinum Palmeum</i> | 5.28 |
| <i>Vinum Cedrites</i> | 5.32 | <i>Vinum Panacites</i> | 5.39 |
| <i>Vinum Ceſtrites</i> | 5.36 | <i>Vinum Phthorium</i> | 5.39 |
| <i>Vinum Chamædrytes</i> | 5.36 | <i>Vinum Picatum</i> | 5.33 |
| <i>Vinum è Chamælea</i> | 5.39 | <i>Vinum Pincum</i> | 5.32 |
| | | bb 3 | <i>Vinum</i> |

INDEX

| | | | |
|---|-------|---------------------------|----------|
| <i>Vinum</i> è <i>Pipere</i> | 5.38 | <i>Vlmus</i> | 1.94 |
| <i>Vinum</i> <i>resinatum</i> | 5.30 | <i>Vmbilicus Veneris</i> | 4.78 |
| <i>Vinum</i> <i>Rhodites</i> | 5.24 | <i>Vnguentorum ratio</i> | 1.40 |
| <i>Vinum</i> <i>Rhætes</i> | 5.23 | <i>Vng. Abrotoninum</i> | 1.48 |
| <i>Vinum</i> <i>Saluiatum</i> | 5.39 | <i>Vng. Amaricimum</i> | 1.56 |
| <i>Vinum</i> è <i>Satureia</i> | 5.36 | <i>Vng. Anethinum</i> | 1.49 |
| <i>Vinum</i> <i>Scammonites</i> | 5.39 | <i>Vng. Cinnamoninum</i> | 1.62 |
| <i>Vinum</i> <i>Scillinum</i> | 5.16 | <i>Vng. Crocinum</i> | 1.52 |
| <i>Vinum</i> <i>Stachadites</i> | 5.36 | <i>Vng. Cyprinum</i> | 1.53.106 |
| <i>Vinum</i> <i>Strobilites</i> | 5.31 | <i>Vng. Elatinum</i> | 1.42 |
| <i>Vinum</i> è <i>Sycomoris</i> | 5.29 | <i>Vng. Gleucinum</i> | 1.55 |
| <i>Vinum</i> è <i>Syriaca Nardo, Cel-</i> | | <i>Vng. Hedycroon</i> | 1.58 |
| <i>tica, Malabathro</i> | 5.38 | <i>Vng. Irinum</i> | 1.54 |
| <i>Vinum</i> <i>Terebinthinum</i> | 5. | <i>Vng. Malabathrinum</i> | 1.64 |
| | 2.7 | <i>Vng. Megalinum</i> | 1.57 |
| <i>Vinum</i> <i>Thymites</i> | 5.36 | <i>Vng. Melinum</i> | 1.43 |
| <i>Vinum</i> è <i>Thymelæa</i> | 5.39 | <i>Vng. Mendesium</i> | 1.60 |
| <i>Vinum</i> <i>Tragoriganites</i> | 5.35 | <i>Vng. Metopium</i> | 1.59 |
| <i>Viola alba</i> | 3118 | <i>Vng. Narcissinum</i> | 1.51 |
| <i>Viola purpurea</i> | 4.107 | <i>Vng. Nardinum</i> | 1.63 |
| <i>Viperæ iclus, notæ, curatio</i> | 6. | <i>Vng. Ocimum</i> | 1.47 |
| | 38.40 | <i>Vng. Oenanthinum</i> | 1.44 |
| <i>Viperinæ carnes</i> | 2.15 | <i>Vng. Rosaceum</i> | 1.41 |
| <i>Virulentorum icluum curatio</i> | | <i>Vng. Sampsuchinum</i> | 1.48 |
| | 6.39 | <i>Vng. Susinum</i> | 1.50 |
| <i>Viscum</i> | 3.85 | <i>Vng. Telinum</i> | 1.45 |
| <i>Vitex</i> | 1.115 | <i>Vnguis odoratus</i> | 2.7 |
| <i>Vitis alba</i> | 4.163 | <i>Vrina</i> | 2.73 |
| <i>Vitis nigra</i> | 4.164 | <i>Vrsinus adeps</i> | 2.68 |
| <i>Vitis sylvestris</i> | 4.162 | <i>Vrtica</i> | 4.79 |
| <i>Vitis vinifera</i> | 5.1. | <i>Vua</i> | 5.2 |
| | | <i>Vua</i> | |

INDEX

Vulpinus pulmo

X *Anthion*
Xiris

2.35

4.122

4.20

Z

7 Ea, seu semem 2.81

L. Zopissa 1.81

Zytum 2.79

FINIS.

66 4

Sinco al Sr. Joseph Jeronimo
de Cananora, Cananora

INDEX

*Rerum que in scolys
continentur, sinigno-
rum, Elenchus.*

A Brotani, & Absinthij
facultates diuersæ pag.

349

Absinthij discerniculū 348

Acacie discerniculum 109

Acanthi discerniculum 339

Acanthi, à carduo Benedicto
differentia 337

Achillea, à Stratiote

Millefolio diuersa 502

Acinos, ab Ocymo Caryophyl
lato diuersus 369

Acorus, à Galanga differt 9

Acorus, in lituania nascitur 9

Acorus, quid hodie 9

Acomiti discerniculum 541

Aconitum. 3. ab herba Paris
diuersum 541

Adipis omnis discerniculum
197

Adianti discerniculum 585

Aegilops, ab Avena differt
586

Aethiopis, ignota 90

Agallochi natales 31

Agarici natales 319

Agerati natales 519

Agni facultas 110

Anga quid, & quæ falso
eius nomen usurpent 471

Alabastritis discerniculū 719

Alceæ discerniculum 463

Alcibiadi facultas 494

Alcyonij discerniculum 709

Alismæ notitiæ uarietas, eiusq;
cū plātāg. aquat. diu. 466

Aloe facultas 345

Alsines facultas 550

Alibææ facultas 463

Aluminis discerniculū 699

Alyssi dubia noticia 414

Amaraci discerniculum 366

Ambrosiæ natales 434

Ambrosia Of. Polemo. 434

Ammi ignotum 386

Ammoni delectus 410

Amomi à Rosa D. Mariæ di-
uersitas 24

Ampeloprasii natales 281

Amphisbenæ uenē cura. 730

Amurcæ facultas 114

Amygdalarū ama. facu. 133

Amyli discerni. & fac. 222

Anagallis ab Auricula mu-
ris diuersa 309

Anagyris pictura, & facul-
tas 465

Anchusarum discer. 493

Andro

INDEX

| | | | |
|---------------------------------------|-----|--|-----|
| <i>Androsaces ignota</i> | 450 | <i>Aqua è floribus Myrti</i> | 123 |
| <i>Androseni discerniculū</i> | 469 | <i>Aqua è limonibus</i> | 128 |
| <i>Anemone, Papauer sylvestre,</i> | | <i>Aqua è folijs Arbuti</i> | 132 |
| <i>diuersa</i> | 307 | <i>Aqua è stercore humano</i> | 103 |
| <i>Anethi facultas</i> | 383 | <i>Arabici lapidis notæ</i> | 717 |
| <i>Anguium senectus, quid</i> | 155 | <i>Araneorum genera.</i> | 180 |
| <i>Anonis, Resta bonis idē</i> | 340 | <i>Arbuti discerniculum</i> | 132 |
| <i>Anonidis uires</i> | 340 | <i>Arcij facultas</i> | 565 |
| <i>Anthemidis discerniculū, &</i> | | <i>Arctij discerniculum</i> | 565 |
| <i>facultas</i> | 454 | <i>Argemone, ab Agrimonia</i> | |
| <i>Anthyllidis dubia notio</i> | 452 | <i>diuersa.</i> | 307 |
| <i>Antidotus Theriacalis Mat-</i> | | <i>Argenti recrementi discerni-</i> | |
| <i>thioli</i> | 733 | <i>culum</i> | 682 |
| <i>Anthipathis Coral. not.</i> | 712 | <i>Argenti spumæ discer.</i> | 684 |
| <i>Antirrhini natales, & fa-</i> | | <i>Argenti uui discerniculū</i> | 691 |
| <i>cultas</i> | 581 | <i>Arisari natales</i> | 297 |
| <i>Aparines facultas</i> | 414 | <i>Aristolochiæ longæ & rotun-</i> | |
| <i>Aphaces discerniculum</i> | 142 | <i>dæ natales</i> | 326 |
| <i>Apiastri facultas</i> | 425 | <i>Aristolochiæ Clematidis non</i> | |
| <i>Apios ubi nascatur</i> | 622 | <i>comperta notio.</i> | 325 |
| <i>Apij discerniculum</i> | 390 | <i>Armenij lap. notæ</i> | 687 |
| <i>Apocynon ignota</i> | 543 | <i>Arimixtura</i> | 297 |
| <i>Aqua quintessentialis Mat-</i> | | <i>Arrhenogonon, Theligonon,</i> | |
| <i>thioli</i> | 732 | <i>Phyllon, Mercurialis, idem</i> | |
| <i>Aqua ex Aro</i> | 297 | <i>444</i> | |
| <i>Aqua è Gentiana</i> | 321 | <i>Artemisiarum discerniculum</i> | |
| <i>Aqua è floribus Myrti</i> | 123 | <i>433</i> | |
| <i>Aqua Flammolæ Ital</i> | 480 | <i>Asari discerniculum</i> | 18 |
| <i>Aqua è floribus Sābuci</i> | 618 | <i>Asclepiadis ab Hedera terre-</i> | |
| <i>Aqua è flore Dictamni Italici</i> | | <i>stri, & Vincetoxico discer-</i> | |
| <i>357</i> | | <i>niculum</i> | 425 |
| | | <i>Ascy</i> | |

INDEX

| | | | |
|---|------|---|-----|
| <i>Ascyri discerniculum</i> | 469 | <i>lum</i> | 82 |
| <i>Asij lap. nota</i> | 713 | <i>Blattarū discerniculum</i> | 166 |
| <i>Aspalathi à Rhodio ligno di-</i> | | <i>Bliti discerniculum</i> | 243 |
| <i>uersitas</i> | 29 | <i>Botrys discerniculum</i> | 435 |
| <i>Asparagorum facultas</i> | 255 | <i>Brassica discerniculum & fa-</i> | |
| <i>Aspleni discerniculum</i> | 451 | <i>cultas</i> | 248 |
| <i>Aspidis ueneni animaduersio</i> | | <i>Britanica à Bistorta discernicu-</i> | |
| <i>Asteris discerniculum</i> | 574 | <i>lum</i> | 474 |
| <i>Astragali discerniculū</i> | 521 | <i>Buglossi discerniculum</i> | 579 |
| <i>Astrictio in Dioscoride, pro a-</i> | | <i>Bulbi esculentus & uomito-</i> | |
| <i>crimonia</i> | 197 | <i>rius ignoti</i> | 300 |
| <i>Atrachylidis à Cartamo syl-</i> | | <i>Buny natales</i> | 570 |
| <i>uestri diuersitas</i> | 416 | <i>Buprestis ueneni animaduersio</i> | |
| <i>Atriplicis facultas</i> | 245 | <i>Buphthalmi discerniculū</i> | 455 |
| <i>Auellanae nucis discerni.</i> | 136 | <i>Butyri facultas</i> | 188 |
| <i>Auena facultas</i> | 216 | C <i>acalia ignota</i> | 576 |
| <i>Auripigmenti ratio</i> | 699 | <i>Cadmia animaduersio</i> | |
| <i>Auripigmenti ueneni animad-</i> | | | 668 |
| <i>uersio</i> | | <i>Cacilia ueneni cautio.</i> | 707 |
| B <i>accharis ab Asaro &</i> | | <i>Calamintha animaduersio</i> | |
| <i>Caprifolio discerni.</i> | 369 | | 361 |
| <i>Balaustij discerniculum</i> | 122. | <i>Calcis uinae animaduersio</i> | |
| <i>Ballote discerniculū</i> | 424 | <i>Calcanthi discerniculum</i> | 693 |
| <i>Balsami discerniculum</i> | 29 | <i>Cancami discerniculum</i> | 32 |
| <i>Barbulae Hirci facultas</i> | 274 | <i>Canis rabidi uenenum & cau-</i> | |
| <i>Basilisci ueneni animaduersio</i> | | <i>tio.</i> | |
| <i>Bdelyi discerniculum</i> | 64. | <i>Cannabini se. uires</i> | 464 |
| <i>Betae discerniculum</i> | 250. | <i>Cantharidum ueneni cautio.</i> | |
| <i>Betonicae discerniculum</i> | 474. | | 738 |
| <i>Bituminis, Pissasphaltis, Mu-</i> | | <i>Capparum facultas</i> | 303 |
| <i>niae, Naphthae discernicu-</i> | | <i>Cardamomi discerniculum</i> | 13 |
| | | <i>Car</i> | |

INDEX

| | | | |
|---|------|--|-----|
| <i>Carduorū discerniculum</i> | 336 | <i>Chamaleonis nigri discernicu- lum</i> | 332 |
| <i>Carpasi succi cautio.</i> | 746 | <i>Chamæpeuce discernicu.</i> | 578 |
| <i>Cari facultas</i> | 383 | <i>Chamelææ & Thymelææ di- scerniculum</i> | 618 |
| <i>Casæi discerniculum</i> | 182 | <i>Chrysanthemi discerniculum</i> | 518 |
| <i>Cassia & Cinnamomi discer- niculum</i> | 23 | <i>Chrysocollæ discerniculū</i> | 686 |
| <i>Castanearum facultas</i> | 116 | <i>Chrysocome obscura noticia</i> | 516 |
| <i>Castorei discerniculum</i> | 160 | <i>Chrysogonon ignota</i> | 516 |
| <i>Catanance ignota</i> | 582 | <i>Cicadarum discerniculū</i> | 172 |
| <i>Caucalis discerniculū</i> | 270 | <i>Ciceris discerniculum</i> | 225 |
| <i>Cedri discerniculum</i> | 88 | <i>Cicutæ discerniculum</i> | 542 |
| <i>Celticæ Nardi discerniculum</i> | 16 | <i>Cicutæ ueneni cautio.</i> | 745 |
| <i>Cenchri ueneni cautio</i> | | <i>Cimicum facultas</i> | 165 |
| <i>Centaurij maioris discernicu- lum</i> | 327 | <i>Cinnabaris animaduersio</i> | 689 |
| <i>Centaurij minoris discer.</i> | 329 | <i>Circeæ ignota</i> | 438 |
| <i>Cepææ discerniculum</i> | 465. | <i>Cirsij discerniculum</i> | 573 |
| <i>Ceræ facultas</i> | 208 | <i>Cisti discerniculū</i> | 103 |
| <i>Cerasiorū discerniculum</i> | 124 | <i>Clematidis utriusque discerni- culum</i> | 480 |
| <i>Cerastæ ueneni cautio</i> | | <i>Clinopodij facultas</i> | 417 |
| <i>Cerui genitalis uires</i> | 167 | <i>Clymenum ignotum</i> | 485 |
| <i>Cerui cornu, & ossis Cerui- ni discerniculum</i> | 176 | <i>Cnici discerniculum</i> | 632 |
| <i>Cerussæ animaduersio</i> | 743 | <i>Cochlearum discerniculum</i> | 150 |
| <i>Chalcitis animaduersio</i> | 696 | <i>Cerulei animaduersio</i> | 687 |
| <i>Chamæcissi discerniculum</i> | 577 | <i>Colchici discerniculum</i> | 547 |
| <i>Chamadaphnes discerniculum</i> | 592 | <i>Colocynthidis facultas</i> | 623 |
| <i>Chamaleonis albi discer.</i> | 329 | <i>Coni</i> | |

INDEX

- Conizæ* discerniculum 439. *Elaphobosci* discerniculū 339.
Corallij animaduersio 711. *Elaterij* discerniculum 600.
Coriadrifacultas 387.744 *Elæomeli* ratio 40.
Corni discerniculum 130. *Electuariū* in uenena 739.
Cratæogonon ignotum 443. *Elichrysi* discerniculum 517.
Crithymi discerniculū 258. *Empetri* dubia noscitur. 622.
Croci facultas 34. *Emphemeris* ueneni cau. 742
Cucurbitarum discerniculum *Epimedium* ignota 490.
264. *Equiseti* utriusq; discerni. 511.
Cucumeris syl. discerniculum *Ericæ* dubia noscitatio 96.
600. *Erui* discerniculum 233.
Cupressi discerniculum 84. *Eryngij* discerniculum 343.
Cyniæ discerniculum 633. *Erysimi* discerniculum 287.
Cynoglosson, *Lycopsis* diuersa. *Eupatorij* discerniculum 506.
579. *Euphorbij* facultas 408.
Cypiri discerniculum 12. **F** *Abarum* facultas 227.
Cytisi discerniculum 569. **F** *Fabæ* *Aegyptiæ* nat. 228
D *Auci* discerniculū 395 *Felis* discerniculum 200.
Dictamni discerniculum *Ferri* rubig. animaduer. 677.
lum 357. *Fernæ* discerniculum 401.
Dipsadis ueneni cautio. 788 *Filicis* discerniculum 629.
Dorycnij dubia noscitatio 537 *Filiculæ* discerniculum 630.
Dorycnij ueneni cautio. 788 *Fœniculi* discerniculum 394.
Drabæ dubia noscitatio 286. *Fœmigræci* facultas 225.
Draco. mar. discerniculū 152. *Fraxini* discerniculum 90.
Drac. mar. ue. cautio. 788 *Fumariæ* discerniculum 567.
Dryopteris discerniculū 630. *Fungorum* discerniculū 545.
E *Beni* discerniculū 105. *Fungorū* ue. cautio. 754.
Eboris discerniculū 175. **G** *Agatis & Galaetidis*
Echini discerniculum 144. *lapidū* animaduersio.
Echij discerniculum 495. *Gally* discerniculum 557.
Galio

INDEX

- Galiopsis discerniculum* 556. *Hyacinthi discerniculū* 522.
Gentianæ discerniculum 323. *Hyoscyami discerniculū* 532.
Gentianæ spēs, Cruciata 323. *Hipocri discerniculum* 530.
Gerani discerniculum 436. *Hyssopi discerniculum* 350.
Gingiberis discerniculū 289. **I**ndicatio 688.
Gingidy à Chærefolio diuer-
sitas 268. *Intybi & Condrillæ descri-*
ptio 262.
Gith discerniculum 403. *Iridis discerniculum* 7.
Gladioli discerniculum 491. *Iunci discerniculum* 514.
Glandis unguentariæ discerni-
culum 605. *Iunci odorati discerniculū* 26.
Glauy facultas 411. *Iuniperi discerniculum* 85.
Glaux dubie noscitur 587. *Ixia uen. cautio.* 752.
Glutinātia metallica 412. **L**abri Veneris discerni-
culum 333.
Graminis discerniculū 498. *Lactis ratio* 185.
Halicæ ueterū rō. 217. *Lactis coagulati uen. cau.* 756
Halimi dubia nosci. 98 *Lacertarū discerniculum* 131.
Heleny facultas 35. *Lagopi discerniculum* 489.
Heliotropy discerniculū 635. *Lampsanæ discerniculū* 108.
Hellebori discerniculum 596. *Lanariæ herbæ à Saponaria*
discerniculum 292.
Helxines utriusque discernicu-
lum 504. *Lapathi discerniculum* 241.
Hemerocallis discerni. 340. *Laserpity discerniculum* 405.
Hemionitidis discernic. 452. *Laueris discerniculum* 256.
Herbæ Sabinae discernicu. 86. *Lemniæ terræ animaduersio*
Hippocāpi discerniculū 145. 692.
Hippoglossi discernicu. 580. *Lentis discerniculum* 230.
Hippopotami delinatio 158. *Lentisci descriptio & facul-*
tas 74.
Hirudinis ue. cautio. 761. *Ligusticum à Leuistico differt*
Hordei discerniculum 212. 377.
Hormini discerniculū 447.

Limo

INDEX

| | | | |
|--|------|--|-----|
| <i>Limonij dubia noscitur.</i> | 488 | <i>Mustellæ discerniculū</i> | 161 |
| <i>Lithospermi discerniculū</i> | 459 | <i>Myricæ discerniculum</i> | 95 |
| <i>Lolium, Pseudomelanthium di</i> | | <i>Myrrhæ discerniculum</i> | 65 |
| <i>uersa</i> | 221. | <i>Myrrhis ab Angeli. di.</i> | 571 |
| <i>Lonchitis discerniculū</i> | 461 | <i>Myrti discerniculum</i> | 123 |
| <i>Lychnidis uaria noscitur.</i> | 422 | N <i>Arcisii, discerniculum</i> | 606 |
| <i>Lysimachia discerniculū</i> | 76 | <i>Nardi discerniculum</i> | 15 |
| M <i>Aceris discerniculum</i> | 91. | <i>Natricis uen. cautio.</i> | 789 |
| <i>Malabathri discerniculū</i> | 20 | <i>Nery discerniculum</i> | 544 |
| <i>Maluæ discerniculum</i> | 244 | <i>Nymphææ discerniculū</i> | 449 |
| <i>Matronæ discerniculū</i> | 228 | O <i>Chræ discernicu.</i> | 689 |
| <i>Mandragoræ discernicu.</i> | 539 | <i>Ocimasri discerniculū</i> | 496 |
| <i>Mandragoræ uen. cautio.</i> | 748 | <i>Oenanthe à Filipendula diuer</i> | 439 |
| <i>Marcoris Guayaci ures</i> | 93 | <i>sa</i> | |
| <i>Mari discerniculum</i> | 368 | <i>Onichis discerniculum</i> | 7 |
| <i>Meconij uen. cautio.</i> | 749 | <i>Oleum Theriacale Matthioli</i> | 734 |
| <i>Medij dubia noscitatio</i> | 489 | <i>Origani discerniculum</i> | 355 |
| <i>Medullarū discerniculū</i> | 198 | <i>Ornithogali discerniculū</i> | 274 |
| <i>Mellis discerniculum</i> | 206 | <i>Ouorū discerniculum</i> | 171 |
| <i>Mellis Heracly. cautio.</i> | 743 | P <i>Acomia discernic.</i> | 457 |
| <i>Meliloti discerniculum</i> | 367 | <i>Paliuri uaria noscitur.</i> | 98 |
| <i>Mei discerniculum</i> | 10 | <i>Palma discerniculum</i> | 120 |
| <i>Mespili discerniculum</i> | 129 | <i>Panaces discerniculum</i> | 376 |
| <i>Millesolij discerniculum</i> | 571 | <i>Papaueris discerniculum</i> | 527 |
| <i>Misy, Melantheria, Sory discer-</i> | | <i>Papyri arb. facies</i> | 94 |
| <i>niculum</i> | 696 | <i>Parthenij discerniculum</i> | 455 |
| <i>Molybdana, Stimmi, Plumbi,</i> | | <i>Pastinacæ discerniculum</i> | 379 |
| <i>et ei cognatorum discer-</i> | | <i>Peucedani Off. adult.</i> | 402 |
| <i>niculum</i> | 681 | <i>Phylli</i> | |
| <i>Mori discerniculum</i> | 137 | | |

INDEX

| | | | |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----|
| Phyllitidis discerniculum | 426 | Salis floris, spumæ, Nitri ratio. | |
| Pini discerniculum | 72 | Sambuci discerniculum | 618 |
| Piperis deliniatio | 288 | Sandarachæ ratio | 699 |
| Pithyusæ discerniculum | 613 | Sandarachæ uen. cautio. | 758 |
| Plantaginis discerniculū | 255 | Sardonie ueneni cautio. | 746 |
| Polemoniæ discerniculū | 481 | Satyriones uix agnoscuntur | |
| Polygonati discerniculū | 479 | | 447 |
| Polygoni discerniculum | 477 | Scyllæ discerniculum | 302 |
| Pompholygis & Thutia ratio | 671 | Semperuui discerniculum | 552 |
| Populi discerniculum | 91 | Seseli discerniculum | 381 |
| Propolis discerniculum | 208 | Sideritis discerniculum | 499 |
| Psyllij discerniculū | 744.533 | Siliquarum discerniculum | 125 |
| Purpurarum descriptio | 146 | Siseris discerniculum | 239 |
| Pyrethri discerniculum | 397 | Sisymbrij discerniculum | 257 |
| Pyritis discerniculum | 714 | Smilax aspera & leuis, quid | |
| Q Vinquesolij 4. species | 508 | | 589 |
| Quinquesolij à Tormentilla diuersitas | 508 | Smyrniij discerniculum | 392 |
| R Ecrementi argenti ratio | 682 | Solani discerniculum | 535 |
| Resinarū discerniculum | 77 | Sparganion à Cotula fœtida diuersum | 491 |
| Rhapōtici discerniculum | 320 | Sphragis ægos & Lemnia tera idem | 692 |
| Rhamni discerniculum | 97 | Spumæ argenti ratio | 684 |
| Rhodie rad. discerniculū | 509 | Squamarum aris & ferri uires | 674 |
| Rubiginis & Aeruginis ratio | 677 | Stæchadis discerniculum | |
| Rubi discerniculum | 503 | | 352 |
| S Rubetæ uen. cautio. | 760 | Styracis discerniculum | 66 |
| Agapeni discerni. | 407 | Sulphuris discerniculum | 702 |
| | 483 | Symphiti discerniculum | |

Taxi

INDEX

- T** *Axi uen. cautio.* 745. *Tripolij animaduersio* 583.
Telephium, fabaria di- *Trissaginis discerniculū* 420.
uersa 316. *Tussilaginis discerniculū* 432.
Terebinthi discerniculum 75. *Typha animaduersio* 437.
Testiculorum canis discernicu- **V** *Eneni à cibo diuersi-*
lum 447. *tas* 730.
Tencrū uarie noscitur 419. *Venenorum è quattuor quali-*
Thapsie discerniculum 603. *tatibus notæ* 731.
Thlaspī, Bursa pastoria diuer- *Venenatorū aliquot remedia.*
sa 285. *Verbasci discerniculum* 563.
Thracij lapi. Gagatis, & alio *Veneni à cane rabido cautio.*
rum discerniculum 719. *Primarū animaduersio* 203.
Thunnorum delinatio 164. *Vux passæ animaduersio* 665.
Thuris animaduersio 70. **X** *Iphij discerniculum*
Tihymalorum discerniculum 491.
612. *Xiridis animaduersio* 492.
Toxici uene. cautio. 751. **Z** *Ea, Spelta idē* 414.
Tragacanthæ discerniculum *Zopissæ, & Picis ra-*
341. *tio.* 80.
Tribuli discerniculum 487.
Trifolij discerniculum 429.

FINIS.


PEDANII DIO

SCORIDIS ANAZAR

bei, de medicinali materia Libri primi.

Præfatio IO. RVELLIO Sues-
sionensi Interprete.

*Huic præfationi & toto operi appositæ adnota-
tiones & doctæ, & compendiosæ.*



QUANTUM amicissime Arce,
complures non ueterum modo, sed recen-
tiorum quoque de medicamentorum com-
positione, uiribus atq; probatione comen-
tati sunt nobis tamē nec uanum, nec à ra-
tione abhorrētem impetum animi ad hoc
opus incesisse, tibi ostendere tentabimus: quòd eorum nonnulli
absolutum nihil adiderunt, alij quàm plurima, quæ auditu per-
cunctando didicerant, scriptis tradiderunt. Siquidem Buhynus
Iolas & Heraclides Tarētinus, omīssa prorsus herbarum tra-
datione, rem sanē quàm paucis perstrinxerunt. Neq; uerò om-
nes illi de metallicis quicquam rebus aut odoramētis memoriæ
prodiderunt. Crateuas autem herbarius, & Andreas medi-
cus, qui ceteris diligentius hac in parte uersati uidentur, radices
multas apprimē utileis, herbasq; haudquaquam adnotatas, re-
liquerunt. Veruntamen priscorum subscribere oportet senten-
tias: quos, etsi pauca ipsis referantur accepta, magnam tamē im-
pendisse diligentiam constat. Iunioribus minus assentiendum: è
quibus Iulius Cassus, & Niceratus, & Petronius Niger, &
Diodorus, Asclepiada omnes, medicinalem materiam uerna-
culane

culam cognitamq; nullo dignam censuerunt quæ ab ipsis literis
 exacte mandaretur: & ut medicamentorum vires probatio-
 nesq; cursim complexi, sic nullo experimēto eorum effectus col-
 ligentes, inani uero reddendarum causarum studio uerba fun-
 dentes, alia pro alijs scriptitando, rem in aceruum congeriemq;
 controuersiarum exulerunt. Siquidem qui inter eos egregius ha-
 betur Niger, euphorbium, nascentis in Italia chameleæ, succum
 esse contendit: androsamon. q; eandem herbam cum hyperico
 esse: quinetiam aloen in Indæa fossilem nasci, & pleraq; his si-
 milia exponit, reclamante euentia, quæ prorsus ueritati refra-
 gantur. Quibus coniectura colligi potest, ea nō oculata fide, sed
 narratione potius ab alijs accepisse. In ordine idem ipsi aberrarunt,
 partim eorum discrepantes, nullaq; cognatione cōiunctas
 uires collidentes: partim per elementa literarum scripta in ordi-
 nem digerentes, quò facilius memoria mandarentur, genera
 & eorum effectus à sua cognitione disiungentes. Nos uero ab
 ineunte, ut ita dicam, iuuenta, iugi desiderio cognoscendæ ma-
 teriæ allecti, permultis regionibus peragratis (nec enim nescis
 nos militarem uitam exegisse) tuo hortatu commentationem in
 sex libros cōtulimus, quod opus tibi dicamus, Arce, animi gra-
 titudine obsequentes, ob eum quo nos prosequeris affectum. Et
 enim natura cum in oraneis eruditione excultos, tu uero in eos
 quibus cum tibi eiusdem artis necessitudo intercedit, pronus ad
 amicitiam esse soles: in nos etiam aliquanto peculiaris. Enim-
 uero non paruum præbet tuæ probitatis argumentum, optimi
 uiri Licinij Bassi singularis erga te amicitia: quam unā nobiscū
 degentes nouimus, cum mutuam inter uos beneuolentiam amu-
 latione dignam intueremur. Admonitum autē te uelim, eosq;
 qui in hocce commentarios incident, ne in uerbis facultatem no-
 stram aestimetis, sed potius adhibitam rebus cum peritia curam.
 Etenim plurima in ipsi exactissimè cognouimus: quādā etiam

ex ea

ex ea, de qua inter omnes conuenit, historia, percunctationeq;
rerum apud singulos uernacularum diligenter accepimus. Dabi-
mus igitur operam, ut differenti ab alijs ordine tradito, genera
medicinarum uiresq; describantur. Quod autem necessaria sit
medicamentorum ratio, nemo est ferme qui ignoret, & ea &
toti coniuncta sit, uniuersisq; eius partibus efficax administret
auxilium. Quare per medicamentorum compositiones atq; mi-
sturas, & facta in morbis pericula extendi, & incrementum
capessere potest, quam plurimum conferente singulorum medi-
caminum cognitione. Quinetia uernaculam familiaremq; ma-
teriam cōplectemur, ut perfecta sit, quæ a nobis relinquetur do-
ctrina. Verum imprimis curam impendere oportet, ut suis tem-
poribus singula & demetantur, & recondantur: certe pro ho-
rum ratione aut ualent uiribus, aut euamido nulloq; munere fur-
guntur. Serena igitur cœli cōstitutione demetenda sunt. Ma-
gni siquidem refert inter colligendum, si uel squalores uel im-
bres infesti sint: quemadmodum si loca, in quibus prodeunt, cli-
uosa, & uentis exposita sint & perflata, frigidaq; & aquis ca-
rentia: in his enim locis uires eorum longe ualidiores intelligun-
tur. Contrā, quæ in campestribus, riguis, & opacis, cateraq; lo-
cis à uento silentibus enascuntur, plerunque degenerant, & mi-
nus uiribus ualent: multoq; magis, si non suo tempore nec opor-
tunè colligantur, aut si per imbecillitatem intabuerint. Neque
ignorandum, saepe pro peculiari loci natura, aut anni clemētia,
maturius aut serius adulescere. Nonnulla propria ui, hyeme flo-
rent, & folia pariunt: quædā bis anno florifera. Quare cui in
animo est horum peritiam assequi, necesse est eum prima germi-
natione solo emergentibus, adultis & senescentibus adesse. Nā
qui pullulanti herba duntaxat adstiterit, adultam cognoscere
non potest: neque qui adultam tantum inspexerit, nuper erum-
pentem noscet. Quo fit, ut propter mutatam foliorum faciē, cau-

lium proceritates, florum seminisq; magnitudinem, et id genus alias peculiares notas, nonnulli, qui olim has rerum uarietates non perspexerunt, magno in errore uersentur. Quæ causa etiã nonnullis scriptoribus imposuit, qui herbas quasdam, uerbi gratia, gramen, quinq; folium, & tußilaginẽ emittere florem, fructum, & caulem, negant. Ergo qui sæpius ad uisendas herbas & earum natales se contulerit, earum cognitionem maxime consequetur. Scire etiamnum cõuenit, sola ex herbaceis medicaminibus Veratri genera, nigrum, inquã, & candidũ multis edurare annis: reliqua à trimatu inutilia. Quæ uerò fruticosæ sunt, sicut Stæchas, Frixago, Polium, Abrotonum, Seriphium, Absinthium, Hyssopum, & alia id genus semine prægnantia, demetantur. Flores quoque antea, quàm sponte sua decidat: fructus autem, ut maturi decerpantur necesse est: & semina, ubi ficcari cœperint, prius quàm defluant. Herbarum succus & foliorum elici debet, germinantibus tum primũ cauliculis. Lac & Lachrymæ excipiantur, inciso per summum adolescentiæ uigorem caule. Radices, & liquamenta, corticesue ut recondantur, eximere conuenit, cum herbæ suis folijs exuuntur. Siccantur etiam expurgatæ inibi, locis asperginem non redolentibus: sed quæ luto aut puluere sunt obsitæ, aqua elui debent. Flores & omnia quæ incundum odorem efflant, arculis tiliaceis, nullo si tu obduclis, reponantur. Nonnunquam charta aut folijs semina, ut perennent, aptè inuoluuntur. Liquidis medicaminibus densior materia, argentea, uitrea, aut cornea conuenit. Fictilis etiã, si modò rara non sit, accommodatur: & lignea, præsertim è buxo: sed ænea uasa ocularijs medicamentis liquidisq; & omnibus ijs quæ aceto, pice liquida, aut cedria componuntur. Adipem autem & medullas stagnæis uasis recondi conuenit.

Anno

ANNO TATIO IN PRAE- cedentem Dioscoridis Praefationem.

ENimuero cum summus ille, & in tractanda plantarum & medicinali materia omnium facile princeps Dioscorides, nil in hac praefatione praeceat eorum, quae generatim in plantis considerata sunt: hallucinari tamen (si Theophrasto aliter sentiendi credimus) videtur, qui dicat: Solae ex herbaceis medicaminibus veratri genera, nigrum & candidum, in multos perdurare annos, reliqua a trimatu inutilia. Longe alia est Theophrasti opinio, qui libro de Plantarum historia ix. in hanc scribit sententiam. Helleborum in triginta annos utilitatem producit: Aristolochia in quinque, vel sex. Vernilago nigra in quadraginta. Centaurea minor in decem aut duodecim, quod densa sit & crassa: Peucedanum in quinque aut sex: Vitis sylvestris vno perdurat anno, modo non friabilis evadat, ac in umbra seponatur, alias enim putrescet, & in totum reddetur inutilis. Idem eodem loco Elaterium, quae vetustius, eo melius esse scribit. Praeterea se à fide digno accepisse, qui assueveret ducentorum annorum Elaterium apud se habere, quod pretiosi vice monili acceperat. Quin & efficaciae fuisse singularis, causam asserit: Ingentem quae in ipso est humoris copiam, atque ob id cum inciditur in cinerem immitti. Huius rei testimonium esse, quod quinquaginta annorum, lucernae admotum eam nulla mora extinguat. Hac nec ignorasse Dioscoridem dicemus, nefas enim: nec ab ipso statim limine voluisse à Theophrasto dissentire, sed quod verosimilius violatum esse à librariis volumen eius Græcum: res non infrequens etiam in probatissimis authoribus. Quod si ita, ut vulgo legitur, scripsit, id sane cauit ne prodita à se multorum diuturnitate annorum, herbariorum bona pars (qui vani sunt & nugis vendundis geniti) imposturae ansam abriperet. Quod ab extrusis literis factitatum in Pharmacopolijs videmus, quae nec nomina, nec medicamentorum compositiones, nisi mancas & mutilas, atque adeo conspurcatas reddiderunt. Intantum in his expurgandis tot praeclara ingenia desudarunt.

DIOSCORIDIS
IRIS. CAPVT I.

NOMENCLATURA.

Græcè, Iris. Latine, Iris. Italicè, la Iride.
Gallicè, Flambe. Germ. Himelsschöndertel.



*

Iris.



IRIS à cœ-
lestis arcus
similitudine
nomen acce-

pit. Folia fert gladioli, sed
maiora, latiora, & pin-
guiora. Flores à caule æ-
qualibus inter se spacijs di-
stant incurui, uarij: siquidē
candidi, pallentes, lutei, pur-
purei, aut cœrulei conspi-
ciuntur, quæ diuersi coloris
specie, quædam cœlestis ar-
cus imago representari ui-
detur. Radices subiacēt ge-
niculatæ, duræ, odoratæ,
quæ frustatim dissectæ, in

umbra siccantur, & traiectæ lino reconduntur. Melior est Illy-
rica & Macedonica: & inter has laudatissima, quæ pumila fe-
rè & densa constat radice, frangenti contumax, subrufo colo-
re, gustu amaro, odore perquàm sincero, ita ut nullum prorsus
suum redoleat: quæ dum tunditur, sternutamenta mouet. Secun-
dum locum habet Africana, candicans, gustuq; amara. Terebi-
dines in uetustate sentiunt, tunc tamen odoratiores reddi solent.
Vis omnibus excelsa, extenuans, cōtra tuſsim efficax: hu-

morum

morum qui agrè reijciuntur crassitiem digerunt, bilem crassam
que pituitam ex hydromelite drachmis septem epota, purgant
somnia conciliant, lachrymas ciunt, torminibus medentur. Ede
dem pota ex aceto auxiliantur serpentium ictibus, lienosis, con
nulsis, perfrictionibus, horroribus, & quibus genitura effluit
menses ex vino pota pellunt. Decoctum earum feminarium so
ribus utiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaque in
eis uenarum spiracula: ischiadicis infunditur, fistulas ac sinus
carne explet. Radices ex melle glandis modo subditæ, partus ex
trahunt: quin etiam coctæ & illiæ, strumas, ueteresq; duritias
emolliunt. Siccæ quoque vlcera replent, & cum melle purgant
nudata ossa corpore operiunt. Doloribus capitis, cū aceto & ro
saceo magna utilitate illinuntur. Adnota cum albo ueratro &
duabus mellis partibus, lentigines & uitia cutis in facie à sole
contracta emaculant: pessis, malagmatis, & acopis inseruntur.
In vniuersum, magni ad omnia usus.

Inter Illyricas seu Sclauonicas Irides ea melior est, quæ flauescit, nam
quæ in albedine Raphanū refert, longe inferior est. Ea in Italia pro
uenit, & ex eius succo hydropicis remediū paratur, quod non nisi sic
cæ Iris eò asseratur. Venetijs quæ videtur Sclauonica Iris, spectaculo
est, non paræde medicina. Vera Iridis radix calida & sicca est in secūdi
gradus fine, & tertij principio. Habet id dotis præter eas, quas ei as
signat Dioscorides, Comanducata oris graucolentiā aufert, & si ex eius
decocto colluantur dentes, dolorem sedabit. Radix gargarizata faucium
abscessus discutit. Eadem & eius succus coleram solunt, flegma, & a
quam, qui in corpore erit flani habitus humorem. Si cum aceto bibi
tur, venenis omnibus aduersatur. Attractus naribus succus, flegma po
tenter elicit e cerebro. Stomacho nocet, eaque de causa cum spica offeren
da, & hydromelite. Habet hoc Italia, ut nō pluuioso vere, herbas pro
ducatur, quæ non inferiores ijs sint, quæ è Candia asserantur. Quod in
Iride nō contingit. Nam inibi non nisi Sclauonica valens est. Quo ma
gis nobis qui ad Septentrionem vergimus danda opera erit, ut e nati
uo loco Iridem habeamus, siquidem eius facultates aptare medicina vo
luerimus. Profert Valerius Cordus homo in annotando Dioscoride di

ligens, & acuti, & solertis in perpendendis plantis ingenij, Iridem Germanicam: hanc & odore & gratia inferiorem Illyrica facit, superiorem acrimonia, ut quæ grani Gnidij modo fauces exurat, atque idem fieri ut gustu molesta sit. Sed quod ad odorem & saporem aromaticum attinet, Illyrica cadere, licet alium vehementius, quam illa subducatur.

ACORVM CAP. II.

NOMENCLATURA.

Gr. Αχορον. La. Acorum. Ita. l' Acoro.

Gal. Grāde Galange. Ger. Acherburtzel.



*

Acorum.

Acorum folia Iridis habet, angustiora tamen: radices non dissimiles, complicatas, non in retum, sed obliquum actas, & summo cespite sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratis. Optimum est densum, candidum, plenum, carie non exesum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum, quod Aspletion dicunt. Radici vis calfactoria. Decoctum potu urinam cit: prodest lateris doloribus. & iocinoris atque thoracis: itē tor-

minibus, vulsis, ruptis: lienem absomit: urinae stillicidio, & serpentum ictibus auxiliatur: insidentibus ad muliebres affectus iridis modo utiliter imponitur: oculorum caligines succo disc-

tit: an

it: antidotis radix magno usu commiscetur.

Dioscoridis Acorum non esse Gladiolū vulgarem hinc patet. Quod licet candidās sit Gladioli radix, & quadātenus Iridē representet, nullū tamen acrē, atque adeo nec gratū, aut ingratū gustū praeferat. Nec Galangā esse hinc claret. E Syria ad nos Galāga affertur, sicca adeo & exucca, vt Acori necne folia habeat, diiudicare nō possis. Nam de radice quam candidantem esse in Acoro scribit Dioscorides, aliam esse in Galanga, quam ruffam intus & foris non possis dicere. Adde his quod gustum in Acoro acrem requirit Dioscorides, qui in Galanga acerrimus est. Deinde nullae amaritudinis particeps Galanga est, quod Acori facultatis esse Galemus ostendit. Postremo si Serapionis hac in re autoritas non repudianda videatur, diuersis & de Acoro & de Galanga capitibus tractauit. Quod si omnium longē in tractando Dioscoride acutissimo Matthiolo Senensi credimus, cui etiam subscribit Valerius Cordus, veram Acorū id esse putabimus, quod Officinis Calamus Aromaticus nominatur. Merlus medicus qui multo tempore medicinā apud Lipruschum Lituaniae factitauit, Matthiolo constanter asseuerauit, multam apud Lituaniā Acorum gigni, suisq; manibus e terra euulsiisse, omnibus deprehensis dotibus, quas in Acoro desiderat Dioscorides. Nec aliter Dominicus Sennus, qua est fide & autoritate, referente Cordo, Acorum in Syria nasci vidit, natiuis praeditum dotibus. Eo fit vt cum in Calamo aromatico veram Acorum habeamus, Calamus itidem aromaticus nobis barbarie temporum deperierit.

MEVM. CAP. III.

NON ENCLATURA.

Gr. Μηρό Αθαμαντικόν. La. Meum. Ita. Il Meo.
Gal. & Off. Fœniculus tortuosus. Ger. Beerddurtz.

MEum, quod Athamanticum vocant, in Macedonia et Hispania plurimum gignitur, anetho folijs & caule simile, sed eo crassius, binum ferme cubitorum altitudine attollitur, sparsis in obliquum rectūque radicibus, longis, tenuibus, odoratis, linguam excalfacientibus. Quae feruescēt ex aqua, uel trita citra coctionem, praclusorum renum, uesicaeque, fœcēt

a s nitia



*

Meum.

mine ignaris & medicis & spetiarijs à vulgo herbariorum obtruduntur, cum nec vires nec nota consentiant. Rarum fuisse in Italia Meum suo tempore Plinius testatur, adeo ut medici ferere cogerentur. Nec hodie proventre in Italia præcellentissimus vir Matthiolus asserit, proinde nec in Gallijs, nec in Germania. Mei loco Galeno autore, Myrobalaño, quam etiam Nutem vnguentariam vocamus, & qua nihil aliud planè est, quam Ben vnguentariorum, uti possimus. Calide sunt Meæ radices tertio ordine & sicca secundo: si tamen plus iusto admoueantur, capitis dolorem excitant, quod cum in eis siccitas a caliditate vincatur, certam quampiam humidam cruditatem capiti subinfert, quæ retroa caliditati iuncta, nocuementi causa est.

CYPERVS. CAP. IIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Κυπρις & Lat. & Offi. Cypirus, vel Cyperus.

IIA.

Ita. Angoloso odorato gionco.
Gal. Souchet. Germ. Wilde galgen.



Cyperus.

Cyperus, quem aliqui
Crysiceptrum, ut aspa-
lathum appellant, folia feri-
porraceis proxima, sed lon-
giora & exiliora: caulem
odorati iunci, cubitalē aut
maiores, angulosum, in cu-
ius acumine minuta folia
cum semine exoriuntur: ra-
dices, quarum in medicina
est usus, coherētes inter se,
oleis oblongis similes, aut
rotundae, nigro colore, sua-
ui odore, amaro gustu. In
lacunosis, palustribus &
cultis enascitur. Optima est
grauissima, densa, fractu cō-
tumax, plena & aspera, o-

doris cum quadam acrimonia iucundi, qualis est Cilicia, Syria
ca, & quæ à Cycladibus insulis petitur. Huic calida uis inest.
Venarum spiracula laxat, urinā ciet, ad calculos, aquamq̃ sub-
tercutem utilissimè bibitur, aduersus scorpionum ictus remedio
est: perfrictionibus uulvæ, & præclusionibus sotu prodest: pel-
lit menses. Contra ulcera oris, etiam si depascent uorentq̃, sari-
na eius efficax est. Malagmatis calfacientibus, & unguento-
rum spissamentis bene adijci solet. Aliud Cyperi genus tradūt
in India nasci, gingiberis effigie, quod manducatum croci uim
reddat, gustu amaro sentitur, & illitum præsentem psilothri-

um

um exhibet.

Valerius Cordus eò facit inter se disfidere Cyperidem & Cyperum, Eum iuncum angulosum Cyperidem vocat, cuius radices longæ sunt: Cyperum vero, qui similes Oliuæ habeat, ac sibi inuicem innexas. E Syria Cyperus affertur nostro longe odorator: hic tamen si deficiat, nostrate uti possumus. Radix quæ sub nomine Curcuma ad nos ex India deportatur, Matthiolo putatur esse secunda illa Cyperi species, quam describit Dioscorides eodem è loco transportari, ac gingiberis speciem referre, & comaducatam croci odorem reddere cum amaro gustu. Quod verum sane est. Nam omnes respondet notæ. Antiqua patrum barbaries Curcuma Chelidonium esse putauit, falsi Serapionis superscriptione, qui capiti de Chelidonia titulum imposuerit Curcuma. Cyperi radices calefaciendi & desiccandi virtutem habet. Vnde & vlceribus profunt, quæ, quod nimium humida sint, coire non possunt. Pro sunt & orificijs talium vlcerum quod astrictio in se quippiam habeant. Nec tamen incisoria virtute carent.

CARDAMOMVM. CAP. V.

NOMENCLATURA.

Gr. Καρδαμουρον. Lat. & Offi. Cardamomum.

Ita. Il Cardamomo.

Gal. Graine de Paradis. Ger. Cardamoemsiy.

Cardamomum optimum est, quod ex Comagene, Armenia, Bosphoroq; deuehitur. In India quoque & Arabia prouenit. Eligi debet plenum, frangenti contumax, occlusum, fractumq; (quod enim huiusmodi non est, exoletum iudicatur) & gustu acre, subamarum, & odore caput tentans. Excalfactoriam vim habet, potumq; ex aqua facit ad comitiales, ischiadicos, tusses, neruorum resolutionem: item ad rupta, vulsa, tormina. latas ventris tinea excutit. Ex vino autem potum, renibus, difficultati vrinae, à scorpione ictis, neque non omnibus venenum vibrantibus auxilio est. Cum cortice radicis lauri epota drachma calculos comminuit: ~~pari~~

tu ene

*scabiam ex aceto illitum adimit: Et ad Vnguentorum
spissamenta additur.*

Hoc in loco duo sibi prestantes viri cōpugnant, quorū vterque in
adnotando Dioscoride egregiā nauauit operā. Matthiolus emū-
elo iudicio, Valerius Cordus nitida breuitate. Amborum ego opinionē
recitabo, tum facile erit non obscū naris hominibus, hac de re sententiā
ferre. Valerius Cordus repudiata Manardi & Antonij Musæ sentētia,
qui nos vero Cardamomo carere censuerunt, Dioscoridem ait & Sera-
pionem, integros Cardamomi fructus suis confertos granis descripsisse.
At nobis sola grana, quod saporis & odoris eximij sint, in vsus serua-
ri, cortices verò quod lignosæ, nullōque sapore ac odore prædita sint, ab-
ijci. Porro duo ad nos Cardamomi genera afferet, maius et minus. Ma-
ius fructum habere lignosum, inglandis fere magnitudine, intus angu-
losis & aromaticis granis, mali punici modo plenū & confertū, & fra-
ctu contumacem. Minus vero fructum ferre, Auellana multo minorem,
triquetrum, & minoribus granis repletum, eiusdemque saporis & odo-
ris, sed quæ vehementius linguam penetrent. Maius ad nos hodie par-
cius adferri, propterea in eius locum quosdam grana Paradisi substi-
tuisse, & Cardamomum maius appellasse: improprie tamen & malè.
Nam sapore, quo piperi similia sunt, & odore plurimum à Cardamo-
mo differre. Fructum vero figura aliquam habere cognationē, qui oui
columbini magnitudine conspiciatur, & Cardamomi modo granis an-
gulosus repletus sit. Grana etiam ipsa Melligette vocantur, quod à re-
gno Melli aduehantur. Totaque errare via qui Nigellæ citrinæ semen
Cardamomi nomine dignantur. Hac pene ad verbum Valerius Cor-
dus. Videamus quid dicat Matthiolus, quem è Thuscis in Latīn pro-
feram. Ignotum nostro tempore Cardamomum est, nec verum à merca-
toribus qui simplicia alia ad nos aduehunt, desertur. Est apud eos Car-
domomum maius, Nigellæ semen, & Meligette, quorum trium nullum
est Cardamomum, vel Gracorum, vel Arabum. Aliud enim pro Car-
damomo accipiunt Graci, aliud Arabes. Serapio qui Græcos omnes in
simplicibus reddidit, Cardamomum, Cordumenum appellat: & alio i-
tidem capiti quod ex mente Isuach facit, titulū do Cardamomo impo-
nit, quod sua lingua, Saccola maius et minus vocat, quod omnino dif-
fert à Gracorum Cardamomo, quod sub nomine Cordumeni descripse-
rat, atque ab omnibus illis, quæ in officinis reperiuntur. Hæc vero non
esse Dioscoridis semina huic apparet. Parum densa sunt, facile rumpun-
tur, nec manducata in gustu amaritudinem quampiam relinquunt.

Indi

Indicet a quibus lector, ego in Matthioli sententiā accedere malim. De hoc siquidē & longa hominis experientia probatam fidem asserti.

NARDVM. CAP. VI.

NOMENCLATURA.

Gr. Νάρδος & . Lat. & Off. Nardū. Ita. Il Nardo.
Gal. du Nard. Ger. Spickzen nardi.



Nardum.

Dvo nardi genera: unum Indicum, alterū Syriacū appellatur, nō quod in Syria proueniat, sed quod mōtis, in quo oritur, pars una ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex hoc Syriaci genere præcipuum est recens & leue, largam gerens comam, flauum colore, perquam odoratum, ac Cyperū redolens, breui spica, amaro sapore linguā siccante, quod diu in sua odoris gratia permaneat. Ex Indicis autem Nardum quoddam Gāgitis uocatur, a fluuio Gāge, apud quem enascitur, montem præterfluente. quod genus ob multam loci, in quo prodit, uliginem, uiribus infirmius est atque procerius adolescit, plures ferens spicas ab unica radice comosas, unaque conuolutas, ac grauter olentes. Mōtanum autem odoratius, spica breui ac mutila, odore Cypero uicino ceteras habens Syria et dotes. Est & genus quoddam cui Sampharitico nomen locus indi

indidit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, candidiore interim medio caule, hircorum urris supra modum redolente, quod improbat. Made factum uendi solet: quod uitium ex eo deprehenditur, quod candida sit spica, & squalida, nulloque puluere obsita. Adulteratur sibi cum aqua, aut palmeo uino, inspissationis ponderisque causa inspirato. Intueri autem oportet, si lutum radicibus infideat, & in cerniculo puluerem excutere, eluendis manibus utilem. Vim habent excofactoriā & exiccantem. Urinam mouent, aluum potu sistunt, uulua profusa, sanicemque apposita supprimunt. Nausea ex aqua frigida auxiliatur, & stomachi rossonibus, inflationi, iocinori, regio morbo, renum uitij. Aqua autem incocta fotu ad inessum, uulua inflammationibus medentur: Ad glabras oculorum genas ualent: siquidem eas ad densiore pilum reducunt: perfusis humore corporibus insparguntur. Miscentur antidotis, & in fictili non picato ad ocularia medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cum uino in pastillos coacta.

Nardus non Indica ad nos, sed Syriaca ex Alexandria assertur. quam odoratissimam se Venetys uidisse Matthiolus scribit. Disceant igitur mercatores delectum, ne temere & suas profundant pecunias, & alijs illudant. Spica Nardi non summitas, sed ipsa eius radix est. Quod ei expeditissime patebit, qui familiare sibi Galeni effecerit.

Nardum Celticum. CAP. VII.


NOMENCLATURA.

Gr. Κελτικὴν Νάρδα. Lat. Nardum Celticum.

Ita. Nardo Gallico. Gal. Nard Gaulois.

Ger. Harten Bogdasenen bleumlin.

Celticum nardum nascitur in Liguria Alpibus, saluica patrio nomine appellatum, prouenitque in Istria. Exiguè fructificat, & cum radicibus in manuales fasciculos componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido, florem lateum



Nardum Celticum.

teum. Cauliculorum & radicum duntaxat usus est, & odoris suauitas: unde pridie fasciculos aqua abluere expedit, & exempta terra, paulo solo atque humenti (subrecta charta) reponere, postridie repurgare: siquidem utile, cum aceroso alienoque propter humoris vim, non excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ hirculis uocatur, ab odoris grauitate: sed facilis cognitio: nanque herba candidior est, sine cauliculo, minoribus folijs, radice neque amara, neque odora-

rata, uti uerum Nardum est. Itaque radices atque cauliculi, abiectis folijs triti secernuntur, uino excipiuntur, digerunturque in pastillos, & ita fideliter nouo diligenter operto assernari debent. Laudatur maxime recens, iucundi odoris, radice numerosa coherens, plenum, nec fragile. Ad eadem quæ Syriacum pollet, sed uehementius urinam cit, & stomacho utilius est. Inflammationibus iocinoris, & felle suffusis auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum absinthij decocto bibitur: item aduersus lienem, renum & uesicæ uitia, & uenenatos ictus, ex uino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia unguenta.

Celtica Nardus, quæ & Saliunca, ea planè est quæ Spica Romana Pharmacopolijs dicitur: Nascitur in Liguria Alpibus, in Istria, Carinthia, & Pannonia. Lauendulam seu maiorem, seu Massiliensem non esse Nardum Celticam hoc uno argumento patet. Sole in Nardo Celtica radices & caules medicinam faciunt, nam flores & folia nullo usui sunt.

sunt: In Lauendula, soli flores & folia medica vi pollent, cum interim radicem, & caulium nullus sit vsus. Celtica Nardus potentius vrinam ciet, quàm Indica aut Syriaca, ceteris in rebus inferior.


Montanum Nardum. CAP. VIII.

NOMENCLATURA.

Gr. *Ογδὺν ὡρεδ* &. Lat. *Nardum montanum*.

Ita. *Nardo montano*. Gallis & Offi. *incognitum*.

Montanum Nardū, quod ab aliquibus thylacitis & nigris appellatur, in Cilicia & Syria nascitur, surculo & folijs eryngio similibus, minoribus, minimè tamen spinosis asperisq;. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu hastula regia, sed longè gracilioribus, & longè minoribus. Neque caulem, neque fructum, neque florē profert. Ad eadem ad quæ Celticum efficax.



Asarum.

Montana Nardus quæ olim è Cilicia coriaceis sacculis adserbatur non in medicina tantum vsus, sed quo etiam ob suaueolentiam ignibus inijceretur, hodie ad nos non afferitur, nisi (quod casu & raro fit) cum alijs mercibus asportetur. In Cilicia abunde provenit, unde & Ouidio, *Spica Cylissa* vocatur. Montana Nardus nō ea herba est, q̃ funiculi modo per terram serpit, vt quæ nullo nec sapore nec odore pradiata sit.

ASARVM.

CAP. IX.

NOMENCLATURA.

Græ. *Ασάριον*. Lat. & Offi. *Asarū*. It. *Asaro*.
b Gal.

Gal. du Cabaret. Ger. Haselburtz.

A sarum, quod & ipsum aliqui sylvestre Nardum appellat, Hedere folijs, minoribus multo, rotundioribusq, floribus cytino Hyoscyami similibus, purpureis, inter folia proxime radicem emicantibus, odoratis, in quibus semen acinosum radices numerosas, geniculatas, tenues, obliquas, Gramini non dissimiles, longè tamen graciliores, odoratas, excalfaciètes, & quæ linguam uehementer mordent. Excalfactoriam uim habet, urinam cit, hydropicis & uetusto coxendicum dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua mulsa potæ, menses trahunt, & Veratri albi modo purgant. In unguenta additur. Vm brosis montibus prouenit, sed plurimum in Ponto, Phrygia, Illyrico, & Italia Iustinensi agro.


D iuersa sunt Asarum, de quo hic scribit Dioscorides, & Baccharis de qua in tertio, maleq; actū ab eis est, qui Baccharis, in Asari ca put retulerūt. Sed reuera Asarū, Bacchar vulgare est, nō illa Baccharis.

PHV. CAP. X.

NOMENCLATURA.

Gr. φού. Lat. Phu, & Nardus sylvestre. It. Phu.
Offi. Valeriana. Gal. La Valerienne.

P Hu, quod & aliqui sylvestre Nardum appellant, nascitur in Pōto, folio Olusatrici, aut Elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, læui, cauo, molli, in purpuram uergente, geniculis intercepto, florib. Narcisso proximis, maioribus tenerioribus, & ex albicante purpureis: radice superius ad digiti minoris crassitudine, ex obliquo uillosa in nigri Veratri aut Iunci odorati modū: capillamentis inuicem contextis, flauescens, odoratis, cū quadam odoris grauitate Nardum æmulantibus. Excalfacit, urinam mouet, si sicca potuit detur. Decoctum eadem præstare potest, ad lateris, etiam dolorem efficax, menses cit, antidotis inseritur



* Phu.



Valeriana.

ritur. Adulteratur radice Rusci ammixta: sed maleficium deprehenditur: quoniam hac dura est, & frangenti contumax, sine ulla odoris gratia.

PHu Valeriana est, non illa quidem minor, sed maior: & quod ad Narcissi florem attinet, corruptus hic Ruellio & Matthiolo Dioscoridis est codex. Valeriana minor subtiles habet & intricatas radices quæ commendando odori scrinij induntur. Hanc non esse Phu non abs recensuit Cordus.

Malabathrum. CAP. XI.

NOMENCLATURA.

Græ. μάλαβαλον. Lat. & Off. Folium Indum,
& folium Malabatri. Ita. folio Indico. Gal. Fucille d'Inde. Ger. Negeblätter.

b 2

Mala

Malabathrum arbitrantur aliqui esse Indici Nardi folium, falsi quadam odoris cognatione: permulta enim Nardum olent, quemadmodum Phu, Asarum, Niris. secus autem res se habet. Nanque Malabathrum folium sui generis est, quod Indica gignunt paludes, lentis palustris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum statim lino transsuntur, & siccatum reconditur. Tradunt siccatis aestivo seruire aquis, humum aridis fruticibus uri: quod ubi non euenerit, ne amplius quidem renasci. Laudatur recens, ex candido nigricans, integrum, nec fragile, odore caput feriens: quod diu in suavi odore permaneat, & nardum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirmum uero & minutim contusum, praesertim si cariosum uirus olet, uitiosum est. Easde Nardo sortitur uires, sed efficacius omnia praestat. Uri nam uehementius ciēt, ac stomacho magis prodest Malabathri uis. Lippitudinibus inflammationibusque tritum & in uino seruifaculum commodē illinitur: subditum linguae, oris halitum & suauitatem commendat. Vestium quoque odorem interpositum seruat, & ab erosione tuetur.

Malabathrum, quod antiquis Folium, siquidem folium est, & nil praeter ea, paludibus innascens. Hodie ad nos non affertur. Folia Casiae huius substituntur loco, quae profecto ignota arboris sunt. Satius erit, si Galenum secuti, Malabathri uice, nullo periculo Casia utamur, aut Syriaco vel Indico Nardo.

CASSIA CAP. XII.

NOMENCLATURA.

Gr. κασσία. Lat. & Offi. Cassia.

Ita. Cassia. Gal. la Casse.

Cassia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiam gignitur, crassi corticis sarmento, folijs piperis. Eligenda est fuluescens, pulchri coloris, coralli amula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordens, & cum ali-

quan

quanto feruore adstringens, aromatica, uinoso odore, cuiusmodi est, quæ ab incolis *Achy*, appellatur, ab *Alexandria* negociatoribus *Daphnitis*. Huic præfertur crassa, purpurea, et nigricans, *Zigir* cognomine, quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina usus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui *Museletico blasto*, id est, germi cognomen est. Reliquæ uiles, & quæ *Aphemum* dicitur, nigra, insuavis, cortice tenui, ac rimoso & quæ *Darca*, & *Citto* uocitatur barbaro nomine. Similior huic est *Pseudocasia*, quàm ut explicari possit, quæ gustu coarctatur, cum nec acris, nec odorata sit, hærentemq; medullæ corticem habeat. Inuenitur etiam lata quædã fistula, mollis, leuis, surculosa, quæ antedicta præfertur. Damnatur candicans, scabra, hircinum uirus redolens, & quæ tenui fistula & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendi, urinam ciendi, siccandi, & leuiter astringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, quæ præstandæ claritatis gratia concinnantur, & ad malagmata. Lentigines tollit cum melle illita, menses trahit, contra viperarum ictus pota auxiliatur: aduersus intestinas inflammationes omnes, & renum uitia, pota proficit. Fæminis in solio desidentibus, aut suffimentis, prodest ad dilationem vuluæ. Ea duplo pondere medicamenti mixta, Cinamomi uicem supplet, si ipsum desit: nam eosdem effectus præbet, ad plurima per quam utilis.

Cinnamomum. C A P. XIII.

NOMENCLATURA.

Gr. *Κίνναμονον*. Lat. & Offic. *Cinnamomum*.

Ital. *Cinamomo*. Gal. *Cinnamome*.

Cinnamomi genera plura, partium sibi nomen vèdicatitia. Præfertur tamen *Mosyliticum*, quod *Casia*, cui *Mosyliti* nomen est, aliquam referat effigiem. Sed in eo genere recens, nigrum, ex uinoso in cinerem vergens, læue, tenuibus ramulis,

b

3

ac fr

ac frequentibus nodis cinctum, per quam iucundè olens. Optimè
 ferè indicium, iucundi odoris proprietate cōstat. Inuenitur enim
 cum optimo, eoq; quod peculiare est, odor Rutæ aut Cardamo
 mo proximus. Insuper acre, mordens, & cum calfactione qua
 dantenus salsum, quod non citò confricanti asperum, aut frian-
 ti lanuginosum, leuibus tamen internodijs appareat. Si certior
 fieri voles, uellito ab radice surculum. facilis est huiusmodi p-
 batio: namq; fragmenta miscellanea quædā esse videntur. Qua
 autem melius spirant, suo halitu cum nares primum consulun-
 tur, olfactum ex plentia, deterioris dignotionem impediunt. Est
 etiamnum montanum, crassum: punilum, fuluescēs admodum.
 Tertium à Mosylitico, per quam suauiter olet, nigrum, frutico-
 sum, paucis intercedentibus geniculis. Quartum, fungosum, can-
 dicans, aspectu tuberosum, vile, ac friabile, magnam habens ra-
 dicem, quæ Cassiā planè representat. Quintum genus, odore na-
 res feriens subrufum, & cortice fuluæ Cassiæ simile, tangētī fir-
 mum, minus neruosum, densa radice firmatum. Is quæ Thuris,
 Cassiæ, Mirti, aut Amomi odorē spirat, minus suauitatis inest.
 Deligito scabrum, album, rugosum: at laue, & lignosum circa
 radicem, ut inutile, reijcio. Est etiamnum simile aliud, cui Pseu-
 docinnamomo cognomen est, vile, inualidi odoris solutarumq;
 virium. Vocatur etiam Zingiber, cum tamen sit Xylocinnamo-
 mum, præbens quadam Cinnamomi faciem. Est autē lignosum
 Cinnamomū, sarmenta longa robustaq; ferens, odore logè Cin-
 namomo inferiore. Sūt qui Xylocinnamomū, à Cinnamomo ge-
 nere differre dicant, quod à natura eius abhorreat. Cinnamo-
 mum omne ex calfacit, emollit, & concoquit, vrinam ciet, tam-
 mēses quam partus potū aut ex myrrha impositū pellit cōtra be-
 stias quæ virus eiaculantur, venenaq; conuenit: caliginem pupil-
 lis oculorum obuersantem discutit, crassitiem extenuat, lentigi-
 nes & vitia cutis in facie ex melle illitum detergit: cōtra tusses,
 de flu

defluxiones aquam subtercutem fusam, renum vitia, & Urinæ difficultatem efficax est: Unguentis preciosis inseri solet: & in summa, magni ad omnia vsus. Tritum vino excipitur, umbræ, siccatum, quod diutius eduret, reconditur. Est & quoddam Cinnamomum, quod aliqui Pseudocinnamomum appellant, perquam denso atq; crasso sarmento, longè tamen inualidius Cinnamomo, & odore & gustu.

Annotatio in Cap. XII. & XIII.

De Cassia & Cinnamomo.

Cognata adeo plâta sunt Cassia & Cinnamomum, ut perfectè Cassia ramos in totum Cinnamomo similes Galenus viderit, nec secus Cinnamomiramos Cassiâ pro maxima parte referre. At si quis Canellâ vulgo vocatam diligētius expendit, ac Officinarum qui illam cōtinēt saccos euoluerit, omnes reperiet Cassiæ descriptas à Dioscoride species. Ea enim mercatorum natura est, ut bonas merces sibi putere velint, quo peiores diuēdant. Cassia dum cortice vestitur, Xylocassia: nudata cortice, Cassia Syrinx, quod fistulam representet dicitur. huius vice cortex longo tempore deportata ad nos radice, quæ amarum, nō aromaticum saporem haberet. Nūc sed raro aliqua eius species affertur. Arabum Cassiæ fistula quam solutinam vacant, omnino alia est à Græcorum Cassiæ fistula. Siquidē fructus est proceræ arboris qui in India & Egipto nascitur quæ & Faba Egyptia dicitur. Cinnamomi multam fuisse penuriā Galeni tempore constat. Quod si imperatoribus ipsis quibus tum omnia parebant cara hac planta erat, intantum ut pro thesauro asservarent, nihil mirum si nostro saculo incognita sit & rarissima.

Amomum. CAP. XIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Αμομον. Lat. & Offic. Amomum.

Ital. Amomo. Gal. incognitum.

Amomum exiguè frutificat, ex ligno se conuoluens in racemi modum, flore, ceu candidæ Violæ paruo: folijs vitis albæ similibus. Laudatur quàm maximè Armeniacum, fuluo auri colore, ligno subrufo, valde odorato. Medicum, quoniam in campestribus & aquosis enascitur, infirmius esse constat. Est

b 4 autem

autem magnum, subuiride, tactu tenerum, frutice venoso, odore origani. Ponticum vero subrusum, paruum, fragile, racemosum fructu turgens, & odore nares feriens. Deligito recens, candidum vel subrubrum, quod nec astrictum cohareat, nec conuoluatur, sed solutum diffundatur, seminis plenum, uuis paruis simile, graue, odoratum, modo cariem non contraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore non euariante. Vim habet calfaciendi, astringendi, exiccandi. Somnum allicit, & illitum fronti, doloris sensum aufert, inflammationes & meliceridas cōcoquit, discutitque: inuat quos scorpis percussit, ex Ocimo illitum, & podagricis cōfert, inflammationes oculorum viscerumque lenit ex uia passa: ad vuluarum vitia in pēsis, aut in seſsionibus utile est, decoctum iecinori, renibus, podagræ, potu conuenit. Antidotis immiscetur & preciosissimis vnguentis. Adulteratur herba Amomo simili, quæ Amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu. Nasctur in Armenia, flore Origani. Quare in huiusmodi probationibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem, quæ ab una radice integros surculos emittunt.

Amomum cum in Italia, diligentissimo Matthiolo authore nō nascatur, nec sit ea planta, quam Rosam S. Mariae Italica matrona vocant, hæ rationibus (Similes Bryonia fronds non habet, nullum Origani odorem refert, acrimonia nares non percellit, quin potius nullius est odoris) tantisper dum vero Amomo carebimus (nam Portugalli nō ita pridem verum ex India adueher. cœperunt) authore Galeno eius vice Acoro utemur.

COSTVS. CAP. XV.

NOMENCLATURA.

Græ. Κόστος. Lat. Costus. Ital. Costo.

Gal. & Offic. Incognitus.

Precellit Arabicus, candidus, levis, eximia odoris suauitate. Secundum locum sibi vendicat Indicus, levis, uber, ut fern

serula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxens, & odore feriens. Optimus est recens, albus, abunde plenus, densus, aridus, à teredinibus non erosus, sine graueolentia, gustu calidus ac



Costus.

antidota et malagmata. Sunt qui admistis Helenij Comageni præduris radicibus, adulteret, quod deprehensu facile est, si quidem neq; gustu seruet Helenium, neq; ualidum odorem uibrat, ut caput tentare possit.

*C*ostum ut plurimum Officina habent, amarum, & dulce. Sed de his non loquitur Plinius, aut Dioscorides, at de albo tantum. Paucis ab hinc annis verus Venetys assertur. Inde sibi comparent pharmacopole, nec diutius in antiquo errore inueterascent.

Odoratus iuncus. CAP. XVI.

NOMENCIATURA.

Gr. ὀνός. Lat. Iuncus odoratus & rotundus.

b 5 Itali

Ital. Gionco odorato. Gal. Pasture à chameaux.

Offic. Squinanthum.

O Doratus iuncus, in Africa, & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa: proximus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alij Teuchitin: pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus confricando rosæ odorem emittit, igneæ mordacitatis ad linguam. Floris, culmorum radicisq; est usus. Vim Urinæ ciunda habet, menses pellit, discutit inflationes, caput agruat, modicè astringit, comminuit, excoquit, ac venarum spiracula laxat. Flos eius in potu vili sanguinem reijcientibus, doloribus stomachi, pulmonis, iecinoris, & renum, miscetur antidotis. Radis astringentior est, ideo fastidijs stomachi, hydropicis, conuulsis, drachma vna cum pari pōdere piperis, per dies aliquot datur. Decoctum vuluæ inflammationibus, ad desidentium fatus utile est.

Iuncus odoratus, Squinanthum Officinis vocatur, voce corrupta à Ἰχοῖνοῦ & ὄνθου, vnde vox integra prodit Ἰχοῖνοῦ ὄνθος qua Squinanthus quasi velint dicere, Flos Iunci odorati. hic ad nos hodie non affertur, sed stipites tantum, & folia, & radices. Iuncus odoratus seligendus est recens, nam à vetere odor omnis & sapor abeunt.

Calamus odoratus. C A P. XVII.

NOMENCLATURA.

Gr. κάλαμος & ἄρωματικός. Lat. Calamus odoratus.

Ital. Calamo odorato. Ga. & Offi. Calam⁹ aromaticus.

Calamus odoratus in India nascitur: melior est fuluus dē-
se geniculatus, & qui assulose frangitur, plena araneorū
fistula, albicans, lentus in mandendo, & astringens, ac cum ali-
quanta acrimonia amarus. Urinam potu ciet, quare cum grami-
nis aut apij semine coctus, in aquæ subtercutem fusæ morbo, re-
num

num uitijs, stillicidio urinæ, ruptisq̃, cōmodè bibitur, menses & potu & appositu pellit, tuſſi ſuffitu medetur per ſe, aut ex reſina terebinthina, hauſto per arundinem fumo, ad muliebres inſeſſus decoquitur, & clyſteribus imponitur. ſuffitionibus, malagmatisq̃ odoris gratia commiſcetur.

Calamus Aromaticus, canna odoratiſſima, quæ quibuſdam maioris Aſiæ Lacubus (dum ſiccantur) enaſcitur, ad nos hodie non aſſertur, ſed huius loco acori radix, quæ ſola ex Acoro medicinam facit cū in Calamo odorato uſui ſit arundo, non radix.

Balsamum. CAP. XVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Βαλσαμον. Lat. & Offic. Balsamum.

Gal. Baufine.

Balsamū, arbor albæ Violæ, Lycij, ſiue Pyracantha magnitudine conſpicitur. Folium rutæ proximum, longè candidius, perpetuò uirens. In Iudæa ſolum quadam ualle & Aegypto naſcens. his differens modis, ſcabritia, proceritate, gracilitate. Quod igitur tenuis & capillacea coma eſt, Theriſtum uocant, quaſi demeſſile: fortaiſſus quoniam ob gracilitatem facile demetatur. Aeſtiuis ſub ortu Canis ardoribus, arboris unguibus ferreis inciditur, manatq̃ è plaga ſuccus, quem Opobalsamum uocant: ſed tam exiguo ſtillatu, ut annis ſingulis, ne plures quidē quàm ſe ni ſeptēniue cogij cogantur, inibiq̃ pondus duplo reſponditur argento. Succus probatio eſt, ut ſit recens, ualidi odoris, ſyncerus, non ad acorem uergens, dilui facilis, lenis, astringens, ac modicè mordens guſtu. Sed uariè uitiatur, miſto ab aliquibus Terebinthi, Cypri, Lentisſci, Balani unguento: itē ſuſino, metopio melle, aut Cypria cera liquida, quod maleficium facile deprehēditur. Namq̃, merus in laneam ueſtem ſuſus, neq̃ maculam facit,

cit, neq, si eluatur, notam reliquit: uitiatus autē inheret. & lac
 instillatus coagulat, quod adulteratus nō efficit. Quinetiam syn-
 cerus in aqua aut lacte celerrimē liquatur, coloreq, lactescit: ui-
 tiatus uero olei modo innatat, se conuoluens, aut in stellæ modū
 diffundēs. Syncerus senescens crasse scit, deteriorq, redditur. Hal-
 lucinantur, qui aqua concretum pessum ire, & ad ima fidere ar-
 bitrantur, postea dissipatum supernatare. E ligni genere, quod
 Xylobalsamum uocant, probatur recens, sermento tenui, sului,
 odoratum, quadam tenus Opobalsamum spirans. Necessarium
 etiam seminis erumpit usus, quare eligatur flauum, plenum, grā-
 de, ponderosum, mordens gustu, feruens in ore, modicē Opobal-
 samum olens. Adulteratur semine hyperico simili, quod à Pe-
 tra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, ui-
 rium ignauia, sapore Piperis. Efficacissima uis inest succo, &
 quam maxime calfaciens, abstergit quæ tenebras oculorum pu-
 pillis effundunt, medetur perfrictionibus uulue, cum rosaceo ce-
 rato appositus, menses quoq, secundas, & partus extrahit, hor-
 rores illitu discutit, ulcera sordida expurgat, & cruda conco-
 quit, urinam potu ciet, ægrè spirantibus prodest: datur in lacte
 contra Aconitum haustum, aut serpētium iētus, miscetur acopis
 malagmatis, & antidotis. In summa, præcipua auctoritas suc-
 co, secunda semini, minima ligno. Semen commodè potui datur
 doloribus lateris: pulmonum uitijs, tuſsi, ischiadicis, comitialibus
 uertiginosis, orthopnoicis, urinæ difficultati, torminibus ac ser-
 pentum morſibus, ad muliebres suffitus per quā utile est: uul-
 uam aperit in defesſionibus balnearum decoctum, & humo-
 rem euocat. Lignum easdem habet uires, aliquātō minores. Ex
 aqua potum cruditatibus, torminosis, uulsis, uenenatorum iētibus
 opitulatur, urinam cit, ad capitis uulnera cum sicca Iri con-
 uenit, squammas oſſium extrahit, & ad unguentorum spissa-
 menta additur.

Balj

Balsamum Syriaca arbuscula, in Egypto non secus ac olim nascitur, sed sincerus eius liquor ad nos non affertur. Carpobalsamum, Balsami fructus: Xilobalsamum, Balsami est lignum. Hac adulterata in Pharmacopolijs venduntur. Hac diluunt incolæ ad medicinam & vnuent a, tñ viribus destitutā lignosam substātiā nobis obtrudunt. Balsami vice, Stacte vti licebit, qui liquoris è Myrrha elicit flos est. Loco Xilobalsami violarum radice, quas Cheiri officina vocant.

Aspalathus. CAP. XIX.

NOMENCLATURA.

Gr. Ἀσπλάτθ. Lat. Aspalatus. Ita.
Aspalato. Gall. & Offic. nomen
Latinum vsurpant.

Aspalatus, alijs Erysisceptron, frutex est surculosus, multis spinis horrens, nascitur in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula, quo ad unguentorum spissamenta pigmentarij utuntur. Optimus est grauis, detracto cortice rubens, aut in purpuram uergens, densus, odoratus, gustatu amarus. Est & alterum genus candidum, lignosum, sine odore, quod deterius habetur. Vim calfaciendi cum astrictione obtinet: unde decoctum uino ad tetra oris ulcera colluenda conuenit, ad nomas genitalium, & sordida ulcera infunditur: subiectum in pessa, parum extrahit: alium sistit eius decoctum, & sanguinis reiectionem potu cohibet, urinae difficultatem inflationesq; discutit.

Aspalatus non illa arbuscula est, quæ Rhodi nascitur Oliuastro similis, patrum memoria pro Agallocho vsurpata, & è qua precati orbiculi fiunt, nigri aut flau sub cortice coloris, non rubri aut purpurei, quod requirit Dioscorides. Adde his, in re medica Aspalato radice cortice tantum utimur, in Rhodio ligno, ipsum lignum medicinali vim & odorem habet.

Mus

MVSCVS. CAP. XX.

NOMENCLATURA.

Gr. Βρυον. Lat. Muscus. Ital. Mosco.

Gal. Mouffe. Offic. Vinea.

Bryon, id est, Muscus, à quibusdam Splechnon appellatur: in Cedro arbore: Populo alba & Quercu inuenitur. Optimum est cedrinum: proximum populeum: in quo genere candidum & odoratius præstat, nigricans improbat. Astringendum habet. Decoctum insidentium uuluis utile: unguento balanino, oleisq; inspissandi gratia inseritur: thymiamatum, acoporumq; compositionibus conueniens.

Muscus seu villosa illa arborum canities, non pro eo hic accipitur, qui in quauis arbore nascatur, sed tantum qui in cedro, Populo alba, Picea, Quercu, Larice, Abiete proueniat ac sit odoratus. Muscus vulgaris, Indici animalis pus est. Qui diligentiores sunt, quo hac clarius distinguant, illum musum, moschum hunc appellant.

Agallochum. CAP. XXI.

NOMENCLATURA.

Gr. Αγάλλοχον. Lat. & Offic. Agallochum. Ita.

Agollocho. Gal. nomen non indiderunt.

Agallochum, lignum est quod ex India atq; Arabia deportatur, Thueia ligno simile, maculatum, odoratum, gustu astringens, cum quadam amaritudine, cute uerius, quam cortice uestitur, aliquantulum uersicolore. Manditur, aut decocto os colluitur, commendandi halitus gratia. Sudores arcet toto corpori insparsum: pro thure ad suffimenta substituitur: radix epota drachmæ unius pondere, humida stomachi uitia & imbecillitatem, seruioremq; mulcet: si lateris, iecinoris uel dolor excruciat, si dysenteria, aut tormina infestant, ex aqua bibere prodest.

Agallo

A Gallochum, Xiloaloes, seu lignum aloes, referentibus Portugallis in insula Taprobana nascitur, suauissimi odoris etiam si non vratur. Venerijs assertur quod probatissimum est. A gallochum calidum & siccum est in secundo gradu.

Narcaphthum. CAP. XXII.

NOMENCLATURA.

Gr. Νάρκαφθου. Lat. Gal. Offic. Narcaphthum.
Ital. Nercaphtho.

Narcaphthum ex India desertur corticosum, simile Sycomori libro, quod iucundi odoris gratia sufficitur. Miscetur thymiamatis compositis: constrictionibus uulua suffitu prodest.

Narcaphthū aut hodie ignotum, aut Storax est sicca, aut Corzumbrum, aut potius Tignamē, quod plane nil aliud est, quam Thymama.

Cancamum. CAP. XXIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Καρκάμου. Lat. Cancamum. Ital. Cancamo.
Offic. Lacca. nec aliud nomen habet.

Cancamum Arabici ligni lachrima est, myrrhæ quodammodo similis, uirosi gustus, quam ad suffimenta usurpant. Vestes eo, Styrace & Myrrha additis suffiuntur. Vim proditur obtinere extenuandi obesos, si ternum obolorum pondere ex aqua, aut mulso aceto plusculos dies ebibatur: lienosis datur, comitialibus & suspiriosis: menses cum aqua mulsa pellit, oculorum cicatrices confestim emendat: uino madefactum medetur eorundem hebetudinibus, aduersus gingiuas humore pregnantibus: doloresq; dentium, non aliud efficacius.

Can

Cancamum ex Arabia ad nos hodie, nec alijs locis assertur. Nec est gummi illud spissum & transparens, quod Laccam vocat, nempe nullum gustu, suffit uve odore præ se fert, quod in Cancamo reperiri scribit Dioscorides. At enim in cap. de Cancamo seipsum confundit Serapio, qui dicat: Laccam è cælo super arbores Manna in modum decidere. & ex eius face Carmesinum in tinctorijs fieri. Cauendum proinde ne pro Cācamo aut Laccam, & minus Dialaccam accipiamus. Astringit enim Dialacca: Laxat & aperit Cancamum.

CIPHI. CAP. XXIII.

NOMENCLATURA.

Gr. κῦφι. Lat. Cyphi. Ital. Cipi.

Gal. & Offic. Cypheos.

CYphi thimiamatis compositio est dicata dijs, qua abunde Aegyptij sacerdotes utuntur. In antidota misceri solet suspiriosis datur in potu. Permulta componendi rationes, quarum una hæc est: Sumito cyperi dimidium sextarium, cum paribaccarum Iunperi adultæ modo: unæ passæ pinguis, exemptis uinaceis, minas duodecim: resina repurgata minas quinq; Calami & Iunci odoratorū. & Aspalathis singulorum minam: Myrrha duodecim: uini ueteris sextarios nouem, cum duabus mellis minis: unā passam detractis uinaceis tusa, cum uino & Myrrha subigito: cætera tusa & cribrata adjcito: die uno humorem combibere finito: dein mel coquito, dum sibi glutinis ascescat crassitudinem: eliquatam resinam accurate permisceto cum reliquis diligenter contritis, & in fictile uas recondito.

Adiectum quibusdam hoc esse caput Dioscoridis uidetur, quod in antiquis exemplaribus non repperiatur. At cum Cyphi amplam Aetius mentionem fecerit, id certò statuere non audeo.

CROCUM. CAP. XXV.

NOMENCLATURA.

Gr. κρον & . Lat. & Offic. Crocum. Ital. Zaffarano.

Gal. Saffran. Ger. Saffran ziment.

Cro



Crocus.

Crocum, optimū in me-
dendi usu Coryceum,
recens & boni coloris, pau-
lum candidi gerēs in capreo-
lo, oblongum, omnibus suis
partibus constans, non fragi-
le, plenum, a quo detractum
est nihil, quod madefactum
manus inscit, nec situm redo-
let, aut carie sentit, subacre:
sin huius generis non est, aut
uetus, aut humore perfusum
creditur. Secundus locus da-
tur Coryceo, è tractu Lyciæ
contermino. Tertius Licio è
monte Olympo. dein ex Ae-
gibus Aetoliæ. Cyrenaicum

& Centuripinū inter Sicilica omnia uiribus infirmius est. Om-
nium natura oleacea. Itali tamen ob succi copiam, & coloris
uenustatem, tingendis mortarijs dicauerūt: quibus de causis ma-
gno uenditur. Vtilissimum in medicina quod antè descripsimus.
Adulteratur immisto Crocomagmate tuso, atq; etiam sapæ su-
blitu: contrita, quò pondus adyiciatur, simul argenti spuma, aut
plumbagine. sed malefium declarat insidens puluis, præsertim
si defrutum in odorando subolet. Thessalus ipsum tantum odora-
tum esse uoluit. Alij exitiosum, tribus drachmis ex aqua potis.
Proculdubio uim coquendi, emolliendi, atq; substringendi ha-
bet: urinam cit, elegantem colorem præstat: qui ex passo biberint
crapulam non sentient: oculorum fluxiones illitum cum huma-
no lacte, cohibet: additur in potiones, quæ interaneorum causa
temperatur: ad uulnæ etiam sedisq; cataplasmata utiliter inditur

c

uene

uenerem stimulat, uergentes ad ignem sacrum inflammationes mulcet, auricularijs collectionibus utile. Quò facilius conteratur in calido fictili sole siccari oportet, celeriterq; uersari. Urinam mouet radix ex passo pota. Fit etiam expressis unguenti crocini odoramentis, & in formas digestis, quod Crocomagma uocat. Optimum est odoratum. modice Myrrham olens, graue nigrum, ligni expers, laeue, subamarum, quod madefactum Croci colore reddit, gustatumq; uehementer dentes ac linguam inficit, multis durans annis, quale est, quod à Syria defertur. Habet suas uires ad delenda quæ caliginem oculis obuersant: urinam cit calfacit, coquit, & emollit. Vires Croci proportionem quadantenus representat, quandoquidem plurimam Croci partem sibi Crocomagma uendicat.

Crocom quod certis olim in prouincijs nascebatur, nunc & in Gallia excellentissimum, et in ipsa adeò Germania prouenit in Austria maximè & Vienna territorio. Abundè quid sit Crocomagma et deducet Dioscorides. Tota Croci substantia procedit in secundum caliditatis gradum & siccitatis primum, eaq; de causa vim habet maturandi, cui subsidiaria est astrictoria qua participat virtus.

Helenium. C A P. XXVI.

NOMENCLATURA.

Gre. ἑλένιον. Lat. Helenium. Ital. Euola.

Gal. & Offic Enula Campana.

Ger. AsantßBurtzel.

Helenium folia habet Verbasci angustioris folij, asperiora, oblonga: caule quibusdā in locis non emittit: radicem sub
albi



Helenium.

albidā, interdum subrusam,
odoratā, subacrē, uegetam,
magnā, ex qua agnata ppa-
gines liliorū aut ari modo se-
rūtur. Motibus in umbrosis,
siccoq; solo proucnit. Foditur
estate radix, particulatimq;
dissecta siccatur. Potū radice
decoctum menses & urinas
ciet, ipsaq; in eclegmate ex
melle pdest tussi, orihopnææ
ruptis, conulsis, inflationibus
& serpentium morsibus. In
summa excalfaciens. Folia
ex uino cocta utiliter ischia-
dicis illinuntur. Helenium sto-
macho utile in passo conditū:
siquidem salgamarij paulu-
lum siccata radicem, mox

decoctam, & frigida aqua madefactam, in sapam conij-
ciunt, & ad usus recondunt. Trita potaq; ad cruentas excre-
tiones efficax est. Alterum Helenij genus in Aegypto gigni-
Crateus tradit. Herba est cubitalibus ramulis, Serpylli modo
per humum repentibus, folijs Lenticula circa ramos. sed longiori-
bus crebrisq;, radice pallida, digiti minoris crassitudine, per ima-
tenui, supernè crassa, cortice nigro. Nascitur in maritimis, colli-
busq;. Radix una in uino epota, contra serpentium ictus auxilia-
tur.

INula seu Helenium, ex Helena lacrymis nata, dum Canopi gu-
bernatoris mortem defiet, duplex. Nostras, nulli non cognita, Aegy-
ptia, qua humilis & coronaria est. Nostratis radix, non statim à gustu

6 2 excal

excalfacit, ut piper nigrum, & album: superflue enim humida est. In-
re igitur electuarijs inseritur, qua sunt ad crassos et viscosos humores
e pectore & pulmone educendos.

Omphacinū, oleūq̃. C A P. XXVII.

NOMENCLATURA.

Gr. Ελαιον ὀμότριβες, καὶ Ελαιον κοῖνον.

Lat. Omphacinum oleum, & oleum commune.

Ital. olio Omphacino è uolgare. Gal. Huyle

d'Oliue. Offic. Latino utuntur nomine.

Ger. Baumol.



Omphacinum.

facit, emollit uentrem, à perfrictionibus corpus tuetur, ipsumq̃
pro

Oleum quod ex im-
maturis oliuis expri-
mitur, ad multos usus recte
ualentibus accomodatissimū
Omphacinum id appellatur.
Præstat recens, odoratum,
quod non mordeat. Tale un-
guentorum compositionibus
idoneum intelligitur. Stoma-
cho utile est, quod astrin-
gat: gingiuas contrahit, den-
tes firmat: si contineatur
in ore, sudores cohibet. Et
quò uetustius ac pinguis, cò
ad medicamenta aptius est.
Et, ut reliqua in commune
dicantur, omne oleum cal-

promptius ad obeunda munera reddit, aluum emollit: ulceratium uenerorum uires permistum hebetat: contra uenena datur, assidue potum redditumq; uomitionibus, soluit aluum hemina mensura cum pari ptisana succo aut aqua potum: ad tormina calidum simul decocta ruta tribus sextarijs in potu datur: uentris animalia pellit, idem maxime ilei intestini morbo laborantibus infunditur, uetus magis calfacit & uehementius discutit, oculorum claritati sublitum confert. Si uetusti non sit occasio, in uase decoquitur ad mellis crassitudinem, ut uetustatem representet.

Oleum syluestris oliuæ.

CAP. XXVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Εκ τῆς ἀγρίας ἐλαίας ἑλαιον. Lat. Oleum syluestris oliuæ. Ital. l'Olio che si fa delle oliue saluatiche. Gal. & Offic. commune nomē non mutant.

Oleum quod syluestres oliuæ fundunt, uehementer adstringit, & ad sanorum usus secundum sibi locum uendicat. In doloribus capitis utiliter pro Rosaceo substituitur, sudores arcet, defluentes capillos inhibet. furfures, ulcera capiti; manantia, scabiem, leprasq; abstergit, tardius canitiem sentiūt, qui eo quotidie perunguntur. Candidum oleum fit hoc modo: Album colore, nec anniculo uetustius, in nouum fictile oris patuli funditur, centum heminarū mēsurā, & sub solem media quaque die concha refunditur, ex altoq; demittitur, ut assidua deuolutione, icluq; agitatū respumet: octaua die fœnum gracum mundum quinquaginta denariorum pondere, calida aqua madefactum donec emollescat, in supradictum oleum deycitur, ita ne

6 ij extil

extillet aqua. Postea tede præpinguis picea assulatim cæsa æqua
le pondus adijcitur, & transanctis octo diebus, oleum concha
mouetur. Vbi candorẽ contraxerit, in uas nouũ uetere uino affu
sum recondi debet. substratis fertula Capanæ corollis drachmas
undecim pendentibus, cum pari Iridis pondere sin minus rursus
soli mandandum, & idem munus obeundum, usq; dum inalbe
scat.

Annotatio in Cap. xxvñ. xxvñ.

Oleum cum simpliciter dicimus, illud intelligimus, quod ex satiuis
Oleis: Omphacinum, quod ex immaturis Oleis exprimitur. Can
didi Olei conficiendi rationem docet Dioscorides. Candidum Oleum in
Portugallia Vlsbona conficitur.

Sicyonium. CAP. XXIX.

NOMENCLATURA.

Gr. Σικιόνιον. Lat. Sicyonium. Ital. Sicionio. Eo
Galli & Officinæ carent.

Sicyonij componendi ratio hæc est: In lebetem oris lati stan
no inductum, funditur olei albi quod crude oliua reddide
runt, cõgius unus: aqua semicõgius. Leui id igne coquitur, leni
ter mouendo: at ubi bis efferbuit, & subtraeto igne refrixit,
innatans oleum concha decapulatur, & adiecta noua aqua con
feruescit, & reliquis ut diximus peractis, reponitur. In Sicyo
nia maximè fieri consuevit, Sicyonij inde accepto cognomine.
Calsæctoriam adquendam usq; modum uim habet. Febri ac ner
uorum uitij prodest: fœminæ ad commendandum faciei nitorem
eo utuntur.

IN Sicyone Peloponensi vrbe è candido oleo, preparabatur oleum eo
quo scribit Dioscorides modo. Hodie fieri desit.

Str

Strigmēta balnearum. CAP. XXX.

NOMENCLATURA.

Gr. ρύω & βαλανέϊωρ, καὶ ρύω & ἐκ τῆς παλαί-
 seas. Lat. Strigmenta balnearum Strigmenta
 palestra. Ital. Le rasure de i bagni. Le rasure della
 palestra. Hæc antiquorum, non nostratis usus.

Strigmenta à balneis calfaciunt, molliunt, discutiunt: ad se-
 dis rimas, & condylomata illinuntur. Illa uerò quæ ex pa-
 lestris puluerem sibi ascuerunt, in sordis speciem redacta, arti-
 culorum nodos imposita adiuvant: ischiadicis in fotus aut ma-
 lagmatis locum, calida commodè sufficiuntur. Deraſe gymna-
 siorum parietibus simulacrisq; sordes calfaciunt, tubercula, quæ
 agrè ad coctionem perducuntur, dissipant, desquamatis &
 ulceribus senum prosunt.

Antiquitus Oleo corporibus in balneo perunctis, sudorem Oleo mi-
 xtum serui vel publici vel priuati strigilibus eradebant. Id strig-
 mentū vocatum est. Luētaturi itidem iuuenes Oleo perungebantur. In
 palestra, dein puluere oblineabant s. se. Cænosa illa crassities quæ cis à lu-
 do erad. batur in balneis, in vsus medicina cedeat.

Elæomeli. CAP. XXXI.

NOMENCLATURA.

Græ. ελαϊόμελι. Lat. Elæomeli. Ital.
 Eleomele. Res nostris incognita &
 Officinis.

IN Palmyris Syria, quod Elæomeli uocāt, ex quodam caudi-
 ce manat oleū, melle crassius, sapore dulci. Bilē, cruditatesq;
 detrahit, sextario cū una aquæ hemina dato, sed q; sumpſere, tor-
 4 peſcunt

pesunt, & uiribus deficiuntur: quod minimè uereri oportet, ue-
rum crebrò excitare, ne ueterno pressi somnos capient. Fit &
oleum è pinguitudine sirculorum Oleæ: optimum uetus, crassum
pingue, non turbidum. Calfacit, priuatimque caliginibus oculo-
rum illitur: lepras, neruorumq; dolores illitum emendat.

Elaomeli ad nos hodie non affertur. Quod è Quercuum & Betula-
rum uetustis truncis fluit, sapore habet mellis, pinguitudinem olei,
proritat ad nauseam & vomitum Eleomeli, & laxat aluum.

Cicinum oleum. C A P. XXXII.

NOMENCLATURA.

Gr. Κικινον έλαιον. Lat. Cicinum oleum. Ital.

l'olio Ricino. hoc Offic. nò parant: proinde nec apud
Gallos nomen habet.

Cicinum oleum hoc modo temperatur: Maturi Ricini, qua-
nuoles quantitate, torrido sole flaccescunt, & ouarum mo-
re instrati tantisper insolantur, dum uestiens cortex fractus deci-
dat: caro colligitur, & coniecta in pilam diligenter tunditur: po-
stea in lebetem stanno illitum, qui aquam habeat, demittitur,
subiectoq; igni feruescunt: & ubi insitum prorsus humorem red-
diderunt, sublato ab igni uase, innatans oleum concha tollitur,
& reconditur. Sed in Aegypto, ubi largior increbuit usus, lon-
gè secus fieri solet Nam repurgatos Ricinos mola mandant &
accurratè molitos per sportulam torculo exprimunt. Tum qui-
dem ematuruerunt Ricini, cum continentibus orbiculis exuun-
tur. Ad psoras, & ulcera capitis manantia ualet, prodest sedis
inflammationibus, uuluis conuersis atq; præclusis: item indeco-
ris cicatribus, & aurium doloribus emplastra efficaciora red-
dit additum: potu aquam aluo extrahit, uentris animalia pellit.

Hoc oleum hodie fit sub nomine Olei de Kerua, seu Catapucia ma-
ioris Arabum.

Amg

Amygdalinum. CAP. XXXIII.

NOMENCLATURA.

Gre. Ἀμυγδαλινὸν ἐλαίον. Lat. Oleum Amygdalinum. Ita. l' Olio delle Mandole. Gal. Huyled'Amendes. Off. Oleum amygdalarum.

Amygdalinum oleum, quod aliqui Metopium uocant, hoc fit modo: Semodius ex amaris nucibus repurgatis siccatisq³, in pila ligneo pistillo leniter tunditur in offas, aqua quæ ferbuerit sextarius adijcitur, & ubi dimidia hora humorem hauserit, uehementius quàm antea tunditur, mox tabellis premitur, & quod digittis hæsit, concha excipitur. Pressis nucibus rursum hemina aqua inspergitur, & postquàm ebiberint, idẽ opus prosequendum. Singulas heminas reddunt singuli modij. Contra uuluarum dolores, strangulatus, conuersiones, & eorundem locorum inflammationes efficax est: uitys renum, calculosis, difficili urina, suspiriosis, lienosisq³, proficit: dolores capitis, grauitatem auditus, sonos incertos, tinnitusq³ discutit: maculas & uitia cutis tollit è facie, & eam erugat cum melle, radice Lilij, & Cypria cera, aut rosaceo cerato: & oculorum hebetudines emendat, ulcera capitis manantia, & fursures cum uino abstergit.

Et si hodiè ex Amygdalis dulcibus & amaris oleum exprimatur. Satius tamen aget, qui hoc in negotio Mesue præscriptionem sequetur.

Balaninum. CAP. XXXIIII.

NOMENCLATURA.

Gre. Βαλάνινον ἐλαίον. Lat. Oleum Balaninum.

Ita. l' Olio di Ben. Gal. Huyle de Ben. Off. Oleum de Ben.

Simili modo fit Balaninum Oleum, quod repurgat maculas, lentigines, uaros, & cicatrices nigras: aluum soluit, stomacho aduersatur, contra aurium dolorem, sonos, & tinnitus auxilio est, cum anserino adipe instillatum. Similis sesamini ratio. Fit etiam è nuce iuglande oleum, quod caryinum uocant. Eandem uim habet quam balaninum.

Oleum Balaninum, quod è Glande vnguentaria fit, & Oleum è Ben dicitur, apud Italos vulgare, nobis penè incognitum quod ad bonitatem attinet.

Hyoscyaminum. C A P. XXXV.

NOMENCLATURA.

Υοσκυάμινον, κνιδελαϊον, Κνίκικον, ράφανελαϊον.

Lat. Hyoscyaminum, Gnidicum oleū, Cnicinum oleum, Oleum Raphaninum. Ita.

l' Olio dell' Iusquiamo, del Grano

Gnidio, del Cartamo, del Ra

fano. Officinis, si præpa

rentur, nomina la

tina habent.

HYoscyaminum sic fit: Semen candidum, recens ac siccum tunditur, & calida aspergitur aqua, ut in amygdalino diximus: dumq; insolatur, siccata, quæ sub manu sunt, partes cū reliqua massa permisceantur: hoc autem fieri oportet dum nigrescat, & grauitur oleat: mox pressum atque excolatum reconditur. Ad aurium dolores efficax est, pesus miscetur, ad emolliendum utile. Fit & è Grano gnidio purgato & tuso. Vis ei aluum soluere potu. Non secus Cnicinum oleum temperatur, cui facultas eadem est quæ factu è Gnidio grano, uerum inualidior. Raphaninum è Raphani semine fieri solet, ceterorum more. Phthiriasis mala uoletudine contractas tollit. Scabrities
cutis

utis in facie emendat. Ad obsonia utuntur Aegyptij. Melan-
thinum idem quod Rhaphaninum potest. Tritum Sinapis semē,
& calida aqua madefactum, adiecto postea oleo exprimitur.
Id ad diuturnos dolores efficax est, transfert humores qui in ali-
qua parte concreuerunt.

Commodius nostro tempore tritum & calefactum Hyoscyami se-
men cogitur oleum reddere, quā olim malefactum aqua. Idem fit
in Rhaphanino & Sinapino. & vetustus mos dicitur. E Grano Gnidio
oleum exprimitur, quo rustici Itali ad se purgandos vtuntur. Olei ē
Carthamo & Nigella rarus aut nullus est vsus.

Myrteum. CAP. XXXVI.

NOMENCLATURA.

Græ. Μυρτινέλαιον. Lat. Myrteum. Ita. l'Olio
Mirrhino. Gal. Huyle de Murte. off.

Oleum Myrtinum.

Myrtei faciendi ratio hæc est: E Myrto nigra syluestri, aut
satiua, foliorum mollissima quæq; tusa premuntur. Succo
vires omphacini olei portiones adijciuntur, subiectisq; carboni-
bus inferuescunt donec concoquantur, innatans oleum deradi-
tur. Sed longè facilius hæc compositio: Tenera folia contusa co-
quantur in oleo & aqua, & quod innatat eximitur. Priu-
atim alij deiecta in oleum folia in sole macerant: alij prius oleum
in spissant Malicorio, Cupresso, Cypero, et Iunco odorato. Efficax
est amarum gustu, & oleosum, viride, translucēs, & olens
Myrtu. Astringit & indurat: ideo medicamentis miscetur, quæ
cicatricē obducunt, prodest ulceribus in capite manantibus, am-
bustis igni: & papularum eruptionibus. Facit ad attrita & fur-
fures, sedis rimas, codylomata, articulos laxatos, corporis sudo-
res cōpescit, et omnia quæ ad strictionē inspissationēq; desiderāt.

Alia ratione parant seplasia Myrtinum oleum quam Dioscorides
aut Mesue præscripserunt. Et sanè melius caderet, si paratur in bal-
neo Mariae, & cum olio Omphacino.

Lau -

Laurinum. CAP. XXXVII.

NOMENCLATURA.

Gr. Δαφνέλαιον. La. Laurinum. Ita. l'Olio

Laurino. Gal. Huyle de Laurier. off.

nomen latinum in usu.

Laurinum fit hoc modo: Lauri bacca cum matura sunt, in aqua coquuntur: siquidem ex obducto cortice quanda pinguitudinem reddunt, qua manibus subacta, concha excipitur. Alij omphacinum prius oleum Cypero, Iunco odorato, & Calamo inspissant, deinde tenera Lauri folia concoquunt: alij etiam baccas, donec oleum odorem contraxerit alij Styracē & Myrtum addunt. Optima Laurus ad id latifolia & montana. Oleum Laurinum utilius quò recentius, quoq; uiridius colore, amarissimum, & acre. Vis ei ex calfaetoria, emolliens, uenarū spiracula aperit, lassitudines discutit, omnibus neruorum uitijis, algoribus, destillationibus, aurium doloribus, malis renum frigore contractis, illitum, non aliud iuuantius, attamen potum nauseam parit.

Oleum Laurinū aliter à Mesue paratur, aliter à Dioscoride, aliter ab Officinis. In quibus qui eruginē admiscunt, malè agūt. Enervat enim erugo olei temperamentum. Probe praparatum prater uires quas ei tribuit Dioscorides, ualet dolori Hepatis, Hemicranæ proueniētis à causa frigida, dolori stomachi, dolori colico, matricis, & splenis.

Lentiscinum. CAP. XXXVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Σχινέλαιον. Lat. Lentiscinum. Ita. l'Olio del

Lentisco. Gal. Huyle de Lentisque. offi-

cina Galliarum rarum aut nullum Len-

tiscinum habent.

Similis Lentiscini ratio. Nam è maturo fructu temperatur, fractis prius spissamentis, ut in Laurino diximus: hoc scabiē iumen-

umentorum canumq; sanat, utilissimum pēssis, acopis, & le-
rarum medicamentis sudores cohibet. Nec secus Terebinthi-
um fieri solet. quod refrigerat & astringit.

Oleum Lentiscinum in pluribus hodiē Thuscā partibus paratur,
& in comitatu Senensi, præcipuē in insulis Helba & Giglio, fit eo
acto: Sumuntur fructus Lentisci, aliquot ante diebus ex arbore de cer-
ti, numero & pondere qui satis est videtur, immittuntur in aquam,
ulliunt lento igni, & cum crepare incipiunt, tum torculari immittun-
tur, & non addito altero oleo, ex eis oleum exprimitur, nam satissu-
erq; ex sese reddunt. Rustici qui eo vtuntur in cibo, laudant vt valens
medium ad acuendum visum. Oleum quod ē Terebintho fit ad nos nō
fertur, proinde nec in vsu est.

Mastichinum. CAP. XXXIX.

NOMENCLATURA.

Gr. *μασικήλαιον*. Lat. *Mastichinum*. Ita. l'Olio di
Mastice. Gal. Huyle de Mastic. Off. Oleum de Mastice.

Mastichinum ē trita fit Mastiche, quod contra omnia
uulua mala efficax est, mediocriter calfacit, astringit, et
nollit. Aduersus prominentes stomachi duritias, celiacorum,
ysentericorumq; cruciatus utile: faciem emaculat, & colorem
tuidum facit. Opimum in Chio insula componitur.

Ratio parandi olei Mastichini, quod fit ex Mastiche qua Lētisci re-
sina est, rectius doctorū hominū iudicio cū alābico vitreo pareretur.

Vnguentorum compositio.

CAP. XL.

NOMENCLATURA.

Gr. *σύνθεσις μυνγων*. Lat. *Vnguentorum compositio*. Ita. la compositione de gli unguenti. Galli &
Officinæ, hæc si præparant, nomi-
na vt lubuit imponunt.

DE ratione Vnguentorum consequenter tractandū existi-
mauimus, quando quidem ea in nonnullis corporū utijs,
ant

aut medicamentis mista, aut corpori persusa, aut naribus obiecta, plurimum prosunt. In quorum probationibus consulere nares oportet, an ea oleant, ex quibus temperantur. Optimum huiusmodi iudicium: quod in quibusdam planè observari non potest, propter ea, quæ admiscuntur, odore cæteris prævalentia: ut in Amaracino & Crocino, Telino, & plerisque alijs, quæ crebra circa hæc meditatione experiri conveniet.

Dioscorides ab hoc capite xl. ad lxxvj. de Vnguentis tractat, non illis plagarijs, sed odoratis, quæ planè nihil aliud sunt quàm olea materia cuiuspiam aromatica permixta: Olea vero simpliciter cum dicit, Oleum è fructibus & seminibus arborum expressum intelligit, sine alterius mixture olei.

Rosaceum. CAP. XLI.

NOMENCLATURA

Gr. Ρόσιον. Lat. Rosaceum. Ita. l'Vnguento Rosado.

Rosaceum sic fit: Iunci odorati quinque libras & bessem tundito, & subactas aqua in viginti olei libris & quincunce subinde mouenda, coquito: dumq; percolaueris, in olei libras viginti, & quincuncem, adijcito Rosas non madesactas numero nulle, & manibus melle perunctis identidem moueto: interdiu premens, finito nocte tota macerari, postea exprimito: et ubi recrementu pessum ierit, mutato uase, in craterem melle illitum recondito. Cæterum Rosas quæ antea pressæ fuerunt, in label lum demittito, & affusis octo libris & quadrante spissati olei, iterum premito, eritq; secundarium oleum. Quod si tertias usq; quartæ sue perfusiones insundens exprimere uoles, secundarium fiet, tertiarium, & quartarium unguentum. Sed quoties id feceris, uasa melle oblini debent. Si uerò secundam infusionem instituire libet, in expressum oleum, numero pari recentes Rosas, nullo humore imbutas inijcito: manibus melle præmadesactis,

agi-

egitans premito: & iterum, tertio & quarto, simili modo exprimens facito, totiesq; recenteis Rosas detractis unguibus immittito: fiet enim ita oleum multo ualidius: nam septies oleum rosarum infusionem admittit, nec amplius. Prælum melle perungatur, oleum à succo diligenter secerni oportet, nam si minimū quid relinquatur, unguentum corrumpet. Alij autem detractis unguibus, Rosas tantum oleo macerant in sole, hoc modo: Rosæ quæ se libram pondere æquant, in sextario olei diebus octo mactescunt, & usque tertiam perfusionem quadraginta diebus inolantur, & sic oleū reconditur. Alij Calamo, aut Aspalathorū olei spissamenta faciunt. Alij coloris causa Anchusam adniscunt, & salem, quo minus oleat. Vim astringendi & refrigerandi obtinet, fomentis & cataplasmatibus utile. Potum solut aluum, stomachi ardorem restringit, ulcera caua replet, & nūlct, quæ cacoëthe uocantur: ulceribus in capite manantibus, itque feruidis eruptionibus illinitur: caput dolens eo persunditur: dentes inter initia doloris collui prodest, ad genarum duritias illitum efficax est, ad laceßita interanea & concitatas uulnas utilissime subijcitur.

Vnguentum Rosatum si probè fiat è præscriptione Mesue, nihilum cedit illi, quem Dioscorides ostendit. Nostras è Mesue, inflammationes sistit, congregat, confortat, spissat, & prohibet cursum materiae ad male affectos locos. Potum valet in dysenteriam. Vulneribus capitis prodest: mirum enim in modum caput firmat, & inflammationem inhibet.

Elatinum. CAP. XLII.

NOMENCLATURA.

Gr. Ελάτινον. Lat. Elatinum. Ita.
l'Vnguento Elatino.

Fracta

Fraëla Elate tusa & scarificata, in labellum deijcitur: omphacinum oleum triduo infunditur, mox par sportulam exprimitur: uerum pares esse debent utriusque portiones, dein mundo uase ad usus reconditur. Viribus Rosaceo proportionē respondet, aluum tamen non mollit.

Elatinum unguentum antiquitus fiebat è carnosio dactylorum cortice, qui Elate Græcis dicitur. Quæ dictio quoniam etiam Abietem sonat, quidam etiam ex Abiet. parant Elatinum oleum, sed malè.

Melinum. CAP. XLIII.

NOMENCLATURA.

Gr. μέλινορ. Lat. Melinum. Ita. l' Vngueto Melino.

Melinum hoc modo temperatur: Olei congius, decem aquæ sextarijs admiscetur. Adijcitur elatæ palmarum fraëla quadrans, & Iunci odorati uncia, quæ die uno macerata coquuntur, mox in uas oris patuli oleum excolatur, & indita arundinacea crate, aut uetusta tegete, Cotonea mala superponuntur, & uestimentis operta tâtisper inibi resident, dum malorum uires ad se oleum alliciat. Aliqui Cotonea, decem dierum spacio operimentis inuoluunt, ut contineatur odoris suauitas, nec euanescat: postea biduo macerata oleo exprimuntur, oleumq; reconditur. Id uim refrigeratorem & astringentem habet. Contra scabiosa ulcera & quæ serpunt, ac surfures, perniunculosq; effectum præbet, exulceratis uuluis infunditur, citatam urinam sistit infusum, sudores cohibet: contra cantharidas, buprestim, pinorum erucas, bibitur. Laudatur maximè quòd Cotonea mala olet.

Melinum unguentum fit cum Cotoneorum fructu probè maturo, in particulas conciso, tum in oleum omphacinum immisso, ac insolato cum bona succi portione, postremo in balneum Maria infuso, iterata ut docti sciunt, infusio.

Oenanthin

Oenanthini compositio. CAP.

XLIIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Οινανθίνου. Lat. Oenanthinum. Ita.

l'Vnguento Enanthino.

O Enanthe è Labrusca, optimè olens postquam emarcuit, dieſecta in Omphacinum oleū mouetur, uoluiturq̃, & cum biduo manſerit, exprimitur, & reconditur. Astringit, proximum rosaceo effectū præbens: sed aliū non resoluit, aut mol-
lit. Probatissimum est quod odore Oenanthem refert.

ID quamuis non paretur, ipsa tamen verba satis ostendunt, quæ re, parari debeat. Nam vires non desunt.

Telini cōponēdi ratio. CAP. XLV.

NOMENCLATURA.

Gr. Τήλινου. Lat. Telinum. Ital.

l'Vnguento Telino.

Foenigræci libræ quinque, calami libra una, cypiri libræ duæ olei libris nouem, septenis diebus macerantur, quotidie ter mouentur, postea præmuntur, & reponuntur. Aliqui pro Calamo Cardamomū substituunt, & Cypiri loco Xylobalsamū macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato, Fœnumgræci macerantes exprimunt. Hoc Telinum abscessus emollit, & con-
coquit, omnibus uuluarum duritijs magnoperè conuenit, sæmi-
nis difficile parientibus subijcitur, ubi præ excretis humoribus
loci siccitatem contraxerunt, sedis inflammationes lenit, tenes-
mo

mo subditum prodest, ulcera capitis manantia surfuresq; expurgat, ambustis & pernionibus addita cera proficit, vitia cutis in facie emendat, pigmentis ad conciliandum faciei nitorem inseritur. Eligi oportet recens, quod non uehementer Fœnigraci odorem præ se ferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato: tale enim optimum indicatur.

Telinum seu Fenugracinum unguetum vulgò è Fenigraci semine Oleo incocto, vel ad solem macerato, paratur. Qui sit ut vires cū Dioscoridis Telino non respondeant, Nam aromatum ut in horum plerisque omnibus spectus est usus.

Sampsuchini compositio.

C A P. X L V I.

N O M E N C L A T V R A.

Gr. Σάμψυχινον. Lat. Sampsuchinum.

Ital. l' Unguento del sansucco.

Serpylli, Casia, Abrotani, florū Sisymbrij, frondium Myrti, Sampsuchi, singulae portiones quadā pro viribus ipsorum coniectione, unā tunduntur, atque is omphacini olei modus adijcitur, qui madentium vires non euincat. hæc post quadriduum exprimuntur: denuò noua alia, simili mensura & equali tempore macerata premuntur, ita enim ualidius reddi solet. Eligi oportet Sampsuchum colore ex atro uiridi, plurimum redolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, cascatoriam, extenuantē. Aduersus uulnæ præclusiones, conuersionesq; efficax est, menses & secundas & partus extrahit, uulnæ strangulatus recreat lumborum inguinumq; dolores lenit, sed cum melle uti eo præstat, quandoquidem uehementi astrictione locos indurat: lassitudines illitum discutit: in opisthotonicorum, uulforumq; catoplasmata utilissimè additur.

Ama

A Maracus Galeno, & Paulo, non ille est Amaracus, quem Theophrastus, Dioscorides & Plinius Sampsuchum vocant, sed Marū. Quod vero diuersis Dioscorides tractauit capitulis de vnguento Sampsuchino, & de vnguento Amaracino, id duabus rationibus motus effecit. Prima fuit. Si Amaracini & Sampsuchini compositiones conferas, longè pretiosiorē & odoratiorem iudicabis Amaracinum: & idcirco vt eius excellentiam separatim notam faceret, separatim etiam assignauit caput. & Amaracinum vocauit. Secunda, Sampsuchum (vt patet è proprio in tertio libro capite) Amaracum dicitur Cixici, vnde electissimum hoc vnguentum exportatur, & quod optime Cixicini id suum componant Amaracinum, nomē Dioscorides mutare noluit, quod è Cixico retulerat.

Ocimini compositio. CAP. XLVII.

NOMENCLATURA.

Gr. Οκίμινον. Lat. Ocimum. Ital.

l'Vnguento del Basilico.

Ocimum oleum fit ut Cyprinum. Ocimi folia decerpta librarum undecim & beßis pondo, die noctuq; viginti olei libris macerato, premito, colato: cumque exhauseris qualulum, rursus parem olei modum fundito, & exprimito. Vocatur autem id secundarium, nam tertiæ perfusionis nō est capax. Deinde recens Ocimum equali pondere, ut in rosaceo diximus, rursus maceratur, & cum tanto temporis spacio maduerit, exprimitur, & oleum reconditur. Quod si in animo fuerit ter aut quater madesacere, semper Ocimum recens addes. Potest ex omphacino confici, sed illo modo melius, Idem quod Sampsuchinum potest, sed inefficacius.

Abrotonini compositio.

CAP. XLVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Αβροτονινον. Lat. Abrotoninum. Ital.

l'Vnguento dell' Abrotano,

d

2

Olei

Olei Cyprini odoribus imbuti libris nouē & quincunce, foliorum Abrotoni libras octo die noctuq; madefactas, premito. Quod si in longum tempus oleum uelis asseruari, eie-
ctis prioribus folijs, noua appones, & macerata exprimes. Cal-
facit, ad uluæ duritias præclusionesq; efficax est, menstrua &
secundas pellit.

Anethi compositio.

C A P. XLIX.

NOMENCLATURA.

Gr. Ἀνηθίνον. Lat. Anethinum. Ita.

Vnguento dell' Anetho.

Olei libris octo & dodrante, florum Anethi libras un-
decim & bessē, maceratas in oleo die una, manibus
premito, & recondito: quod si iterum persundere uelis, recentes
Anethi flores cōsimiliter madefacito. Vuluarum duritias emol-
lit, uenarum spiracula laxat, contra horrores febriliū circuitu re-
deuntes auxiliatur. Calfacit enim, & lassitudines discutit, pro-
dest articulorum doloribus.

Susinum. C A P. L.

NOMENCLATURA.

Gr. Σουσίνον. Lat. Susinum. Ital.

Vnguento de i Gigli.

Susinum, quod alij Lilinum appellant, sic temperatur: Olei
libra nouem cum quincunce, Calami libra quinq; & qua-
drans, Myrrha uncia quinq;, permixto odorifero uino decoquū-
tur, & colato oleo, cardamomi tusi & cœlesti aqua madefacti
libra tres & semis macerantur: premunturq;, tres libra cum se-
misse spissati olei: assumuntur mille Lilia decerptis folijs in latū nō
tamen

eamē pfundūt, labellū demūt untur: iniectū oleū, manibus melle
 perunctis agitatur: die noctuq, cōquiescunt, & in pyxidem ma-
 tutinis exprimuntur, quod defluet oleum, protinus ab aqua, quæ
 simul expressa fuerat, colo incerni oportet (non enim, ut rosaceū
 moram tolerat, nam concalfactum feruet & comprutescit: qua-
 re sepius decapulandum) uasa melle illinenda, tenuis sal inspar-
 gendus, & si qua sordes uasis faucibus hæsit, eximenda. Odo-
 ramentis iam expressis ex quasilo in labellum transfusis, rursus
 oleis prius odoribus imbuendi, quod primum pondus æquet, &
 Cardamomi tusi drachmæ decem conijciuntur. Hæc manibus
 scitè pressa, interiecta breui mora exprimuntur: quod profluit,
 repurgatur. Tertio eadem infunduntur, adiecta Cardamomo
 & sale, & manibus malle madefactis. Longè optimū: erit, qđ
 prius exprimūtur secūdū qđ sequitur: tertiū locū sibi uendicat qđ
 nouissimū pđit. Denuò in mille Lilia euulsis folijs expressum pri-
 mō oleum infunditur: tum eadē ratione proseguendum, idemq, fa-
 ciendū ut prius, addito Cardamomo, dein expresso, & quo fre-
 quētius recētia Lilia maceraueris, eò unguentū ualidius efficies.
 Deniq, cum factū abūdē uidebitur, singulis cōpositionibus misce-
 re conuenit Myrrha quam optimæ duas & septuaginta drach-
 mas, & Croci decē, Cardamomi quinque & septuaginta: Cro-
 ci uerò & Cinnamomi pares portiones tunduntur, & cribra-
 tæ in lutrem cum aqua demittuntur, expressumq, primō un-
 guentum infunditur, & paulo pōst excipiuntur uasculis zccis,
 Myrrha aut gummi antea perfusis, & Croco, melle & aqua
 madefactis. Eadem fiunt in altera aut tertia expressione. Ali-
 qui simplex ex Balanino, alioue oleo, & Lilijs componunt. Op-
 timum esse constat in Phænice, mox Aegypto factum. Sed cum
 primis laudatur quod Lilia redolet. Excalfacit, emollit, uulua
 præclusiones, & collectiones apperit, utilissimum ad muliebria
 mala: ulcera in capite manantia, feruidas eruptiones, uaros, fur-

furesq̄ emendant, uibices cicatricesq̄ celerrimè ad colorem reducit, ita ut sæpe fallant. In summa extenuat, potum bilem per aluum extrahit, urinam ciet: sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

Annotatio in Cap. xlvij. xlvij. xlvij. l.

CLara sunt hæ compositiones, nec minus Officinarum parandi modus, licet multo inefficacior: viderint secreti iudicij medici, ut in his priuatim utantur.

Narcissinum, C A P. L I.

NOMENCLATURA.

Gr. Νάρκισσινον. Lat. Narcissinum.

Ital. Unguento del Narcisso.

Narcissini olei spissamenta ita fiunt: sex libræ Asphalathi cum sextante tunduntur, olei eloti libræ septuaginta cum uncijs quinq̄ assumuntur. Asphalathus aqua madefactus in tertia olei parte coquitur, quo exempto, Calamus quinq̄ libris & besse adijcitur, cum Myrrha gleba contunditur, cribrataq̄, ac uino ueteri odorato immista decoquitur: simulac autem cum ijs efferbuerit, eximitur: refrigeratum oleum excolatur, eius portio in labellum mittitur, flores Narcissi quamplurimi conijciuntur, qui bidui spacio (ut in Susino dictum est) permoti exprimuntur. Oleum subiude decapulandum, siquidem celerrimè putredinem sentit. Valet hoc ad emolliendas uulnæ durnias præclusionesq̄, sed capitis dolores facit.

In quibusdam Dioscoridis codicibus habetur, Aspalathum solum coquendum cum tertia olei parte. Superfluum sane esset septuaginta libras olei desumere, & postea tertia tantum parte uti, nisi dicamus, Aspalathum cum tertia olei parte concoctum, spissamentum esse primum & præcipuum unguenti Narcissini tum secundam olei partem inspissari Calamo & myrrha. Postremo spissamentum tertium fieri, cum Narcissi floribus ex tertia tertia Olei parte, quod Græca attentè legenti satis declarat. Nā: ὡς ἐπὶ τοῦ σποσίου, non ad specierum tantum illam in labello confusionem referuntur, sed ad totam compositionem.

Croci

Crocinum. CAP. LII.

NOMENCLATURA.

Gr. Κρόκινον. Lat. Crocinum. Ita.

l'Vnguento del Zaffarano.

Cum Crocinū cōponere uoles, prius olei (ut in Susino dixi-
mus) spissamēta facies eisdē pōderibus & mēsuris, cuius
olei libras treis & semissē, Croci uncia unā assumes, idētidē quo-
tidie moueto, & sexta die quā hoc assiduo peregeris oleū à Cro-
co colis incernito: eidē Croco parē olei modū adycito, moue tri-
duo, dein cōtusa Myrrhæ atq; cribrata drachmas quadraginta
permisceto, & in pilo agitatū reconditio. Aliqui oleo aromati-
bus ad Cyprinū imbuto in Croci cōpositione utūtur. Optimū est
qd abūdē Crocū spirat, in medēdi usu expetitū. Proximū quod
Myrrhā refert. Calfacit, somnū allicit: quare persape phreniti-
cis: subuenit, persusum, aut naribus admotum, aut illitum pus
mouet, ulcera purgat, contra uulua duritias atque præclusio-
nes, & ulcera quæ cacoëthe uocantur, pdest, cū Croco, cera, me-
dulla, duplicato olei pōdere: cōcoquit enim, emollit, humēclat &
permulcet, Ad oculorū glaucitates ex aqua illinitur. Huic au-
tē proportionē respōdet Butyrinū, onychinū & Styracinū, quæ
& si nominibus distant, uiribus & cōpositione cognata sunt.

Cyprini spissamētum. CAP. LIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Κυπρίνον σύψις. Lat. Cyprini spissamentū. Ital.

l'Vnguento Ligustrino.

Olei Omphacini eloti pars una, aquæ cœlestis tantundem
cū semisse, cuius una parte oleū diluitur, altera adiciēdis
odoramentis admiscetur, dein assumptis Asphalathi libris quin-
q; & semisse, calami libris sex & semisse myrrhæ libra una car-
damo

damomi libris tribus & drorante, olei libris nouem, & uncis quinque. Asphalathus tusus & aqua affusus decoquitur in oleo, donec conferuescat: Myrrha autem uino uetere odorifero subacta contususq; simul Calamus digeruntur in offulas quæ ex æpto Asphalatho immittuntur, & ubi efferbuerint, sublato atheno, oleum percolatur. Cardamomum tustum reliqua aqua aspersum insnuatur, spatula agitur, nulla, dum refrigerit, interpellatione. Post hæc colato oleo, in uiginti octo libras olei, floris Ligustri, quod cyprium uocant, sex & quadraginta libra cum besse instillantur, quæ sufficienter madefactæ per sportulam exprimuntur. Quod si copiosius desideretur, idem recentium florum pondus iniectum, simili modo prematur, & iterum aut tertio, si quis uelit, madefacere poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonum, quod cum odoris suauitate nares feriat. Aliqui Cinnamomum addunt. Calfacit, emollit, ora uenarum adaperit, uulua neruorumq; uitis conuenit: pleuriticis, fractisq; per se, uel cerato immistum: malagmatis imponi solet, quæ opisthotonicis: angina laborantibus, inflammationiq; inguinum opitulantur: item in acopa adijcitur.

Irini spissamentum. CAP. LIIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Ἰρίνου σπύσις. Lat. Irini spissamentum.

Ital. Vnguento Irino.

Spatha quàm minutissime cōtusa sex libras cū besse, in tribus & septuaginta libris & quincunce olei, æreo uase, additis decem aquæ hæminis incoquito, quoad odorẽ acceperit: postea in capulam melle oblitam colato: ex eo aromatibus imbuto oleo, Irinum primo temperatur, Iride ex oleo inspissato macerata, ut scripsimus. Sed alia est componendi ratio: In olei septuaginta libris & quincunce, Xylobalsami, ut dictum est, con-

tusi

usi, libras, quinque & sextantem excoquito: postea detracto Xylobalsamo: nouē libras & dextantē adjcito, & Myrrhae glebam uetere uino odorato persusam, & in olei ita odori-
bus imbuti quatuordecim libris, totidem tusæ Iridis, binis die-
bus ac noctibus madesacito, strenuē & uehementer adstringi-
o. Quod si uis ualidius fieri, par pondus iterum ac tertio simili-
er maceratum exprimito. Longe optimum est quod solam Irin
let, quale est in Perga Pamphiliæ, & Elide Achaia natum.
Irim habet calfacloriam atque emollientē, crustas adimit. sordi-
la ulcera & putrida purgat, confert fæminis uulua causarijs,
tem inflammationibus eiusdem atque præclusionibus, partus
ijcit, hæmorrhoidas recludit, cōtra aurii sonitus ex aceto, Ruta
& amaris nucibus, prodest, diuturnis destillationibus, naribus
llitum, & contra graueolentia earum ulcera, quas ozenas uo-
ant, auxiliatur, aluum purgat cyathus epotus, facit ad ilei cru-
iatus, urinam mouet, difficileis uomitiones adiuuat, perunclis
o digitis & immisissis, uel ijs quæ ad uomitum ciendum indun-
ur, angina etiam illinitur, aut ex aqua mulsa gargarizatur:
tem contra arteria scabritiem datur ijs, qui Cicutā, Coriandrū,
ut uenena fungorum hauserunt.

Annotatio in CAP. LII. LIII. LIIII.

Aperta sunt quæ de Crocino & Ligustrino tradit Dioscorides, &
hoc modo praparari poterant, pharmocopola tritam sequuntur se-
nitam. Cum tamen de Iride præcipit Dioscorides, radicem intelligit,
iō florē, nempe qui ingratum odorem aspiret, cuius contrarium repperi-
ur in radice. Quod uero optimum Irinū fieri tradit in Elide Achaia,
non Achaia legendum, sed Arcadiæ. Elidem enim cosinographi, non
in Achaia, sed in Arcadiam referunt.

Gleucinum. CAP. LV.

NOMENCLATURA.

Gr. γλεῦκινον. Lat. Gleucinum. Lat.

Unguento Musteo.

d s

Gleu-

GLeucinū absolute constat omphacino oleo, Iunco odorato, Calamo, celtica Nardo, Spatha, Aspalatho, Seritula Cāpana, Costo, & musto: circumdatis interim uinaceis uasi, quod aromata, uinum & oleum conceperat. Tricenis diebus, bis in die mouetur, postea expressum oleum reconditur. Calfacit, emollit, remittit: horroribus & neruorum uuluaq; uitijs auxiliatur, omni acopo iuuantius, quippe quod emolliat.

TΑΙΧΙΣ, quod Gracis Mustum significat, huic vnguento nomen dedit, in cuius tradenda facultate diuersum sapiunt, hinc Columella et Plinius: inde Dioscorides & Galenus. Quorum hū frigus, isti calorem inducere iudicent. Sed Galenus, qui vinacea lento igni decoquit, non amplo fumario, idem sentire quod Dioscorides videtur.

Amaricinum. CAP. LVI.

NOMENCLATURA.

Gr. Αμαρίνιον. Lat. Amaracinum. Ita.

l'Vnguento Amaricino.

Amaracinum longe optimum in Cyzico fieri solet ex omphacino & Balanino, spissamētis è Xylobalsamo, Iunco odorato, et Calamo factis, conditisq; Amaraci, Costi, Amomi, Nardi, Casia, Carpobalsami et Myrrha odoribus. Aliqui, quò preciosius fiat, Cinnamomum addunt. Mel autem & uinū assumentur: hoc in uasorum illitionem, illud ad cogendas tuorum aromatum offas. Amaracinum calfacit, soporem mouet, uenarum spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, urinam cit, putrilaginibus ac fistulis per quàm utile: nec non humentibus hernijs, postquam medica manus operam suam impenderit: crustas, & tetra ulcera, quæ theriomata uocant, rumpit: difficili urinæ, illita sede, & eius inflammationibus auxiliatur: hæmorrhoidas illitu soluit, uulua subditum menstruos cursus euocat, duritias, ac uulua tumores discutit, uulneratis neruis, musculis confert, laneo centunculo modicè madefactum & impositum.

Supra

Supra in Sampsuchino diximus quæ res Dioscoridem mouerit ut se-
paratim tractaret de Amaracino & Sampsuchino vnguentis. Tra-
it Galenus sui temporis vnguentarios cum Amaracinam Cixici compo-
sitionem vellent imitari, Amaraci loco, Marum quo magis aspiraret in-
scuisse, se vero cum Amaraco parasse, in qua ut odoris minus, ita vir-
ti nihil diminutum.

Megalinum. CAP. LVII.

NOMENCLATURA.

Græ. Μεγαλειον. Lat. Megalinum. Ita.

Vnguento Megalino.

Fælitabatur olim Megalinum, sed nunc compositio exole-
uit & prorsus oblitterata est. Cuius ad historia complemen-
tum meminisse non fuit alienum. Mistura cū Amaracino eadē
erat, sed resina exuperabat, hac tantum ratione differens. Qua-
leuiter emollit. Resina unguētis, neque tutela neque volupta-
s gratia adijcitur, sed coloris crassamentiq; causa. Ea tantisper
quitur, dum desinat olere: cuius coquendæ ratio declarabitur,
cum de resina differemus.

Hoc hodiè non conficitur, & desierat fieri Dioscoridis tem-
pore.

Hedychroum. CAP. LVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Ἡδύχρουν. Lat. Hedychroum. Ita.

Vnguento Hedichroo.

Quod Hedychroon uocāt, in Co fieri solet: eisdē præditū
uiribus et misturis, qbus amaracinū, sed suauius spirat.

Est Hedychroon vnguentum cuius compositionem hic tacet Dio-
scorides. Nostro etiā tēpore nō praparatur. Sunt etiam Hedychroi pa-
lli, qui ingrediuntur Theriacen Andromachi, & quorum conficiendo
um rationem tradit Galenus in libro de Antidotis.

Metopium. CAP. LIX.

NOMENCLATURA.

Græ.

Græ. Μετωπίον. Lat. Metopium. Ita.

l'Vnguento Metopio.

Fit in Aegypto unguentum, quod Metopion patrio nomine appellatur, propter Galbani missionem: nam lignū in quo Galbanum enascitur, Metopion uocat: constat amaris nucibus, omphacino oleo, Cardamomo, odorato Iunco, Calimo, melle, uino, Myrrha, Balsami semine, Galbano & resina probatur pingue, graui odore, quod magis Cardamomum & Myrrham, quam Galbanum respiat: Calfacit uehementer, & adurit, atq; extrahit, ora uenarum aperit, ulcera purgat, extrahitq; ad precisos nervos, & musculos, ad hernias humore contractas, cum erodentibus medicamentis efficax est: ceratis & malagmatis inseritur: horroribus, conuulsisq; præsertim quibus ceruix in scapulas deiecta, & retrorsum contracta est, utile habetur: sudores ciet, uulua spiracula recludit, & eiusdem duritias laxat: in summa, moliendi uaturam habet.

Mendesium. CAP. LX.

NOMENCLATURA.

Græ. Μενδίσιον. Lat. Mendesium. Ita.

l'Vnguento Mendesio.

Mendesium constat Balalino oleo, Myrrha, Casia, & resina. Aliqui tamen post singulorum pondera, Cinnamonum exiguum addunt, nullo compendio: nam quæ simul excocta non fuere, uim nullam exhibent. Similem Metopio uim obtinet, sed inferiorem multo.

Annoratio in Cap. lix. & lx.

Hæc duo præcedentia capita, satis clara sunt, & in his satissuperque seipsum exponit Dioscorides. Non consciuntur in Europa.

Staete. CAP. LXI.

NOMENCLATURA.

Græ.

Græ. ΣΤΑΧΤΗ. Lat. Staële. Ita. Statte.

Storace liquida. Off. Styrax liquida.

Staële uocatur pinguitudo recentis Myrrhæ, cum exigua aqua tusa, & Origano expressa. Ea perquā odorata, ac preciosa est: atque unguentum per se facit, quod Staële nominatur. Maxime probatur quæ nullam olei mistionem admisit, cuius minima portio compos est uirium plurimarum. Vim calfactoriam Myrrhæ & calidis unguentis respondentem habet.

Graphice pingit Dioscorides quid sit Staële, ut non alio opus sit sermone. Differunt tamen Styrax liquida, & Staële, siquidē diuerse sunt arbores, Styrax & Mirrha. Staële ē receti Myrrha in aqua resoluitur. Styrax liquida, ē Styrace Calamita antea oleo & resina imbuta exprimitur. Myrrha recentis inopia, Staëles itidem penuriā parit. Affertur ex Oriente, sed parum syncera. E selectissima tamen Myrrha fieri potest.

Cinnamominum. CAP. LXII.

NOMENCLATURA.

Græ. Κινναμώμινον. Lat. Cinnamominum.

Ita. Vnguento del Cinnamo.

Cinnamominum confit ē Balanino oleo, & Xylobalsami, Iunci odorati spissamentis, atque Cinnamomi, & seminis Balsamini suauitate conditur, quadruplaq; Myrrhæ ad Cinnamomum portione, mel ad cogenda omnia adijcitur. Laudatur non acre, molli odore, planē Myrrham redolens, crassum, odoratū, gustu perquā amaro. Id non à resina, sed Myrrha, crassitudinem obtinuit: resina enim neque amaritudinē præbet, neque ullam odoris gratiam adijcit. Vim habet admodum acrem, amaram, & calfacientem. Itaque ora uenarum aperit, calfacit, discutit, diffundit, humores et spiritus attrahit, caput aggrauat, contra uulnæ uitia cum duplo oleo, cera, & medulla efficax est. Ita enim serè multum acrimoniæ exolefcit, & quadam emolliendi

liendi vis contrahitur, alioqui adurit, & præ omnibus crassis unguentis indurat. Facit mirum in modum ad fistulas & ulcera, quæ putredinis uitium senserunt: item ad hernias humidiores, carbunculos, febrium horrores, tremores, gangrænasq; cum Cardamomo: aduersus serpentium morsus illinitur, scorpionum & phalangiorum ictibus cum tritu grossis imponitur.

Nardinum. CAP. LXIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Νάρδιον μύρον. Lat. Nardinum unguentum. Ita. Unguento del Nardo.

Ratio Nardini faciendi uariatur. Nam aut Malabathrino folio, aut sine eo fit: plerumq; autem Balanino oleo, aut omphacino, Iuncus odoratus spissamenti gratia adyctur: sicut propter odoris suauitatem, Costus, Amomum, Nardum, Myrrha, Balsamum. Laudatur tenue, non acre, Nardi arida aut Amomi odorem referens. Vis ei extenuans, acris: expurgat, excalfacit, absterget humores, rarefacit. Hoc liquidum est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi resinam recipiat. Fit etiam simplex ex omphacino oleo, Iunco, Calamo, Costo & Nardo.

Malabathrinum. CAP. LXIIII.

NOMENCLATURA.

Gr. μάλαβαθρινον. Lat. Malabathrinum. Ita. Unguento Malabathrino.

Malabathrinum spissamentum Nardini habet, insuper Myrrhæ plusculum additur: qua de causa calfacit, Crocino, aut Amaricino uiribus respondens.

Iasminum. CAP. LXV.

NOMENCLATURA.

Hoc caput non est in Græco codice.

Apud

Apu*d* Persas fit, quod Iasminum cognominatur, ex albis floribus Violæ: quorum sextans, in Italicum sextarium Se*mi*ni olei demittitur, uiolis, ut in Lilino diximus, uicissim permutatis. Apud Persas inter epulandum usurpatur odoris causa. Nam toti corpori cōuenit, præsertim cum in balneas descensum est. Sed his opitulatur corporibus, quæ calfactionem, laxationemq; desiderant, grauius enim spirat, quàm ut libenter à plerisque recipiatur.

Trium præcedentium capitum confectiones clara sunt. Porro l*v*. cap. cui titulus Iasminum vnguentum, in nouissimè editis exemplaribus græcis non habetur. Quidam cum floribus quos Iossēminos vocant consciunt. Quod non esse è mente Dioscoridis facile (siquidem hoc caput non adiectitium est) cum Matthiolo concesserim. Iasminum Græcis, Violatum Latinis redditur. A tenim de his Violis intelligendum, quæ Arabicè Keiri dicuntur. Porro radices, caulis, longitudo, densitas, rami, folia, & pleræque aliæ partes Iossēminorum longe absunt a Violarum albarum deliniatione.

Myrrha. CAP. LXVI.

NOMENCLATURA.

Gr. *Σμύρνα*. Lat. & Off. Myrrha. Ita. La Myrrha. Gal. la Myrrhe. Ger. Myrrhen.

MYrrha lachryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ non dissimilis: è cuius uulnere defluit lachryma in subiectas tegetes: alia circum caudicem concrescit. Dicitur ex his aliqua Pediaimos, præpinguis, quæ expressa, statim emittitur: alia Gabirea pinguisima, leto & pingui solo nascens, ea copiosam sudat Stacten. Omnium prima est quæ Trogloditica appellatur, accepto cognomine à loco, in quo prouenit, splendens, subuiridis, ac mordens. Quinetiã legitur tenuis quædam, quæ à Trogloditica secunda est, Bdellij modo mollis, uerum odore grauiuscula, apricis nascens. Alia Caucalis cognominatur, præter modum exoleta, nigra, & retorrída. Omnium deterrima quæ

Erga-

Ergasima dicitur: pingui carēs, cano situ obducta, acris, ad gummi imagine uergēs, & uiribus eius proxima, improbatur Amineā cognomine. Ex ijs pastilli fiunt, sed ē pinguibus, pingues, & odorati: ē siccioribus, haud quaquam pingues, & inodorati: minus odore pollet, quā oleum non admisit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur macerato gummi aqua, in qua Myrrha maduerit. Eligenda est recens, squalore obsita, leuis, undique cōcolor, quā confracta uenas unguium modo candidas & leues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens: super uacua & inutilis est ponderosa, coloris piceī. Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccāt, astringit, uulnam emollit, & praeclusam aperit, menses & partus celeriter extrahit, cum Absinthio, Lupinorum cremore, uel succo Rutae admoda tuberculo Fabae deuoratur in uetere tussi, orthopnoea, in laterū pectorisq; doloribus, in alui profluuio, & dysenteria: horrores discutit, duabus horis ante februm accessiones, faba magnitudine pota cum Pipere & aqua: subdita linguae liquataq; scabritiem arteriae expolit, obtusam uocem expedit, uentris tineas enecat: contra grauem oris halitum manditur, & aduersus alarum tadia, cum liquido alumine illinitur: gingiuas & dentes stabilis: colluto cum uino & oleo ore: uulnera capitis illitu glutinat: medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cum cochleae carnibus: ite purulentis auribus inflammatisq; cum Meconio, Castorio, & Glaucio: ad uaros autem cum casia & melle illinitur: impetigines ex aceto purgat: defluentes capillos cum Ladano & uino myrteo illita, firmat: diuturnas destillationes lenit, illitis penna naribus: oculorum ulcera complet, albugines tollit, caliginem discutit, scabritiem laeuigat. Fit ē Myrrha, perinde atque thure, fuligo, & ut postea ostendemus, ad eadem conueniens. Bæotica Myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdam in Bæotia nascentis. Melior est quā Myrrham odore representat: uis ei calfa-

Eloria

Toria inest: emollit, discutitq; suffimentis comodissimè inseritur.

Myrrrha selectissima pauca adeo quantitate ad nos affertur, vt molis potius sit vice, quàm aromatis. Vulgata hac Myrrha non Bdelum est, vt ei patebit qui caput de Bdellio Dioscoridis diligenter legerit, uicq; vulgare nostram Myrrham contulerit. Adulterabatur Myrrha Galeni tempore cum liquore Carpasi, arboris venenosa & mortalis, quàm ita praparatam (etiam Theriara immixtā) sumpsisset, proculdubio nociebatur. Caterum extrinsecus applicita multis malis vsui erat. Videntur pharmacopola vt Myrrham seligant, Materia listaq; qua possunt purgeant, vt selectissimam Myrrham Alexandria comparent, ne inscientes remediū loco, venenum exhibeant. Arbor Myrrha quinum est ubitorum altitudinis, non sine spinis caudue duro & intorto, crassiore quam thuris, cortice laui, similiq; Vnedoni, folio Olue, sed crispiore & culeato. Myrrha excalfacit & desiccat secundo ordine, amara est, & hstersoria. Myrrha vbi deerit, Calamus odoratus substituetur. Lachrynam esse, Myrrham Bæoticam quæ è radice incognite nobis arboris distillet, satis liquet: at si plura dicere voluerimus, aut insomnia, aut mentia proferenda.

Styrax. CAP. LXVII.

NOMENCLATURA.

Gr. Στύραξ. Lat. Styrax. Ital. Lo stirace.

Offic. Storax Calamita.

Styrax lachryma est arboris malo Cotonæ similis. Præfertur sordescens, flavus, resinosis, & albicantibus grumis, quàm plurimum in sua odoris gratia permanens: qui dum mollior, melleum liquorem reddit: qualis è Cataballis, Pissidia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, surfuosus, friabilis, canoq; si obduclius. Caterum lachryma inuenitur gummiū similitudine, perlucida, & Myrrha amula: uerum per pauca manat. Adulteratur ligni scobe, quam uermiculi erodentes excusserunt, nelle, & iridis sedimento, & quibusdam alijs. Alij ceram ut adipem odoribus imbutum, flagrantissimis folibus cum Styace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua uer-

c

mich

miculos exprimunt, uenūdantq̃. Styracem hunc, quoniā in uermiculorū specie cōtrahatur, Scolectē cogmināt, quē tāquā ſyncerū imperiti approbāt, nō animaduertētes ad præcipuā odoris fragriā, ſiquidē acer admodum eſt, qui adulterationis uitio caret Styrax calſcit, emollit, & cōcoquit. medetur tuſſi, deſtillationibus, raucedini, grauedini, & interceptæ uoci, uulnæ præcluſæ duritiæ laboratū cōuenit, cit mēſes potū appoſituq̃, aliū leuiter mollit: ſi exiguū cū reſina terebinthina catapotij modo deuoretur. Miſcetur utiliter diſcutiētibus malagmatis, acopiſq̃. Adoletur autē & igni torretur, ut fiat ex eo, uelut ex thure, fuligo, ad eadē cōueniens ad quæ Thuris fuligo: ex eo etiā in Syria Styra-cinū oleum componitur, quod calſcit uehementer, & emollit: uerū caput dolore afficit, adgrauatq̃, & ſoporem adfert.

Styrax in quibuſdā Aſiæ minoris tractibus prouenit. Calamita autē nomen duxit ē libro Galeni de Antidotis, Vbi ſimplicia recensens quæ intrant Theriacen, Styracem laudat ut præſtanti orem, quæ ē Pamphilia in iūcis afferretur: id anſam præbuit, ut Calamita nomen acciperet. Quod uero iuncea reliquis præſtaret, deinceps uſitatū medicis, ut Styra-ci ſemper Calamita nomen adiungerent, nimirum quò excellētiorē designarēt. Quod uerò legitur in textu Dioſcoridis (Qualis eſt Cathallis) legendum ē Plinio eſt (Qualis eſt Gabalites) qui dicat: Styracem naſci in Syria Iudeæ proxima, iuxta Gabala Marathunta, & in Selenicia mōte Caſſio. Pulueris in Styra-ce cauſa eſt uermiculi arbore exadētes.

Bdellium. CAP. LXVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Βδ'ελμιον. Lat. Bdellium. Ita. Bdellio. Res

Gal. incognita. Of. nomine utuntur Latino.

Bdellium, alij Bolchō appellant: alij Madelcon: lachryma eſt Saranice arboris. Probatur guſtu amarum, tranſlucidum, taurini glutinis in morem, intus pingue liqueſcens facile, ligni ac ſordis expers, ſuffitu odoratum, ungui ſimile. Eſt etiamnum Bdellij genus ſordidum, nigrum uberioribus glebis in offiis

conuo

conuolutū, Aspalathi odore, ex India aduectum. Defertur etiā a Petra oppido siccum, resinosum, liuescens, sed facultate secundum. Adulteratur gūmi: sed ita uitiatū nō perinde gustui amaritudinem repræsentat, nec usque adeo suffitionibus odoratum calfacit & emollit duritias, & turgentia guttura, humiditas hermas discutit cū ieiuna salina dilutum, uulue spiracula laxat appositū & suffitu, & partus humiditates q̄ omneis extrahit: calculos potu cominuit, urinā mouet: et tussietibus, a serpēte percussis, utilissimè datur: ualet ad rupta, uulsa, laterum dolores, & discursantes spiritus: malagmatis inseritur, quæ contra duritias & neruorum nodos profunt: contusum resoluitur affuso uino aut aqua calida.

B Dellij loco hætenus Myrrha deprauata uenit. Seplasijs rarum, & monile habeti, Siciliense Bdelliū (Neapolitanis Cefaglioni) Palmæ figuram, cubito nō amplius, altum. Tenerum & sapidum semen, pluribus septum inuolucris, edendo est.

THVS. CAP. LXIX.

NOMENCLATURA.

Gr. Λιβανος. Lat. Thus. Ital. Lucenso Off. Lat. nomine. Gal. Encens. Ger. Weitauch.

Thus in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primatum tenet in eo genere masculum, Stagonias appellatum, suapte natura rotundum: tale autem indiuiduum est candidum cum frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens, Indicum uero fuluescit, & colore liuet, sed rotundum industria faciliant: nam in quadrangulares formas dissectum, fictilibus uersant, donec rotunditatem contrahat. Verum eiusmodi Thus tempore flauescit, quod Atomum, aut Syagrum appellant. Secundum locum habet Arabicum, & Similo nascens, quod aliqui Copiscum uocant, minus multo & fuluius. Est & ge-

nus aliud, cui *Amomita* cognomen est alioqui candidum: quod
 dū mollitur, mastiche more digitis cedit. Adulteratur in itinere
 Pini resina & gummi, quod facile deprehendi potest: siquidem
 suffitum gummi flammam non ei aculatur, & resina in fumum
 euanesceat, thus uero statim ardet: idem maleficium odor prodit.
 Ad calfaciendum & astringendum pollet, oculorum caligi-
 nem discutit, cana ulcera complet, & ad cicatricem perducit,
 cruenta uulnera glutinat, infrenatq; cunctas sanguinis eruptio-
 nes, etiamsi cerebri mēbranis effluat: ulcera quæ cacoethe uocā-
 tur, & sedis & reliquarum partium permulcet tritum cum
 eo & lacte linamentum: formicantes uerrucas inter initia impe-
 iginēque ex aceto & pice illitum tollit, ambusta igni, permio-
 nēque cum sullo adipe aut anserino, & ulcera in capite ma-
 nantia cum nitro si infricetur, sanat: paronychys cum melle, au-
 ribus fractis cū pice, medetur, ad reliquos aurium dolores cū dul-
 ci uino infunditur: instammata à partu mammae cum cimolia
 & rosaceo magna utilitate perungitur: additur ad arteria uisce-
 rumq; medicamenta: prodest sanguinis excreationi potum: sed
 in secunda uale tudine haustum, insaniam mouet, & largius
 cum uino potum interficit. In fictili mundo Thus crematur, fla-
 grante glebula succensum à lucerna, donec exuratur: post perfe-
 ctā uersionem operire oportet: usque dum restringatur, sic enim
 in cineres non redigitur. Aliqui ollulam aneo uase cauo circa
 mediū perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, ut in eius
 mentione mox ostendemus. Alij crudo fictili luto oblito, & in
 fornacem indito, cremant. Fistili etiam nouo iunacibus prunis
 torretur dum non amplius bullet, aut pinguitudinē uaporē mē
 emitat: facile enim comminuitur quod perustum non est.

Thuris cortex. C A P. L X X.
 NOMENCLATURA.

Græ

Gr. φλοιὸς λιβάνης. Lat. & Off. *Thuris cortex.*

Ita. Cortesia dello incenso. Gal. l'Escorce de l'Encēs.

Prefertur *Thuris cortex* crassus, pinguis, odoratus, retens leuis, minimè scaber, siue membranis. Adulteratur admisto Pini aut nucis eius cortice, sed horum index ignis est: siquidē reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore sumum eructant: *Thuris* uerò cortex ardet, & cum odoris fragrantia uaporem ei aculatur. *Thuris* modo uritur, & uis eadē quæ *Thuri*, sed ualidior astringentiorq;. Quare potu cruentis ex creationibus, uuluis fluxione laborantibus, in pectore confert: ad cicatrices oculorum. & caua sordesq; efficax est: tostus scabris lipitudinibus auxiliatur.

Manna thuris. CAP. LXXI.

NOMENCLATURA.

Gr. μάνη λιβάνης. Lat. *Manna Thuris.*

Ital. *Manna dello incenso.*

Manna *Thuris* probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & *Thuis*, sed in ualidiusculam. Sunt qui cribrata Pini resina, ac polline, aut cortice *Thuris* confusi adulterant, sed hæc igne deprehenduntur. Neq; enim æquè suffitu aerium uaporem sed fuliginosum & impurum expuit, & permistum suaueolentiæ halitus uirus habet.

Thuris fuligo. CAP. LXXII.

NOMENCLATURA.

Gr. Αἰθάλη λιβανότης. Lat. *Thuris fuligo.*

Ital. *La fuligine dello incenso.*

Fuliginē *Thuris* sic facito: Forcipicula, lucernis accensas singulatim *Thuris* glebas, innouā fictile ollā cōcauā imposito, & areo uase in medio perforato, deterfa diligenter sorde, obtegito: alterā admoneto, ex altera eius parte aut utraq; subiectis

quaternū digitorū altitudine lapillis, quò facilius perspici queat, si uratur: & qua locus capax fuerit, glebulas alias supponito, & antea quam prorsus prior gleba restinguatur, aliam impo- nito: donec sufficiente fuligine uidearis coegisse: Cōtinuo tamen externa aramenti partes spongia, aqua frigida madefacta, ab- stergantur: ita enim tēperato aris seruore, fuligo omnis inhere- bit, quæ aliōqui per leuitatē decidua, Thuris cineribus admisce- tur. Derasa itaq; fuligine, cinis cremati Thuris seorsum substra- hendus est. Idem opus, quoad satisfactū tibi uidebitur, obeundū. Oculorū inflammationes mitigat, fluxiones suspēdit, ulcera pur- gat, cana explet, carcinomata sistit. Simili modo è Myrrha, resi- na, styrace reliquisq; lachrymis fuligo excipit ad eadē cōueniēs.

Annotatio in Cap. lxxix. lxxx. lxxj. lxxij.

THUS, Thuris cortex Thuris Māna, & Thuris fuligo ex vna eadē q; plāta pdeūt ac ideo nō alienū fuerit de his etiā simul tractare. Ac primo de ipso Thuris arbore, qui licet in Arabia sola nascatur, non vbiuis tamen, sed in medio fere regni Sabeorū, vbi. Atramita habitat Solū id rubrū e lacteo traditur, spectās ortus solis æstiuū, vndiq; terra ar- gillosa crustacea; raris fontibus ac nitrosis per Mineos pximū pagū eue- hitur tramite angusto. Sole trecenta familia ius in Thura habet, & ob id sacra vocatur, & cū arbore vulnerāt, nec sieminarū cōgressu nec funerū polluitur. Duplex eius vindemia. Prior naturalisq; canis ortu flagrantis- simis æstibus cortice qui pregnās & tenuissimū tēditur, laxato plaga: nō adēpto. Inde p̄silit spuma pinguis, q̄ cōcreta dēsat, vbi loci natura poscit tegete palmea excipiente. alibi area circūpauita, purius illo mo- do, sed hoc pōderosius. Quod hæsīt in arbore ferro depeclitur ideo cortico- sum. Saucius arbores nemo custodit. Cōtrā, Alexādrīe vbi Thus rude in- terpollatur renouaturq; nihil tutū à fure. Autūno quoq; legitur par- tu æstiuo, hoc purissimū & calidū, Carpheotū vocāt. Sequēs vindemia verna, incisis per hyeme arboribus: rufum hoc exit, nec cōparādū priorī dathiatum appellant. Quod ex eo rutūditate gutta pepēdit, masculū vocatur, cū fere alias nō vocetur mas, vbi nō sit siemina. Religioni tri- butū, nè alter sexus vsurpetur. Masculū putāt a specie testiūdictū. Praci- puagratia māmoso cū inhaeretē lachrymā priore cōsecuta alia s̄x miscuit Singula hæc manū implebāt, cū tardius depecleretur. Graci hoc modo

Sta

Stagoniā & Atomū Thus vocant, minores guttas Orobiū appellāt. Mācas concusſu elisas Mānā vocamus. In insulis etiam Thus nasci perhibet Dioscorides, recētioreſ addunt nebulosas esse insulas ac morbidas, atq; adeo in has ablegari fontes, quò citius pereāt, nec mercatores à cōtagio innoxios si ppius acceſſerint. Thuris cortex cū lachryma areſa clade peſctūtur, & cū Thure affertur. Valētius quā Thus ipsum, astringit & deſiccāt. Quid ſit Māna Thuris ſuperius (ē Plinio) diximus. ſi quis rudius malit, puluiſculus eſt & pollē maſculi Thuris qui dū inuicē atteruntur grumi, reſoluitur. Māna illa ſolutiua roſcidus eſt ē cælo ſeruētīſſimus ut plurimū, diebus nocte decidens humor, nunc in grumos coactus. nūc in mel eliquatus, ut cognata cū cælo erūt ſupra quā ceciderit. De fuligine Thuris plura dicere ſuperflūū ſit, ipſe enim ſibi interpres eſt Dioscorides.

Picea & Pinus. CAP. LXXIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Πῖτυς. Lat. Pinus & Picea. Ita. Il Pezzo & il Pino. Off. Pineæ. Gal. Pin & Peſſe.
Ger. Rot danner

Pinus & Picea generi eidem aſcribuntur, ſed quandam flagitant ſpecierunt diſtinctionem, arbores uulgo cognitæ: quarum cortex astringit, prodeſt tritus & illitus intertrigini, ulceribus ſummū corpus occupātibus, ambuſtisq; cum ſpuma argenti & manna. Vlcerā delicatulorum acrimoniam reſuſcitantium, cerato Myr tino exceptus, ad cicatricē perducit: tritus cū ſutorio atramento ſerpentia cohibet, ſuffitu partus & ſecundis eycit, potus aluum ſiſtit, urinam mouet. Folia eorum trita & illita inſlāmationes leniūt, uulnera ab inſlāmatioē uindicāt: trita autē & decocta in aceto, ſeruēti collutioē, dentiū dolores: mulcēt: hepaticis utilia ſunt, drachmæ pōdere in aqua aut mulſa pota. Pineæ nucis cortex & folia potu idē præſtant. Teda earū particulatim ſecta ſi in aceto coquat & decocto dēs colluat, dolores leuat. Ex his etiā ſit ſpatha acoporū peſſorumq; compoſitioni

e 4 bus

bus idonea. Quin etiam earum crematarum fuligo ad librarij atramenti confectionem excipitur. Ea circumlitionibus efficacissime imponitur, quibus palpebras ornant: coloremq; mentiuntur. Calliblephara Græci uocant. Arrosis oculorum angulis, callofis glabrisq; genis, & collachrymationibus opitulatur. Pityides appellantur Pinorum Piceæque fructus, qui in conis inueniuntur. Vim astrictoriam habent, & aliquantum excalfacientem, tussi & pectoris uitij auxiliantur, per se, aut ex melle sumpti. Nuces Pineæ cum repurgatæ manduntur, aut cum passo aut cucumeris semine bibuntur, urinam cient, acrimonias in renibus & uesica hebetant, stomachi rosiones leniunt, datæ cum portulacæ succo, uirium infirmitatem roborant, corruptorum quoque humorum labem obtundunt. Pineæ nuces integræ recenter arboribus decerpæ in passo franguntur, & decoctæ uetustæ tussæ ac tabitudini conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur.

Picea græcis Peuce: Pinus, Pytis: si sponte proueniat, Pinafter, nam Pinus culturam recipit. Coni Piceæ & Pini inter se differunt. Longus est Piceæ conus, ita crassus ut manum compleat: squamas habet tenues, & a sese resolutas, sic ut sub squamis nucs videri queant, At breuior latiorq; est Pini conus, & Pyramidalis figura, crassior, lignosior, & compactior, ut videri non possint nucs. Verum si in calido æstuario habeatur, aut ad feruentem solem exponatur, dissiliunt, spargenturq; ingenti cum fragore nucs. Pini syluestris & Piceæ plures esse species, Italia testis est & Alpes, nam Picea frigoribus gaudet. His cognatæ sunt arbores, Larix, Abies. Tada. E Larice extrahitur liquida & summa virtutis resina, quæ Terebinthina vocatur, quod in eius è locū successerit quæ olim è Terebintho parabatur. Inciditur Larix ad medullā vsque, unde postea æstate distillat in certa vasa è Piceæ cortice cōfecta. Picea resinā edut durā, & intra corticē cōdensatā, distillat tamē aliquādo & trūcus, liquidā similē Laricina. Profert Abies liquorē hūc excellentissimū, cuius nulla apud veteres sit mētio, vocaturq; ab Italis Lachrimo vel Oliod' Auezzo. Errāt qui hūc putāt Laricina resinæ florē esse. Colligitur enim is liquor è cortice tum trunci, tum ramorū, aperientibus se
se ue


se resicis quibusdam: quæ turgentes indicant hunc eo loci esse liquorem, qui enatus reperitur corticem inter & corticem. Est hic liquor limpidus, clarus, & transparens, odoratus, & amarus. Hic odor & amaritudo in Laricina resina non reperiuntur. Vetus plus anno flavescit ab illa sua transparentia, & induratur aliquantum. Carnem inducit: emundat discutit, consolidat. Potus ventosos humores discutit, tutissimumq; remedium est laterum doloribus, & ad purgandos aremulis renes, & ad arcendam horum generationem. In cibo sumptus, prodest doloribus neruorum, & iuncturarum. Consolidat nullo negotio plagas, maximè capitis.

Lentiscus. CAP. LXXIIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Σχῖνος. Lat. Lentiscus. Ita. Lentisco.

Off. res incognita. Gal. Lentisque.



Lentiscus.

& eiusdem aut sedis procidentia. In totum Acaciæ & Hypocisthidis

Lentiscus nota arbor est, cuius toti inest adstringendi: semini enim, folio, ramo, cortici, radicibusq; cognatæ insunt vires. Liguamētum autem ita fieri solet: Folia, cortex, & radix in aqua coquuntur, & ubi abundè cocta refrigerataq; sunt, folia abijciuntur: aqua denuo coquitur, donec mellis habeat crassitudinem. Lentiscus sua adstringendi dote, ualet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu. Item contra eruptionem sanguinis è uulua,

cisthidis uicem representat. Idem facit succus è tritis folijs. Deco-
ctum fotu caua explet, & fracta ossa ferruminat: uulnè fluxio-
nes sistit, nomas arcet, urinam pellit, motus dentium collutione
stabilis. Virentes surculi calamulorum uice dentibus repurgan-
dis affricantur. Fit è semine oleum, quod prodest cum quid a-
stringi opus est. Lentiscus resinam gignit, quæ Lentiscina cogno-
minatur, & ab aliquibus Mastiche. Pota utilis est sanguinem
reijcientibus, & tussi ueteri: stomacho auxiliatur, sed ructum
mouet. Additur in dentrificia & illitiones faciei, ad nitorem
cuti conciliandum. Palpebras oculis incommodas replicat, man-
ducata halitum oris commendat, gingiuas contrahit. Optima
& copiosissima in insula Chio prouenit. Præfertur (nitedula
modo) resplēdescens, & candore Tyrrhenicæ ceræ similis, adul-
ta, retorrida, friabilis, odorata, stridorem adens. Viridis autem
inferior est. Adulteratur Thuris, resinæq; pineæ nuci mistura.

Lentiscus resinifera arbor, lentis folijs, in Italia tum alibi, tum in
Sene maritima nascitur, in ruinarum Romanarum macerijs, &
toto illo maris Tyrrheni tractu, Caietam vsque, & circa Neapo-
lim. Ibi & procera & humiles nascuntur. Producit Lentiscus in Italia
Mastichem, sed non ea abundantia qua in Chio & Creta insulis. Len-
tiscus desiccatur secundo gradu, vel initio tertij: in caliditate & frigidita-
te propè æquè temperatus. Astringunt omnes eius partes. Itidem succus
foliorum viridum astringit. Mastiche alba astringit & emollit, exal-
facit & desiccatur secundo ordine.

Terebinthus. CAP. LXXV.

NOMENCLATURA.

Græ. Τέρενθος. Lat. Terebinthus. Ita. Tere-
tho. Gal. & Officine Terbentinam
vocant. Ger. Terpentin.

Terebinthus cognita arbor est, cuius folia, & semen, &
cortex astringunt, & ad eadem ad quæ Lentiscus conue-
niunt, simili parata modo sumptaq;. Fructus esui aptus est, sed
stoma-

omacho aduersatur: ex calfacit, urinam mouet, uenerem exci-
 it: contra phalangiorum morsus conuenienter in uino bibitur.
 Resina eius ex Arabia petraea defertur. Prouenit etiam in Ju-
 daea, Syria, Cipro, Aphrica & Cycladibus insulis. Sed praeua-
 t candida, perlucida, uitreo colore, & in caruleum uergente,
 dorata, Terebinthum olens. Terebinthina resinas omnes ante
 dit, proxima Lentiscina, & Pinu, & Abiete. Has sequitur
 Picea & Piceis nucibus resina. Natura omnibus calfacere,
 tollere, discutere, expurgare. Tussi ac tibi conueniunt per se, aut
 eclegmate ex melle: uitia pectoris expurgant, urinam cient,
 cruda concoquunt, uentrem emolliunt. Palpebras commodissi-
 ie replicant, lepras tollunt, cum aerugine ac sutorio atramento,
 itroq; auribus saniem emanantibus cum melle & oleo, ite in
 ruritu genitalium utiles, malagmatis, ac opisq; admiscuntur, la-
 rum doloribus per se, illitu & appositu auxilio sunt.

Terebinthus, quem Graeci Terminthos vocant, arbor in Graecia,
 Asia minore, Africa, & India nascens, nascitur etiam in Italia,
 monte castri Tridentini, ubi Iulius Alexandrinus Medicus, Matthio
 antea non visam ostendit, qua in totum Theophrasti Terebintho re-
 onderet. Vidit & postea Matthiolus in pluribus alijs locis, ut apud
 huncos in monte quem eorum lingua Baldo nominat, & in alio, cui
 omen facit Carso. Venetijs non ita pridem asserri cepit, sed maiori ex
 arte cocta, raro liquida. Hac ideo dixi, ut Terebinthinam resinam scia-
 us non omnino esse deperditam.

Resinae aliae. CAP. LXXVI.

NOMENCLATURA.

Gr, ΠΗΤΙΝΗ ὕλη, ΠΗΤΙΛΙΝΗ, καὶ ΠΕΥΚΙΛΙΝΗ. Lat.

Resinae alie. It. l' Altre ragie.

Liquida resina e pinu et picea, a Gallia & Hetruria conehi
 solet, atq; olim a Colophone petebat: hunc Colophonie sibi
 gnomētū uedicauit. A Gallia quoq; subalpina, qua uernaculo
 ore latrice appellat incolae. Ea in linctu, et p se, magnopere pdest
 tussi



Larix.

tuſi ueteri. Colore inter ſe eſt, ſiquidē alia candida eſt alia oleoſa, alia mellei liquoris ſimilitudine, ut Larigna Cupreſſus etiam liquida fundit reſinam, quæ ad eadem pollet. Quæ uerò aridarum generi aſcribuntur, quedam ex Pineis nucibus, alia Abiete, alia Picea & Pinu exſtunt. Eligi debet longe omnium odoratiſſima, tranſluſcens, non retorrída, neque lutata, quandam ceræ faciem præbens, & friabilis. E Picea et Abiete reſinæ cætera antecedunt: odoratæ enim ſunt, atque Thus odore imitatur. Præſtantioreſ à Pityuſa inſul deferuntur, quæ ſecundum Hiſpaniam ſita eſt. Sed quæ e Picea nucibus Pineis & Cupreſſo manarunt, nihil ad illas, nec tantum uiribus potiuntur. Veruntamen eorundem gratia quorum & illæ ſumi ſolent. Lentiſcina Terebinthinæ reſpondet. Vritur reſina omnis liquida in uaſe quadruplæ capacitatis ad humorem qui inſunditur. Itaque reſinæ congius, in duobus aquæ pluuiæ coquitur, ſubiectis leuibꝰ prunis: reſina aſidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrída reddatur, a digitis cedat. Cæterum ubi refrigit, in fictile non picatum, quo aconitum uocant, id eſt, non illitum, reconditur. Fiet etiam eximiꝰ candoris, ſi reſina omnis eliquata præcoletur, quò ſæculenti ſordes excernatur. Vrantur quoque ſine aqua, primum leni igne, & ubi coire cœperunt, maior carbonum ſtrues ſupponi

tu.

r, & triduo citra intermissione[m] discoquuntur, usquedum
tedictas natura sua notas exuerint, mox ut dictum est, repo-
nuntur. Aridas unius diei spacio decoxisse satis est. Vt & odora-
malagmatibus, & acopis, & unguentorum colorationibus
ignoperè utiles sunt. E resina perinde atque Thure fuligo exi-
ur, ad circumlitiones idonea, quibus palpebras fucant, & co-
rem mentiuntur. Prodest glabris genis, collachrymationibus,
sisq[ue] oculorum angulis, ex ea fit atramentum scriptorium.

¶ Aec sunt Resinarum nomina. Resina Terebinthina, è Terebin-
tho. In huius locum successit frigidis in locis Picea resina, alijs La-
na, è Larice. Lentiscina quæ & Mastiche, è Lentisco. Pineæ, è Pino.
iegna, ex Abiete. Strobilina, è Strobilis, nempe Pini comis. Pix Hispanica,
Pix Græca, & Colophonina officinarum, resina coëta spēs est, cuius
fectionem docet Dioscorides. Color ex eo in pice prodit, vt plus mi-
sue colorata fuerunt resina. Resinarum præcipua est è Mastiche, mo-
enim astringit, & nequicquam pungit, aut acris est. Ceterarum po-
tissima est Terebinthina, astringit enim & amara est, & ob id plus
stiche digerit. Quinetiam astergit eius amaritudo. Pini resina licet
rebinthina sit acrior, non plus tamen attrahit, aut digerit. Mediant
er has Picea & Abietis resina. Vt enim resina Terebinthina acriores
t, ita non perinde acres, Pini & Cupressi resinas. Emollit resina Te-
rebinthina, secundo ab hac loco Lentiscina: has acrimonia superat Cu-
sina.

Pix liquida. CAP. LXXVII.

NOMENCLATURA.

Gr. ἡ πῖσσα ὕγρα. Lat. & Offic. Pix liquida.

Ita. Pece liquida. Gal. Poix fondue.

Ger. Schiffberß.

¶ Pix liquida, quam alij Conum uocant, è pinguis[sim]is Pini
Piceaq[ue] lignis congregatur. Optima est splendens sincera,
is. Contra uenena, phthisim, purulentam excreationem, tuf-
suspiria, & pectoris humores, qui difficile extusuntur, ef-
ix est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. Tonsillarū

& uue

Et uuae inflammationes, anginaeque utiliter perunguntur: purulentis auribus infunditur cum rosaceo, Et illinitur cum trito si le serpentium morsibus: adiecta uero pari cera scabros ungue extricat, impetiginesque emendat: uuluae duritias ac sedis tubercula discutit: cum farinaque hordeacea Et pueri impubis urina decocta, strumas rumpit. Cohibet ulcera quae serpunt, cum pine cortice, aut sulphure, aut furfuribus illita. Caeterum cum Thurmannae et cerato profundos ulcerum sinus conglutinat, rimas sedis et pedum, magno auxilio illinitur, ulcera replet, Et cum melle purgat. Quin et cum uua passa et melle carbunculos et putrida ulcera emarginat, disrumpitque. Erodentibus medicamentis, quas Septas uocant, probe immiscetur.

Picinum oleum. CAP. LXXVIII

NOMENCLATURA.

Græ. πιτσελαιον. Lat. Picinum oleum.

It. l' Olio della pece. Off. non preparant.

Epice fit quod Pisselæon appellatur, separato liquore aquoso, qui supernatat Pici, sicut serum lacti. Nam expanso, quando Pix coquitur supra cortinam uellera pura madescunt acceptoque halitu eius exprimuntur in uas. Quas pix liquida, prebet utilitates. Alopecias capillo replet, cum farina hordeacea illitum: quibus et liquida Pix medetur, iumentorum ulcera sibi emendat.

Fuligo liquidæ picis.

CAP. LXXIX.

NOMENCLATURA.

Græ. λίγνυς τῆς ὑγρᾶς πίσης. Lat. Et Offi. Fuligo liquidæ Picis. Ita. la Fuligine della Pece. Gal. Suye de poix fondue.

Fit hoc modo è liquida pice fuligo: In lucerna noua quæ el-
lychnium habeat, nonnihil picis incendito, lucernamq; ficti
i uase in clibani speciem eonformato, superius in angustum for-
ucato, inferius perforato, ut clibani esse solent: operito, & ado-
eri sinito, consumptoq; liquore nouum infundito, quoad suffici-
em usui fuliginem collegeris. Vis ei astringens, acrisq;. Vsu est
ad pigmenta quibus palpebras linunt & uenustant, & ad cir-
umlationes. Item ubi glabris pilos restitui oportet, ad imbecilles
achrymososq; oculos: insuper ad eorundem ulcera non inuti-
is est.

Pix arida. CAP. LXXX.

NOMENCLATURA.

Græ. ξηρὰ πῖσσα. Lat. & Off. Pix ari-

da. It. la Pece secca. Gal. Poix seche

Ger. Griechisch bech.

Liquida Pix decocta in spissam coit, quam uocant aliqui
Palimpissam. quo in genere quædam uisci modo lentescit,
ioscas cognominata: altera sicca est. Probatur pura, pinguis,
dorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia et Lycia, picis resinæq;
inul naturam habentes. Calfactorem uim habet: dura emol-
lit, pus mouet, tubercula panosq; discutit, ulcera replet, uulnera-
q; medicaminibus commode permiscetur.

Zopissa. CAP. LXXXI.

NOMENCLATURA.

Græ. ζώπῖσσα. La. & Ita. Zopissa.

Zopissam aliqui aiunt derasam nauibus resinam cum ce-
ra, quã alij Apochyma appellant. Ea dissipandi naturã ha-
bet

bet: quoniam marino sale macerata sit. Alij pineam resinam hoc nomine vocauerunt.

Cognata hac quinque capita sunt, & aperta, ideo priuatim tractari non debet. I liquida picis aut nullus, aut rarus hodie in medicina est vsus. Oleum Picinum nostro tempore non preparatur. E pice tamen & resina per alebicum rectius distillaretur. Fuligo qualiter excipi debeat, satis superque ostendit Dioscorides in cap. de Thure. Sicca pix nulli non nota est. Vt fiat plures rustici in hyrcinia sylua norunt. Zopisfa quæ & Græcis Hypochina, Latinis, Pix naualis, fiebat Græcis ad illinendas naues è resina & cara: Nunc verò Germani ex liquido Bitumine picem naualem concoquunt, quod etiam in Epiro fit, vbi Pissaspharton, id est, Picibitumè copiosè habetur. Pix sicca excafcacit & desiccacit secundo ordine, plus tamen desiccacit, quam calefaciacit. Contrarium accidit in liquida. Et liquida & sicca pix, astergunt, maturant, digerunt, & cum gustatur, amara sunt, & acres. Fuligo picis desiccacit, quæ è Terebintho & Myrrha eadem facilitate abstergit, quæ ea quæ è Thure fit. Plus tamen potest, & plus acrimonie habet quæ è Stryace, & hac plus quæ è pice liquida, hancque superat resina Cedrina. Vtiles sunt oculorum morbis.

Bitumen. CAP. LXXXII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ασφάλτος. Lat. Bitumen.

Ita. Bitume.

Bitumen Iudaicum cæteris anteponitur. Cuius probatio est, ut purpure modo splendeat, sitq; ponderosum, ac ualidum odorem uibret. Nigrum autem & sordidum, uitiosum est. Adulteratur pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sydone. Liquidum inuenitur in Agragantino Siciliæ, fontibus innatans, quo utuntur ad lucernarum lumina, olei uice. Hal lucinantur qui id Sicilicum oleum nominant: nanque liquidum bituminis genus esse constat.

Pissasphaltum. CAP. LXXXIII.

NOMENCLATURA.

Gr. $\pi\iota\tau\alpha\sigma\phi\alpha\lambda\tau$. Lat. Pissasphaltum.

Ital. Pissasphalto.

N Ascitur in Appolloniatarum agro circa Epidaurum, quæ Pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunijs montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, æstuque in litus expuitur, illic cocta in glebas, mistam Bitumini picem redolet.

Naphtha. CAP.

LXXVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. $\nu\alpha\phi\theta\alpha$. Lat. Ital. &

Offic. Naphtha.

N Aphtham uocant Babylonij, Bituminis colamen, colore candidum: inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita ut ex spacio protinus in eam transfiliat. Ad suffusiones oculorum, & albugines utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur: uuluarum procidentia, strangulationesq; olfactu, suffitu, imposito emendat. comitiales morbos suffitum deprehendit, Gagatæ lapidis more, purgationes mulierum cum uino & Castorio potum elicit: tuſſim ueterem, & anhelitum adiuuat, serpentium morſibus, coxendicum late cumq; doloribus auxiliatur, datur cæliacis in catapotio deuorandum cum aceto: potum discutit sanguinem concretum: dysentericis cum ptisana liquatum infunditur: distillationibus suffitio ne medetur, mitigat dentium dolores oblitum: ceterum pilos in commodos siccum replicat, specillo impositum. Concalfactum au

f tem

tem & cum farina hordeacea, nitro & cera illitum, podagris articulorum doloribus, lethargicisq; prodest. Pissasphaltos eadem, quæ Pix & Bitumen, si misceantur, potest.

Annotatio in Cap. lxxxij. lxxxij. lxxxij.

Bitumen quod Asphaltos est Græcis, pinguis est ceu terra adeps, calore & substantia picis, qui fit ut facillimè ignem concipiat. Verum Bitumen est Iudaicum, quod è lacu, cui mari mortuo nomen est elicitur. Est & liquidum è Sicilia bitumen, quod etiam in Gothia & Saxonia prouenit. Hoc Barbari axes vngūt, & iumentorum scabiem: hoc etiam lucernarum lumina accedunt. Pissasphaltos Bitumen est Pici permixtum, quod apud Apolloniam nascitur, & nunc in Transylvania fluminum impetu è montibus defertur, quod Germani purgant, & cū ad cera crassitudinem coxerint, ad faces pro cera vntur. Arabes duas Mumie species faciunt. Vnam quæ verum est Dioscoridis Pissasphaltos: alterā, quæ vera est Mumia. Porro vera Mumia est, quæ è Myrrha: Aloe, Croco, & ex humiditate quæ ex cadaueribus humanis resudat conficitur. Atenim cum in Asia diuitum tantū & principum corpora ad eum condiantur modum, pauperum verò cum Asphaltis & Pice: nec mercato ribus diuitum auferre corpora facultas sit: restat vram nos Mumiam non habere, cum pauperum tantum cadauera ad nos afferantur. Bitumen verum excalfacit & desiccet secūdo gradu. Naphtha olim è Parthia afferebatur, bituminosus liquor, seu ut quidam volunt, eliquatum terræ seu saxi occulta natura, Bitumen, & in olcasam materiam resolutum, vulgo oleum petra, seu Petroleum vocatur.

Cupressus. C A P.

LXXXV.

NOMENCLATURA.

Gr. Κυπρίσος & . Lat. Cupressus. Ital. Cipresso.

Off. Latino nomine. Gal. Du Ciprez.


Ger. Cypressen nuss.

Cupressus refrigerat, & astringit. Cuius folia ex passis & exiguo Myrrha pota, vesicæ rheumatismis & urina difficultati auxiliantur. Pilula autem ex uino tuscæ in dysenteria.

alibi



Cupressus.



Chamæcyparissus.

alui fluxione, tussi, & orthopnœa, aut si reijciatur sanguis con-
 uenientissimè bibuntur. Earum decoctum eosdem præbet effe-
 ctus. Tussæ cum fico duritias emolliunt, nariumq; polypo meden-
 tur. In aceto coctæ, & cum lupinis detritæ, scabros ungues ej-
 ciunt. Hernias intestinorum prolapsu erumpentes illitu repri-
 nunt. Folia eadem præstant. Pilulæ cum arboris coma suffitæ,
 ulices abigere existimantur. Folia trita & imposita, uulnera
 onglutinant, sanguinem supprimunt, capillum ex aceto tingūt.
 Illinuntur per se aut cum polenta ignibus sacris, ulceribus quæ
 erpunt, carbunculis & oculorum inflammationibus, admota
 um cerato stomachum corroborant.

CVpressus procera arbor, & fronde semper virescente, fructus (nēpe ter in anno) feracissima: vocantur hi galbuli, pibila, & nuces: colliguntur mensibus Ianuario, Maio, Septēbri. Semen habet adeo minutū vt etiam visui imponat. Miraculo naturæ est tam exiguo semine, ingentem adeo arbore procreari. Nulla vetustate lignum eius corrumpitur. Cupressi lacrima liquida est, Larigna similis, dum gustatur, admodum feruens.

Iuniperus. CAP.

LXXXVI.

NOMENCLATURA.

Gre. Αγρευθις. Lat. & Off. Iuniperus.

Ital. Ginepro. Gal. Geneure.

Ger. WBechholter.



Iuniperus.

Iuniperi genera duo. Altera maior altera minor. Vtraq; acris est excalfacit et urinā mouet, accēsa serpētes fugat. Baccarū nonnullæ nucis iuglandis magnitudine non nuquam grandeſcere aliæ nucem Ponticam æquare inueniuntur, rotūda, odorata, in mandendo dulces, ſubamara quæ Arceuthides etiam id eſt, baccæ Iuniperi, nominantur. Modice calfaciunt & astringunt, ſtomacho utiles, contra peſtoris uitia, tuſſim, inflationes, tormina, & ſerpentium icſus efficaſſime bbum

buntur: urinam cient, unde ruptis, conuulsis, & uulua strangu-
latui subueniunt. Foli acrimoniam habent, ideò tam ipsa quàm
eorum succus ex uino contra uiperarum morsus illini aut bibi
prodest. Corticis cinis cum aqua illitus lepras eximit. Ramenta
ligni deuorata interficiunt.

Est Iuniperus proceræ altitudinis: est & humilis, ac parem fructum
obseruata proportionem referunt, quo etiam in medicina utimur.
Fert Iuniperus gommam similem Mastiche, hanc Sandaracam, & ver-
nicem scriptorū, diuersissimum tamen à Sandaracha quam quinto libro
describit Dioscorides. Sandaracha hæc, recens, lucida est, alba, & tran-
sparens, sed veterascendo rufescit. E Sandaracha & ligni semine fit Ver-
nix. liquida utilis est ambustis, & eximij remediij in dolores & tumo-
res hæmorrhoidum. Sandaracha calida & sicca est in primo gradu. Oleū
quod cum duobus vasis sibi inuicem oppositis vel cum vitreo alembico fit
e Iuniperi ligno admodum sicco, dolorem dentium à frigiditate catar-
rhi sistit.

Herba Sabina. CAP.


LXXXVII.

NOMENCLATURA.

Gr. Βεῤῥυς Lat. & Off. Sabina. Ital. Sauina.

Gal. Sauinier. Ger. Sanelboon.

Sabina duorum generum est: una folijs Cupresso similis, spi-
nis horridior, grauius olens, acris & feruens. Arbor est
coactæ breuitatis, quæ sese magis in latitudinem fundit, huius
folijs nonnulli pro suffitu utuntur. Altera Tamarici folio similis
est. Vtriusque folia nomas sistunt, collectiones illitu mitigant,
& cum melle nigritias sordēsque repurgant: carbunculos cum
uino pota rumpunt: sanguinem per urinam eliciunt: partus ap-
f 3 post



posita extrahunt, & suffi-
tu idem præstant. Vnguentis
calsacientibus immiscentur,
& priuatim Gleucino.

Sabina vtraq; & ea quæ Cu-
preßi similitudinē refert, &
quæ Tamarici, in Italia vulgò
planta nota est. Nascitur & in
Gallijs, sed nō adeo vulgata. Se-
lago quadantenus folijs Sabina
refert, non perinde odore vel sa-
pore. Sabina excalfacit & desic-
cat tertio ordine, & de eorum
est medicamentorum numero,
quæ subtilissimis constat parti-
bus. Pota, crassos humores disgre-
gat, & concoquit.

Sabina.

Cedrus. CAP.

LXXXVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Κέδρος. Lat. Cedrus. Ital. Cedro.

Gal. Cedre. Offic. Ignota. Ger.

Ein Zederbaum.

Cedrus arbor magna est, ex qua picem colligunt, quæ
Cedria uocatur, Iuniperi modo baccas parit: baccarum
Myrti magnitudine, rotundas. Cedria optima est crassa, perluci-
da, grauis odoris, quæ dū effunditur, guttatim nō dissipata coit.
Cui ea uis inest, ut defuncta corpora coferue & uinētia corrūpat
Qua ex causa mortuorum uita, aliq appellauere. Vestimēta quo

¶

q̃ & pelles eximia calfaciēdi & siccādi dote, corrūpit. Magni ad ocularia medicamēta vsus. Quippe illita oculis claritatē affert albugines cicatricesq̃, detergit: instillata autē cū aceto, uermes, aurium necat: cū hyssopi decocto infusa, sonitus sibilosq̃, sedat canis dentiū indita eos frangit, & dolores leuat: idem facit cum ex aceto colluitur. ~~Myrti~~ Angina ea perunguntur. Tonsillarum inflammatio nibus auxilio est: lēdes pediculosq̃, illitu enecat. Cerastra mor- sibus cum sale imposita subuenit, contra hausta leporis marini uenena: in passo sumpta, auxiliatur. In elephantia, aut linctū, aut perunctiōne proficit: pulmonum ulcera purgat, & si cyathus eius sorbeatur, persanat: uermes & tineas subterindita ne- cat: & partus extrahit. Fit & oleum, à Cedria separatū, diū coquitur, uelleribus supra halitū eius expansis, ut in Pice, eius- dem ad omnia vsus. Priuatim uehementer perunctū, scabiem quadrupedum, canum, boumq̃, persanat, inherentes ricinos ene- cat, ulcera quæ ex tonsura acceperunt, ad cicatrices perducit. Ce- drides Cedri fructus uocantur. Calfactoriam uim habent, sto- macho aduersantur, auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, strangu- ria, menses ciunt, ex polline Piperis poti. Contra haustum leporē marinum in uino sumuntur. Serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino, aut medulla, corpore, in antidota adduntur. Fuli- ginem, quomodo ex pice, congeri oportet, quæ eandem quam picea fuligo uim præbet.

Cedrus Iunipero in totum similis. Nec bacca, baccis Iuniperi dissimi- les, purpureæ, leues, odoratæ, esculentæ, & magnitudo eadem. Ma- turescūt autumno, verum priusquam maturescant recentes baccas pro- ducunt. Qui fit, ut id temporis in Cedro uisuntur & noui & vete- res fructus. Gaudet Cedrus locis frigidis & saxosis, ac montibus mirum in modum delectatur. Nascuntur Cedri in Istria, at eos habent inco- la pro Iuniperis. Georgius Reffinger. Doctor Medecinae ramum dono dedit Matthiolo, quaquauersum Baccis, onustum, purpureis, lenibus, odoratis, & magnitudine Myrtilorum. Iam iam id notum quod du-

rißimum est Cedri lignum, & ea causa fuit antiquis ex eo statuas cōficiēdi, quod perēniores putarent, eis qua ē lapide vel metallo fierent. Nascuntur etiam Cedri in aureis Italiae hortis, in ripis Tyrrhami mari, lacu Benaco, qui vulgo dicitur Lago di garda. Cedrus duarum est specierum. Vna qua similis est Iunipero, ramosus est & brevis, Altera, arbor est in ista altitudine. Vtraque species calida & sicca est tertio ferē ordine. Cedria quartum ordinem attingit, tantum calida est, & subtilis in suis partibus. Corpora mortua desiccant, & illorum humiditatem absumit, corpora solida non attingit.


Laurus. C A P.

LXXXIX.

NOMENCLATURA.

Gr. Δάφνη. Lat. & Offic. Laurus. Ital. Lauro.

Gal. Laurier. Ger. Lorbeerbaum.



Laurus.

ciunt. Ergo in eclegmate trita cum melle vel passo prosunt
tabi

Laurus quaedā tenui folio constat, altera latiore. Vtraque ex calfaciōis naturam habet, & emollientem. Vnde decoctum earum in muliebres infusus additum, uulua & uesicae uitis conuenit. Virentia folia sensim substringunt: illita quoq, ac trita, uespasum apiumq, uelibus opitulantur. Eadem cum polenta & pane illita inflammationē omnem mitigant: sed pota stomachum effundunt, & uomitiones mouent. Lauri baccae magis quā folia calfaciunt.

iabi, orthopnœæ, & omnibus thoracis rheumatismis. Contra scorpionnm ictus ex uino bibuntur, uiligines emaculant. Succus baccarum utilissimè aurium dolori & grauitati instillatur, cum uino uetere, & Rosaceo. In medicamenta autem adijciuntur, quæ neruorum lassitudines reficiunt, acopa uocant: & ad unguenta quæ calfaciunt & discutiunt. Cortex radices calculos rumpit, partus necat, hepaticis prodest, tribus obolis in uino odorato potus.

Laurus odoratissima arbor, & Apollini dicata, pacem presert, quemadmodum oliua, à fulmine non percutitur. Vim habet ex sese producendi ignis. Si enim bacilla duo è Lauro sicca, superposito sulphure inuicem magna agilitate conficueris, confestim ignis exiliet. Folia, & fructus Lauri potenter desiccant & excalfaciunt, plus tamen fructus quam folia. Cortex radices minus in se acrimonia & caloris habet, sed amaritudinis magis, & aliquantum astringit.

Platanus. CAP. XC.

NOMENCLATURA.

Gr. πλατάνος. Lat. Platanus. Ita. Platanus. Arbor officinis inecognita.
Gal. Plan. Ger. Aßotn.

Tenerrima Platani folia in uino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt, tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilule in uino potæ, serpentium morsibus auxiliantur: exceptæ autem adipe, igni ambusta sanant. Insidens foliorum pilularumq; anugo, oculos & aures offendit.

Platanus Orientalis arbor, gratiam ex umbra, amplitudine, & amœnitate meruit, eamque ob causam olim in Italiam aduecta. Platani non longè à nostro æuo in Italiam asportati, non in altam proceritatem increuere, attamen spissum corticem gignunt. Media in temperamento & Platanus inter frigiditatem, & humilitatem: desiccât cortex & fructus.

f 5

Fraxi-

Fraxinus. CAP. XCI.

NOMENCLATURA.

Gr. μελία. Lat. Fraxinus. It. Frassino.

Gal. Fraisine. Off. *vt latinis.* Ger.

Eiñ aefchbaum.

Fraxinus arbor nota est, cuius foliorum succus, & ipsa peruncta, aut ex uino pota, uiperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ligni ramenta scobemq; potu perniciem asferre tradunt.

Fraxinus arbor notissima, duas habet species, proceram, & humilem, utramque armandis hastilibus aptissimam. Fraxinus serpentibus inimica, ut nec eius umbram sustineant. Composita una ex parte è Fraxini frondibus corona, & propter extructo igne, in medio collocatus serpens, per ignem potius, quam per Fraxineas frondes pertransierit. Fructum fert Fraxinus auium linguis similem, huiusque in medicina est usus, sub nomine, Lingua auis.

Populus. CAP. XCII.

NOMENCLATURA.

Gr. λεύκη. Lat. Populus alba. Ita. Popolo bianco.

Gal. Tremble. Officinæ pilulis utuntur, quas Oculos Populi uocant. Ger.

Sarsachbaum.

Potus albæ Populi cortex uincia unius pondere, ischiadicis ac urinae stillicidio prodest. Arbortium fieri tradunt, si cum mulino rene bibatur: folia quoque cum uino post purgationes pota, idem præstare produntur. Tepens foliorum succus, utiliter aurium dolori instillatur. Pilulæ quæ primo foliorum partu exiliunt, illitæ cum melle, oculorum hebetudini medentur. Memoriae prodiderunt, corticem albæ Populi & Nigræ, particulatim casum, & sulcis stercoratis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre. Populi nigræ folia cum aceto illita, magna

gna utilitate podagricis doloribus illinuntur. Resinam Populus fundit, quæ in malagmata additur. Semen potum ex aceto comitialibus utile est. Lachrymam Populorū commemorant, quæ in Padum amnem defluat, durari, ac coire in Succinū, quod Eletrum uocant, alij Chrysophorum. Id attritu iucundum odorem spirat, & aurum colore imitatur: tritum potumq; stomachi uentrisq; fluxiones sistit.

Populus alba & nigra eò tantū inter se differunt, quod alba in inferiori parte folia candida habeat. Succinum seu Ambra fulua non è Populo distillat, verum in certis maris Septentrionalis insulis nascitur. Id antiquitus Germani Glesum vocarunt, quod quidam eorum qui cū Casare Germanico erant, eo temporis quo ijs in regionibus res ageret, Glesariam, eam quæ plus abundaret Succino, insulam vocauerunt. Iis in insulis Succinum nasci certum est: distillat è certis arboribus qui Pinis notatibus, multum sunt adsimiles, & in terram decidit. Cūq; inibi congelatum duritiam conceperit, raptum ab undis quas eò insaniēs ventus detulerit, in Germaniam postea defertur.

Macer. CAP. XCIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Μακρη. Lat. Macer. Ita. Macero.

Gal. & off. Macis.

Macer ex Barbaria aduehitur, cortex flauescens, crassus, gustu perquàm astringens, qui contra cruentas excretaiones, dysenterias, & alui fluxiones bibitur.

Dvobus præcipuè argumentis patet, Græcorum Macerem, & Macis Arabum inter se distare. Dioscorides, Galenus, & Paulus in Muscata nulla habita mentione, corticem (vt verisimile est) non nominant. Porro Macer Galeno, cortex est Indicus, modicè acris, odoratus, & admodum acerbus. Macis noster, os & guttur potenter vellicat, ab odore desiccatur, amarore penè insensibili. secunda classe calidus & siccus: cum suis Galeno frigidum inter & calidum temperetur. Quocirca vester Macis, Græcus non est: ita nec illorum, noster est.

Vlmus.

Vlmus. CAP. XCIIII.

NOMENCLATURA.

Gr. *πτελέα*. Lat. *Vlmus*. Ita. *Olino*.Ger. *Orme. Off. Inusitata.*Ger. *Wimerbaum.*

Vlmi & folia, & cortex, & rami, vim habent spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur: uulnera glutinant, sed multo magis corticis Tilia, si fascia loco intorqueatur. (nam in lori morem flecti potest) crassior cortex in uino aut aqua frigida unciatim potus, pituitas trahit. Fraëta ossa celerius solidescunt, si decocto foliorum corticis aut radicis foveantur. Humor in folliculis enascens, prima germinis eruptione, cuti illitus, nitorem inducit, faciemq; splendidorem præstat: Qui dum siccatur, in animalia abit, quæ culicum formam gerunt. Folia cum tenerescunt coëta, olerum more ad obsonia usurpantur.

Vlmus ingens arbor, & vulgo cognita. Vesicæ Vlmi liquor præter eas quas ei attribuit vires Dioscorides, opem adfert singularem, pueris quibus intestinum est ruptum, si cum lineis fascijs, potenter è bracciis ruptura adalligetur.

Lignorum marcor.

CAP. XCV.

NOMENCLATURA.

Græ. *σαπροτης ξυλων*. Lat. *Lignorum marcor*. Ita. *Tarlatura del legno.*

Ex

F X caudicibus lignisq̃, ueteribus caries congeritur, quæ farina modo illita, ulcera purgat, & ad cicatricem perducit, serpētia cohibet, si cum pari Aniso & uino subacta, linteisq̃ imposita, illinatur.

V Illis res arborum caries, exiliēs erodentibus vermibus velut farina. & tamen vliheribus mirè utilis. Sed longè præstantior quæ ex India adfertur, collecta è Guayaco in curam Neapolitani morbi. Desiccatur enim & consolidat non vltera tantum mediocria, at ea etiam quæ eo in malo prodeunt in pudendis.

Harundo. CAP. XCVI.

NOMENCLATURA.

Gr. κάλαμος. Lat. Harundo. Ita. Canna.
Gal. Roseau. Ger. Ror.

I N Harundinum genere quædam Nastos, id est, farctior uocatur, ex qua sagittæ faciliari solent. Alia fœmina, qua tibiarum ligulas efficiunt. Alia quòd fistulis addicta sit, Syringias, cui multum inest carnis, crebris cincta geniculis, ad librorū conscriptionem accommodata. Alia crassa, concava, apud omnes nascens, quæ à quibusdam Cypria, ab alijs Donax appellatur. Alia Phragmites, seu uallatoria, gracilis, candicans, uulgo cognita: cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula aculeosq̃ corpore extrahit: luxata, lumborumq̃ dolores cum aceto mulcet. Virentia folia tusa & imposita ignibus sacris, medentur, & ceteris inflammationibus. Corticis cinere perunctæ cum aceto alopecie sanantur. Panicula lanugo si aures intrauerit, exsurdatur. Eundem effectum implet Harundo, quæ Cypria dicitur.

Papyrus. CAP. XCVII.

NOMENCLATURA.

Græc.

Græ. Πάπυρος. Lat. Papyrus. Ita. Papiro.

Papyrus Officina non norunt.

Papyrus qua chartæ fiunt, nullis non cognita, præcipua in medicina utilitatis ad laxandas fistulas: madefacta lino inuoluitur, usque dum inaruerit: Constricta enim atque immissa in hiatum, humore completur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radix: itaque Aegyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes, & mansam expuunt: ipsis radicibus pro ligno utuntur. Crematæ Papyri cinis, depascentia ulcera cum omnium partium, tum oris maximè, cohibet: uerùm melius id combusta charta præstat.

Annotatio in cap. xcvi. xcviij.

Caput xcvi. ex sese apertum est. Papyrus, arbor triquetra, gradis, nusquam tamen decem cubitis altior, nascitur certis propè Nilum locis, ubi aqua post inundationem restagnant. Flores producit, quæ antiquitus corolla toxebantur dys, nullum tamen aut fructum, aut semen producit. Nascitur & in Syria Papyrus, eodè quo Calamus odoratus laeu, & eo inibi nihil præter funes fit, prouenit & iuxta Euphratem.

Myrica. CAP. XCVIII.


NOMENCLATURA.

Gr. Μυρίκη. Lat. Myrica vel Tamarix. Ita.

Tamarigio. Gal. & Ger. Tamaric.

Off. Tamariscus.

MYrica seu Tamarix, arbor uulgo cognita est, cum apud nigras & stagnantes aquas enascatur, fructum quasi florem ferens, compage muscosum. Aegyptus Syriaq; alteram gignunt mitiorem, syluestri cætera similem. Fructum parit Gallæ proximum, inæqualiter astringentem gustu, quo conueniënter utimur uice Gallæ in medicaminibus oculorum orisq; datur cruentæ excreationi in potu, & cæliacis, & contra profluvia fæminarum,

*Myrica.*

minarum, regium morbum,
 & phalangiorum morsus.
 Illitus tumores inhibet. Cor-
 tex in eosdem usus adhibe-
 tar. Decoctum foliorum cū
 uino potum, lienē absunūt.
 Ad dolorem dentium in col-
 lutionibus salutare, & mu-
 lieribus fluxioni uulvæ op-
 portunis in desefionibus.
 Pthiriasi lendibusq; circum-
 fusum prodest. Abundan-
 tiam fœminarum sistit impo-
 situs arboris cinis. Potorios
 calices è caudice lienosis mo-
 liuntur, quò datus in his po-
 tus proficiat.

Domesticam habet Aegyptus & Syria Tamaricen: sylvestris est,
 quæ in hortis Italiae habetur, cuius rei manifestum dant signum,
 flos & fructus, quos similes Galla non producit, ut domestica. In Neapo-
 litano malo decoctio radices Tamaricis succidancam agit Guayaci. Ta-
 marix abstergit, incidit, & cum propemodum nil desiccare videatur,
 aliquantam vim habet astringendi.

Erica. CAP. XCIX.

NOMENCLATURA.

Gr. Ερίκη. Lat. Erica. Ita. Erice. Huius vsum
 off. non habent. Galli, putant esse, quod di-
 cunt. Bruyere. Ger. Heyd.

Erica fruticosa arbor, Myricæ similis, logè minor, cuius flo-
 re apes reprobum mel efficiunt. Tam flos quàm coma ser-
 pentium ictibus illitu medetur.

Erica



Erica.

Erica arbuscula Asia et Graecia propria, bis in anno florescit. Prodidit Hermolaus in Italia nasci, & Cordus in Lunenburgensi solitudine. Hic haeret Matthiolus, tum quod ea verborum breuitate a Dioscoride descripta est, ut iudicandi rationem abstulerit, tum quod non admodum respondere videtur.

Acacalis.

C A P. C.

NOMENCLAT.

Græ. Ἀκκάλις. Lat.

Acacalis. Ita. Acacalide.

Fructus Officinis incognitus.

Acacalis fructus est nasticis, seminis Myricæ quadatenus similis: cuius aqua in qua maderit, ad collyria additur, quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

Rhamnus.

C A P. C I.

NOMENCLATURA.


Gr. ῥάμνος. Lat. Rhamnus. Ita. Ramno.

Galli. Bourg Espine. Off. una cresspa.

Ger. Creutzbeet.

Rhamnus fruticat in sepibus, ramos ferens rectos, & aculeos in acuta spinæ modum, folijs paruis, oblongis, superpinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius. Tertium nigrioribus latioribusq; folijs constat, & quadatenus rubetibus,

CHIMA



Rhamnus.

cuius rami quinque cubito-
rum longitudinem implent,
spinofiores quidem, sed infir-
mioribus minusq; rigentibus
aculeis. Fructum edit latum,
candidum, tenuem, folij cula-
ry specie, uerticillo similem.
Omnia folia igni sacro, &
serpentibus ulceribus, effica-
citer illinuntur. ~~Hamnus albus & niger~~
~~copiosè in Italia apud Thuscos~~
~~nascitur, vocaturq; vulgata~~
~~eorum lingua Marruché, nec est~~
~~Spinus merlus Thuscorum, aut~~
~~Longobardorum Spinus cerui-~~

Rhamnus albus & niger
copiosè in Italia apud Thus-
cos nascitur, vocaturq; vulgata
eorum lingua Marruché, nec est
Spinus merlus Thuscorum, aut
Longobardorum Spinus cerui-

us. Quod hic largis sit folijs, & in baccis fructum nigrum producat,
mitem Ligustro, quo pictores vtuntur ad virorem bellissimū inducen-
um: quæ res nequitiam cui voles Rhamno conueniunt. Rhamnus
siccat & digerit secundo ordine, & infigidat in fine primi, aut in ini-
secundi.

Halimus.

CAP. CII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀλὶμ. Lat. Halimus. Ita. Halimo.

Gal. Blanchepute. Off. in usu non est.

Halimus frutex est sepimentis idoneus, similis Rhamno,
sine spinis, folijs oleæ, sed latioribus. nascitur in sepibus
maritimis. Folia decoquuntur ciborum gratia. Radix con-
fusa, rupta, torminaq; mitigat, dragma pondere in aqua mul-

g

sa

sa pota eadem lactis ubertatem facit.

Halimus de earum genere plantarum est, de qua authores diuersissime sentiunt. Quidam arbusculam cum Dioscoride sentiunt, quidam falsi saporis herbam qua in littore maris nascitur. Cratena herbarius nasci sub hedera, nec alibi, longis & hirsutis folijs, odore admodum Cupressum referentibus. Solinus nasci in Candia, ac solo demum suum famen sedare. Arabes Molochiam & Atriplicem marinum vocant, ac eo apparet herbam eos putasse, non arbusculam. Ruellius franciscanum profert, cuius frondes edendo esse possint, ea in eis grata falsitudo inest: Matthiolus herbam falsam qua in venetiarum littore nascitur, cui nomen vulgo Bidone est, neuter tamen affirmare audeat, quod producit plantam, Halimum esse. Satius igitur fuerit, Halimum nobis incognitum dicere, quam Halimum nescio quem proferre, qui & nobis non perinde vsitatus, & sit medicina non utilis.

Paliurus. CAP. CIII.

NOMENCLATURA.

Græ. παλίουρος. Lat. Paliurus. Ita. Paliuro.

Gal. Aubepin. hoc Off. non vtuntur.

Ger. Meerbein.

Paliurus frutex cognoscitur aculeatus, durus, cuius semine pingue & fuliginosum inuenitur, quod potum tussi opitulatur, vesicae calculos comminuit, serpentium iclibus aduersatur. Folia & radix astringentiam vim habent, quorum decoctum potu aluum sistit, urinam trahit, contra uenena & serpentium morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoresque omnes discutit, trita & imposita.

Variât itidem authores in historia paliuri, Dioscoridis paliurus diuersus est ab eo quæ diuersis generibus describit Theophrastus. Paliuri Theophrasti diuersi sunt ab eo quæ annotat Agathocles. Agathocles Paliurus ab eo discrepat quæ deliniat Plutarchus. Plutarchi itidem Paliurus ab omnibus alijs differt. In hac sententiarum diuersitate, certum quid statuere temerarium fuerit, nisi cum Matthiolo dicamus, plantarum spinosarum nomen esse, quæ diuersæ sint pro ratione regionum.

ACN

Acuta spina. CAP. CIIII.

NOMENCIATURA.

Græ. Ὠξυάνανθα. La. Acuta spina. Ita. Oxiacantha.

Gal. Espine vinette. Off. Berberis.

Ger. Erbselen.



Acuta spina.

Acuta spina, quam pyramam aut pithyanthen aliqui uocant, arbor est pyraſto ſimilis, ſpinoſa ualde, & minor. baccas profert myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleum: radicem multifidā, altē deſcendentē. Huius bacca potu aut cibo, alui profluuiū, & abundantiam ſæminarum ſiſtunt: radix illita aculeos & ſpicula extrahit: abortū fieri tradunt, ſi ter radice uenter, aut ſenſim feriatur, aut perungatur.

Oxiantham nō eſſe Berberim Arabū, & multa lia declarant, & quod Pyro ſylueſtri, collatis inuicē formis, neutiquā ſimilis. Si Matthiolo credimus, Oxiantha erit arbor illa ſpinoſa, quæ pud Thuſcorū regionē maritimā, trunco, cortice, & ramis Pyro ſylueſtri ſimilis eſt, quæ ſua lingua uocant Bogaia, & in Tridentinis montibus Amperlo, & Pane d'Orſo, & apud forum Iuliū, Barax & biāco. Notas enim omnes habet, quas Oxiantha attribuit Dioſcorides. Hæc & ſuas vires Creſpinum, ſeu Ribes, vulgo cognitæ nec quicquam illi deperijt, ſi nō Oxiantha ſit, ſicut nec Vux ſpina aut Vux marina, quod Ribes non ſit. Suis quæq; prædita eſt dotibus, quæ peti ex Arabibus & recentioribus poſſunt. Oxiantha Galeno Pyri ſylueſtris eſt

g

z

ſpc

species, paræsq̃ue & in sese & in fructibus vires habent, licet Pyri sylvestris fructus in totū stipticus & acerbus: cū Oxiaçathæ fructus, præter id quod stipticus est, è partium etiam subtilitate incisoriū sit. At enim quod ad formam attinet, Oxiaçathæ fructus ad Myrti, non Pyri sylvestris similitudinem accedit.

Rubus canis. CAP. CV.

NOMENCLATURA.

Græ. κυνόσβαλϑ. Lat. Rubus canis. Ita. Rouo canino. Gal. Eglantier sans odeur. Off. Rosa sylvestris. Ger. sambutten.

Frutex est arboris instar, rubo longè maior: folia fert multò latiora myrto, firmis circa ramos spinis: flore candido, fructu oblongo, nucleo oliuæ simili, qui per maturitatē fuluescit, & flocculos intus continet. Fructus exemptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit: seruefacti enim ij in uino, mox potius arteriam infestant.


Rubum canis seu Cynosbatum non esse Rosam sylvestrem multipatet argumentis. Folia non habet Rosa sylvestris Myrto similia, fructus habet longè grossiores Oliuæ baccis. Theophrasto Rubus caninus fructum fert purpurascentem, similem malo punico, & magnitudine medium inter eum quem stirpes ferunt, & punica malus: folia vitici similia: id ostendit quantum Rosa sylvestris a Rubo canino differat, atque adeò diuersis capitibus de eis tractatur à Dioscoride.

Ligustrum. CAP. CVI.

NOMENCLATURA.

Græ. λυγώϑ. La. Ligustrum. Ita. Ligustro. Gal. Ithroefne.

Ligustrum arbor est Oliuæ folijs circum ramos similibus latioribus, mollioribus, & iurentioribus: flore candido muscoso, odorato: semine sambuci, nigro. Optimū nascitur in Cinope & Ascalone. Folia astrictoriam uim habent: quare conmanducata ulceribus oris medentur, illata feruidis inflamma



Ligustrum.

oscoridis est Pixacantha, & non Periclimenon.

tionibus, carbunculisq; pro-
sunt, decocto eorundem igni
ambusta fouentur: capillum
rufant trita folia, quæ in ra-
dicula succo maduerint. Flos
ex aceto fronti illitus capitis
dolorem sedat. Cyprinum
oleum quod ex eo fit odora-
tum, excalfacit, mollit ner-
uos: si quæ feruenti natura
prædita sint, assumat.

Ligustrum publicis in Italia
vix inter sepes nascitur, flo-
ret ineunte vere, & astatu ini-
tio. Seruius Virgilij interpres,
Ligustra malè interpretatus est
cōuoluuli flores. Nec minus falsi
sunt qui censuerūt. Ligustrum,
Arabum esse caprifolium, quod

Philyrea. CAP. CVII.

NOMENCLATURA.

Græ. φιλύρεα. Lat. Tilia. Ita. Phillerea.
Gal. Til. & Troesne.


Philyrea arbor est ligustri magnitudine, folijs oleæ, ni-
grioribus & latioribus, fructu lentisci, nigro, subdulci,
ematum coherente, asperis nascitur. Huius folia astringunt:
eadem vtilia ad quæ oleaster, cum astrictione est opus: ma-
nè ad oris ulcera, commanducata, aut si decocto colluantur:
a urinam ac menses cient.

Nulla est inter Theophrastum & Dioscoridem controuersia, cum Theophrastus è Phyliræ nomine Tiliam (vt est) intelligat: Dioscorides sui generis arborem, quàm abundè depingit. Et vt scribit Matthiolus, arbor est a multis cognita, nascitur enim & crescit in multis Italiae locis, & præcipuè saxosis & montanis, vnde excellentissimus medicus D. Maphæus à Maphæo transplantauit eam, quæ hodie Venetj's horto suo nobilissimo viridescit.

Cistus. CAP. CVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. κ'is & . Lat. Cistus. Ita. Cisto. Off. Latinum nomen usurpant.



Cistus.

Cistus, quem aliqui citharon, aut cissaron uocant, ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus, saxosis locis nascens, folijs rotundis, acerbis, hirsutis, flos masculo ut mali puniceæ, feminae albet: Vis astringens, unde flores in uino austero bis in die poti, prosunt dysentericis, & nomas per se illi cohibent: uetustati ulcerum & igni ambustis cum cerato medentur. Hypocistis, orobethron, aut cytinus nonnullis cognominata, iuxta cisti radices nascitur, floris punici similitudine. Quæ

dam flaua, altera herbacea, tertia candida. Liquatur acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant, fractamq; macerant, & incoquunt, reliquaq; ut in Lycio prosequuntur. Vires acaciæ habet, uerum aliquant

aliquantò magis siccatur, & astringit. Prodest dysentericis, cæliacis, sanguinem excreantibus: scæminarum profluuiis & pota & indita.

Nascuntur Cistus & hypocistis in pluribus Thuscæ locis, quinetiã abundè proueniunt in asperissimis & maximè saxosis Apenninæ montibus. Deberent igitur quorum est munus, inde sibi omni labore & diligentia conquirere, præcipuè cum sine vero hypociste confici Theriaca non queat, nec alia item medicamenta quibus quotidie nobis in medicina sit opus. Vbi vera hypocistis defuerit, vera Acacia, aut Balaustiorum loco uti possumus. Astringit priuatim Cistus: folia desiccant & astringunt: valentiores sunt flores. Sic frigidus est Cistus, ut etiam quippiam a se tepidi caloris habeat. Plus astringit hypocistis.

Ladanum.

CAP. CIX.

NOMENCLATURA.

Græ. Λάδανον. Lat. & Off. Ladanum. Ita. Ladano.

Est & alterum cisti genus, ledon à nonnullis appellatum, frutex simili modo nascens, longioribus folijs, & nigrioribus, quæ uerno tempore quidam contrahunt pingue. Foliorum uis astringens, atq; effectus cisti præbens. Fit ex eo quod Ladanum dicitur: Siquidem cum cisti frondes pascuntur capræ, hirgæ, pinguetudinem conspicuè barba carpunt, & suo lentore illosis cruribus adhaerescenrẽ reportant: quam depectentes in olea, colantesq; cogunt in offas, & ita recodunt. Alij uerò attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conlomerantq; in Ladanum. Maximè probatur odoratum, subuide, facile mollescens, pingue, quod arenas non collegit, nec ualore oblitum est, resinosum, quale in Cypro gignitur. Arabicum uerò Libycumq; uilius. Natura ei spissandi, calfacendi, molliendi: ora uenarum patefacit, capillum fluentem connet, addito uino, myrrha, & myrteo oleo: cicatricibus dorem reddit, cum uino illitum, medetur aurium doloribus, cum

g 4 hydr

hydromelite aut rosaceo infusum: suffitu secundas eicit. Pessis immistum, uulua duritiem sanat. In medicamenta quae dolore tuissimq; finiunt, & malagmata utiliter inseritur. Aluum sistit cum uino uetere potum, & urinam ciet.

Satis apparet è Dioscoride quid sit Ladanum. Galenus differre quidem nihil specie à Cisto, qui eo ubi tum uiuebat nasceretur, dicit: & regionis gratia quae Cilicia sit, excellentius esse. Id prouidendum ut non adulteratum, sed verum Ladanum habeamus. Venetijs probatissimum, sed paucis in locis habetur, ideo hic sedulo iudicio est opus.

Ebenus. CAP. CX.

NOMENCLATURA.

Græ. ΕΒΕΥΘ. Lat. Ebenus, Ita. Ebenu.

Gal. l'Ebene.

Ebenus optima habetur Aethiopica & nigra, nullos habens uenarum discursus, facilius cornu leuore. Cum frangitur densa apparet, mordens gustu, atque astringens. Suffitur iucundo odore supra carbones sine fumi tadio. Recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinem acceditur, & trita ad cotem flauescit. Altera est Iudica, internatis segmentis candicantibus & modicè fuluis, item frequentibus maculis: caterum prior, bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna cōsimilia pro Ebenu uaneunt: quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas assulas resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentiae in suffitu praferentia. Caliginem oculorum absterget: ad ueteres destillationes, pustulasq; mirum in modum pollet. Si quispiam facta ex eo coticula collyrijs utatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes ramentāue uino Chio die noctuq; macerata, in collyria digerantur. Nonnulli prae trita ipsa excolant, reliquaq; eundem in modum peragunt. Alij pro uino aqua utuntur. Vritur in fistili nouo, donec in carbones redigatur: lauatur plumbi usti mo-
do

lo, & ita siccis scabrisq; lippitudinibus conducit.

Sola (vt inquit Plinius) terrarum India fert Ebenum, nec tota, at in modica tantum ipsius parte nascitur. Si Dioscoridi tamen & Herodoto credimus, in Ethiopia etiam prouenit. Ebenus sicca notissima in Italia est, apud eos enim qui pectines conficiunt infiniti trunci reperiuntur, ac in eorum itidem officines qui orbiculos horarios faciliant Ebenus composita est subtilibus partibus, virtutem habet absterforiam & alidam. Quidam Gayacum Ebeni specie putant, istud nec affirmare nec negare ausim, cum a nullo eorum scriptorum pradiclum sit, quae folia, flores, & fructus Ebenus producat.

Rosa. CAP. CXI.

NOMENCLATURA.

Græ. Ροδον. Lat. & Off. Rosa.

Gal. Rose. Ger. Rosen.



Rosa.

Rosa refrigerat & astringit, sed sicca multo magis. Succus recentibus folijs exprimitur, desectis forfice unguibus (sic appellatur candidæ foliorum partes) reliquum in pila premi & teri debet in umbra, donec cogatur, & ita ad oculorum circumlutiones recondi. Siccantur etiamnum folia rosarum, continuo uersata, ne muceant, neue sitis is insideat. Aridis rosis & in uino decoctis expressus liquor, facit ad dolores capitis, aurium oculorum, gingiuarum, sedis,

ti intestini, ac uulue, pinna illitus aut infusus. Eadem sine ex

g s pressio

pressione tusa, præcordiorum inflammationibus, humidis stomachi vitijs, igni sacro illini prodest: siccis ac tritis semina asperguntur. Misceri solent uulnerarijs antidotis, atq; compositionibus, quas *Antheras* uocant. Folia uruntur in *Calliblephara*. Flos qui in medijs rosis inuenitur, siccatus, gingiuarum fluxionibus efficaciter inspergitur. Capita pota citam aluum, & cruentas reiectiones sistunt.

Rosei pastilli. CAP. CXII.

NOMENCLATURA.

Græ. ροσιδισ. Lat. Rosei pastilli. Ita. Pastilli delle Rose. Off. Trochisci diarhodon.

Pastilli, quos *Rhodides* uocant, hac ratione conficiuntur: Rosarum uiridium, quæ nullo antea humore madefacta extabuerint, drachmæ quadraginta, Indicæ nardi drachmæ decem, myrrha drachmæ sex, trita digeruntur in pastillos, qui triu obolorum pondus æquent, siccatiq; in umbra in fictilli non picato, atq; obturato reconduntur. Alij adijciunt costi drachmas duas, iridis Illyricæ totidem, & uinum Chium cum melle miscent. Mulieribus monilium uice collo circumdato usui sunt, ad retundendum graue sudoris uirus: tritis etiam utuntur ad illitiones & diapasmata, quæ fiunt ad sudores coercēdos, ita ut à balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

Annotatio in Cap. cxj. cxij.

Multa sunt Rosarum differētiæ, rubris tamen plus in medicina utimur, decerptis nondum sese aperiētibus calathis. Rosei pastilli, quos trochiscos de Rosis *Pharmacopolia* uocant, nō eo quo apud *Dioscoridem* conficiuntur modo.

Lycium. CAP. CXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. λυκιογ. Lat. & Off. Lycium. Ita. Lycio.

Lycium, quod aliqui Pyxacanthan uocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus: folijs buxifensis: fructu piperis, nigro, laui, amaro, densoq;: cortice pallido non dissimili Lycio madefacto. radicibus multis obliquis lignosis: Nasquitur plurimum in Capadocia, Lycia, & plerisq; alijs locis, aspera loca amat. Succus extrahendi ratio hac est: Rami cum adiculis tusi, & ante per multos dies macerati coquuntur, tum bictis lignis itide liquor, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id Lyciū. adiecta decoctioni amurca, aut absinthij succo, ut felle bubulo. Innatās spuma inter coquendū exēpta, oculorū medicamentis additur, reliquo ad alia utuntur. Simili modo fit yciū, semine expresso & insolato. Optimū quod uri potest, rerinclumq; rubentē spumam ostendit: glebis extrinsecus nigris, utus cum fregeris rufis, odore minime uiroso, cum amaritudine stringens, crocino colere, cuiusmodi Indiciū est, ceteris præstans. Lycium astringit, caliginē oculorū discutit, genarū scabiem, curitus, ueteresq; fluxiones sanat. Facit ad purulentas aureis. ulceratas gingiuis, tōsillas, labiorū fissuras, sedis rimas, attritisq; illitū. Ca-liacis, dysentericis potū inditūq; cōuenit. Dat sanguine excreatibus & tussi, ex aqua. Cōtra rabiosi canis morsus catapotio deuoratur, aut in aqua bibit. Flauos facit pilos, reducis, ulceribus quæ serpūt aut putrēt, medet, fæminarū profluvia oppositū sistit, rabiosorū iclibus ex melle potū, aut uice catapotij deuoratu, auxiliatur. Tradunt Indiciū fieri Lyciū, ex frutice longitudo appellato, ea spinarū generi ascribitur, ramos reſtos habens, ternū cubitorū longitudine, maioresue, rubo crassiores, à ra-ce numerosos, fractus cortex rubescit, folia olea similia. Herba aceto decocta proditur lienis inflammationibus & regio mor-mederi, & fæminarū purgationes elicere. Assenerat etiam uadā in potu, eosdē effectus præstare: semē cyatho dimidio potū purgare: uenenis quoque auxilio esse.


offi

Officinarum Lycium adulterina res est è pluribus succis cōficta, nec ad nos hodie è Lycia affertur. Pyxacanthæ unde verum extrahi Lycium possit, in Lyguria Alpibus proneniunt, sed adeò modicè curamus quæ ad vsum medicine faciunt, vt ignoremus ea etiam, quæ sponte nobis à natura offeruntur. Deficiente Lycio Amurca olei quæ in vase æreo cocta sit vtamur, aut Sumacho. Paucis ab hinc annis Pyxacanthæ fructus piperi similes in Italiam ex Alexandria aduehuntur.

Acacia. CAP. CXIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ακασία. Lat. Ita. & Off. Acacia.



Acacia.

Acacia in Aegypto nascitur, spina instar arboris fruticosa, non se in rectum attollens. Florem habet candidum, & semen lupino simile in folliculis, ex quo succus expressus siccat in umbra, niger ex maturo semine, subrufus ex viridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, ut in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex folijs & semine succum. Manat & gummi ex ea spina. Vis ei ad spissandum, refrigerandumq; efficax. Succus oculorum medi-

camentis utilis, ualet ad ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, per-
niones, pterygia, & oris ulcera: procidentes oculos reprimi,
mensium abundantiam sistit: prociduam uuluam cohibet, citam
aluum supprimit, aut potius aut subter inditus, capillos denigrat.
Lauatur oculorum medicamētis, trito in aqua, mox effuso quod

con

concreuerat, donec pura extet aqua, & ita cogitur in pastillos. Fritur etiam in cruda fidelia, donec fictile fornacibus percoquatur, torreturq; in carbonum halitu perflata. Spina decoctum solutos artus fotu committit. Præfertur eius spina gummi, quod in uermiculorum speciem contrahatur, & utri modo perluceat, ligni expers. Proximum est candidum, sordidum uero ac resinofum, inutile. Cutis meatus obstruit, & medicamentorum, quibus admiscetur, acrimoniam hebetat. Ambustis ex ouo illitum, pustulas non patitur erumpere. Alium Acaciae genus in Cappadocia Pontoq; provenit, Aegyptiae spinae similitudine, longe minus, tenerius, humile, aculeorum uallo munitur, folia habens ruta, semine lenticula minus fert autumno, in loculis connexis, ternum quaternumue capacibus. Succus eius atringit, uiribus inferior, & ocularibus medicamentis inutilis.

A Acaciae succus apud nos non nascentis arboris, hodie non affertur, sed huius loco succus prunorum syluestrium vulgo successit. Aptius tamen huius vice folijs Rhois uteremur, & liquore qui è folijs lentisci & hypocistidos conficitur. Vocat Serapion Acacia gommam, Arabicam gommam quae è sua descriptione alia est ab officinarum gommâ Arabica. Hac enim nil simile habet contractis vermiculis: at arenosa est, quae res satis coarguit nos Arabicam gommam, & perinde succo carere. Acacia stiptica est & astringentior. Arabica gomma lenit & aperit, & cum ob causam nec implere aut stringere poros carnis potest, quod in gommâ spinae Aegyptiae requirit Dioscorides. Vulgaris hac Arabica gommâ Matthiolo è Galeno ea est gomma, quam Graeci simpliciter gommâ vocant, & mixtio è diuersis arborum gommis, id quod eorum iudicio contrarium est, qui ubi nomen gommæ simpliciter apud Graecos vident, non aliam, quam spinæ Aegyptiae gommam intelligunt. Tolerabilis duci poterat gomma Tracacanthæ, si ad nos vera Acacia afferretur, sed hac destituti, qui gommam habeamus? Vera Acaciae succus debeat tertio ordine, & elotus frigidus est in secundo, purus in primo.

Vitex.

CAP. CXV.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀνθ. Lat. Vitex. Ita. Agno casto.

Gal

Gal. & Off. Agnus castus.

Vitex siue lygos, frutex est in arborem assurgens, nascitur in fluminum ripis, asperisq; locis, ac torrentium alueis: ramos gerit praelongos, fractu pericaces: folia oliuæ: sed molliora. Duo genera eius: Vna harum album florem mittit cum purpureo: altera tantum purpureum, & semen, ut piper. Excalfactorias vires habet, & adstrictorias. Semen eius potum uenenatis ictibus, aquæ quæ cutem subijt, lienosisq; auxiliatur, lac euocat, menses ciēt, drachmæ pondere in uino potum, geniturâ exoluit, caput tentat, & soporem affert. Decoctum herbæ & seminis in desessione, mulieribus uulvæ malo opportunis opitulatur: ita inflammationibus, purgationes mouet semen cum pulegio potum, etiam suffitu uel appositu: capitis dolorem dissoluit illitum: instillatur cū aceto & oleo capiti in lethargo & phrenitide. Folia suffitu aut substractu fugant uenenata: illita quoq; serpentium moribus auxiliantur, testium duritias cum butyro & folijs uittium emolliunt. Rimas sedis semen cum aqua illitū mitigat: & cum folijs medetur luxatis, uulneribusq;. Virgam qui manu teneat dum iter facit, negatur intertriginem sentire. Agnū, quasi dicas castum, uocant Græci, quoniam matronæ in Thesmophorijs Atheniensium castitatem custodientes, folijs huius cubitus sibi sternunt. & lygon quasi iumen, propter inuictam ferè ramorum stexitatem.

Vitex seu Agnos à castitate, arborum prima vere floret, calida & sicca est tertio ordine, & è multis subtilibus partibus composita. Nigra & alba abundè in Italia proueniunt.

Salix.

CAP. CXVI.

NOMENCLATURA.

Gr. Ἰτέα. La. & Off. Salix. Ita. Salice. Gal. Saulx.

Salix uulgò nota est. Cuius semen, folia, cortex & succum spissandi uim habet. Trita folia cum exiguo pipere & uino pota



Salix.

pota, illiosis subueniunt: sumpta per se & cū aqua, præstant mulieribus ne concipiant. Salignū semen in potu sanguine expuctibus prodest. Cortex eosdem præbet effectus: corticis cinis admixto aceto maceratus, illitu clauos & callos tollit. Ex folijs & cortice succus cū rosaceo in calyce punici calfactus, aurium doloribus auxiliatur. Decocto eorū podagras foueri utilissimū: surfu res purgat in corpore. Excipitur succus qui manat ex ea, cū storet, exciso cortice: in plaga enim cōcretus humor

uenitur, qui ad purganda, quæ obstant oculis, suā vim præbet. Salix multarum specierū & cognita arbor, succos è Plinio tres conficit, Vnum qui è trunco resudat in modum gomme: Secundum qui inciso cortice: Tertium qui incisis per autumnum truncis. Vulgare est vndes & flores Salicis ægris somnum conciliare.

Syluestris olea. CAP. CXVII.

NOMENCLATURA.

Gr. Ἀργελαία. La. & Off. Oleaster & Syluestris olea. Ita. Oliuo saluatico. Gal. Oliuier sauuage.

Syluestris olea, quam aliqui Oleastrum appellant, alij Æthiopicam oliuā, folia astringunt: trita autem & imposita veniem sacrum, ulcera quæ serpunt, epimyelidas, carbunculos, lunias, nomasq; cohibent, crustas emarginant cum melle illita



Sylvestris olea.

lita. Quinetiam sordida ulcera repurgant: inflammationes panosq̃, cum melle imposita discutiunt: cutem à capite uulsam conglutinant: oris ulceribus & priuatim infantium, commanducata medentur. Succus & decoctum eosdem habent effectus: sanguinis eruptiones, ac muliebri profluvium admotus succus inhibet, uua oculorū, pustulisq̃ prodest, ulcera & ueteres defluxiones sistit: quapropter in colyria additur, ad genarū erosiones perquā utilis. Ex-
 primitur succus tuis folijs, affuso uino aut aqua, siccatusq̃ sole in pastillos digeritur. Sed longè ualidior ad recondendum succus habetur, qui cum uino, quā cum aqua expressus est. Auribus subuenit, siue ulcerentur, siue pus effluat. Folia conuenienter celiacis cum farina hordeacea illinuntur. Uruntur cum floribus folia, ut spodij uicem cinis præstet in cruda olla, oblito ore luto, usque dum siglinum percoquatur: restinctaq̃ uino, & rursum subacta, eodem modo uruntur, postremo cerusæ modo elota coguntur in pastillos. Huiusmodi cinerem in medicamentis oculorum constat spodio non cedere, sed eisdem uiribus præditum esse putandum est. Foliorum satius oleæ eadem uis intelligitur, sed aliquanto inferior: unde ocularibus medicamentis ob suam mitiorem uim conuenientior est. Sudor ligno uirenti accenso manans, illius sanat lichenas, furfures & scabiem. Oleaginum
 semen

Semen illitum medetur furfuribus, & ulceribus, quæ depascunt
 vorantq; quod autem intra nucleum est, ex adipe & farina sca-
 bros ungues excutit. Colymbades trita & ambustis illita, pu-
 tulas gigni prohibent, sordida ulcera purgant. Muria succus col-
 utas gingiuas contrahit, & motus dentium firmat. Oliua fla-
 va & recens stomacho utilior est, uentri difficilis: nigra autem
 & matura corruptioni opportuna est, stomacho aduersatur, ocu-
 lis non conuenit, capitis dolorem mouet. Arefacta illitu depas-
 centia ulcera sistit, & carbunculos emarginat. Oleum sylue-
 ris Oliuæ gingiuis putri uligine laborantibus colluitur, dentiū
 mobilitates stabilis, calfacti fotus, gingiuis fluxione laboranti-
 bus utilis est: lanam enim specillo circunligatam oleo madeface-
 re oportet, & gingiuis admouere, donec albæ spectentur.

Lachryma æthiopicæ oleæ.

CAP. CXVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Δάκρυον τῆς αἰθιοπικῆς ἐλαίας. Lat. Lachry-
 ma Aethiopica Oleæ. Ital. Gomma dell'olivo
 d'Ethiopia. Off. Gummi Eleni,

Lachryma quæ Aethiopica olea stillat, Scamomio simi-
 lis quadantenus est, fulua, stillis exilibus cōstans, mordax
 uæ autem Ammoniæ aut gummi similitudinem refert colo-
 nigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates Oleæ
 castriq; similem lachrymam sudant, quæ commodè ad oculo-
 rum hebetudines illinitur, cicatrices albuginesq; illitu emendat,
 nam & menses ciet, cauis dentium impressa, ad dolores ef-
 ficax est. Inter uenena scribitur, partus pellit, lepras & impeti-
 gines

gines sanat. Appellatur autem Aethiopica & agrestis Olea.

Amurca. CAP. CXIX.

NOMENCLATURA.

Gr. Ἀμύργη. Lat. & Off. Amurca. Ital.

La Morca dell' Olio

Amurca expressæ oliuæ recrementum est. Decocta in cupreo uase ad crassitudinem mellis astringit, ceteros præbens Lycij effectus: insuper dentium dolori & uulneribus, cum aceto, uino aut mulso commodè illinitur: additur in medicamenta ocularia, & meatus inductu suo obstruentia: uetustate meliorem fieri constat. Utiliter infunditur sedis, genitalium, ac uulnæ exulcerationi. Si uerò cum omphacino recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit. Iumentorum scabiem decocto Lupini & Chamæleonte illitu sanat. Cruda & receti Amurca podagras articularesq; dolores foueri utilissimum: peruncta in ulleja pelle, & hydropicis imposita, tumoris molem reprimat.

Annotatio in Cap. cxviij. cxviij. cxix.

Narbonensis Gallia Oleastris itidē ut Oliuis abundat. Inter Oliuam & Quercū mortalis est inimicitia. Emoriur Oliua Quercu applantata. Gomma syluestrium aut Aethiopicarum Oliuarum, & si ad multa sit utilis, nostro tamen tempore usu desit, nec sane notum est colligatur necne. Amurca olei, teste Catone, calci mixta inducendis officinis quæ pannos sericeos contineant utilis est. Araneas enim aut tineas, aut quosuis vermiculos non sustinet, & ab humore muros tuctur.

Quercus, Glans, Fagus, Ilex.

CAP. CXX.

NOMENCLATURA.


Gr. Ἀγρὺς. Lat. & Off. Quercus. Ita.

Quercia. Gal. Chesne.

Q uer



Quercus.



Viscum quercinum.

Quercus omnis adstrictoriam vim habet, præsertim liber qui cortici & ligno intercedit: quinetiam tunica putamini glandis subiecta. Decoctum ex ijs datur dysentericis, cœliacis, sanguinem excreantibus. Trita in pessa, sæminis fluxione uulvæ laborantibus subijcitur. Glandes eosdem effectus exhibent, urinam ciunt, capitis dolorem & flatus in cibum sumpta pariunt, resistunt esitata uenenatorum ictibus. Decoctum earum & corticis cum lacte uaccino potum, prodest cōtra toxica. Intritæ crudæ, inflammationes illitu leniunt: ad duritias quas cantharidæ uocant, & malefica ulcera cū salsa axūgia cōueniunt. Illi næ glandes uiribus Quercus antecellunt. Fagus & Ilex, Quercus generi assignatur, & cōsimile munus obeunt. Ilignæ radices cortex cū aqua coctus dū mollitus intabescat, & tota nocte

h 2

illius

illitus, denigrat capillos, prius Cimolia terra purgatos. Folia omnium tusa & trita tumoribus prosunt, & imbecillas membrorum partes corroborant.

A Quae Quercus frondibus, tum cum primum prodeunt tenerissimis per Alembicum distillata, potu sanat fluxus hepaticos, lapillos renum comminuit, & albis mulierum fluxionibus medetur. Fagi folia commanducata, labra & gingivas aeras sanant. Ex adusti Fagi cinere linimentum fit ad extrahendos renibus lapillos. Habet id carbo Illicis ut caput non offendant. Quercus Ricini, ijs similes quos sylvestres Rosae producant, sicci & in puluerem redacti potenter astringunt, & ob id omnibus corporis fluxibus commodant, & alias ubi restrictione est opus.

Castaneæ. CAP. CXXI.

NOMENCLATURA.

Gr. Κασανα. Lat. Castaneæ. Ital. Castagne.

Gal. Chataigne. Off. Nucces Castaneæ.



Castaneæ.

Sardianæ glâdes, quas Saliqui Castaneas, aut Lopima aut glandes Iouis appellant, adstringunt, similesque effectus præbent, præsertim tunica quæ carnem & corticem media intercusat, caro his qui ephemereum biberunt, conueniens est.

Castaneæ manducata liberalius dolorem capitis inducunt, flatus generant, obstipant corpus, & agre digeruntur. Sed quæ torrentur sub cinere, tollunt quippiam de nocumēto, si postea cum Pipere & sale aut cum Saccaro manducentur. Reuerà quamvis nutrant corpus, tamen bona non sunt.

Galla

Galla. CAP. CXXII.

NOMENCLATURA.

Græ. Κέντς. Lat. Galla.

Gal. Noix de Galle.

Galla fructus est *Quercus*. Aliqua *Omphacitis* appellatur parua quidem sed tuberosa, solida, nullo foramine perforata: altera plana, leuis, perforata. Eligi debet *Omphacitis*, quæ efficacior est: Vtriusq; vis uehementer astringere. Trita extrescētia in carne, fluxiones gingiuarum & uulæ, atq; oris ulcerationem cohibent. Nucleus dentium cauernis inditus dolorem sedat. Cremata carbonibus donec igne flagrent, & uino aut aceto aut acida muria extincta, sanguinem supprimunt. Decoctum quibus insidere expedit, efficax est, & contra uulvas procidentes, fluxionesq; capillos denigrant, aceto aut aqua macerata, dysentericis celiacisq; cum uino aut aqua trita conuenienter illinuntur, aut bibuntur: obsonijs addi debent, aut integræ in aqua præcoqui, in qua nonnihil excoquendum est, quod his affectibus conferat. In summa, his utendum ad astringenda, aut siccanda quæ opus sunt.

Galla in pediculis ut glans nascitur. Proueniunt & in folijs glandes, quæ aquosiores, statim ut deciderint, flaccescunt. Galla *Omphacites* medicamentum est potenter acerbum, & maiori ex parte terrefris & frigida, & cum ea facultate desiccat & repercutit fluxus: astringit etiam, & membra luxata & languida in priorem habitum restituit. Grandis Galla desiccat, sanguinem usta restingit.

Rhus. CAP. CXXIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Ρῆς. Lat. Rhus. Ital. Rhoe.

Gal. & Off. Sumach.

Rhus quæ obsonijs aspergitur, ab aliquibus *Erythros* appellata, semen est coriary fruticis, sic uocati, quoniam corio

h 3 rum

rum insectores eo utatur ad inspissandas pelles, arbuscula in petris nascens, binum cubitorum altitudine, folijs oblongis, subrubentibus, in ambitu serratis, acino uuarum gracilium denso, magnitudine Terebinthi, quadantenus lato, Cuius corticosa tunica perquam utilis est. Folia uim habent astringendi, & Ascacia effectus præbent. Decoctum capillos denigrat. Dysentericis infunditur, & in potus eorum in seßusq; adycitur. Instillatur auribus purulentis, gangrenas & pterygia cohibent folia, ex aceto aut melle illita. Liquamentum fit ex aridis folijs, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadem, ut Lycium, conueniens semē eosdē effectus exhibet. Celiacorū dysentericorūq; obsonijs inspergitur: fracta, desquamata, liuidaq; illitū ex aqua, ab inflammatione uindicat: lingue asperitates cum melle abstergit: candida sceminarum profluvia sistit, hæmorrhoidas sanat cum quercino carbone intrito admotum. Aqua in qua semen maduit decocta cogitur, coitq; efficacior ipso semine. Gummi desert quod detium cauis imprimitur, ad dolores finiendos.

Rhus cuius fructum Læti similem, Sumach Pharmacopolie vocant, nascitur in Italia in pluribus Apennini locis, cum notis omnibus quas ei tribuit Dioscorides. Fructus & succus Rhois plurimum in se austeri habent, & ideo desiccant tertio, & insigidant secundo ordine.

Palma. CAP. CXXIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. φοίνιξ. Lat. Palma.

Gal. Palmier. of. Dactyli.

Palma in Aegypto gignitur. Ea medio maturitatis uigore, autūno decerpi solet, Arabici Myrobalani similis, Pomatis cognomine, colore uiridi, & odore mali Cotonei, quod si ad maturitatem peruenire sinatur, Phœnicobalanus fiet. Palma acerbæ est & adstringēs. Contra alui sceminarumq; profluvia, in uino austero bibitur, hæmorrhoidas sistit, uulnera glutinat illi



Palma.

erè astringit, & cohibet. Nuclei palmarum, ceterorum more cremati in crudo fictili, & uino restincti, cinere loto, spodij uicē efficiunt, miscēturq; in Calliblephara. Quòd si non iustā uisionē acceperint, denuò cremandi. Vim adstringendi habent, & spicula cutis obductu suo claudunt. Contra oculorum uirā & pusulas, palpebrarum defluuia, cū Nardo effectum præbent, cororis excrecentias cum uino reprimunt, ulcera ad cicatricem perducunt. Sed inter primas utiles ex Palmis humilibus Aegyptiæ.

Palma, elate. CAP. CXXV.

NOMENCLATURA.

Gr. φοίνιξ ἐλάτη. Lat. Palma. Elate. Ital.

Corteccia della Palma. Gal. l'Escorce du Palmier.

h 4

Palma

nat illitu. Phœnicobalani re-
centes plus siccis adstringut
capitū dolore afferūt, copio-
siores in cibo inebriāt: siccio-
res sanguinē excreatibus, sto-
machicis & dysentericis uti-
les in cibo: illinuntur cū Coto-
neo & cerato anathino ue-
sicae uitis. Cariolæ præsertim
esu, faucium asperitati medē-
tur. Thebaicarum decoctū
potu astuationem sedat uires
recreat cum hydromelite ue-
teri sumptū, cibo idem faciūt
Fit ex eis uinū ad eadem con-
ueniens. Decoctū per se potu
& gargarisatione magno-

Palma, quam aliqui Elaten aut Spatham appellant, fructus Palmarum adhuc florentium, inuolucrum est calixque quo in spissamenta unguentarij utuntur. Optima habetur odorata, astringens, ponderosa, praelusa, intus pinguis. uis ei adstrictoria, sistit ulcera quæ depascunt. laxatos artus committit. trita miscetur cataplasmatibus & malagmatis, prodest præcordijs, imbecilli stomacho, & iocinori affecto musta cõferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subinde detersum, capillos denigrat, datur bibendum congruè, renum, uesicæ, & uiscerum uitij: uulnæ ac uentris fluxiones sistit, scabiem cum resina & cera sanat, si uiginti diebus recens apponatur. Inuolutusque in ea Elate fructus, quem suo amplexu fouet, Elate etiam uocari solet, & ab aliquibus Borassus. Adstringit, & Spathæ effectus præstat, non sic unguentis expetitus. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta, eadem facit quæ Borassus.

Annotatio in Cap. cxiii. & cxv.

Palma fructus paruuli hodie Caryota, & olim Dactyli vocabatur. E Syria, Venetijs asseruntur, & Neapoli ex Africa & Barbaria. Palmam habet Italia, sed fructum non producit. In Hispania fructum procreat, sed perfectam maturitatem non attingit. Ad hanc perueniunt utique fructus Palma Cretensis: at his nihil deest quæ in Cypro proueniunt, palmula quas Nicolaos vocat Plinius quatuor cubitorum longitudinem æquant. Distillat ex Indiarum Palmarum trunco & ramis, liquor quo incolæ uicini utuntur. Hoc ita conficiunt. Arbore mense Augusto ab incolis inciso, liquor statim defluit quem certis suis uasis excipiunt, hunc decoquunt (Quippe si non coquatur, ultra tertium diem vigorem non extendit, quin fortissimum fit acetum) eo quo nos mustum, sapa conficienda modo: deinde fit suauissimum mel, quod postea in aqua dissoluunt, & dierum viginti spacio certa quadam ipsorum solertia id percolant, quousque probe siccæ purgatum, & benè clarum euadat, ac inde suauissimum euadit in vinum, quod diu asseruetur.

Malum

Malum punicū. CAP. CXXVI.

NOMENCLATURA.

Gr. Ρόα. Lat. *Malum Punicum*. It. *Pomo Granato*. Gal. *Grenadier*. Ger. *Granatopffel*.

Malum Punicū omne boni succi est, stomacho utile, per-
exiguum sufficiens alimentum. Dulcia stomacho utilio-
habentur, sed aliquantulum in eo calorem gignunt, inflatio-
es pariunt, unde in febris abdicantur. Acida adstringunt, estu-
iti stomacho auxiliantur, & multo magis contrahunt, ac uri-
m cient, ora gingivasq; ledunt. Vinosa uero mediam sortiun-
r naturam. Nuclei acinorum acidi Punici in sole siccati et ob-
nys insparsi, concoctiue, fluentem aluum stomachumq; sistunt:
elesti aqua madescunt, bibunturq; commodè sanguinem ex-
eantibus: ad desessus dysentericorum, sceminarumq; fluxione
lue laborantium utiles sunt. Expressus nucleorum succus co-
atur cum melle, ad oris, uirilitatis, & sedis ulcera, nomas, re-
utas, & ea quæ in corpore extuberant, aurium dolores &
rium uitia, præsertim acidorum. Huius flores Cytini uocan-
, qui adstringunt, siccant, cohibent, sanguinolenta glutinant,
as Punicum, præstant utilitates. humida gingivarum uitia mo-
esq; dentes decocto colluuntur: herniam prolapsu intestini e-
mpentem cataplasmate repellunt. Memoriae tradunt, qui tres
am minimos Cytinos deuorauerit, nullā eo anno lippitudinē
surum. Eliquatur Hypocistidis exemplo. Malicorium, asperū
mali Punici putamē, quod aliqui Sidion appellant. Id spissan-
um habet, & quos Cytini, præbet usus. Decoctum radicis
u latas uentris tineas pellit, & easdem euocat. Balaustium
uestris Punici flos est, Cytino similis, cuius cōplura genera re-
iuntur, candidum, sulum, colore rosaceo: succus ex eo expri-
h s mitur

mitur, Hypocistidis modo, cui adstrictoria vis inest, eadem facies
quæ Hypocistis & Cytinus.

Punica mala à contentis multis in se granis, Granata vocantur.
Quæ acida erunt in dulcia vertentur, si eorum radices porcum, huius
mannin ve letamen cum urina multis asservata diebus appolueris. Squil-
la arbori applantata, facit ne fructus in arbore dimidantur. Servatur
mala Punica contorto in arbore pediculo. Pariter si creta inducas eum a-
qua temperata, & postea siccanda soli exponas. Idem facies si aqua bul-
lienti immerferis, & tum per octo aut decem dies desiccaveris ad solem.
Cytinus Dioscoridi, mali Punici domestici flos est: Balanistium flos est
quem sylvestris producit. Cytinus Plinio, Punici mali tam domestici
quam sylvestris flos est, modo non sit apertus: Balanistium, utriusque
flos, qui apertus sit. Optimi domesticorum flores purpurei, flammæ, &
viridi coloris. Venetijs hodie ex Oriente, Cipro, & Candia afferuntur,
visui admodum grati, & singularis in sua facultate effluvia: at suo Ita-
li artificio sicca prodire cogunt, ut nihilum cadant extraneis. Sidion
Græcis, Malicorum Latinis, mali Punici cortex est immaturus.

Myrtus. CAP. CXXVII.

NOMENCLATURA.

Gr. ΜΥΡΤΙΝ. Lat. Myrtus. Ita. Mirto. Off.
Myrtilli Gal. Du Murte.

MYrtus sativa nigra utilior est medicinae, quam candida.
& in hoc genere multo magis montana, semen tamen
imbecillius parit. Vis & Myrti & seminis adstringit. Semen
viride aut aridum in cibo datur sanguinem excreantibus, &
vesicæ erosionibus. Succus viuentibus baccis expressus, eosdem
effectus exhibet, stomacho utilis, urinam cit: prodest contra pha-
langij morsum, & scorpionis ictus, in micro. Seminis decoctum
capillum tingit. Ius decocti in uino ulcera in extremis membris
nata sanat, oculorum inflammationes illitum cum polline poten-
ta lenit, contra ægilopas illinitur, crapulam arceat præsumptum
uinum, quod feruescens aliquantum eius semine exprimitur.

alias

lias enim acorem contraheret. Præstat idem seminis effectus, nile procidentia uulnarum in dessectionibus, sedis uitæ, & foemina fluxione nula laborantibus, purgat surfures, ulcera capitis manantia, atque eruptiones papularum fluentes continet: adlitur quoque in medicamenta, quas liparas uocant, uti oleum quod ex folijs eius factum est. Decoctum foliorum ad dessectiones balnearum conuenit, & contra laxatos artus, & male solidescences: eo fracta ferruminationi repugnantia utilissimè fomentur, uiriliginem emendat, purulentis auribus infunditur, & apillos denigrat. Succus eadem efficit. Trita folia & ex aqua lita humidis ulceribus & partibus omnibus fluxione laborantibus, cæliacisq; profunt: & admisto Omphacino oleo, aut exiguuo Rosaceo cum uino, ad ulcera serpentia, ignem sacrum, testium inflammationes, epinyclidas, & condylomata. Arentium foliorum farina utiliter inspargitur paronychijs, pterygijs, & contra alarum feminumq; perfusiones, cardiacorum sudores cohibet. Folia cruda seu cremata cum cerato, ambustis, paronychijs, pterygijsq; medentur. Exprimatur folijs succus aduso uetere uino aut aqua cælesti, cuius recentis usus est, nam exiccatus planè cariem sentit, & uires amittit. Myrtidanum dicitur, adnatum inequabile, uerrucosum, intumescensq;, & concolor, quod perinde quasi manus, Myrti caudicem amplectitur. Magis quàm Myrtus astringit. Tusum addito austero uino reponitur, coactumq; in pastillos siccatur in umbra: multò efficacius & folio & semine, cerato, pessis, insectionibus, cataplasmatibus admistum, ubi astringendum aliquid est.

MYrti domestice utraque species, & sylvestris itidem, in tota maris Tyrreni ripa, in Genuensibus, & Romanis fluuijs in omni Neapolitano regno, natura abundè prouenit. Omnium flores albi sunt et odoriferi, perplacetque unguetarijs aqua ex ijs alēbico distillata. Alba et nigra Myrti domestici, baccas ferūt oblongas, ferè similes oliuis sylvestribus, sed maiores. Redactis in puluerē frondibus & semine baccarū Myrti,

ti, ijs succurrit qui Fungos maleficos manducarint. Myrtidanum re-
nota est, & vulgaris ubi nascuntur Myrti. Fit à mulieribus. Itali
fructibus recentibus & maturis, & exacte molitis conditum, quo
diu acervatur, ac gustui non iniocundum est, si cum tostis carnibus eda-
tur. Confert etiam fluxionibus dysentericis & stomachicis, & supe-
fluis feminarum mensibus. Myrtus è diuersis composita substantijs, vi-
centem in se habet qualitatem frigidam & terrestrem. Quinetia sub-
tilium est partium, & calida: & ob id potenter desiccatur.

Cerasia. CAP. CXXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. κέρασις vel κεράσιον. Lat. Cerasus. Ita.

Cirego. Gal. Cerisier.



Cerasia.

perire oportet. Cerasia præcoquos edunt fructus, quibus calx radici, non
dum editis floribus circumspanditur.

Cerasia aluo utilia sunt. Si uiridia sumantur, eadem siccata, illam sistunt. Gummi quod Cerasi resudant, cum uino diluto, tussi uetustæ medetur, colorem commendat, usum exacuit, appetentiam inuitat: idem ex uino potum, calculosis auxilio est.


Cerasia è Ponto primum in Italiam aduecta, cum Lucullus victoria contra Mithridatem potitus est, multorum sunt generum, quæ secundum species, usus itidem in medicina variant. Nullo alio leamine gaudet Cerasia, quam suorum ramorum putamine, quos circa radicem infodere, dein terra o-

Siliqua

Siliquæ. CAP. CXXIX.

NOMENCLATURA.

Græ. κεράτσια. Lat. Siliqua. Ita. Carobe vel
Carobole. Gal. Carouge. Off.
fructus Xilocaracta.



Siliquæ.

Siliquæ recentes stoma-
cho aduersantur, aluum
soluunt: eadem siccata sistūt,
stomachoq; utiliores fiunt,
urinam ciunt: sed præcipuè,
quæ uinaceis condiuntur.


Siliquæ Latinis, Ceratia Græ-
cis, quod cornibus similia
sint, nomen acceperunt. Abun-
dè in regno Neapolitano &
tota via Appia visuntur. Flo-
rent in ipso statim initio & fi-
ne veris, fructum itidem ferunt
tota æstate, & per omnem autu-
num. Cum primum ex arbore
leguntur, prorsus ingrati sunt,
& gustui horridi, at siccī dul-
ces enadunt, & summè grati.

Mala. CAP. CXXX.

NOMENCLATURA.

Gr. μήλα. μήλον, Lat. Malus, Malum.
Prior dictio arborem, secunda fru-
ctum designat. Ita. Me-
la. Gal. Pommes,

Folia



Mala Cydonia.

dorum assumptus orthopnoicis salutaris est. Decocto fouentur uulnæ, & sedes si procidant. Cotonea quæ melle condiuntur, urinam mouent: mel autem sibi constringentem illorum uim & inspissantem asciscit: quæ cum melle coquantur, stomacho atque ori gratiora sunt, sed minus inspissant. Cruda cataplasmatibus adiunguntur, ad cohibendam aluum, aut si stomachus æstuet, aut in uomitiones effundatur, ad mammarum inflammationes, pradueros lienes, & condylomata. Fit unum ex ipsis tuis expressisq; sed quò perduret, quindecim sextarijs succi unus melli adiungitur, alioquin in acorem degenerat. Prodest ad omnia quæ dicta sunt. Fit & oleum ex ijs, quod Melinum uocamus, quo utimur quoties astringenti oleo est opus. Eligi oportet uera, quæ sanè sunt rotunda, parua, & odorata: quæ uerò Struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus utilia.

Flos



Persica.

Flos & uiridis & siccus ca-
taplasmatis imponitur, ijs
conueniens quæ astric-
tionem desiderant, inflamma-
tionibus oculorum, reiectio-
nibusque sanguinis, contra ci-
tam aluum, & mensum
impetus, in uino bibitur.

Melimela uentrem molli-
unt, & ab eo animalia ex-
pellunt, stomacho negotium
exhibent, æstuosa. Ea mul-
tis dulcia Mala uocantur.

Epirotica Mala, quæ Latine
Orbiculata dicuntur, stoma-
cho utilia, sistunt aluum, uri-
nas euocant, Malis tamen
Cotoneis inualidiora. Syl-
uestria Mala similia sunt

arnis, & adstringunt. Sanè in hunc usum immatura omnia
ous sunt. Persica Poma matura tam stomacho quàm uentri
ilia sunt. Acerba aluum cohibent, sed sicca uehementius:
ecoctum è succis alui stomachique fluxiones sistit. Arme-
aca, quæ a Latinis præcocia dicuntur, minora sunt supradi-
is, & stomacho utiliora. Medica Mala aut Cedromela,
quæ Latini Citria uocant, nemini non cognita. Arbor ipsa om-
bus anni temporibus pomifera, alijs deciduis, alijs subna-
entibus. Malum oblongum est, rugosum, colore aurum imi-
ns, cum grauitate odoratum, semen habet Pyri. Id in uino
tum uenenis resistit, aluum mouet, oris suauitatem commen-
dat

dat, decocto eius colluto, aut succo. Estur in malacia mulieribus, uestiarijs impositum ab erosione uitio uestes uindicare existimatur.

TAm multa sunt Malorum differentia ut nulla non regio, nulla vrbs, nullum oppidum, nullum castellum sit, quod non priuam quamdam suam aut originem, aut insitionem ostendet. Infiniti ea de re si operis, species omnes describere. Nota omnibus Cydonia: Melimela a melio dulcore nomen sortita sunt. Quid Epirotica mala sint, ignoramus. Agrestia Mala & vbiuis nascuntur, & suas & diuersas habent species. Persica Mala, & ex earum genere Armeniaca que Abricotavocant satis nota sunt. Medica mala, Cedromela, Citria, ouali forma sunt, lata carne, succo acetoso, cortice citrino: hac ne putrescant in Hordei acervis sepeliuntur. Virtutem habent in venena omnia & precipue illorum semen. Limones, Aurentia in Medicorum Malorum genus cadunt. Aqua qua per vitreum alembicum è Limonibus educitur, prater id quod seminarum faciem expolit & erugat, impetiginem sanat: infusa Syrupus, ardorem febrium compefcit. Pota pueris, vermes necat.

Pyra. CAP. CXXXI.

NOMENCLATURA.

Græ. Πύρος. Lat. Pyrus. Ita. Pera.
Gal. Poirier.

PYrorum multa genera, quæ tamen omnia astringunt: proinde adduntur conuenienter in repellentia cataplasmata. Decoctum è sticcis, & cruda ipsa aluum sistunt, ieuinos esitata ledunt. Achras Pyrastri genus est, quod tardissime ematurefcit. Vim Pyro astringentiozem habet, & ad eadem conuenit. Stringunt etiam eius folia. Ligni Pyrorum cinis efficaciter hu auxiliatur, quos Fungi strangulant. Ciunt Fungos, si Syluestria Pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

Pyrorum

PYrorum itidem vt malorū infinita differentie sunt, quarū facultates ē sapore & gustu deprehēdemus. Pyra stomacho grata sunt, & desiccant. Plurastringunt syluestria, idē in fluxibus valētiora domesticis

Mespilus. CAP. CXXXII.

NOMENCLATURA.

Gr. Μέσπιλον. Lat. Mespilus. Ital.

Naspolo. Gal. Meslier.

MEspilus, q̄ a nonnullis *Aronia* uocatur, spinosa arbor est, folio *Oxiacanthæ* fert pomū suauē, exigū, tribus intus sicculis qua ex causa id nonnulli *Tricoccō* appellauerunt: tarde maturescit, esu astringit, stomacho gratū est, aliūq̄, supprimit. *Alerū* Mespili genus in Italia nascit, quod alq̄ *Setaniū*, alij *Epimēida* uocat. Arbor folijs mali, sed minoribus, pomū fert rotūdū, sui, umbilico latiore, quod astringit, seroq̄ maturescit.

MEspillū *tricoccū* ea est arbor quā Itali *Azarolo* nomināt. Porro *Oxiacanthæ* reposuimus, qđ *Azarolo* Apij folia habeat, & *Pythacanthæ buxi* quæ sibi nō cōuenire nullus nō uidet. At *Oxiacanthæ Theobraستي* testimonio apij folia habet, p̄inde cōueniētius legetur folio *Oxiacanthæ*. *Epimelis* vel *Sitaniō* vulgo nota sūt. *Epimelides* autē nominātur d̄ iuxta syluestria mala adnascātur: *Vnedones*, qđ nisi vnū nullus de orare possit priusquam mollescat, adeo fauces astringit. *Vnedonis* hæc ex efficit Galeno, vt Mespillo arbuti vicia tribueret, qđ sanē vēdicare nō possumus, nisi dicamus de alio eū Mespillo quā *Dioscoridē* intellexisse.

Lotus arbor. CAP. CXXXIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Λωτὸν. Lat. Lotus. Ita. Loto. Gal. Alisier.

Lotus arbor est mastæ magnitudinis, ferēs baccā pipere maiore, dulcē, cibis gratā stomacho facile. Aliū sistit baccis. p̄metorū ligni decoctū siue potu, siue infusione, dysentericis ac minis fluxione uulnē laborātibus auxilio est, rufat capillos, an alium cohibet.

Lotus arbor, quam latini Celtim & Fabā græcā (vt quidā volūt) nomināt, Gallis cū suo fructu notissima est: nō multū astringit, at è subtilibus partibus composita, desiccatoria est, & ob id rasura ligni valet ad fluxus menstruos, ad dysenteriam, & fluxus stomachales. Conquitur ad eū effectū modò in aqua, modò in vino, vt res exiget, & nō tantū per clysterem insundetur, sed ipsa etiam decoctio bibetur.


Cornus. C A P. C X X X I I I I.

NOMENCLATURA.

Gr. Κραμία Lat. Cornus. Ital. Corniolo.

Gal. Corneillier.

Cornus dura arbor est, baccas ferens Oliuæ modo oblongas, quæ primū uirēt, dein per maturitatē rubescunt, aut ceræ colorē repræsentant. In cibo astringūt, profluuiū alui atq; dysentericæ salutares, siue in edulio, siue in defruto exhibeantur. Mu-



Sorba.

ria, ut oliuæ cōdiuntur. Sames quā uirētia folia torrēdo resudarunt, impetigini conuenienter illinitur.

Theophrastus Cornū matrē & seminā facit ac suas cuiq; dotes assignat. Cornus vicinas apes nō sustinet. cōmoritur enim statim vt flores illa descerpserint, fit è pulpa fructuū, mixtio Cydoniæ similis, & ex eorū decoctione Gelata cū Zucharo, quæ præter id quod grata sunt gustui, proficiūt etiā fluxionibus dysentericis, & reducantibus mensibus.

Sorba. C A P.

C X X X V.

NO

NOMENCLATURA.

Gr. ὄζα. Lat. & Ital. Sorba. Gal. Cormes.

Sorba colore luteū referētia prius quā maturescāt, dissecta & sole siccata mandūtur, ut aluum sistāt. Eadē est functio molitorū farinae, si polenta loco sumatur quod & decoctum eorum in potu praestat.

Sorba duorū sunt generū. Nā aut rotūda, & alijs dulciora, & sapidiora sunt: aut oblonga parviorū Pyrorū in morē, praedictis asperiora & rudiora. Præter hæc sunt & sylvestria gustu nō ingrata & quæ plus astringunt, si immatura desiccantur.

Prunus. CAP. CXXXVI.

NOMENCLATURA.



Prunus

Græ. Κοκκυμηλέα.

Lat. Prunus. Ita.

Susino.

Gal. Prunier.

Prunus arbor est nota, cuius pomū estur, sed stomachum male habet, aluum mollit. Syriaca Pruna & præcipue quæ Damasci gignuntur, exsiccata stomacho utilia sunt. aluum astringunt. Folia Pruni in uino decocta collutione & gargarizatu uiam, gingiuas, & tonsillas fluxione laboranteis reprimunt. Præstant idem syl-

i 2 uest

uestrium Prunorum bacca, post maturitatem exiccata. Cum sapa uero decocta, stomacho utiliores redduntur, aliumque magis astringunt. Gummi Prunorum agglutinat, potum in uino calculos comminuit, ex aceto quoque illitum, lichenas infantium sanat.

Prunorum itidem ut Malorum & Pyrorum multa sunt differentia, & varij est qualitate effectus. Sunt Pruna virilia, rubra, alba, crocea, purpurea, grossa, media, parua, dulcia, acetosa, mediocris saporis, dura, fragilia, longa, rotunda, oualia. Pruni fructus soluit corpus: plus tamen recens, quam sicus. Damascena alium solunt, & astringunt. Sic enim corpus solunt, ut semper stipticum reliquant, quod idem faciunt Tamarindi, & Myrobalani.

Arbutus. CAP. CXXXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. Κομαρ, Arbutus. Ita. Arbutio.

Gal. Arroches.

Arbutus sine Vnedo, arbor est Cotonea malo non dissimilis, tenui folio, cuius fructus Pruni magnitudinem implet, nullo intus nucleo, huic Memæcylo cognomen est. Maturus aut flauet, aut rubescit, in esu acerosus, stomacho aduersatur, capitisque dolorem mouet.

Arbutus in Italia abunde provenit, sed quod Dioscorides dicit, Cotonea malo similem esse, id ad proceritatem potius referendum, quam ad frondes aut corticem. Arbuti enim fronds similes sunt Laurinis & Iugis, nisi quod è viridi flauescunt. Cortex è nigricante rubescit, rudis & squamosus plus tamen rubescit & lauis est in ramis. Floret sub aestate sine flore albo paruarum campanarum specie, adfabrè in oblongos racemos extructo. Foliorum aqua per alembicum extracta cum osse cordis ceruini, mirum in modum in pesie coduct, precipue antequam cofermetur.

Amygdalæ. CAP. CXXXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Αμυγδαλή. Lat. Amygdala. It. Le Mandole.

Gal. Amendes. Off. Latino nomine,

Amyg



Amygdalæ

Amygdalæ amaræ radicū tritarū decoctū, vitia cutis in facie corrigit, illitæ nuces idem munus præstāt. menses admotæ ciūt, capitis dolori auxiliantur, illitæ fronti aut temporibus cū aceto vel rosaceo, epynictidas sanāt, ex uino ite putrescētia ulcera, & quæ serpiūt, & morsus canū cū melle: earū autē esu dolores finiūtur. Alium emolliūt, somnū faciūt, urinā ciēt, cōtra sanguinis reiectiones cū amylo assumiūt. Renū uitijs & pulmonū inflammationibus ex aqua in po-

tu aut eclegmate cū resina Terebinthina datur. Calculosis diffi-
ciliq; urinā in passo auxiliantur, & illinctu cū melle & lacte,
hepaticis, tussi, & inflationibus coli, nucis Auellanae magnitu-
dine. Quinus septemsiue præsumptis ebrietatē nō sentiūt potiores.
Vulpes si cū quadā esca eas uorauerint, emoriūtur. Gummi eius
calfacit & astringit: reijciētibus sanguinē, potū auxilio est: im-
petigines quæ summū corpus occuparūt, illitū cū aceto tollit, tussi
uetus & cū diluto uino potū medetur, calculosis cum passo bibere
prodest. E nucibus Græcis, dulces cibo idoneæ: sed multo minus
uālēt in remedijs, quā amaræ: attamē extenuat, urinā ciūt. Re-
entium esu cum suo putamine, stomachi uitia emendatur.

Amygdalæ dulces sunt, aut amaræ. Eæ calidiores sūt & valentius
deficiant. Amygdalæ quantum uelis dulces, de amarore tamen oc-
cultato dulcore aliquatū participant, quod processu tēporis agnosciuntur.

Pistacia. CAP. CXXXIX.

NOMENCLATURA.

Gr. Πισακία. Lat. Pistacia. Ital. Pistachi.

Gal. & Off. Fistici.

Pistacia, quæ cōstat in Syria gigni pineis nucibus similia sūt
 & stomacho amica. Trita cum uino contra serpentium
 iētus prosunt sine edantur, sine bibantur.

Vitellius Censor Syria legatus sub prima Tyberij Caesaris tēpora,
 Pistacia in Italia intulit. Pistaciū plātā Venetijs visuntur, Ca
 ietæ, & Neapoli. Pistacia maturat, l. niūt, resoluūt, coferūt putridæ pul
 monis humiditati, puri pectoris, & tussi. Stomachū, vellit, non prius
 in aquam infusa.


Nux iuglans. CAP. CXL.

NOMENCLATURA.

Gr. Κάρυα Βασίλικα.

Lat. Nuces iuglādes. Ita. No-

ce. Gal. Noix.



Nux iuglans.

Nuces iuglādes quas nō
 nulli Persicas uocant
 sunt difficiles cōcoctū, stoma
 cho inutiles, biliosæ capitis do
 lorē inferētes, tussiētibus ini
 micæ, & uomituris ieiunū
 in cibo aptæ, cum Ruta uerō
 & ficis præsumptæ, & à
 summo cibo, uenenis resistūt:
 nec minus si à ueneni haustu
 comedantur: largius esitata
 tineas latas pellūt. Illinuntur
 mammarum inflammatioi,
 abscessibus, luxatisq; cū mel
 lis

lis exiguo & Ruta: cū Cepa autem, sale & Melle, canis hominisq; morsu proficiūt: tormina, cum calyce suo perusta, & umbilico admotæ, sedant. Putamē combustum tritumq; in oleo & nino, infantium capite peruncto, nutrit capillum, alopecias replet. Sistunt menses nuclei usti, si triti ex uino admoneantur, ydē e ueteribus, illiti carbunculis, gangranis & agilopijs medentur alopecijs commanducati & impositi præsenti sunt remedio. Nucibus tufis Oleum exprimitur. Recente stomacho innocentiores sunt ut pote suauiores, itaq; Allio mistæ eximunt acrimoniam, liuores in corpore illitu tollunt.

Nux simpliciter, Nux Regia, Iuglans, Glans Iouis, Nux Persica, idem sonant, nempe arborem satis cognitam. Siccæ Nuces astringunt, virides & recentes nullam ostendunt facultatem quæ oleosa sit, & astringentia. Indicæ nuces calidæ sunt secundo ordine, humida primo. Sumptæ in cibo stomachum grauant, & prauum alimentum generāt.


Nuces auellanae. C A P. C X L I.

N O M E N C L A T V R A.

Gr. Λεπτοκαρυα. Lat. Noces auellanae.

Ital. Nocciuole. Gal. Noysettes.

Noces auellanae, quas & Leptocarya uocant, stomacho infestæ sunt: ipsæ tamen tritæ, & in aqua mulsa potæ, tufi ueteri medentur: tostæ & cum exiguo Piperis potæ, destillationem concoquunt. Crematarum cinis cum axungia aut adipe urfi perunctus alopecijs capillum reddit. Aiunt nonnulli usta earum putamina, & in cineris speciem redacta, cum oleo, caeriorū oculorum pupillas infantibus denigrare, persuso sincipite.

*Auellana nux.**Auellana sylvestre.*

N Vces, à Ponto, vnde asportata, domestica sunt & sylvestres. Domesticarum alia oblonga sunt, alia rotunda. Oblongae, suauiores gustu. Ea tardius quam rotunda maturescunt.

Morus. CAP. CXLII.

NOMENCLATURA.

Gr. Μορέα ἢ Σινάμινεα. Lat. *Morus*. Ital. *Moro*.

Gal. Meurier. Off. Latino nomine usurpatur.

Morus arbor nota est, cuius fructus aluum soluit, stomacho inutilis est, & facile corruptionem sentit. Hoc idem præstat Mori succus: decoctus autē æreo vase atq; insolutus, adstringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & tonsillarū inflammatioēs, addito mellis exiguo. Sed inoleſcit vis eius adiecto sciſſili Alumine, Galla, Croco & Myrrha: itē myricæ semine

tri,

*Morus.*

Iri, et Thure. Immatura Mori poma siccantur, tusaq; acinorū Rhois uice obsonijs miscentur, ut celiacos iuuent. Radicis cortex decoctus in aqua, & potus aluum resoluit, latas uentris tineas excutit: his quoque auxiliatur, qui Aconitum hauserūt. Folia trita ex aceto illita, ambustis igni medentur, tinguntq; capillum, utium & Fici nigra frondibus simul coctis in aqua cœlesti. Succus foliorum cyathi mensura potus, contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruesca-

ti corticis & foliorum iure dentes aptissimè in dolore colluuntur. Radix circiter messem incisa, facta in ambitu scrobe, succum mittit, qui postridie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est. Tubercula discutit, & aluum purgat.

Morus alba et nigra nunc Gallijs cognite sunt. Multo minus astringunt, Mora alba, quam nigra, nempe admodum & manifestè dulcia, quanuis aliquantum insipida, Matura Mora solunt corpus, immatura (sicca) astringunt. Manducata ante omnem cibum, statim è stomacho descendunt, viam cibis qui ea consequuntur parant: quod si ab alio cibo edantur, & se & alium cibum corrumpent.

Sycomorus. CAP. CXLIII.

NOMENCLATURA.

i s

Gra.

Græ. Συκόμορος. Lat. Sycomorum. Ita. Sicomoro.

Gal. & Off. incognita arbor.

SYcomorum aliqui etiam Sycaminum, id est, Morum, uocant, cuius fructus Sycomorum etiam propter inefficacem gustum appellatur: arbor est magna, fico similis, frondosa, multo lacte abundans, folijs Mori. Pomum ter aut quater anno fert, non ramis, ut ficus, sed caudice ipso, Caprifico non dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribus, quod non maturescit, nisi ungue aut ferro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria, Rhodo, locisq; non multi tritici feracibus, ubi prouentu sæcundo restibiliq; inuamentum adfert, cum annonæ caritas premit. Pomum aluo utile est, sed perquam exilem præbet alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus primo uere tenera arbore, antequam fructum ferat, eximitur, lapidis ictu summo cortice desquamato: si enim altiore plaga uioletur cortex, nihil effluet. Spongia aut uellere, lachryma excipitur, quæ siccata & in pastillos coacta, fictili uase reponitur. Vis succi emollit, uulnera conglutinat, discutit collectiones coctioni repugnantes. Bibitur etiam aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & perfrictiones, celerrimè teredinem sentit. Gignitur & in Cypro arbor genere distans, quæ cum sit Ulmus, prædita tamen est folijs Sycomori, fructu Pruni magnitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis.

Habet id proprium Sycomorus (propria Aegypto arbor) ut cæsa uiridis persistat, nec siccatur, priusquam in aquâ immittatur. Hæc Aegyptiam, sed nec Cypriam cognoscimus, ac proinde supersedere satius quam plura dicere.

Fici. CAP. CXLIIII.

NOMENCLATURA.

Græ.

Gr. ΣΥΚΗ. Lat. *Ficus*. Ita. Ficho.

Gal. Figuier.

*Ficus.*

Fici maturæ recentes stomachum lædunt, alium solunt, sed facile contracta ab eis fluxio sistitur, sudorẽ euocant papulasq̃, sitim sedant, calorem restringunt. Siccis natura excalsaciendi, uires alunt, sed sitim magis stimulant. Aluo utiles, rheumatismis uentris & stomachi contraria: gutturi autẽ, arteriæ, renibus, uesicæ, & ijs quos longa ualeitudo decolorauit, anhelatoribus, hydropicis, comitialibus aptissima. Feruescẽtẽ cũ Hyssopo & pota, thoracem purgat: tussi ueteri, diuturnisq̃ pulmonum

uitijs conueniunt: aluum molliunt tussẽ cũ Nitro & Cnico, dein manducata. Decoctum arteriæ et tonsillarũ inflammationibus gargariũ atq̃ prodest. Cum hordeacea farina cataplasmatibus miscentur, & in muliebres fotus cum Fœnugraco & ptisanã. Caterum cum Ruta coctæ torminibus infunduntur: coctæ illitæq̃ duritias discutiunt, parotidas et furunculos emolliunt, panos ad maturationem perducunt, maxime Nitro, Iri aut calce addita. Crudæ si cum antedictis tundantur, eadem efficiunt: cũ Malicorio, pterygia purgant: cum atramento sutorio, deploratis uere tibiarum punctionibus, & cacoethicis ulceribus medentur. Quin et cũ uino decoctæ addito Absinthio et hordeacea farina, utilissi

utilissimè hydropicis illinuntur. Crematæ cum cerato sanant per-
miones, prurigines, sonitusq; si crudæ terantur, & Sinapi liquo-
re q; aliquo exceptæ auribus instillantur. Tam sylvestris quàm sa-
tiua Fici lacteus succus coaguli modo lac contrahit, concretumq;
dissoluit, ut acetum. exulcerat corpora, meatus aperit, soluit al-
uum, uulnam recludit cum detrita Nuce græca potius, menstrua
ciet cum luteo oui appositus, aut Tyrrhenica cera: podagricorū
cataplasmatibus cum farina Fænigræci et aceto utilis: lepras, liche-
nas, utiligines, uitia cutis in facie, psoras, ulcera in capite manan-
tia, cum polenta expurgat. Instillatus plagæ, percussus à scorpio-
ne, uenenatorum ictibus, & rabiosi canis morsibus auxiliatur.
Prodest dentium dolori lana exceptus, & canis eorum addi-
tus, uerrucarum infectiones tollit cum adipe, circumlita in
ambitu carne. Hoc idem præstat succus è teneris ramis sylvestris
Fici, qui lacte prægnantes, silente adhuc oculo tusi exprimuntur,
& siccatus in umbra reponitur. Et lac & succus imponuntur
exulceratorijs medicamentis. Decocti cum bubulis carnibus ra-
mulis ficulni, facilem afferunt decoctionem. Lac efficiunt quod
magis soluat, si inter coquendum Ficulneo surculo, spathæ loco,
moueatur.

Ficus hodiè trium specierum ab extraneis afferuntur. Flaus, sparteis
corbibus compacta. Alia in cistis, interstratis Lauri folijs. Tertia è
Mafsiliensi prouincia veniunt minutis & turbinatis sparteis corbibus
inclusæ. Paruæ hæ sunt, sed admodum suaves. Caricas peculiare suum
habere genus censuit Hermolaus in corollario. Hæ aperta sunt.

Grossi. CAP. CXLV.

NOMENCLATURA.

Gr. ὄλυνθici. Lat. Grossi. Ita. Fichi
grossi. Gal. Les Gros.

Grossi, quæ Erinei nonnullis uocantur, coctæ, illitæ, stru-
mas nodosq; omnes emolliunt. Crudæ formicas, uerru-
cas

cas & thymos, nitro farinaq; additis, tollunt. Folia eadem possunt. Illita cum sale & aceto ulcera in capite manantia, epinyelidas & furfures sanant: ijs ficosæ extuberationes, & genarum scabritiæ perfricantur. Nigræ Ficus folijs cauliculisq; candidæ utiligines perunguntur: faciunt ad canum morsus, & ulcera quæ ceria, id est, fauos, uocant. Grossi cum sylvestris Papaueris folijs ossa extrahunt: furunculos cum cera discutiunt, contra muris aranei morsus, & scolopendræ uenena, cum Eruo & uino illitæ, auxiliantur. Fit ex cinere Ficus tam sylvestris quàm satiuæ lixiuium, crematis ramorum cauliculis, quod subinde macerari opus est & inueterascere: siquidē inter caustica intelligitur. Gangrenis prodest: nanque expurgat & consumit quæ excrescunt: eoq; sic utendum est: Spongia assidue hoc lixiuio imbuta superponitur. Interdum dysentericis, & in fluxiones uetustas, & sinus cuniculatim exedentes, magnosq; instillari conueniet. Etenim purgat, conglutinat, carne replet, & oras committit, non secus atque emplastra, quæ cruentis uulneribus injiciuntur: enema uocant. Bibitur ad discutiendum sanguinem concretum, & cōtra præcipitationes, rupta, conuulsa, cum cyatho aquæ recenter colatum, addito olei exiguo. Cæliacis, dysentericis per se cyathus datus prodest, neruorum uitij, conuulsionibus. Commode illinitur ex oleo, utpote quod sudores moueat. Aduersus Gypsi potum et phalangiorum morsus bibitur. Hec eadem præstant reliqua lixiuia, præsertim quernum, omnia tamen adstringunt.

Persea. CAP. CXLVI.

NOMENCLATURA.

Gr. Περσεα. Lat. Persea. Ita. Perseo.

Gal. Off. ignota.

Persea arbor est in Aegypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho utilem, in quo phalangia cranocolapta nomine

inuc

inueniuntur, præsertim in Thebaide. Arida folia in farinam redacta, illitu sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc proderunt aliqui in Perside exitiosam esse, translatamq; in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

Persea Aegyptia, non est nostra Persica. Vtraque tamen è Perside educta. Persica in frigidis regionibus prouenit. Persea Rhodi seruenti regione viz. florem emittit. Perseam scribit Galenus malignam & reuenosam in Perside, asportatam in Aegyptum hac malitia desuncta.

Iberis. C A B. CXLVII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἰβέρης. Lat. Iberis. Ita. Iberide.

Cal. Chasse rage.



Iberis.

de tractat in sequenti libro. adieclitum hoc caput non iniuria esse videtur. Qui enim acris herba cum arborum serie?

Iberis siue Cardamantica, folia habet Nasturtij, uere uirentiora: caulem cubitalem, aut minorem: in incultis nascitur: æstate lacteum florem promit, quo tẽpore efficacior est. Radices duas Nasturtio similes habet, calfacientes & adurentes. Ipsæ enim ischiadicis cū salsa axungia emplastri modo utiles, quaternis horis alligatæ, ut dein in balneas descendantur, & postea oleo cum lana locus perungatur.

Cum clarum sit Iberidem

idem esse cū Lepidio, quo

PEDANII DIO-

SCORIDIS ANAZAR-

bei, de Medicinali materia, Li-

ber secundus. Ioanne Ru-

ellio Suefsionensi

interprete.

*Adpuncta annotationes doctæ &
compendiosæ.*

P R A E F A T I O.



IN PRIMO, charissime Aree, Libro, quem de medicinali materia condidimus, de aromatibus, oleis, unguentis, arboribus, & nascentibus ex eis succis, lachrymis, seminibusq; differuimus. In hoc autem secundo de animantibus, melle, lacte, adipe, frugibus, atque oleribus explicabimus, subnexis herbaceis, quæ acri prædita sunt facultate, utpote quæ cū ipsis cognatiōe iuncta sunt: qualia Alliu, Cēpa, Sinapi, intelliguntur. Idq; ideo, ne cognatorū vires disiunxisse videamur.

Echinus, siue Erinaceus. CAP. I.

N O M E N C L A T V R A.

Gr. Εχίνος θαλάττιος. Lat. Echinus marinus. Ita.

Riccio marino. Gal. Herison de mer. Porc espic.

Marinus



Marinus Echinus stomacho uentriq^{ue}, utilis est, urinam cit, huius testa cruda inassata, commodè medicamentis admiscetur, quæ psoras abstergunt, crematæ uerò cinis sordida ulcera expurgat, luxuriantem carnem reprimat. Terrestris Erinacei corium combustum alopecijs cum Pice liquida aptissime illinitur. Assecatum corpus, & aceto mulso potum, renum uitis auxilio est, item aquæ quæ cutem subit, conuulsionibus, elephantia & malè habitis, quos cachectos uocant, uiscerum fluxiones exiccat. Eiusdem iecur sicili solibus excocto arefactū, ad eosdem usus utilissime reconditur.

Echinus Marinus spinosus est, rotundus Echino terrestri cetera similis, nisi quod spinæ nigriores & breuiores sunt. Crustam habet ab aculeis, cochlearum forma, & in huius connexo carnem, partim luteam, partim caruleam. Cibus est non ingratus gustu, modo ut decet preparatur. Spinis, orbiculatim conuolutus, pedū loco graditur, eoque fit ut plerique retritū reperiuntur aculeis. Est & aliud maioris generis, quod longius a littore capitur. Hunc Echinomietram uocant. Erinaceorum minimum cinis abstergit, digerit, attrahit. Echinus terrestris animal est, & cognitum, nunc canino, nunc porcino rictu. Noctu tantū è latebra prodit. Frigida eius natura, multaque huius superfluitates, nutriendis seruiunt aculeis. Testes habet renibus animum more astrictos, ac
ideò

ideo velocissimus est in coitu. Perterresactus pile in modum sese contrahit, at superuncta aqua, distrahitur, & incedit. Caro eius medicinis, quàm cibus aptior, quippè terrestris, & digestionis non parens. Histrix Africanum & Indicum animal, ex Erinaceorum est genere.

Hippocampus. CAP. II.

NOMENCLATURA.

Græ. ἵπποκαμπός. Lat. Hippocampus.

Ita. Hippocampo.

Hippocampus marinum animal est exiguum, cuius creaturæ cinnis exceptus, cum liquida pice aut axungia seu Amaricino unguento illitus, alopecias replet.

Indicat hac dictio Hippocampus prægrandem Erucam, quod vulgari-
bus maior sit, ideoque nihil mirum si hanc exiguum animal vocet
Dioscorides. Nam additam (Hippo) dictionem, Græcorum idioma facit.
Animalculum est mediocri Gambaro, & corpore & forma simile, præ-
terquam quod brachias bifidas non habet, collo & capite oblongo, &
in totum colore bruchis adsimile, è nigro rubescens, subq; terram in hor-
tis & campis delitescens ac herbarum & frugum radices edens. Itali
Cagne & Orsoline: ut Hippocampus, Fallopa vocant. Hippocampi cin-
nis desiccatur & resoluit.

Purpura, buccina, eorumq; volutæ.

CAP. III.

NOMENCLATURA.

Græ. πορφύρα κινυξ κίονια. Lat. Purpura Buccina.

Cionia. Ita. Porpore Buccine Cionie.

Purpura usta exiccat, detes abstergit, excrescētias in carne
cohibet, ulcera purgat, & ad cicatricem perducit. Eadē præ-
stant cōcremata Buccina, sed uehementius urunt. Si quis salis ple-
na, fictili crudo adurat, dentifricio conueniunt, ambustis utiliter
illinuntur, quibus solui medicamentum non oportet: nā posteaquā
vulnus cicatricem duxerit, ipsum in testæ modum induratum sponte
sua decidet. Fit etiam calx è Buccinis, ut in eius mentione de-

k

mon

monstrabimus. Cionia uocatur Purpurarū Buccinorūq; media partes, circa quas testa uolumen clauiculatim intorquetur, cremata simili modo, maiore purpuris buccinisq; facultatē urendi consequuntur, quoniā apprimendi naturā obtinēt. Buccinorum carnes ori gratae sunt & stomacho utiles, sed aliū nō molliunt.

Purpure dura sunt testa, & in se liquore illum continenti, è quo superba illa vestes antiquitus finge- batur. Liquorem hunc habent in candida gutturi ve-



na, quæ in mortuis nō reperitur, sed cum ipso spiritu euanescit idq; quo viuas caperent, eo artificio piscatores utebātur. Est Purpuris lingua digitali lōgitudine ea duritia ut cuiusvis ostraceorū generis (è quorū carne pascuntur) testam perforet. Huius rei gnari piscatores, capitis in littore ostreis, nassarū formā è iuncis intextis ostreis, mētiebātur, ac longo fune alligatas in mare proijciebāt. Tamē ostreae siti pene emortua, ut senserāt aquā, statim aperiebāt sese, ad quas accurrētes purpurae ut inde pascerentur, durā illā linguā ostreis inferebāt. Ea pungi se sentiētes, occlusa testa, ac inter duos eius parietes linguā Purpurarū oppressā, piscatoribus viuas offerebāt. Per quinquaginta dies extra aquā viuunt Purpure, sola sua in nutrimentu salina cōtente, ac statim ab attacta dulci aqua moriuntur. Species purpurarū sunt Buccina, ita nūcupata, quod cornu militaris imaginē referāt. Maiores sunt purpura, cū longo canalis in modū rostro, vnde linguā exerūt. Id totū è spinosis circulis est cōpactū, & in Buccinis nō reperitur. Et purpura & Buccinae tot habēt in dorso circulos, quot vixere annis. Buccina solis affiguntur & reperiuntur in scopulis.

Mituli.

CAP. IIII.

NOMENCLATURA.

Græ

Græ. *Μυταίς*. Lat. *Mituli*.

Mituli laudatissimi in Ponto. Cremati eundem Buccinis effectum præbent: priuatim plumbi more eloti, oculorū medicamentis tum melle utiles habentur, genarum crassitudines absumūt, albugines purgant, & cætera quæ oculis caliginē offundunt. carnes eorum ad canis morsus utilissimè imponuntur.

Tellinæ.

CAP. V.

NOMENCLATURA.

Græ. *Τελλῖναι*. Lat. *Tellinæ*. Ita. *Telline*.

Recentes Tellinæ aluo utiles, sed maxime ius earum: salita uruntur, tritæq; in cinerem & cum cedria instillatæ, auulsos pilos renasci non patiuntur.

Chamæ.

CAP. VI.

NOMENCLATURA.

Græ. *Χῆμαι*. Lat. *Chamæ*. Ita. *Chame*.

Chamarum Conchularumq; in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet: id cum uino assumitur.

Annotatio in Cap. iij. v. vj.

Cum diuersis in capitibus de Mitulis & Tellinis scripserit hoc in loco Dioscorides, & Galenus libro de facultate simplicium in cap. De vipera, tractet de Mitulis: & de Tellinis proprio capite, ac peculiare cuiq; & diuersas ab alterutro facultates assignet, nec aliter egerit Paulus Aegineta fidelis utriusque imitator, constat nō vnā (vt quidā volūt) sed diuersas esse Ostreorū species, Mitulos, & Tellinas. Eæ notissima sunt in Italia & maxime Romæ, vbi magna illarum probat copia, quod probè ab arena purgatæ, gustui gratæ sint. Mitulos nullus est qui deliniet, & proculdubio, aut nō reperiuntur, aut hoc nomine nobis sunt incognita. Hiattule ex esse possunt quæ cum leni testa, apertæ in Adriatici maris ora reperiuntur.

k z

vng

Vnguis odoratus. CAP. VII.

NOMENCLATURA.

Græ. οὐνξ. La. Vnguis odoratus. It. Vnghia odorata.
Gal. & Off. Blattæ Bisantriæ.

Vnguis siue onix Conchilij tegumentū est, ei simile quo purpura integitur: quod in Indiæ nardiferis lacubus inuenitur: suauem ideo spirans odorem, quod conchylia inibi nardi pabulo uescantur. Colligitur posteaquā stagnantes aquæ æstius squalloribus inaruerunt. Laudatissimus qui à rubro mari defertur, candicans, pinguis. Babylonicus nigrescit, atque minor conspicitur. Ambo odoris gratia suffiuntur, sed aliquatenus Castoreum olent. Idem suffitu excitant fæminas uulvæ strangulatu oppressas, comitialesq; poti uentrē molliunt. Crematū conchylum eadem efficit, quæ purpura & Buccinum.

Vnguis odoratus, quod vnguis speciem reserat, Blatta Bisantria, (per Arabes) Officinis, ut plurimum dum prurit, ingratiū odorem spirat. Res multum ab illa præstantia disidens, quam ei in conficiendo thymiamate sacra etiam tribuunt literæ. Excellentē vidit Matthioli, sed rarum: Ideo hic admonendi Pharmacopole, & officinas nō tam qnerent copia, quam certo & modico specierum delectu.

Cochleæ. CAP. VIII.

NOMENCLATURA.

Gr. κοχλίας περσαί & καὶ θαλάσσι &, La. Cochlea terrestris & marina. Ita. Chiocciole terrestri & marine. Gal. Escargots. Ger. Schnecken.

Terrestris Cochleæ stomacho utiles sunt, & nō facile corrumpuntur. Optimæ Sardonica, Aphricana, Astypale-

ca



ea, & quæ in Sicylia ac Chio gignuntur & quæ in Liguria al-
pibus. Pomatiæ, id est, operculares, cognominatæ. Marina sto-
macho idonea, & facile aluo excernitur: fluuiatilis uirus olet.
Quæ uerò uepribus frutetisq̃, glutinata cohæret, quam uocant
nonnulli Sefilon, uentrem & stomachum turbat, uomitiones
excitat. Crematæ omnium testæ excalfaciendi & urendi na-
turam sortiuntur: purgant lepras, uirilignes, dentesq̃, emēdant
oculorum ticitrices, & uitia cutis in facie, albugines, ac uisus
hebetudines, si cum carne sua ustæ tritæq̃, ex melle illinantur.
Caudæ cum tegumentis impositæ, aquæ inter cutē tumores exu-
gunt: sed non ante soluantur, quàm omnis hauriatur humor: po-
dagricas inflammationes leniunt, impactos corpori aculeos illitæ
euocant, menses tritæ & admotæ ciunt. Carnes earū cum Thu-
re & Myrra illitæ, cum uulnera alia, tum maximè quæ nerui
acceperunt, conglutinant: tritæ in aceto, sanguinē naribus erum-
pentem infrenant: uiuæ corpus, & præsertim Africanæ, cum
aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat: trita cum testa, ui-
no & Myrrha, si exiguum inde bibatur, coli uesicæq̃, cruciatus
sanat. Terrestris pilos incommodos replicat, si quis abrafo acu-
lentore eius, pilum attingat.

Cochlearum apud veteres adeo exquisitus fuit cibus, ut eas vndiquaq; cōquirerent, asseruaretq; & nutrent. Terreſtres Cochlea secundum eas quibus pascuntur herbas gustui grata, aut ingrata sunt. Nam quæ Calamentho, Origano, alijsve similibus herbis pascitur, eas nemo recusabit. Cōtra quæ in Lacubus, cœnũ: quæ in fluvijs, virus redolebunt. Concharum omne genus leniter cōcavas crustas seu testas habet, quibus aperiendis & claudendis natura potentes sunt. Rarũ est in quibusdã vnica & latiuscula cōcha tegi. At Cōchlearũ species omnes vnica & cōtinua testa cōduntur, quã (domus vice occlusa) cum incedunt dorso appensam post se trahunt. Spiras habet hæc testa planas, cōnexas, turbinatas, acuminatas. Testas, quæ proprie Limaces sunt, non habent, macula alioqui nigra aut lutea insignes. Habent ea, ut vulgus opinatur, certum in capite lapillum, qui tertianis remedio est. Vivunt opacis & raris in locis ex eis per alembicũ aqua paratur decorãda mulierũ faciei.

Cancrì.

CAP. IX.

NOMENCLATURA.

Græ. Καρκίνοι ποταμίοι. Lat. Cancrì fluuiatiles.

Ita. Granchi di fluui. Gal. Cancres de riuiera.

Ger. Heusser.



Cancrorũ
fluuiatiliũ
exustorum
cinis, qui
duo cochlea
ria expleat
adiecto di
midio radi
cis Gentia-

ne modo, triduo potus cum uino, magnoperè prodest canis rabiosi morſibus, rimas pedum, sedisq; perniunculos, & carcino-mata, cũ decocto melle lenit: triti crudi, potiũq; ex asinino lacte, auxiliatur contra serpentium phalangiorũq; morſus, atque scor-pion

pionum ielus: decocti autem & cum iure esitati, ijs prosunt qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauserunt: necant scorpiones triti, & cum Ocimo admodti. Possunt eadem marini, uerum inefficacius omnia praestant.

CAncri quos hic describit Dioscorides, Astaci aut gamari, quas Galli (Escreuiffes) vocant, non sunt: sed solū ex crustaceorū genere cauda carens, & rotundo corpore, quod locustis & squillis oblongū est. Est inter Astacum tamen, & Gammarum differentia, quod Astacus marinus sit & crassius pisces: Gammarus vulgaris sit Escreuiffa, aut marina, aut fluuiatilis. Errant proinde medici, qui in canis rabiosi morsibus, phthisicis ve curadis: cū Cancrorū vsu Dioscorides & Galenus praescripserint, Gamari vtuntur. Recentes medici, lapillos qui in Gammarorū capite reperiuntur, in puluerem redigunt, bibendūq; offerunt ad purgandos arenulis renes.

Terrestris scorpio. CAP. X.

NOMENCLATURA.

Græ. Σκόρπιος & χερσαῖος. Lat. Terrestris Scorpio.

Terrestris Scorpio tritus & impositus, suae plagae remedium est: quin estur assatus, ad eadem.

Ielus Scorpj terrestris locis frigidioribus, innoxia, calidioribus, noxia est. Nullibi gētū venenati magis & mortiferi Scorpj, quā in Scythia frigidissima regione brutis etiā ad porcos vsque, qui morsum cuiusuis alterius animalis nō timeāt. Nouē in Scorpj's colores nēpe Cedrinū, rubeū, cineritiū, ferrugineū, viridē, fuluū cū cauda nigra, vinosum, albū & fumeū. Qui in cauda septinodes, magis alijs venenati. Cinis scorpionem qui vini ambusti erūt, illis proficiet, quibus vrina ob arenularū opilationem, aut lapidē qui in vesica sit, retardatur.

Marinus scorpio. CAP. XI.

NOMENCLATURA.

Græ. Σκόρπιος & θαλάσσιος. Lat. Marinus Scorpis.

Marini Scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorum, albugines, & hebetudines.

Fertile elemētū mare, exprimeūdis omnibus q̄ in alijs viuūt elemētis. Atq; adeo multa habet q̄ in nullo caterorū. Producit & scorpis.

k 4

Sed

Sed ij non satis noti. Nam quas Itali Scorpenas seu Scarpenas vocant, non esse marinos Scorpios ex Athenai & Aristotelis descriptione cōtendit Matthiolus, & dubitans proponit, piscem qui Italis Ragno dicitur fieri posse vt sit Scorpis. Habet hic in dorso spinas quasdā quibus trāfigit, venenatas, itidem & Scorpena, queis nō raro & ē punitione piscatores confecit.

Draco marinus. CAP. XII.

NOMENCLATURA.

Græ. Δράκου θαλάσσιου. Lat. Draco marinus. Ita. Draco marino. Gal. Dragon marin.

DRaco marinus dissectus & apertus impositusq; iēctus spinæ suæ qua ferit, medela est.

DRaconem describunt marinum Plinius & Albertus ingentem piscē, serpentis effigie, alis non amplioribus quā qua ad natandum sufficiant, ijs viribus & velocitate, vt paucissimo tempore ingentia maris spacia transcurrat. Venenata bestia, quoduis pisciū seu animalis genus, simul atque dente attigerit, morti condonans. Piscatorū arte capta, statim vt in arenam sese protrahi senserit, fossam excavat qua occultet sese. At si exactum illud Matthioli iudicium sequuti, diligenter verba Dioscoridis expanderimus, alium esse Plinij & Alberti draconē marinum, aliud Dioscoridis reperiemus, duabus his coniecturis emoti. Prima est, draco marinus Dioscoridis ferit cum venenata spina, seclus & appositus plagæ suæ remedio est: & illa ingens bellua, sola dente noxia est. Secunda est, paucis verbis medicum huius animalis negocium explicat Dioscorides. Ipse suo veneno remedio est. Quod difficillimum apparet in prae grandi bellua. Qui sit vt Dioscoridis Draco marinus, à superiore differat, quin & ē minutus sit piscibus, quos inter littorales numerat Aristoteles. Poterit esse Draco marinus, quē v. r. ille eximius à se visum describit, longus in morem piscis quem Sommeffo Itali vocant capite & rostro draconis peculiari, pectore arcuato, dorso spina in gibbi modum subrecta, totus ē capite ad caudam per rectas ex utroq; latere lineæ spinosus. Spina per capitis medium eleuata, crista speciem præbent. Nec disparibus spinis torquis figura cingitur collum, ē quibus lineæ in latum pectoris procedit. Hæc duarum media est, quæ suo quaque latere pectus inscindunt.

Sco

Scolopendra. CAP. XIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Σκολόπενδρα θαλασσία. Lat. &

Ita. Scolopendra marina.

Scolopendra in oleo decocta si illinatur, auellit capillos, sed contactu pruritus facit.

Scolopēdra marina terrestri (reſerēte plinio) ſimilis, ſtatim à deuorato hamo inteſtina omnia euomit, ac inde extracto, rursus ea innocuè reuomit, & ſane bella eſſet huius animalis anatomia, ſi quis eo potiri & noſcere artiſiciū poſſet. Scolopendra terreſtris, Italis, Centogābe, inſectū ſpadij coloris, minimi digiti longitudine, cum in humecto ſolo repit, Cicindula in morem micat, digitis attrectata, pruritus ut Scolopendra excitat. Amat humentia adiu, & ſaſas hortorum arcas, & aſtuſas paludes.

Torpedo piſcis. CAP. XIIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Νάγκη θαλασσία. La. Torpedo marina. Ita.

Torpedine marina. Gal. Turpilles.

Marina Torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus uehementiam mulcet: eadem appoſita euerſam ſedem prociduamq; coeracet.

Torpedo piſcis ab effectu nomen ſortita, quod per medios hamos, ſetas, & haſtam piſcatoriam viſ eius pertransiens, ſtupidam reddit manum, tum ſubinde & totum piſcatoris corpus, dorſo eſt in rubedinem vergente, ſupra quod diſtinctas habet notas, ingreſcentes, oculis non diſſimiles, interiori corporis parte albeſcit. Experiētia didicit Galenus, in capitis doloribus, euerſa & procidua ſede non mortuā, ſed uiuam Torpedinem admouendam. Hunc piſcem Veneti Tremalo vocant, quod à ſtupore membri, tremorem inducat: Romani Batti potta, & ſatterigia.

Viperæ. CAP. XV.

NOMENCLATURA.

k s

Gra.

Græ. Ἐχίδνα. Lat. Vipera. Ita. Vipere.
Gal. Viperes. Ger. Brantschlangen.

Viperinae carnes si coacta edantur, claritate oculis afferunt, nervorum vitis auxiliantur, incrementis strumas reprimunt: detracta autem cute, caput caudamque, quoniam carne uacant, amputari debent: quippe commentitium est, quod precipitur, certam utrinque mensuram praecidi oportere. Reliquum uero corpus exemptis interraneis elotum dissectumque, discoquitur cum oleo, uino, salis exiguo, & anetho. Aiunt hi qui uiperas esitent, pediculos procreari, quod plane a ueritate abhorret. Adiciunt aliqui longam senectutem agere, qui eo cibo uescuntur. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. Vina autem uipera in fictile nouum demittitur, adiciuntur salis caricumque tritarum, singulatim quinque sextarii, mellis cyathi sex: mox fictilis operculum luto oblinitur, & fornacibus inassatur, donec sal in carbones redigatur, qui postea tritus in pulueris faciem, reconditur. Plerumque, ut ori gratior fiat, immiscetur Nardi spica, aut Folium, aut Malabathri momentum.

Male intellectus Aristoteles doctissimis etiam uiris erroris viam praestruxit: Non enim id is sensit, Viperinos partus non nisi necata matre nasci, sed eos qui tardius exeunt (Siquidem non plus uno die nascitur) mora impatientes, rodere qua continentur pelliculam, quo citius prodeant in lucem. Itali circumforanei, qui serpentibus alendis quastum faciunt, uiperas in capsulis ostentant, fictibus comitatas, & nequicquam a partu lasas. Nicander & Galenus abunde viperam deliniant. Vipera calida & sicca est, anguillarum in morem condita, nempe cum oleo, sale, anetho, & porris. Viperam curare totum corpus per cutis poros, duorum in Asia & Misia hominum experientia approbat Galenus, qui elephantias, ab hausto uino, cui immortua fuerant Vipera, cadentibus pustulis & renouata, anguium & ostreorum in morem, pelle, sani euaserunt. Vipera in his qui corruptis abundant humoribus, comesta pediculos creant. Olim ut anguille mandebantur in Aegypto, & nostro saeculo

lo in orbis recenter inuenti multis partibus, conficienda Theriaca ratio,
& trochiscorum è Viperis, non ab alio, quam à Galeno petenda.

Senecta anguium. CAP. XVI.

NOMENCLATURA.

Græ. γῆρας ὄφεος. Lat. Senecta anguium. Ita. Spoglia delle serpi. Ger. Schlangen balck.

Senectus anguium in uino decocta dolori aurium, infusus,
& dentium collutione, auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed præcipuè uiperinam.

Senecta anguium, seu Vernatio nota res, nempe cuticula qua sese
sanguis primo vere è terra prodeuntes exiunt, saxis aut stirpibus
affricato & restricto corpore.

Lepus. CAP. XVII.

NOMENCLATURA.

Græ. λαγὼς θαλάσσιος καὶ χερσαίος. Lat. Lepus
marinus & terrestris. It. Lepre marina & terrestre.
Gal. Licure de terre & de mer.



Lepus mari-
nus Loligi-
ni parua simi-
lis est, qui per
se se tritus aut
cū urtica ma-
rina illitus, ca-
pillis euellit.
Terrestris Le-
poris in assati
cere

cerebrum manditur, iuuandis tremoribus qui ualitudine contracti sunt: affriclu aut cibo facilem infantibus dentitionem præstat: exustum caput & cum adipe ursino aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Leporinum coagulum post tri-
duum à concubitu potum, conceptum adimere, partusq; spem in-
tercipere proditur, uulua & alui fluore sistit, comitiales iuuat,
contra uenena ex aceto bibitur, præsertim aduersus concretum
lac, & Riperarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur, ui-
tia cutis in facie, uutiliginem, lentiginesq; sanat.

Lepus marinus in Adriatico mari, est quædam velut carnis parti-
ticula, Lepori solo colore similis, sed qui in India gignitur, pilos ha-
bet & corpus longe maius. Tertiam Leporis marini speciem profert Al-
bertus cætera reliquis piscibus similem, præter caput quod Lepori simile
habet, & spinam dorsi rubram. Nullum animalium, excepto Lepore
terrestri, coagulum habet in ventre. Superstat itidem ut cuniculus,
quod tantam horum copiam facit, non quod hermaphroditi sint, ut qui-
dam existimant. Caro Leporis crassum sanguine gignit, humores me-
lancolicos, & difficulter digeritur. Prodest tamen dysenteria maxime
tosta. Siccatum iecur, iecinorosos iuuat, si bibatur. Totus exustus in va-
se probe operto, valet ad proritandam urinam, ad calculos renum, &
vesica. Fel Leporis xuccharo mistum, flocculos albos qui visum offu-
scant, aufert. Stercus Leporis naturæ mulierum impositum, fluxus me-
struos potenter refrenat, & matricem desiccat.

Pastinaca marina. CAP. XVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Τρυγὼν θαλασσία. Lat. Pastinaca marina.

Gal. Glorin. Ger. Roch.

Marina Pastinacæ radius, qui eius cauda enatus aduer-
sis squamis reflectitur, dentium dolorem mitigat: nam
eos frangit & euocat.

Pastinaca piscis est latus & cartilagineus, ut Raya, Torpedo, &
similes. Habet in superiori caudæ parte, robustum & acutissimum
aculeum, qui in transfigendo præsentaneum affert venenū, atq; adeo
mor



mortiferum, vt Aetius testatur, siquidem vi sua neruos vsque penetrans, spasmus, & post, mortem inducit. Pastinaca cinis, cum aceto mistus, suæ plagæ remedio est. Iecore oleo incocto, scabies non hominum, sed pecorum etiam inungitur, nec moratur effectus. Editur Pastinaca sublata è dorso cum aculeo illo mortifero, parte omni illa fulua, quæ Croco similis est, adempto etiam capite.

Sepia. CAP. XIX.

NOMENCLATURA.

Græ. Σηπία. Lat. & Ita. Sepia.

Gal. Seche. Ger. Blacsfich.

Sepiæ coctæ dū estur atramentū, agrè cōcoquitur, aluū molis collirijs è testa factis cōueniēter genarū scabritiæ perfriantur, ustu in sua testa donec id quod crustosum est abscedat, postea tritu expurgat uutiligines, surfures, dentes, & uitia cutis in facie. Elotu in medicamenta oculorum addi solet, contra albugines, oculis iumentorum efficaciter inspiratur: pterygia oculorū absomit, cum sale tritum & inieclum.

Sepiæ Polipis nō absimiles, præterquā quod ampliori sunt corpore, & plures habēt pedes. In Gallijs cū alibi, tum apud Xanctones cognita. Osse albo quod in dorso reperitur, exterius durū, leue: interius tenerū, fungosum, leniter rude, subtilissimis & intortis lineamētis plenū: ad anulprū surfurū utitur aurifices et ex eo medici detificia factitarūt. Vetus est illud & iuxta verū de Sepijs, quod è se in aquā nigrore pro-
tēso, tātisper visum frustratur, dū se premi senserūt. Sed ea nec est ho-

minum



minū sollertia, vt nec Sepia suū
atramētū, nec Torpedini torpor
nec Loligini marcor profint, quo
minus in potestate hominum ve
niāt. Valētibus stomachis probē
digerūtur Sepia, alias difficulter
permeāt, & crudos humores ge
nerant. Sepiarū oua cum alluata
(quā vocant) à salacibus man
duntur, quo potentiores sint ad
coitum.

Mullus piscis. CAP. XX.

NOMENCLATURA.

Græ. Τρίγλα. Lat. Mullus. Ita. Triglio.

Gal. Barbeau.

Mullorum assiduo cibo acie oculorū hebetari constat. Is
marini Draconis, Aranei, ac Scorpionis morsibus me
detur, si crudus atque dissectus admoneatur.

Mullū quē tantopere ob caput amplū, & sapidū iecur antiqui expe
tiuerunt, vt librā piscis libra argenti penderent, hodie Itali penē Græ
co nomine, Triglia vocant, qui piscis est marinus, colore tabū exprimēs,
seu eum quē illi, Παύροχρο vocant. Sit ne ille quē Barbatū vocamus,
incertū: fluminalis est species, ille marinus, aut in piscinas marinas in co
loniā abductus. Quod a nostro Barbato alienū est. Veneti riglias, Spa
ros vocant.

Hippopotamus. CAP. XXI.

NOMENCLATURA.

Græ. οἰχίς ἵπποπότημον. Lat. Testes hippopotami.

It. Testicoli de l'Hippopotamo. Gal. cheuaus marins.

Hippopotami testes exiccati ac triti, contra serpentium
morsus bibuntur.

Hippopotamus piscis è Plinio & aristotele, magis quā à marinis pi
scatoribus agnitus, corpore asinū nō excedit, iubz, dorso, hinnitu
equum exprimit cauda apri. Auersus intrat in segetē: Sibi ipsi sangui
nem,

nem, prauis humoribus distentior, acuminatis iuncis elicit. Fluentē cum visum est, cæno aut alga superpositis, sistit. Cute est gladio impenetrabili, ex eaque scuta & thoraces fiunt. Cinis corij illitus cum aqua, panos sanat. Adeps rigorem febrium eleuat.

Fiber. CAP. XXII.

NOMENCLATURA.

Græ. Κῆσος & ὄρχις. Lat. Fibri testiculi. Ita. Testiculi di Castoreo. Gal. Bieure. Ger. Ein Byber.



Fiber anaptis uitæ animal, plerūque cū piscibus & Caneris ex aqua uictū capeſit. Huius testes ſerpētū uenenis aduerſantur: ſternutamenta mouēt, & in uniuerſum uarios obtinent uſus: ſiquidē menſes ac partus ciunt, duabus drackmis cū pulegio poti: partus ſecundasq; eijciunt, contra inflationes, tormina, ſingultus, uenena, ixiāq; ex aceto bibuntur. Lethargicos, & utcunq; ueterno obdormiſcentes excitant infuſi: cum aceto autem & roſaceo, olfactu & odoris ſuffitu, idē faciunt: poti & illiti proſunt tremulis, conuulſionibus, & omnibus neruorum uitijſ: in ſumma, caſaſtoriam uim habent. Eligi debent testes ex uno ortu cōnexi ſunt (ſieri enim nō poteſt, ut gemini folliculi in una

in una membrana coniuncti reperiantur) liquore intus ueluti cerebroso, odore graui, & uirus redolente, gustu acri mordēte ac friabili, naturalibus tunicis circumdato. Quem fraude aliqui corrumpunt, coniicientes in follem gummi, aut ammoniacum cum sanguine & castorio subactum, & ita exiccantes. Vanū est quod traditur, testes ab ipsis euelli, & à sese abijci, cum uenatu urgentur: siquidem tangi nequeunt, ita, ut in sue, substricti. Opera autem pretium est diuisa pelle melleum liquorem cum euestiente tunica assumere, & siccatum potui dare.

Castor inferiori Germaniæ & Galliæ notum animal, quā Rhodanus Rhenus, & Danubius fluunt, tamen Austriæ & Vngariæ, amphibitū est in terra & in aquis uiuēs, Lutræ simile, praterquā quod aliquātum maior est. Qui fit ut inter medicos quidā, Lutræ testes, pro castoreis usurpent. Forocissimis & acutissimis est dentibus, quibus truncos arborum dissecat, ad parenda in cauernis tuguria. A demorso membro dentes non prius aufert, quā tusorum ossum crepitū senserit. Castoreum calidū est & siccum. Cum in spasmo, tremore, stomachi singultu, paralyti, abundantia humorum eicienda, ac desiccandū est, tum Castoreum in potionem, aut exterius impunē applicabitur. Quod fieri nō nisi maximo detrimento potest, quibus spasmus ē sicca qualitate, prouenit ex humorū & alimenti defectu, mordacitate, vel acrimonia. Huius grauis sapor & odor, corpori nihilum nocent, si probē applicentur.

Mustela. CAP. XXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. γαλι. Lat. Mustella. Ita. Domola.

Gal. Hermine. Ger. Meuszdres.

Mustela quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur, & inueterata sale, in umbra siccatur. Ea binis drachmis cū uino pota, aduersus omnia serpentium uenena præsentaneo est remedio. Toxico, simili sumpta modo, resistit. Eius uentriculus Coriandro sanctis inueteratusq; percussis à serpente, & comitialibus potu auxiliatur. Cremata in fictili podagriis cōfert, cinere ex aceto illito: sanguinēue peruncta strumæ in-

nat

uantur, comitialibus etiam prodest.

MVstella Latinis Græca duo nomina repræsentat, nēpè γάλη & ἰκτίε
Galarū species sunt, Mustella, quæ licet generis sit nomē, tamen id
propriè animal significat, quod Galli Herminas vocāt. Vuisella vulga
ris est fouinus. Fretta, & Latinis Vinerra, est quæ Furonē nūcupāt. Do
mestica Gale sunt Vuisella: Hermina & Fretta sylvestres. Ictidū itidē
duo sunt genera. Vnū quod Mardra seu Mardrū vocāt: Alterū, quod
Galli quod puteat, Putoys vocāt. Mustella nomē, in hæc quinq; proten
ditur. Dimicatura cū serpētibus, Rata sese ad bellū muniūt. Cōficiūt &
Basiliscos, licet in ipso etiā certamine ē grauiolentia cōmoriātur. Mustel
lē cinis illitus, capiti prodest, & oculorum suffusionē. *De Manu el Cas
tillo es este
libro.*

Ranæ. CAP. XXIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Βάτραχοι. Lat. Ranæ. Ita. Rane.

Gal. Grenoille. Ger. Frosch.

Contra omniū serpētū uenena pro antidoto sunt Ranæ, si
ex sale & oleo decocta edātur, iusq; earū itidē sorbeatur:
contra inueteratos tendinū rigores pollent: illitus earū cinis, pro
fluētis sanguinis impetus sistit, expledis alopeciarū inanitatibus
ex liquida pice illinitur. Viridiū Ranarū cruor auulsos genis pi
los renasci prohibet, in uestigia euulsorum instillatus. Decocta in



aceto & a
qua, dentium
dolores collu
tione leniunt.

INter Ranas,
marina, flu
uiatiles, palu
stres recipiūtur:
terrestres vene
nate sunt. Na
scūtur nigris tā
tum et minutis
carneis portiūci
lis,

rana

lis, è queis totum deinceps corpus protenditur, cum antea nihil altud-
essent, quam oculi & cauda. Vulgatum hodie ranarum oleum, expeti-
tum in podagris fructum non assequitur. Quorundam experientia cō-
pertum Ranarum sanguinem non eo esse effectu, quem describit Dio-
scorides,

Silurus. C A P. XXV.

NOMENCLATURA.

Gr. Αἰλουρῶ. Lat. Silurus. Ital. Siluro.

Gal. Ignotus. Ger. Baisich.

Silurus recēs in cibo nutrit, & facile præbet aliū: sale uerò
cōditus, minimū suppeditat alimentū, arteriam expurgat,
& uocem expedit. Illita saliti caro, aculeos & infixa corpori
spicula extrahit. Muria eius incipientibus dysenterijs prodest, si
in desidentium sots adiciatur: fluxiones siquidem ad summa
cutis elicit, ischiadicis infusa medetur.

Silurum non esse Storionē ex Aristotole & Plinio cōstat, quorū alter
robustis adeo dētibus Silurū scribit, ut ferreos etiā hamos cōminuat:
alter inualescentes equos inuadere: cū Storiones quāuis pragrādes, edētes
tamē sint. Ambo fluuiatilē Silurū describūt: at Storio mari, quā fluuijs
frequentior. Silurus Matthiolo, in Vngariæ Danubio nascitur, &
ab accolis Achia nominatur: nec aliter in Germania ab accolis Rheni
Bolich. Obuium omne animal inuadit, ferrocissimus est dētibus, huiusq;
opiniōi astipulatur Plinius qui dicat Silurū in Rheno & Danubio nasci.

Smarides. C A P. XXVI.

NOMENCLATURA.

Gr. Σμάρις. Lat. Smaris. Ital. Smaride. Non
satis de gallico nomine constat.

Smaridis piscis caput exustum, excrecentes ulcerum oras
spuluillosquē reprimat, nomas cohibet, thymos clauosq; ab-
sumit, caro non secus atque salsamentum prodest à scorpione
percusso, aut à cane demorsis.

Mæ

Mænæ. CAP. XXVII.

NOMENCLATURA.

Gr. Μαῖνις. Lat. Mæna. Ital. Mena.

Piscis non satis nobis cognitus.

Mænarum ex capitibus cinis si illinatur, callosas sedis rimas abolet: eius etiam garum oris putrilagines collutione sedat.

Gobius. CAP. XXVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. γόβις. Lat. Gobius. Ital. Gobio.

Gal. Gouions.

Gobius recens in suillum uentrem coniectus, si consuta rimæ in duodecim aqua sextarijs donec duo supersint decoquatur, excolatus & sub diuo refrigeratus, potui detur, alius si ne molestia deijcitur, illitus contra serpentium canumque morsus auxilio est.

Smarides & Mænæ pisces non satis noti. Matthiolus non assenerat tamen simile Mænæ profert piscem, qui Italis Menole dicitur. Nec errare censet eos qui Smarides putarint, minutos hosce pisciculos, qui Mænæ similes Venetijs vulgo Giroli vocantur. Gobius frequens in Venetiarum Lacunis prouenit, & foetificat. Quod non secus scribit Aristoteles Gobium marinis littoralibus, & ubi pauca sit aqua lacunis delectari. Venetii Go vocitant. Gustu persnaues sunt, facile digeruntur, probè nutriunt, præcipuè qui in arenosis & saxosis littoribus & scopulis capiuntur. Quin & in fluuijs & lacubus Gobij repperiuntur, ob iecoris saporem in pretio, maximè ouis onusti, hijq; persfacile digeruntur.

Thunus. CAP. XXIX.

NOMENCLATURA.

Go. ῥύννις. Lat. Thunnus Ital.

Tonno. Gal. Thun.

l 2

Com

Conditanei Thunni caro, quam Omotarichon uocant, sumpta ijs auxiliatur, quos uipera, nomine Prestet, momordet: sed oportet uinū quāplurimum subinde cogantur haurire, ita ut uomitione reddatur. Contra acrimonias esitatorum maximè ualet: canum morfibz utilissimè illinitur.

Thunnus crassus & pulposus piscis, porco similis, sub mēsem Maiū ex Oceano per columnas Hercules in Tyrrhenum & Aegæum maria, in amplissimas partitus turmas fugienti similis procurrat, pulsus ab ingenti pisce, quem vulgo Spada vocant, quod ori insidentem habeat aurissimum & acutissimū os, ensi persimile, quo demergit & perferat naues. Thunnorum fuga, Gaditanis & spectaculum prabet, & prouētum. Piscatum enim totus accurrit populus, cum ingenti strepitu vocum tympanorum, & scopietariorum. Stolidum & pavidum animal Thunnus, hoc rumore stupefactus, in terra proximavada deuoluit sese, & inibi in retia pręgrandia incidens, praeda fit, & quæstus. Diebus canicularibus percellitur à vermiculo, è quo in furias abactus, totas naues prateruolat, nec id temporis gratus est cibus. Thunnorū pinguitudo gustui satisfacit, stomachum offendit: Contra caro gustui ingrata, non aque stomacho molesta est. Ingentes ij pisces carne sunt dura, digeruntur agrè, parum nutriunt, superfluos creant humores, ob idque saluti probior: s recentibus, duritia & viscositate à sale consumptis.

Garum. CAP. XXX.

NOMENCLATURA.

Gr. γάρρῳ. Lat. Garum, Ital. Garo,
Gal. & Off. Ignotum.

Garū omne, quod ex piscibus carnibusq; sale maceratis liquamen est, si ex eo sotus fiat, depascentia ulcera sistit: morsis à cane medetur: dysentericis atque ischiadicis infunditur nonnullis ut exulcerata adurat: alijs autē laceffenda ad quæ ulcera non senserunt.

Ius piscium. CAP. XXXI.

NOMENCLATURA.

Gr. ζώμῳς νεαγῶν ἰχθυῶν. Lat. In recentium piscium.
Ital

Ital. Brodo de i pesci freschi. Gal. Le brouet des poissons frais.

Recentium piscium ius, modo per se, modo ex uino potum alium subducit. Priuatim ad hunc usum conficitur e Phycidibus & Scorpionibus, & Iulide, e Percis, & recetibus alijs saxatilibus, nec uirus recipientibus, simpliciter cum aqua oleo & Anetho.

Garum antiqui vocauere, quod ex piscis Gari interaneis, maceratis & dissolutis cum sale conficerent. Id postea & ex Scobro factum est: fuit olim Garum copulorum ciborum condimentum. De isto tamen non intellexit Dioscorides, sed generatim de omnibus piscium & carniū salsamentis. Ius piscium esculentū, satis ab ipso auctore explicatū est.

Cimices lectularij. CAP. XXXII.

NOMENCLATURA.

Gr. Κύγεις. Lat. Cimices. Ital. Cimici.

Gal. Punaises.

Cimices, qui in cubilibus enascuntur, canis fabarum inclusi, si ante febrium significationes septeni deuoretur, quartanis auxilio sunt: & citra fabas sumpti, percussis ab aspide pro sunt: uuluarum exanimationes olfactu renocant. Poti cum uino aut aceto, adherentes sanguisugas abigunt. Triti & urinarie fistulae impositi, urinae angustias leuant.

Cimex nocturnū & infestum animal nō suo priuatur in medicina remedio. Vinas applicuant recentes medici, non mortuas, ut praescribit Dioscorides. Matthiolo id magis placet quod e motu illo quem in genitali suscitant, vim urinae expultricem prouident.

Millepeda. CAP. XXXIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Ονίσκος. Lat. Asellus, Millepeda. Ital.

Porcelletti. Gal. Cloporte. Ger. Esel.

Millepedæ, quæ sub aquario vase stabulatur animalia sunt multis pedibus nitentia, quæ cōtacta manu, contrahuntur orbem. Hæ ex uino potæ difficilli urina, & regio morbo auxiliantur. Millepedas illini anginis cum melle utilissimum: trita & in cortice mali Punici calfactæ, doloribus aurium addito Rosaceo, conuenienter instillantur.

Blata pistrinaria. C A P.

XXXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Σίλφη. Lat. Blatta pistrinaria. Ital.

Blatte de mulini. Gal. Grillons de molins.

Blatta eius quæ in pistrinis inuenitur, interanea trita aut cum oleo decocta, aurium dolores instillatu mitigant.

Multipedis notum animalculum vires apertè describit Dioscorides. Blatta itidem satis nota. Veruntamen non sunt vulgares grilli, at pressiore corpore, & subtilioribus penè araneorum in morem pedibus & ob incursum velocissima. Mirum in modum lucem odere, locos amant humidos.

Pulmones. C A P.

XXXV.

NOMENCLATURA.

Gr. πνευμὼν θαλάσσιος. Ital. Pulmo marinus.

Ital. Pulmone marino. Gal. Chappeaux de chair.

Podagras pernionesquæ emendat Pulmo marinus recens tritus & illitus. Suillus & agninus ursinusquæ pulmo impositu, attritus à calceamentis contractos, ab inflammatione tuetur. Vulpinus uerò si arefactus bibatur, suspiriosos adiuvat. Adeps quoque liquefactus, infusus quæ auris dolorem finit.

Pulmo

Plmo marinus zoophyton, vt Vrtica, Stella, cum super undas maris fertur, tempestatem denunciat. Si ex eis bacilli atterantur, lumē sedarum iustar reddunt. Reliqua plana sunt.

Genitale cerui. CAP.

XXXVI.

NOMENCLATURA.

Gr. Αἰδοῖου ἑλαφς. Lat. Genitale cerui.

Ital. la Verga del Cervo. Gal. la Verge
d'un Cerf. Ger. Der Ramp.

Genitale Cerui tritum, & in uino potum, à uipera demor-
sis auxiliatur.

Maris Cerui genitale valet ad retentam urinam, ad dolores colicos, probè elotum, haustaque lotionē. Quidam siccatum & tritum in puluerem proponunt in dysenteria, asserentes efficacissimum esse remedium.

Vngula asini. CAP.

XXXVII.

NOMENCLATURA.

Gr. Οὐξόρου. Lat. Vngula Asini. Ital.

l'Vnghie dell' Asino. Gal.

l'Ongle d'un Asne.

Vngularum asini cinis per dies multos binis cochlearibus potus, proditur comitiales adiuuare, eadem oleo subactæ strumas discutiunt. & illitæ per nionibus medetur. Caprinarum cinere perunctæ ex aceto alopecie sanantur.

Rasis, & Vacca vngulas producit, & mula: has ad inhibendam imprægnationem, illas ad lac pecori prouocandum.

Lichenes equorū. CAP. XXXVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Λειχῆνες ἵππων. Lat. Lichenes equorum.

Ital. Calli delle gambe de i Caualli. Gal. Les

Cal. des iambes des cheuaux.

L Ichenes sunt in equorum genibus, & super ungulas in flexu harum partium indurati calli, qui triti & in aceto potius, comitialibus mederi traduntur.

Iocinera. C A P.

XXXIX.

NOMENCLATURA.

Gr. Ηπαρ. Lat. Iecinora. Ital.

Fegati. Gal. les Foyes.

A sini iecur inassatum esu comitialibus prodest, ueruntamen ieiunis edendum precipitur. Caprae uero inassati decidua sanie, inungi lusciosos prodest, & dum coquitur, apertos oculos halitu eius uaporari: prodest in cibo tostum ad eadem. Tradunt hircini iocinoris cibo comitiales deprehendi. Aprinum recens si arefactum teratur, ex uino potum contra serpentium uolucrumque morsus auxilio est. Iecur canis, qui rabie exagitur tostum & in cibo ab emorsis sumptum, ne tententur metu aquae tueri creditur. Utuntur autem ad arcendos aquae pauores dente eo, qui caninus dicitur: hunc a cane qui momordit exemptum, & folliculo inditum, pro amuleto brachio adnectunt. Inueteratum autem sale mergi iecur, ex Hydromelite binis ligulis potum, secundas pellit.

C Allos in puluerem tritos prodesse dicit Plinius, dolori dentium si in aures infundatur cum Oleo. Galenus & Paulus, ad omnem animalis morsum. Satis sese in iocinoribus explicat Dioscorides.

Coria ueteramentaria.

C A P. XL.

NOMENCLATURA.

Gr. Κατρυματτα. Lat. Coria ueteramentaria. Ital. Scarpe uecchie.

Vete

Veteris corij cremati illitus cinis ambusta igni, intertrigines, nec non calceamentorum attritus sanat.

Veterum calceamentorum corium, carbonibus impositum, hausto fumo, mirum in modum mulieres a matrice suffocatas refocillat. Expellit hic fumus serpentes, non è domibus tantum, at è corporibus etiam, quod expertum in Vipera est.

Gallinæ. CAP. XLI.

NOMENCLATURA.

Græ. Αλεκτορίς. Lat. Gallinæ. Ita. non aliter. Gal. Gellines. Ger. Henner.



Dissectæ gallinæ, & adhuc calentes appositæ, serpentium morsibus auxiliatur: sed identidem alias sufficere oportet. Earum cerebellum in uino bibendum datur contra serpentium morsus: sanguinem à cerebri membrana profluentem sistit. Quæ interiore uentriculi galli sinu residet membrana, secti in laminas cornus specie similis (ea uerò inter coquendum abijci solet) siccatur, tritaq; in uino conuenientissimè stomachicis datur in potu. Ius è uetere gallinaceo alium deijcit. Abiectis itaque interaneis salem coniungi oportet, & consuto uentre decoqui in uiginti sextarijs aquæ, donec ad tres heminas redigantur, totum

l 5

id

id refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquunt olus Marinum, Mercurialem, Cnicum, aut Filiculam. Crudos humores crassosq̃, atram bilem, & strigmenta elicit: prodest longis febribus, suspirijs, articularijs morbis, & inflationibus stomachi.

Ius Gallinarum simplex, astringit corpus, quāvis ius veterum gallorum longo tempore cum sale incoctorum, soluat. Vulgatum deglabare sedes Gallinarum, & plage venenatorum apponere, quo inde venenum exugant. Datur & ius Gallinarum iuuenum cum Saccharo manē in modum syrupi, in declinatione febrium ad reſtificandos humores. Testes gallorum gallinis haud dum admissorum, valēter lapsas vires reparant, & ideo heclicis dantur, & longo morbo extenuatis.

Ouorum natura. CAP. XLII.

NOMENCLATURA.

Gr. ωον. Lat. Ouum. Ita. Vouo.

Gal. Oeuf..

Ouum molliculum plus alit sorbili, & durum plus molli. Luteum oui, contra oculorum dolores utile est: in assatu sedis inflammationibus prodest, cum Croco & Rosaceo: & cōdylomatis, cum Meliloto: cum uua autem fruticis eius, quem Rhoea dicunt, aut Galla, in patinis frigitur, ut cibo alios sistat, per se etiam offerri solet. Candidum oui crudum refrigerat, spiramenta cutis occludit, inflammationes oculorum infusum lenit, ambusta, si statim eo perungantur, pustulas non sentiunt, faciem à solis adustione tuetur, fronti impositum cum Thure fluxiones arcet, auertitq̃: inflammationes oculorum lana exceptum, addito Rosaceo, Melle & uino, mitigat: utiliter contra hemorrhoidis serpentis morsus crudum sorbetur: summè tepidum, prodest uescicæ rosionibus, renum exulcerationibus, gutturis scabritiæ, reiectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis rheumatismis.

Gal

GAllinarum oua sapore & gustu omnibus alijs prestant. Ab his Otidum & Phasianorum. Anatum, anserum & aliorum aquatiliū oua stomachum grauānt, crassos gignunt humores, & difficulter digeruntur. Calida sunt columbarum, & plus medicinam quam cibum resipiunt. Damnantur in totum pauonis & struthij. Laudantur oua tremula, quæ pressi lactis more tremant. Albumine & vitello simul cum oleo rosato contritis vt mur ad inflammationes palpebrarum, aurium, mammarum, quauis è ratione prodeant, cubiti, digitorū, fibrarum, iuncturarum manuum & pedum. Incocta aceto & manducata, fluxus corporis sistunt, & fixa lento igni sine fumo, cum simplici quopiam astrictorio, vt Rhoe, Gallis, flore & testa mali Punici, cochleis cum testis exustis, aut aliquo similium, iuuant fluxus tum stomachales, tum dysenteruos. In mediuinis quæ humiditatem desiccant, elixa sint oportet, fixa aut tosta: cum in eis qui lentos, & viscosos pectoris & pulmonis humores incidunt, aqua incoquenda sint, quousque probè calorem conceperint, ijsque non secus vtendum in cannae gutturi aspretudine, è nimio clamore, aut humorum defluxu conciliata. Quod ex ouorum vitellis, oleum exprimitur, perfectè primum in patella torrefactis, perunctu prodest cuti scabrae, impetigini, scissis labris, manibus, pedibus, & sedi: Valet ad dolentia iuncturarum, ac omnium neruorum locorum vlcera: ad auriunque dolores & vlcera. Vnguntur eo vtiliter ambusti igne, & mirandum in modum contusas cerebri membranas, à partibus sanis gregat, quod summo suo cum honore & agrorum emolumento expertus est diuinus ille Matthiolus. Hippocrates Aristoteli cōpugnās, Creatur inquit pullus è vitello, nutritur ex albumine, cū pullus a feminis, ex ouo, extractus, magna corporis parte vitello implicita comperiat, Testudinis oua etsi in aqua bulliant, nunquam tamen cōdensantur, vitello licet durissimo, & reperit testudinem Matthiolus, cum septem ouis testa obductis in ventre. Id animalium alio nulli contigit.

Cicadae. CAP. XLIII.

NOMENCLATURA.

Græ. τεττιρες. Lat. Cicadae. Ita. Cicale.

Gal. Cigalles.

Cicadae quæ inassatae manduntur, vesicae doloribus pro sunt.

Cica-

Cicada vocale animal, duorum est generum. Sunt maiores, sunt minores Cicada. Minores celerius prodeunt, tardius finiunt, & non cantant. Maiores tardius nascuntur, velocius finiunt, & cantant. A messe in campis cauda terra producta, foetificant, & in vinearum Imbre ad sicturam aluntur. Vt primum à partu, è terra prodire, vermiculorum speciem referunt, qui crescendo in animalia euadunt quæ vocamus Tettigometra, è quibus circa estatis solstitium noctibus Cicada volando prosiliunt. Rore viuunt, & ore carent. Ligulam habent in pedore, è qua rorem attrahunt. Cava est hæc, canalis instar, ac ex ea sonum illum mixtum & mirandum edunt. Oleis gaudet, atque adeo omnigeni arboribus. In frigidis regionibus non proueniunt. Parthi, & alij quidam Orientales Cicadas vescuntur, & Aristoteles suauissimi gustus, ante velatum prædicat. Dolores colicos sedant cum pari granorum Piperis pondere, isque vsus è paroxysmorum ratione variatur.

Locustæ. CAP. XLIIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Αγκιδες. Lat. Locustæ. Ita. itidem.

Gal. Sauterelles.



Locustæ odoris suffitu urinæ difficultates adiuvant: præsertim quæ scæminas malè habent earum carnes nullo sunt in usu. Est & quoddam genus Locustæ, quæ Asiracos aut Ouos dicitur, sine pennis, prælongis cruribus. Exiccata autem si ex uino bibatur, contra scorpionis morsus magnoperè proderit, hac

hac abunde uescuntur Aphri, qui Leptin incolunt.

Locustæ mares, maiores feminis, hæ defixa in terram cauda, oua parturiunt, è quæis postea nascuntur vermiculi tenui membrana cõditi, qua rupta Locustæ procreantur. Calidas amant regiones, nec temere in frigidis reperiuntur. Ex æstuosis quandoque in Europam transuolant. Quod atate Plinij contigit, & non ita pridem anno. 1542. Cyrenaici, Lemnij, & Syrij, turmatim bis, ter ve per annũ ad vastãdos Locustarum nidos, & cum editæ sunt, consciendas proficiscuntur. Indictæ trium pedum longitudine, mordaces admodum sunt.

Osisifragus. CAP. XLV.

NOMENCLATURA.

Gr. φῖβις..Lat. Osisifragus. Ita.

Osisifrago.

Venter eius auis quam Latini Osisifragum appellant, particulatim potus, calculos cum lotio pellere proditur.

Osisifragum ex Aquilarum genere esse constat, qui earum pullos, se ditione in cibo excitata, nido expulsos, foucat ad perfectum volatum. Plinius Alieti (Aquilæ marinæ) pullum, nec propriam esse speciem, sed ex Aquila diuersis maribus admissa, procreari. Albertus, aquaticam auem esse contendit, cigno maiorem, oblongo rostro, cuius pars inferior sacci speciem præferat, in quam magnum piscium numerum occulit, quos postea paulatim deglutiat. Hos Itali vocant Agrotti. Eruditorum nullus est, qui superiores duos cognouisse constanter asseneret.

Galerita. CAP. XLVI.

NOMENCLATURA.

Gr. κορυδαλλος. Lat. Galerita. Ita. Loda. Gal. Alouette.

Galerita auicula est parua, apicem in uertice, panonis modo, gestans: quæ assa in cibo sumpta, cæliacos adiuuat.

Galeri

C Alerita & sine, & cum crista reperitur, Campestres aues, cibantur vermiculis, & quæ decidunt aut creduntur terra seminibus Mares argute canunt, auuunque prima, a statem cantu præsagunt. Accupes aues adeo verentur, ut Speruieri & Smerili seroci volatu terre facta, in hominis sinum, assylli loco confugiant.

Hirundines. CAP. XLVII.

NOMENCLATURA.

Gr. χελιδόνες. Lat. Hirundines. Ita. Rondini.

Gal. Arondelles. Ger. Ein Döaldserch.

Dissectis crescente luna pullis Hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in uentre eorum lapillos offendes: è quibus duos, unum colore uarium, alterum purum eximes: & priusquam terram attigerint, in iuuentæ corio, aut ceruina pelle brachio aut collo adalligati, comitialibus proderunt, & sæpe prorsus eos recreabunt. Hirundines, uti ficedula, in cibo, aciei uisus medicamentum præbent: tam pullorum quam matrum in fictili olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert, anginae eo commode perunguntur. uua & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur: & ipsæ & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuat qui anginae morbo consuectantur.

Hirundinum una species domibus nostris nidos figit. Altera vectorum edificiorum muros, cauernulas, & montium scopulos expetit. Tertia flumini ripas sectatur. Ut primo æquinoctio prodeant, tum ut autumnali secedant, reparandoque pullis visui Chelidoniam inquirent, nulli non in cõperto est. Spicæ auium, non rapacium, carnes edunt.

Ebur. CAP. XLVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Ελεφαντος οδοντος ονυμα. Lat. Eboris

scobs. Ita. La Limatura dell' Auorio. Gal.

La sciure de L' yuoire.

Ebo-

Eboris scobe illito paronychia sanantur. Vim adstringendi Ebur obtinet.

EBur elephantorum sunt dentes, quod vt alias summoperè, expetitur, ita nostro sæculo pretiosissimum. Eò factum vt nullibi penè verum Ebur reperiatur, at quod vulgò huius vice in officinis prostat, minorum piscium sunt dentes. Cum de Elephantis recentiores qui meridianum orbem lustrarunt, satissuperque scripserint, superuacaneū mihi visum est hac de re cartam onerare, at stolidam hanc ex hominum mentibus opinionem optarim extirpari, nimirum continuis esse pedibus, cū nostratis etiam temporis homines viderint, inflexis in genna pedibus, & in hac procumbentes, solem & lunam adorare. Eboris, porphyry (quem vocant) planitie intriti, cinis, valet ad fluxus albos seminarum, potum in lacte seminis lactuca, cum aqua ferro extincta, extracti.

Suillus talus. CAP. XLIX.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀσράγαλος ὄος. *Lat.* Suillus talus. *Ita.*
Talone del pórco. *Gal.* Talon
de Porceau.

Svis talus comburitur, dum è nigro albescat: qui tritus & potus, inflationibus coli, longisq; torminibus medetur.

Ceruinum cornu.

CAP. L.

NOMENCLATURA.

Græ. Ελάφου κέρας. *Lat.* Ceruinum cornu.
Ita. Corno del Cervo. *Gal.* La
corne de cerf. *Ger.*
Bertzhorn.

Ceru

Ceruini cornu cinis elotus, binis ligulis epotus prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, celiacis, regio morbo, & vesica doloribus cum tragacatha: fœminis fluxione uulvæ laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu contritum, crudo fictili luto circumlito, & in furnum inditum uritur donec albescat. Id Cadmiæ modo elotum, ulceribus oculorum & defluxionibus salutare est, infriatum dentes expurgat. Crudi cornu suffiti nidore serpentes fugantur: feruesactum in aceto, si eo gingivæ colluantur, maxillarum à dentitione dolorem adimit.

Planum est xlix. cap. illud tamen sciendum, non omnia animalia os in iunctura pedum habere, talum vocant. Quod ad Ceruos attinet, Dielamnum herbam ejciendis utilem sagittis in Creta docuere: manifesto felle, et iecore carent, quemadmodum equi, asini, muli, cameli, & piscium, vitulus marinus, & delphinus. Fellis loco venas per intestina sparsas habent, in quibus inspersus est liquor ille, quo in animantium ceteris sel conficitur, & ea est causa amaroris, qui perpetuus earum in carne sentitur. Viridis est eis in cauda humor, mortifer, si edatur. Sanguis Cerui cum oleo attritus, clysteris in modum valet ad ulcera & antiquos intestinorum fluxus, potus in vino, ad sagittas venenatas prodest. Cerebrum, nervorum & iunctarum abscessus emundat. Cornu, contustum & potum cum paucis melle, vermes e corporibus ejcit. Ceruorum iuuenum cornua pilo conestita, in portiunculas dissecta, vasi testaceo indita, quod postea probe coopertum & lutatum fornaci credatur, siccata & in pulverem redacta, mirabili sunt effectu ad dolores colicos, si cum Pipere & Myrrha prabeantur. Os cordis Ceruini eximia in omnia venena mortifera virtutis est: & utiliter inseritur remedijs, quæ in pestem fiunt.

Eruca. CAP. LI.

NOMENCLATURA.

Græ. κάρπυ. Lat. Eruca. Ita. Bruchi.
Gal. Chenilles. Ger. Ranp.

Eru

ERUCIS quæ in oleribus gignuntur, cum oleo peruncti, à venenatis bestiis feriri negantur.

ERUCA ex herbarum & præcipuè Brassicæ solijs nascuntur, has ab horti ejiciet, qui equæ cranium ad palum horti medio suspenderit, idem efficiet fluuiatilis cancer. Si arbusculi, quem Sanguin vocant, ramusculo herba & caules attingantur, non dispar sequetur effectus.

Cantharides. CAP. LII.

NOMENCLATURA.

Gr. Κανθαρίδες. Lat. Cantharides. Ital. Cantarelle. Gal. Cantarides.

EFRUMENTIS congestæ cantharides ad recondendum idoneæ sunt, quæ fictili vase non picato conduntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum conuerso suspenduntur super aceti feruentis quàm acerrimi halitum, donec æstu exanimentur, postea lino transfixæ reponuntur. Potentiissimæ omnes uariæ, luteis lineis, quas in pennis transuersas habent, promissoq; corpore crassæ, ac Blattarum modo perpingues: sed inertes ac imbecillæ, quæ unius sunt coloris.

Buprestes, & pinorum erucæ.

CAP. LIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Βύπρης ἐς καὶ πίτουράμπαι. Lat. Buprestes & pinorum erucæ. Ital. Bubrești, & Bruchi de Pini.

SIMILI modo reconduntur Buprestes, genera quædam Cantharidum, & pinorum Erucæ. quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intostæ, reponuntur, Vis omnium communis erodere, ulcerare, calorem elicere. Qua de causa admiscuntur medicamentis, quæ lepras, ferasque lichenas & carcinomata sanant: menses ciunt, pectus emollientibus additæ. Aliqui Cantharidas antidotis impositas, aquæ subtercutē auxiliari

m prodi

prodiderunt: argumento, quòd urinam moueant. Alij penas pedesq; contra potarum ueneficia, remedio esse tradiderunt.

Cantharides vulgata sunt animalia, noménque à Cantharo deductum, ac si diceres, pusillos scarabeos. Eligi debent vigentis aetatis, nam veteres tabescunt, & in usum medicinae sunt inutiles. Buprestes in Italia & Gallijs non perinde vulgares. Animal est (Cordo) scarabeo simile, sublatus pedibus, ultra cimices fœtidum, eo frondes & fructus, si qua per eos repat, inficit. Tela qua sese inuoluunt pinorum eruce astringendo sanguini valet. Medicorum vulgus ex Hippocrate (ut putant) in prabendis Cantharidibus caput, alas, & pedes abijciunt, pernitioso in duobus Hydropicis, quemadmodum narrat Galenus, exemplo, qui paucis post diebus a sumptis ita Cantharidibus periit. At non ea fuit mens Hippocrati, caput, alas, & pedes auferendos, sed potui prabendum priuatim corpus, post caput, alas, & pedes, & non corpus extremitatibus abiectis, nam ita priuaretur remedio, quod eis ob veneni malitiam, à natura datum est. Cerotis & emplastris indita, scabros ungues exerunt. Inseruntur & medicamentis quæ lepram & scabiem sanant, in quæ integræ apponendæ. Præstantiores sunt quæ in triticis campis reperiuntur, lineis rubris alas intersectæ. Hac è Galeno descripta, cuius Cantharidum & Buprestium, quod omnibus notum sit, præparandi præscriptum hic non additum.

Salamandra.

CAP. LIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Σαλαμάνδρα. Lat. & It. Salamandra.

Gal. Salamandre. Ger. Ein osin.

Salamandra lacerta genus est, iners, uarium, quod frustra creditum est ignibus non uri. Vm habet erodentem, calfafloriam, exulcerantem. Additur, ut Cantharis, in medicamentis, quorum vis est exesse, & lepras abolere, similiq; modo reconditur:



conditur. Li-
quesfacta in
oleopilos enel-
lit. Exentera-
ta, detractis
pedibus &
capite, in mel-
l. seruatur ad
eundem u-
sum.

Salamandra tempore pluuiæ sub initium veris & autumnæ conspi-
cua est, at calente æstate & frigescente admodum vere, raro exit è
terra. Animal est corpore lacertis simili, præterquã quod maiore sunt ca-
pite & corpore, altioribus pedibus, & breuiore cauda, ad cursum tar-
dissima. Colore sunt nigro & ruffo virgis ad eò ad viuum a natura ex-
pressis, vt æs arte sumaria attritum dixeris. Aliquanto tempore pro sua
frigidityte in igne Salamandra perdurat, si diu tamen perstiterit, absu-
mitur. Marem aut feminam Salamandra non habet, sed è putrefa-
ctione generatur. Venenatus est harum morsus, & si quã fructus aut
herbas attigerint, saluam quampliam relinquunt, quæ proculdubio
mortifera est, quod multi suo damno experti sunt.

Araneus. CAP. LV.

NOMENCLATURA.

Græ. Αράχνη. Lat. Araneus. It. Ragno.

Gal. Areine. Ger. Spinn.

Araneus, quem holcum, alij lycon, id est, lupum uocant,
subactis cum splenio, & linteo illitus, prolatusq; utrisq;
temporibus aut fronti, tertianos circuitus persanat. Tela eius im-
posita sanguinem sistit, uulnera quæ summam cutem occupa-
runt, ab inflammationis iniuria uindicat. Est & alterum
Aranei genus qui candidam, tenuem, densamque telam

m 2 ord

orditur, quem in aluta ligatum, & lacerto appensum, quartanis circuitibus mederi narrant. decoctus ex rosaceo & infusus, aurium doloribus auxiliatur.

SEx Araneorum sub Phalangij nomine genera describit Aetius, Primum est Rhagius seu acinosus, acino uua nigra similis, & inde nomen sortitus: os habet in uentris medio, & pedes quaquaversum breuissimos. Secundum Lupus, hic in cibum captat & conficit muscas. Largum est illi corpus est uodubile, & incisa partes collo proxima. Tertium Formicarius, quod forma grandes formicas referat, fuliginij est coloris, stellatis maculis notato corpore, & praecipue dorso. Quartum, Cranocolaptes, figura corporis oblonga, colore uiridi, adiacente collo spina qua transfigit. Quintum Sclerocephalus, capite est saxi in morem duro, corporis lineamentis in totum Farsale similibus. Sextum Scoletius, vermi attrito & maxime circa caput ad simile. Phalangios in Italia nasci negat Plinius. Est tamen in Apulia Aranei genus quod Tarentole vocant. Id misere, horrifice, & varie ictos affligat. Quod est diuersis & varijs tum animantis, tum ictorum naturis prohenit. Animantium horum venenium musica sono mitescit. At cessante sono, paulatim redit morbus. Et eam ob causam visitatum est musicorum instrumentorum sonum non ante cessare, quin pariter cesset etiam morbus. Quod longus sonus & desultatio elicit per iocum sudore, vincat tandem veneni malitiam, tantum si interim dum sonus hic perdurat, offeratur agro Theriaca & Mithridatum, & generatim quae ad morsus serpentum & aspidum valent.

Lacerta. CAP. LVI.

NOMENCLATURA.

Gr. Σαύρα Lat. Lacerta It. Lucertola,
Gal. Lisarde,

Lacerta caput intritum & appositum, aculeos & omnia corpori infixata extrahit, uaros, formicantes uerrucas, & pensiles, quas acrochordonas uocant, tollit. Iecur exesis dentibus coniectum, dolores finit. Si diuulsa admoneatur, ictis à scorpione leuamentum praestat,

Seps,

Seps. CAP. LVII.

NOMENCLATURA.

Græ. Σηψ. Lat. Seps. It. Sepa.

Seps, quam aliqui lacertam Chalcidicam uocarunt, in uino pota, morsus suos sanat.

Lacerta, quas hic describit Dioscorides, Lacertis vulgaribus ut plurimum similes, oua ut serpentes pariunt, cochleis inimicissima. In calidis regionibus grandiores quam in nostro orbe reperiuntur. Nicander Chalcidicas Lacertas nostris similes esse contendit. Græci aliquando Lacertam pro Ceraſte seu Sepe usurpant, & hæc confundunt nomina, aliquando Sauron, aliquando Ceraſten genus facientes. Romæ Lacertæ gignuntur dorso stellis notato, quæ quod sub terra lateant, Terrantole vocantur, tam atroci veneno ut Chalcidica haberi possint, aut saltem antiquorum Stelliones. Seps sine pedibus serpens, vipere similis, a Chalcidica lacerta diuersa est sed nomina apud auctores confunduntur.

Scincus. CAP. LVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Σκίγκ. Lat. Scincus. It. Scinco.

Scincus aut Aegypti, aut Indiæ, aut rubri maris alumnus, quamuis inueniatur in Lydia Mauritaniæ. Est autem terrestris Crocodilus sui generis, sale inueteratus cum Nasturtio. Ciunt carnes, quæ renes amplectantur, id sibi iurium uendicasse, ut si drachmæ pondere bibantur, uenerem accendant. Verum decocto lentis cum Melle aut semine Lactucæ cum aqua potio, ueneris cupiditates inhibentur. Additur in antidota.

m 3

Marin



MArini Stinci qui è mari rubro & Aegypto Venetias asportatur, licet crocodilorum speciem refrant, magnitudine tamen pregrandes Lacertas non excedunt, squamis sunt albis in luteum vergentibus, cum caesia à capite ad caudam linea. Hanc crocodili non habent, dorso enim natura sunt liuido. Pausanias in Lybia nasci scribit duum cubitum longos. Officina fluuiatilibus cum marini desunt vtuntur, non pari tamen effectu.

Terreni vermes. CAP. LIX.

NOMENCLATURA.

Græ. τῆς ἐν τῇ γῇ. Lat. merreni vermes It. Vermi della terra. Gal. Vers de terre Ger. Regen Wuurm.

TErreni vermes impositi, præcisos nervos glutinant, tertianas discutunt. Decocti cum anserino adipe, iusufi, affectis auribus medentur: cum oleo autem decocti, si in contrariam aurem instillantur, dentium doloribus præstant auxilium: triti in potu, ex passio, urinam ciunt.

ELumbricis fit oleum, ad nervosorum locorum, & iuncturarum sedandos dolores. Verus preparandi modus in balneo Mariæ, nam inde humor & virtus extrahitur, nihilum ambusto aut torrefacto oleo, vel Lumbricis. Id oleum podagris calidis multum prodest, peruncto primum

primum oleo, loco vbi sentitur dolor, dein suprà illitis vermibus incoctis, tritis & immistis cum aequali pondere ceroti, quod triapharmacum vocant. Lumbrici probè in vino eloti, ac postea in vas vitreũ diligenter, obturatum vt in balneo Maria bulliant inditi, in viscosum quempiam humorem vertuntur, qui solus nervorum & intestinorum plagas consolidat. At præstantius operatur cum oleo gummi Laricis, aut Abietino oleo, quod mirum in modum recentes omnes plagas consolidet, præterquam capitis. Ambusti & in subtilissimũ puluerem reducti Lumbrici, potique cum aquis Marrubij & Absinthij, ictericos iuuant.

Mus araneus. CAP. LX.

NOMENCLATURA.

Græ. μυγάλη. Lat. Mus araneus. Ita.

Topo ragno. Gal. Rat areigne.

Mus araneus dissectus & impositus, sui morsus ueneficia luit.

Mus Araneus colore est mustellino, magnitudine muris vulgaris, more vt talpa in acutũ desinẽte, in hoc altrinsecus ordines duos dẽtium habet, tenues, acutos, cauda quàm mus breuiore. Huius morsus quibusdam in locis innocuus, quemadmodum & scorpij.

Mures. CAP. LXI.

NOMENCLATURA.

Græ. μύες. Lat. Mures. It. Topi.

Gal. Ratz.

Mures, qui in domibus oberrant, concisos scorpionum plagis utilissimè imponi, in confesso est: si inassatos infantes ederint, oris saluam exiccari promittunt.

Domestici sunt, syluestres, & montani mures, sunt & terrestres & marini, de domesticis tamen loquitur Dioscorides. Murium adeps retractos nervos & iuncturas remollit.

Lac. CAP. LXII.

NOMENCLATURA.

Græ. γάλα. Lat. Lac. Ita. Latte.

Gal. Laiet.

m

4

Lac,

Lac generatim omne boni succi est, corpus alit, aluum emol-
lit, stomachum & intestina inflatione uexat, uernum ta-
men dilutius aestiuo habetur, & è uiridi pabulo aluum magis
emollit. Probatum autem candidum, equali crassitudine, quod
ungui instillatum cogitur. Aluum minus tentat Caprinum, quo-
niam pecus hoc adstringentibus pabulis, Robore, Lentisco, &
oleaginis frondibus, & Terebintho magna parte uestitur, in-
de stomacho accommodissimum reddi solet. Ouilum autem dul-
ce, crassum, & præpingue, non usq; adeò utile stomacho, Bubi-
lum tamen, Asininum, & Equinum, uentri magis idonea, sed
ipsum turbant. Quibus in locis pecora Scammoniam, Veratrum,
Clematidem, aut Mercurialem pascuntur, lac omne uentrē &
stomachum subuerit: quale in Iustinis montibus esse à nobis pro-
ditum est. Siquidem Capræ quibus candidum ueratrum pabulo
fuerit primo foliorum partu euomunt & eorum lac haustum nau-
seam creat, & stomachum in uomitiones effundit. Ventrem ad-
stringit lac omne decoctum, præcipueq; candentibus calculis ma-
rinis exustum: & in summa, omnibus auxiliatur internis exul-
cerationibus, præsertim faucium, pulmonis, inter uicorum, uesi-
cæ & renum: foris uero contra pruritum cutis, eruptiones papu-
larum, & uitiatos corporis succos: recens cum melle crudo, addi-
to sale, datur exigua aqua dilutum. Minus inflat quodcunque se-
mel feruefactum: decoctum cum calculis marinis ad dimidias, ul-
cerosas uentris fluxiones adiuuat. Lac quodcunque serum conti-
net implicitum, quod ubi discessit à lacte, multo potentissimum
ad purgationes redditur: datur quibus sine acrimonia uolumus
deiectionem moliri, ut melancholicis, comitialibus, lepris elephā-
tys, & erumpentibus toto corpore papulis. Ex omni lacte fit,
quod Schistum, id est, scissile, appellat. Lac autem fidelili nouo fer-
uet, ramoq; ficulneo receti mouetur, inspersis, postquam bis aut
ter efferbuerit, totidem aceti mulci cyathis, quot sunt hemina
lactis

lactis. Ita enim serefcens liquidum ab eo diuiditur quod in cafeū concreuit: sed cum feruet, ne superfundatur, conueniet spongia ex frigida continuo fictilis labrum detergere, sextariūq; argenteum frigida aqua plenum demittere. Bibitur heminis per interualla singulis, usque ad quinas, ita ut intercedentibus spacijs potantes ambulet. Lac autē recēs efficax est cōtra rosiones, ustioesq; ab exitialibus medicamentis factas ut à Cantharidibus, aut Salamandra, Bupreste, aut pinorum Eruca, Hyascyamo, Dorycnio, Aconito, aut Ephemero: praesertim Bubulum ad id eximie confert: gargarizatur autem exulceratis faucibus, tonsillisq;. Asininum peculiariter collutos dentes gingiuusq; stabilis. Fluxiones alui, si ulcera sentiantur, tenesmosq;, ouillum, bubulum aut caprinum cum marinis lapillis decoctum, sistit: per se autem & cum hordeacea Ptisana, aut Halicaceo cremore infusum magnoperè intestinorum rosiones mitigat: exulcerata uulua mittitur. Humanum lac dulcissimum est, & maximè alit: māmīs autem exuctū, prodest tibi, & stomachi rosionibus: cōtra haustum Lepi in marinum praesidio est: oculis cruore exictu suffusis, cum auris polline instillatur: podagricis utile est cum Meconio & cerato illitum. Lac omne respuendum splenicis, Hepaticis, comitialibus, uertiginosis, & neruorum uitio laborantibus: febriculosis, & capite dolentibus: nisi si quis interdum purgationis gratia, ut ostendimus, Schistum praebet. Primiparae canis lacte perunctos narrant glabrescere: potum contra uenena, antidoti uicem obtinet abortus, mortuos expellit.

Quo nunc utimur Lac aut humanum est, aut Caprinum, aut Pecorinū, aut Vaccinū aut Bufalinū, aut Asininū antiqui etiā equino & camellino utebatur. Est Lac humanum omnibus praestantius, quod in tribus suis qualitatibus temperatum sit. Porro omne Lac est sanguis bis coctus, è caseo compositus, butyro, & sero. Caprinum sequitur in omni sua substantia temperatum. Spissius est pecorinum, & pra alijs minus habet feri, plus casei. Vaccinum & Bufalinum tum spissum,

rum ceteris grassius est. Asininum plus habet seri, minus crassi. Lactis bonitas colore, odore, sapore, & substantia dignoscitur. Colore summè albo, splendido, claro, & non livido. Odore sincero, aromatico, non horribili. Sapore dulci, non acerbo, non aceroso, non amaro, non falso. Substantia media inter spissum & tenuem, sic ut ungui gutta superposita, non spargatur, sed in se coacta permaneat. Eximium quod istiusmodi est, optimum sanguinem: his destitutum dotibus, pessimos humores generat, corpus & stomachum sursum deorsum voluit. Optimum lac constantis ætatis hominibus convenit, qui natura frigidi non sunt, colericis, eclicis, extenuatis, & in summa ubi stomachus mundus est à pravis humoribus. Et è diverso febribus nocet, dolori capitis, male affectis oculis, paralysia, spasmo, de fluxionibus, lapillis, oppilationi, dentibus, gingivis, iuuenibus, flegmaticis, & in totum, qui id à cibo sumpserint, & eo plus nocet, quo spissius est substantia. Præter hæc quo prodest Lac, huic indendum modicum Zucchari aut mellis, quod non coaguletur in stomacho. Non offeratur potui aut cibo, cum piscibus, rebus acetosis, nec in tanta quantitate, ut digerere aut euomere stomachus non queat. Ieiuno etiam bibendum, nec alius sumendus cibus hoc non percocto. Sumentem quietum stare oportet, non dormire, non bibere à vino: quodque dentibus & gingivis noceat, ab eius potu, vino aut aqua mellata os colluendum. A cibo sumptum, multis in rebus nocet. Optimum lac cerebrum auget. Humeat & increasat corpus. Petus lenit, & antiquam tussim. Venerem excitat, multiplicato spermate. Prodest ardori vrinæ, corpora macilentia restaurat, generat probum sanguinem & alimentum. Emollit & colorat corpus. Statim conuertitur in sanguinem, & carnem adauget.

Caseus. CAP. LXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. τυρός. Lat. Caseus. Ita. Cascio.

Gal. Fourmage.

Caseus recens sine sale sumptus alit, stomacho utilis est, et facile in membra delegatur, corpus auget, aluum modicè emollit: alius tamen alio præstantior, pro natura lactis à quo cōfici

ficitur. Decoctus autem & expressus, deinde inassatus, aluum sistit: illitus, oculorum inflammationibus & sugillatis prodest. Qui uerò recens saluus est, minus alimenti præbet, corpus aptè minuit, stomacho aduersatur, negotium uentri interaneisq; exhibet: uetustiore sistitur aluus. Sero quod à caseo manauit, quam optimè canes aluntur. Quod Hippacen uocant, Caseus est equinus: ea uirus redolet, magnoperè alit, bubuloq; proportionè respondet. Nec desunt qui Hippacen, equinum coagulum appellarent.

Caseus laudatur recens, non enim nocet stomacho, & alijs citius digeritur. Vetus, quod linguam pungat, quibusdam est gratus, est tamen omnium pessimus, sanguinem incendit, sitim inducit, difficulter digeritur, lapillos in renibus & vesica generat, iecur opillat, restringit corpus, colicam generat, & melancolicos humores, & maximè in corporibus qui superfluo calore abundant. Et quāuis caliditatis ratione extenuandis humoribus conueniat, ea tamen postea sequuntur incommoda, ut plus duplo noceat, quàm iuuat. Caseus mediæ ætatis, non probatus ducitur, quamuis minus noceat, quam vetus. Cateris præstantior est, pecorinus. Vaccinus crassior, & maioris est nutrimenti, at difficilior digeritur. Caprinus recens, probus: vetus, omnium pessimus.

Butyrum, & eius fuligo.

CAP. LXIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Βούτυρον. Lat. Butyrum. Ita. Boturo.

Gal. Beurre. Ger. Butter.

Elacte pinguisimo probatum fit Butyrum, quale Ouilum est: fit & ex Caprino, agitato in uasis lacte, donec pingue separetur. Butyrum natura oleosum est, & emolliens: unde largius epotum, uentrem resoluit: prodest, ubi oleum non adfuerit, contra uenena. Cum melle si insricetur, dentitiones adiuuat: gingiuarum pruritus, & oris ulcera infantibus emendat.

dat. Illitum foris capaciora alimentorum facit corpora, & ab albidis pustulis per summa scatentibus asserit. Contra inflammationes & duritias uulvæ, quod nec uirius resipit, nec uetustatem sentit, Butyrum efficax est: dysentericis, & coli exulcerationibus infunditur: in medicamenta addi solet quæ pus mouent, utile præsertim cum nerui, aut cerebri membrana, uesicæ ceruix, uulnera acceperint. Id autem purgat, replet, carnem creat, ab aspidē percussis utilissimè imponitur. Recens obsonijs additum olei uicem pensat, & adipis uice fungitur in bellarijs. Colligendæ ex eo fuliginis ratio hæc est: Butyrum in lucernam nouam ingestum accenditur, fictiliq; operculato quod supernè in siphunculi speciem desinat, & infima parte cuniculos clibani modo habeat, crematur, & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur fuliginis modus, quem facere institueris: penna post deraditur ad usus. Eius effectus est in medicamentis oculorum, exiccare & adstringere: fluxiones cohibet, & ulcera celeriter ad cicatricem perducit.

Butyrum maturat & digerit in his tantum corporibus, quæ mediant inter molle & durum, & ideo non maturat abscessus, qui sunt in corporibus duris. Per os sumptum, confert pulmōi, difficultati anhelitus, & alijs pectoris morbis. Solum manducatum plus maturat, cum melle uero & amygdalis amaris ualentius sputum educit, & excellentius emundat.

Medicina lanarum. CAP. LXV.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἐρία δισυπτήρᾳ ἔρία κεκαίμενα. Lat. Succidæ lanæ. Lanæ crematæ. Ita. Lana succida, lana brusciata. Gal. Laine surge.

Laine bruslee.

Succidæ lanæ molles, è collo fæminibusq; laudatissimæ habentur. Subueniunt inter initia uulneribus, percussis, desquamatis

matris, liuidis, ossibus fractis, aceto, oleo aut uino imbutæ: siquidem facile succos combibunt quibus immergunt: & ob pecudum sordem, sic enim *oesypum* uocant, emolliunt: capitis, stomachi, aliarumque partium doloribus, cum aceto & Rosaceo efficaciter imponuntur. Crematarum lanarum cinis, crustas obducit, excrescentias in carne cohibet, & ulcera ad cicatricem perducit. Munda autem & carptæ, in fictili crudo, cæterorum more, uruntur. Nec secus simbriati marinarum Purpurarum flocculi cremari solent. Aliqui cum sordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eodemque modo urunt. Alij in fictili oris patuli, uerucula inter se distantia componunt, & conceptas carminatasque lanas oleo ita suffusas, ut ne stillare quidem possint, assulis tedæ subiectis, & eisdem, lanisque permutatim interstratis, leuiter succendunt, et uistas tollunt. Quod si è Teda pix, pinguitudine ulla profluxit, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medicamenta. Cinerem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & considerare patiuntur, idque sæpius, mutant aquam donec linguam adstringat, nec mordeat.

Oesypum. CAP. LXVI.

NOMENCLATURA.

Gr. *οἶσυπος*. Lat. *Oesypum*. Ita. Sordida grassella della lana. Gal. La gresse de la laine surge.

Oesypum uocant Græci, succidarum lanarum pinguitudinem: Cuius parandi ratio hæc est, Succidæ molles, radicu-
la non curatæ, calida aqua lauantur, & quibuscunque sordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur, magnoque impetu ligula, uti respumet, agitur, aut lignea rude ualidiusculè conturbatur, quò largius sordida spuma colligi possit, deinde marina respergitur: & considere pingui quod supernatabat, collectoque in altero fictili uase, denuò aqua in labellum
fusa

fusa agitur: spuma iterum mari persunditur, & demum eximitur. Hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguitudine nihil prorsus spuma extet. Collectum Oesypum manibus emollitur, & si qua insedit spurcitia, confestim demitur: exclusaq; sensim omni aqua, recentiq; affusa, manibus misceatur, donec admotum linguae Oesypum, astringat leuiter, nec mordeat, atque pingue candidumq; spectetur, tum in fictili uase conditur. Verum omnia feruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigida aqua eluunt, & manibus, non secus atque ceratum mulieres, confricant: ita enim candidius redditur. Alij clotis lanis & sordibus quibuscunque exemptis, ac lento igni in aereo uase ex aqua decoctis, pingue quod supernatat collectum, aqua, ut diximus, lauant: colatumq; in fictilem patellam, quae calidam aquam contineat, linteo operiunt, atque soli mandant, donec candidum fiat, & satis crassum. Alij bidui spacio aquam effundunt, nouamq; adyiciunt. Melius est laue, radícula non curatum, quod succidarum uirus oleat, & si manu in concha fricetur cum aqua frigida, albescat, nihil in se duri aut concreti habens, ueluti quod cerato aut adipe adulteratur. Oesypum excalfacit, explet ulcera, & emollit, praesertim sedis ac uuluae, cum meliloto & butyro: in uellere appositum, menses & partus euocat, ulcera non auriū modo sanat, sed & genitalium cum anserino adipe: contra erosos angulos oculorum, scabiososq; genas quae occalluerunt, & ciliorū defluuia, efficax est. In testa noua torretur, donec redactū in cinerem pinguitudinē amittat. Ex eo etiam fuligo colligitur, uti demonstrauimus, q̄ in oculorū medicamēta comode addi solet.

Lana Succida, quae & Oesipus, & quem hodie, Ysopum humidum officinae vocant, quō ab Hissopo, quam pari corruptela Ysopum, distinguant, planissime a Dioscoride descripta, nihil adyici postulat.

Coagulum. CAP. LXVII.

NOMENCLATURA.

Græc.

Gr. $\pi\iota\tau\upsilon\alpha$. Lat. Coagulum. Ita. Caglio.

Gal. Presseure. Ger. Kymni.

Leporis coagulum tribus obolis ex uino, uenenatorum mor-
sibus, coeliacis, dysentericis, & faeminis fluxione uulua la-
borantibus, ac reiectionibus à pectore, auxiliatur: sanguinem in-
grumos concretum discutit. Post menstruas purgationes apposi-
tum uulua cum Butyro, praestat mulieribus ut concipiant: potum ue-
rò partus enecat, et à puerperio, pariendi spem adimit. Equi co-
agulum, quàm Hippacem aliqui uocant, priuatim coeliacis dysenteri-
cisq; conuenit. Haedi, Agni, Hinnuli, Capreae laticornis, & Dor-
ci, Apri, Cerui, Vituli, Bubaliq; coagula similes naturas sortiun-
tur: contra aconiti potum, in uino, & concretum lac, in aceto, conueni-
ter assumuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admo-
tum, partus spe intercipit. Vituli marini, Castorei uires repræsen-
tat, comitialibus, stragulatis uuluis, potu conferre existimat. Sed
si sit Vituli marini, hoc experimentum est: aqua inspergit, qua pau-
lisper cum alterius animatis, tum praecipue Agni coagulum, madue-
rit: nam si erit sincerum, statim liquefit in aqua: sin minus, consimi-
le permanet. Excipitur autem catulis, qui nondum natare possunt.
In summa, coagulum omne dissipata cogit, & coacta dissoluit.

Adeps. CAP. LXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. $\Sigma\tau\epsilon\alpha\gamma$. Lat. Adeps. Ita. Grasso.

Gal. Gresse. Ger. Feyerst.

Adeps. Anserinus aut Gallinaceus recens & sine sale co-
ditus, ad uulua uitia proficit: sale inueteratus, & qui tem-
poris spacio acrimonia concepit, uulua inimicus est. Reces exem-
ptis membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tantope-
re capacios sit, quantus sit modus adipis, quem curare institue-
ris, obstructo diligenter nase, flagrantissimo soli exponitur,
eli-

eliquescent inde humor in fictile alterum excolatur, donec adeps omnis absumatur, mox loco uehementer frigido reconditur, & ad usus digeritur. Alij fictile fulciunt super aquam calidam, aut tenuem & elanguidam prunam, quæ solis uicē penset. Est & alia curandi ratio: Exemptis membranis teritur, cōiectusq; in ollam eliquatur, adiecto minuti salis momento, mox lineo colo transfusus reponitur. Vtiliter in medicamenta additur, quæ lassitudines & fatigationes leuant. Suillus adeps & Ursinus hoc curantur modo: Recens, præpinguis, renibus potissimum detractus, in largiore aqua cœlesti & quàm frigidissima, exemptis tunicis, diligentissimè manibus confricatur, & exprimendo fermè siccatur, subindeq; noua aqua abluitur: ceterum fictili capacitatis duplæ inditus, in aquam demergitur, & subditis leuibus prunis spatula mouetur, eliquatusq; colo transfunditur in aquam: ubi uerò refrixit, & guttatim aquam omnem exclusit, in prælotum fictile demittitur, & infusa aqua leniter eliquari debet, & manu deprimi, quò facilius faculentum uirus pessum e at: postea in pilam spongia madefactam transfunditur: ubi coire cœpit, residens in imo sordes eximitur: tertio citra aqua eliquatur, repurgatusq; fictili bene operculato, per quàm frigidis locis reponitur. Hircinum seuum, Ouillum, ceruinumq; ita curato: Elotum ex his quodcunque, tunicis, (ut in suilli mentione dictum est) exemptis, pilæ emollendum tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentum uirus excernatur, aut pingue aliquod innatet, sed nitida spectetur. Deinde in ollam fictilem conycito, & adiecta aqua ut superemineat, leui pruna liquefacito, & moueto, atque in aquam colato: cumq; refrixerit, iterum in loto fictili eliquato, & quæ antè diximus facito: tertio sine aqua liquefactum, in persusam liquore pilam colato, refrigeratumq; ut in suilli ratione diximus, recodito. Bubulum autem seuum, renibus maximè detractum

tractum, exemptis membranis, aqua marina ex alto petita eluē-
dum est, mox in pila tundendum diligenter, affusa maris aqua:
cum uerò dissolutum fuerit, in fictilem ollam conijciendum, &
marina aqua, quæ non minus dodrante superemineat, proluen-
dum: decoquendū donec omnis aboleatur odor, additis ad singu-
lis seui Atticas minas, quaternis Tyrrhenicæ ceræ drachmis ex-
colatumq̃, detractis quæ pessum ierant sordibus, in nouo fictili
reponendum: opertumq̃, soli interdū credendum, ut ad cando-
rem reducatur, & odoris uirus euanescat. Priuatim Taurorum
pingue sic curari debet: Renibus euulsum pingue profluente am-
nis aqua abluto, detractisq̃ tunicis, fictili nouo postquā exi-
guum salem insperseris, liquesacito, dein in nitentem aquam ex-
colato, & ubi concreescere cæpit, manibus iterum confricando
uehementer lauato, aqua sæpius infusa, refusaq̃, donec quamo-
ptimè clotum uideatur. Rursus in olla cum pari modo uini odo-
rati decoquito, & cum iterum efferbuerit, dempto ab igni ua-
se, ibidem finito pernoctare: postridie si grauiter adhuc oleat,
noua olla repetitum, uino odorato perfundatur: eadē quæ prius
fiant, dum omne uirus euanescat. Colliquatur & sine sale, præ-
sertim affectionum earum causa, quibus sal aduersari solet, sed
ita paratum non magnoperè albescit. Eodem modo pardorum
ac leonum pingua curari oportet. Taurinum autem & Vitu-
linum pingue, necnon Ceruinum, atque etiam huius animalis
medulla, odoramentis imbuitur hac ratione: Pingue quod odo-
ratum reddi debet, demptis, quo diximus modo, mēbris, elo-
tum & uino quā odoratissimo, nulla maris aqua diluto, fer-
uesactum, pernoctare sinitur: alterum id genus uinum eadem
mensura infunditur, colliquatur, & exquisite colatur, nouemq̃
eius heminis, Iunci Arabici septem drachmæ adijciuntur. Quod
si ipsum odoris fragrantioris fieri uoles, quadraginta floris eius-
dem drachmæ, cum paribus Palmæ, Calami, & Casiæ modis
n addun

adduntur, & Xylobalsami, Aspalathi singula drachma, Cinnamonomi, Cardamomi, & Nardi, singula uncia: omnia exactius tunduntur, & affuso uino odorato, in uase operto, quod supra carbones firmiter collocatum sit. Ter efferuescunt, & semoto ab igni uase inibi pernoctant. Postridie uinum effunditur, aliudq; generis eiusdem adicitur Ter similimodo bene conseruescat. Deinde matutinis exempto adipe uinum effundatur, & abluto uase, si quid imo subsedens hæsît, detergatur: postremo eliquatum pingue & excolatum, ad usus reconditur. Hoc autem modo odoramentis imbuatur, quod antea curatum est, uerum antè dicta prius inspissari solent, quò facilius sibi odoramentorum uires adsciscant. Itaque assumens quodcunque horum uoles, cum uino feruescito, impositis una Myrti ramulis, Serpyllo, Cypero, item Aspalatho plenius tuso. Aliqui tamen ad hunc asum, uno duntaxat horum contenti sunt: cum autem ter efferbuit, exemptum leniter, & linteo colatum, aromatis, uti expositum est, imbuatur. Adipibus spissamenta sic fiunt (quemcunque acceperis, oportet ut recens tundatur) Syncerus & sanguinis expers adeps, reliquas habens notas, quas sæpe retulimus, in ollam nouam demittitur, infuso uino albo, uetere, odorato, quod semipedis altitudinem superet: lento igni feruescat dum uernaculus odor aboleatur, planeq; uinum redoleat: ac ubi deposito uase refrixit, duæ adipis minæ in ollam mittuntur, & duo uini eiusdem sextary, & seminis Loti eius inquam, cuius è ligno ludicræ tibiæ faciuntur, tusi minæ quatuor adijciuntur, lento igni subinde miscendo decoquuntur, cumq; odoris uirus euanuerit: excolatusq; adeps refrixerit, una confusi Aspalathi mina, cum Amaracini floris minis quatuor, & uetere uino subigitur: nocte una hæc odorem rapiunt, combibuntue: postridie in fictilem ollam tricongiam ea omnia cum adipe inie-

Etā

Ela, additis sextarijs tribus uini unà feruescunt, quousque & uim & odorem spissamentorum adeps ipse contraxerit, qui eliquescent colatur, & reponitur. Quod si maiorem odoris fragrantiam efflagites, drachmas octo quam pinguisimæ Myrrhæ uino macerata, quod multos in annos asseruatum est, misceto. Gallinaceus Anserinusq; sic odoribus imbui solent: Cuiusuis eorum percurati sextarij duo fœtili olla excipiuntur, Erysiceptri, Xylobalсами, Palma elata, & Calami planè contusi, singulorum sescuncia admiscetur: uini Lesby ueteris cyathus unus adijcitur, ea ter efferuescunt prunis, mox uase sublato ab igne, die noctuq; refrigerantur: postridie liquata per linteum crassum, mundum in uas excolantur. Vbi uerò adeps coierit, concha excipitur, fœtiliq; nouo densius aperto perfrigidis locis reponitur. Hyberno tempore id instituere oportet, æstate siquidem pingua non coguntur. Nec desunt qui Tyrrhenicæ ceræ momentum adijciant, quò facilius in unum corpus omnia coalescant. Eadem ratione Suillus adeps & Ursinus, ceteriq; id genus, odoramentis imbuuntur. Verum Sampsuchi odorem adeps ipse representabit hoc modo: Curati quamoptimè adipis, præsertim Taurini, mina una, tempestiuq; Sampsuchi exquisitè confracti sesquimina miscentur, & insperso largiore uino digeruntur in offas, quæ in uase cooperto nocte quiescunt: matutinis in fœtili olla leuisculo igni, affusa aqua, leuiter coquuntur, dùmque suum adeps odorem exuerit, defæcatus ac bene opertus, nocte tota permanet: postero die deterfa sorde quæ pessum ierat, Sampsuchi, ut dictum est, contusi iterum sesquimina priori pastillo adijcitur, eodemq; modo in offas cogitur: alijs quæ diximus peractis decoquitur, & colatur, & si qua fundo hæsit spurcitia, deraditur, & frigido loco recondi-

n 2 tur

tur. Si quis tamen incuratum adipem Anserinum, Gallinaceū, aut Vitulinum, à putredine tueri uelit, ita faciendum est: Quem uis adipem diligenter elotum & siccatum in umbra super cribrum, per lintea munda manibus uehementer exprimat linoq; consutum umbroso in loco suspendat, & post multos dies noua charta inuolutum, frigido loco recondat. Pingua autem indito melle uindicantur à putredinis uitio. Vis omnium est excalfacere, mollire, rarefacere. Taurinus adeps, bubulus & uitulinus aliquantum adstringunt. ~~Furcula uinum cum polenta, Rhoe & Caseo, dysentericis datur, & cum Ptisana succo infunditur. Ius decocti phthisicis in sorbitionibus prodest. Datur quoque utiliter iys, qui Cantharidum uenena hauserunt. Hircinus, ut ualidissime discutiat, podagricis auxiliatur, cum fimo capræ & Croco impositus. Huic proportionem respondet Ouillus. Suillus uero contra uulnæ & sedis uitia idoneus est, ambustus igni medetur: è sue uetustissimus quisque sale conditus excalfacit, & emollit, elotus uino pleuriticis pdest: cinere aut calce exceptus inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asinum tradunt cicatrices corpori concolores reddere. Anserinus Gallinaceusq; conueniunt muliebribus malis, & ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, & contra aurium dolores. Ursinum constat raptos uitio alopecie capillos restituere, pernionibus subuenire. Vulpinus medetur aurium doloribus. Flumianilium piscium pingua, perunctis oculis claritatem asserunt, si in sole liquecant, & melli admisceantur. Viperæ adeps contra oculorum hebetudines suffusionésque efficax est, addita Cedria, Melle Attico, & pari oleo uetere: pillos alis euulsos perunctis radicibus recens & per se illitus obliuerat, atque renasci non patitur.~~

Adeps

Adeps omnis in vniuersum humefcat & excalfacit in corporibus humanis (plus aut minus) put natura est animalium & ob id adeps porci plus humefcat, non tamen excalfacit, ut oleum: humano enim in caliditate sua simile est. Taurinus adeps calidior & siccior porcino. Vitellinus inferior est caliditate taurino & capri adeps cedit adipi capra: caprae adeps, hircino: taurinus, leonino. Potentius enim est, & validius digerit, quotquot sunt adipibus animalium quadrupedum, ut potest admodum calidus & tenuis, & ideo conuenit abscessibus, veteribus nodosis, & induratis, & aequè retractis neruis. Taurinus aequidistat à Leonino & porcino, ut enim hunc caliditate superat, ita vicissim ab illo superatur. Et ob id medicamentis veterum abscessuum indi non aliter quam leoninus potest: itidem in medicamentis tetrapharmacō, qui sunt è cera, resina, pice, & adipe, nihil refert, utrum taurinum, vitellinum, hircinum, caprinum, an porcinum imponas: at porcinus magis conueniet infantibus, feminis, & ijs qui molles sunt carnes: taurinus rusticis, & quibus dura est caro, aut quod ita nati sint, aut quod è viuendi ratione id sibi conquisierint. Omnis adeps quo vetustior, eò calidior, tenuior, & plus desiccatur. Hic summopere aduertendum, cum dicit Dioscorides caprinum adipem magis astringere, e porcino, non de astringitione pari qua Rhe, intelligendum, sed fortiore & acutiore porcino. Vocat alias & saporem astringentium, Piperis Pyrethri, Emphorbij, Cepe, Alij cum acre dicere debuerit, & astringentius proprie sit in Gallis, Balanistis, Rhe, & Hypocisthe. Effectum viperini adipis quem noster actor profert, in obliterandis radicibus subalarij pilorū, & curanda suffusione, improbat Galenus, experientia affirmans non ita esse. Porcinus adeps omnibus alijs humidius, itidem plus mollit & maturat, & ea causa est cur inferatur flegmonum emplastris: in ijs vero qui erodentem & mordacem dolorem sentiunt in intestino sedis, aut colo, caprino in clysteribus potius quam porcino utemur: non quod magis reperiatur, & valentius mordacitatem restinguat porcino (è sui enim natura porcinum) sed ideo quod cum spissum sit caprinum, statim coagulatur, & adglutinatur patienti loco: at porcinum, nempe liquidum, foras prodit, ut oleum: idque applicatur in dysenteria & tenesmo. At enim quæpiam tenuis substantie ratione, plus reperiunt quam spissa, & ubi malum altius est infixum in profundo corporis: liquidum duro plus penetrat, aptiusque corrodeti humori miscetur. Ea de re in erosionibus, quæ erant in alto corporis, plus reperiunt adeps anserinus quamuis calidior porcino, quos intermediat adeps gallinaceus Marium adeps semper feminino calidior est: castratorum minus calidus & siccus quod castrati feminarum naturam referant. Adeps animalium in cibo sumptus, languidum reddit stomachum, oppilat, augmentat flegma,

paruum nutrit, deprauatum sanguinem generat, infirmat vim retentricem stomachi, dysentericos & quosuis alios fluxus in corpore, excitat, satiat non sumpto legitimo cibo, sensus & intellectum obtundit, somnolentiam prouocat, & calidum stomachum in bilem & vapores conuertit.

Medulla. CAP. LXIX.

NOMENCLATURA.

Græ. μυελος. Lat. Medula. It. Midolla.

Gal. Moelle. Ger. Marck.

Laudatissima est Ceruina, mox Vitulina, post hanc Taurina, dein Caprina, & Ouilla. Colliguntur aestatis exitu, cum appetit autumnus: quippe cum alijs anni temporibus concrementum sanguinis, & ueluti caro friabilis, in ossibus inueniatur, nec facile cognosci potest, ni quis eam ossibus extrahat & recondat. Omnes medulla molliunt, calfaciunt, rarefaciunt, ulcera explent: Ceruina perunctos uenenata fugiunt. Curantur recētes, adipis modo, aqua respersu subacta, selectisq; ossibus tantisper elota, & in linteum expressa, donec aqua sincera emanet: & deterisa sorde penna, si qua innatet, liquata in duplicato uase in pilam exprimuntur, & ubi coiere, omni fece, quæ ad ima sidit, derasa, fidelili nouo reponuntur. Quod si libet incuratas reponere, facito omnia, quæ de Anserum & Gallinarum adipe demonstrauimus.

Medulla animalium duritiem omnino emollit, in musculis, tendinibus, fibris, & interioribus. Præstantissima est ceruina, ab hac boi iuuenum, & vitulina. Hircina. taurina, robustior est, mordacior, & siccior, Qui fit ut duritias nodosus non emolliat. E ceruina & vitellina pessi sunt ad emolliendas matricis duritias, vnguntur & muliebres loci ad eundem effectum. Medulla est spina itidem ut ex ossibus animalium extrahitur, quamuis quæ est spina educitur, durior sit & siccior. Galenus quo est muco & situ integras Medullas asseruaret, sub veris initium inter Lauri frondes siccis in adibus reponebat: Instante æstate aditis locis, si gidiusculis, & quo Aquilo non peruaderet, fenestellis in diurnum & nocturnum euri spiramentum apertis. Calidis enim locis putrescit, & situm

fitum contrahit: in humidis verò & terræ propinquis, mucum. Quæ edi-
tur e spina medulla, flegma generat & spissos humores, difficulter dige-
rit, nocet stomacho, nauseam prouocat, si tamē valentem digestionī sto-
machum repperit, non improbatē nutrit. Quæ ex ossibus educitur, li-
cet & ipsa in cibo nauseam proritet, & flegma generet, attamen si dige-
ratur probè, nutrit & gustui gravior, quàm spinalis est.

Fel. CAP. LXX.

NOMENCLATURA.

Græ. χολή. Lat. Fel. Ita. Fiele.

Gal. Fiel.

Fel omne curatur hoc modo: Recens præligato ore follicu-
li lino tandiu demissum in feruentem aquam, dum quis spa-
cium trium stadiorum percurset, mox exemptum siccatur um-
broso loco, asperginem non redolente. Sed quod ad oculorum
medicamenta adijci solet, ligatum lino in vitrum uas, quod mel
habeat, immittitur, circumuoluto ad os uasis lini principio, &
operto uase reconditur. Est enim uis omnium acris & excalsa-
ciens. Intensius tamen & remissis uiribus differunt. Siquidem
præstantius in effectu esse uidetur Fel marini Scorpionis, & pi-
scis qui Callionymus appellatur, marinæ Testudinis, Hyænæq;
item Perdicis, Aquillæ, gallinæ candidæ, & syluestris Capræ,
quod priuatim prodest contra suffusiones incipientes, & oculo-
rum caligines, argemas, & genarū scabritias. Ouillo, Suillo,
Hircino, atque Fissino, Taurinum multò efficacius. Felle omni
perfacilem, præsertim infantibus, deiectionem quis molietur, si
intinctū eo tomētū aut fimbriā sedi subiciat. Priuatim Taurino
anginæ cū melle perunguntur: sedis ulcera sanat, & ad cicatricē
vsq; perducit. Idē auribus si actis & purulētis cū muliebri lacte
aut Caprino instillatum medetur, & sibilo earundem ex por-
ri succo. Admisceri insuevit, uulnerarijs emplastris & circun-

n 4 lini

linitionibus, quæ contra uenenata parantur, phagedænicis ulceribus, colicis & scroti doloribus, ex melle prodest: lepras, furfures cum nitro & terra cimolia quàm optimè purgat. Ouillum & Vrsinum contra eadem pollent, uerùm inefficacius hæc præstant. Vrsinum eclegmate comitiales adiuuat. Fel testudinū anginis, & in ore infantium nomis, prodest: naribus inditum comitiales erigit. Syluestrium Caprarum felle peculiariter peruncti lusciosi sanantur. Hircinum idem obit munus: thymia abolet & luxuriantes elephantorum extuberationes illitu reprimunt. Suillum autem contra aurium ulcera, reliquaq; omnia, magno usu assumitur.

Fel ipsissima animalium est bilis, & humorum quos in se continent calidissimum. Cuius animalis natura, sel plus minúsue calidum efficit. Fel quo liquidius, & magis in pallorem deurgēs, eò minus calidum, illo qui spissius est, & coloratus. Habet taurus in felle lapidē, qui potius vesica lapidē frangit. Is tritus & naribus afflatus, visum expedit, & aquæ in oculos descensum inhibet, cum dilatantur tunica. In puluerem lentis pondere reductus, & naribus attractus cum succo Betæ, prodest malo caduco. Fel Aurata piscis, Lucæ, Perdicis, & Galli mire in Venere fæminas oblectant.

Sanguis. CAP. LXXI.

NOMENCLATURA.

Græ. Αἷμα. Lat. Sanguis. Ita. Il Sangue.

Gal. Le sang.

Sanguis Anseris, Anatis & Hædi, utilissimè in antidota miscentur. Palumbi autē, Turturis & Columbæ, necnon Perdicis, oculis cruore suffusis, & recētibus eorum uulneribus, lusciosisq; illinuntur: peculiariter Columbæ sanguis, cruorē membranis cerebri erumpentē inhibet. Hirci, Capræ, Cerui & Leporis sanguis inassatus sartagine, dysenterias & cæliacorum profluvia sistit: in uino potuscōtra toxica efficax est. Leporinus sanguis ita ut tepet illitus, uitia cutis in facie, lentiginesq; emaculat. Canin

ninus commodè ab his bibitur, quos efferata in rabiem bestia momorderit: contra epotum toxicum auxilio est. Testudinis terrestres sanguinem epotum tradunt prodesse comitialibus: marina autem Testudinis cum uino & Leporis coagulo Cuminog³ contra serpentium morsus, & hausta rubetæ uenena, conuenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duritias discutit, emolliq³. Sanguis equarum quæ admissuram expertæ sunt, in medicameta additur quæ erodunt, septica uocant. Sanguine Chamæleonis genarum palpebras euelli creditum est. Hoc enim uiridiū Ranarum sanguine præstatur. Menstrua sanguis fæminarum, circumlitu conceptum inhibere existimatur: aut si omnino mulier menstrua supergrediatur. Leuat podagræ dolores, & igne sacrum illitus.

Improbat Galenus totū hoc caput de sanguine, & ne multis morer, dicit se experta nunquā remedia reliquisse, ut eis uteretur, quibus nullus utetur qui se circumuentum non sentiat. Ipsa nos docet experientia recentem columbæ sanguinē caligini oculorum prodesse, & Tauri sanguine multos in historijs legimus suffocatos. Matthiolus e Galeno Dioscoridis caput hoc emendat, & ubi habetur, Ranarum sanguine genarum palpebras euelli, legendum putat, Vnctis ranarum sanguine genis, quæ deciderint palpebras non renasci. Itidem, ubi legitur, equarum sanguis, legendum, emissariorum sanguis.

Fimum. CAP. LXXII.

NOMENCLATURA.

Græ. ΑΠΟΠΑΪΘ. lat. Fimum. Ita. Lo Sterco.

Gal. La Fiente.

Armentariæ Bonis fimum si recens admoueat, uulnerū inflammationes mitigat, folijs autem inuoluitur, & calfactum cinere feruenti superponitur: coxendicis cruciatus fotu cōpescit. Illitum ex aceto duritias, panos & strumas discutit. Priuatim suffitu fimi, quod à masculo Boue redditum est, procidentes uulnæ reprimuntur, accensi nidore culices abiguntur. Fimum

n s Ca

Caprarum, præsertim in montibus degentium, potum in uino, regium morbum emendat: menses cit cum odoramentis haustu & partus euocat. Tritum in farinam, & impositum lanis cum Thure, fæminarum profluvia sistit: ceterosq; sanguinis impetus ex aceto cohibet. Medetur alopecijs exustum, & cum aceto aut oximelite illitum: cum axungia uerò impositum, his qui podagra tentantur, auxilio est. Caprillum in aceto decoctum imponitur serpentium morsibus, ulceribus quæ serpunt, igni sacro, & parotidibus. Rilem ischiadici uestionem hunc in modum accipiunt: in eo interstitio ubi pollex brachiali committitur, cana ueluti lacuna subsidet, in qua lana oleo imbuta substernitur, deinde sigillatim feruentes stercoreis Caprini pillulæ imponuntur, dū uapor per brachium ad coxam sentiatur peruenire, & coxendicis dolorem mitigare: adustio id genus Arabica appellatur. Ouillum illitum sanat epinyclidis, clauos, pensiles uerrucas, thymos & ambusta igni, rosaceo cerato exceptum, Fimum suis syluestris aridum, in aqua aut uino potum, reiectiones sanguinis sistit: uetustum lateris dolorem mulcet: adrupta & conuulsa ex aceto bibitur: luxatis cū cerato rosaceo medetur. Tam Asinorū quā Equorum fimū siue crudum siue crematū, addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet. Armentarij, qui herba pascitur, siccum fimum liquatum in uino, mox potum, contra scorpionum ictus magnoperè auxiliatur. Columbinum uehementius & excalfacit & urit: cum hordeacea farina mixtum strumas ex aceto discutit carbunculos emarginat, tritū cum melle, lini semine & oleo, ambustis igni medetur. Gallinaceum uerò omnia eadem, sed efficacius præstat: priuatim tamen contra uenena fungorū, & coli cruciatus ex aceto aut uino bibitur. Ciconiæ fimum, si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini fimi nidore partus excuti produntur. Murinum detritum cum aceto, & illitum, alopecijs medetur: cum Thure

&

Et mulso calculos expellit: subdita infantibus muscerda, alui deiectionem promouent. Caninum quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cum uino aut aqua potum, sistit aluum. Humanum stercus illitum, uulnera ab inflammatione uindicat, et obiter intumescere non patitur, sed ea statim glutinat: sicco ex Melle anginae perungi commodissime traduntur. Terrestris Crocodilli finum, Crocodilea uocant, quae mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremque seruat. Optima est candidissima et friabilis, Amyli modo, minime ponderosa, in humore statim eliquescent, quae cum teritur, fermenti acorem quadantenus refert. Adulterant eam sturnorum fimo, quos captos Oriza pascunt, ipsumque non dissimile uendunt. Alij Amylum aut Cymoliam miscent, et adscito Anchusa colore per rarum cribrum paulatim exprimunt, ut se contrahat in uermiculorum speciem: qui siccati pro Crocodilea ueneunt. Inter omnes conuenire inuenio, humanum stercus caninumque gutturi impositum, anginis auxiliari.

Inter animantium stertora laudat Galenus bouinum, caprinum, crocodilinum, caninum, et huius mirabile effectum recitat, si arte et modo educetur. Aqua est stercore humano per alembicum extracta, valet ad fistulas, ad erodentia ulcera, et quae difficulter coagulantur, ad ulcera capitis manantia, ad albuginem oculorum, ad canculos, extra applicatum. Oleum quod, ab aqua, antequam circa alembicum igni, distillat, valentior est ad iam dicta.

Vrina. CAP. LXXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Οὐρορ. Lat. *Vrina*. Ita. *Orina*.

Gal. *l'Vrine*.

Humanam urinam suam cuique bibere, contra Viperæ morsus, ac uenena, incipientemque aquam intercutem proderit.

Scer.

Scorpionis, Viperæ marinorum, Draconisq; morsus ea conuenientissimè fouentur. Canina ad perfundendos canis morsus idonea est, pruritus & lepras nitro addito expurgat: sed uetus, ulcera capitis manantia, fursures, psoras, & feruidas eruptiones, multò magis abstergit: nomas, & præcipue genitalium, cohibet: auribus infusa manas pus supprimit: decocta in calyce mali punici, earum uermiculos abigit. Pueri impubis resorpta urina, orthopnoicis auxiliatur: decocta in æreo uase cū melle emendat cicatrices, & argema, caliginesq; ex ea & cupro idoneum auri ferrumen conficiunt. Quod in urina subsidit, illitu ignem sacrum mitigat: feruesfactum cum Cyprino, inditumq; uulua dolores mulcet, strangulatus leuat, genus deterget, oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cum Myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina uribus eisdem prædita est: priuatim comminuit uesicæ calculos, & potu expellit. Caprina ad aquā quæ cutem subijt, cum Nardi spica quotidie binis cyathis cum aqua bibitur: urinamq; per aluum extrahit, aurium doloribus instillata medetur. Asinina traditur renum uitjs mederi. Lyncis urinā, quā Lyncuriū appellant, simulac excernitur, glaciari correuē in calculi duritiā, uulgò creditum est: quare quod de ea proditum est, uanum esse conuincitur. Est enim quod à nonnullis uocatur Succinum Pterygophoron, ideo dictum quod pennas ad se alliciat. Id potum ex aqua, stomacho aluòq; fluxione laboranti conuenit.

A Nimaliū urina, ut eorū natura, plus minus ue calida est. Omnium debilior, & minus calida, est humana, huic proxima porcina. Apri acris est. Ex hac Thusci mixta cum oleo, ac in sua uesica relictā, cū ad sumum appenderint, quousq; spissitudinem mellis contrahat, ad vermes infantium utuntur, perungentes ea nares & carpum, ac inde mirabilis sequitur effectus. Galenus Dioscoridis sententia non astipulatur, Urinā infantium iuuare astmaticos, & quibus strictum est pectus. Verū Lyncuriū species est Succini quæ paleas attrahit & plumas, nō ex urina Lyncis in terra condensata, concretus lapis. Lapis Lyncis quam officinis

nis

nis impostores videntur, nec est Lyncurium Succini, nec vlla vi ad prouocandam vrinam, nec ad lapides in renibus aut vesica comminuendos, vt stolidè quidam opinantur.

Mel. CAP. LXXIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. μέλι. Lat. Mel. Ita. Mela.

Gal. Miel. Ger. Harzig.

PRincipem locum obtinet Mel, quod Atticæ regionis est, præcipuè ex Hymetto, mox Cycladibus insulis, & è Sicilia, cognomine Hybleum. Magis probatur dulcius & acre, odoratiùs, subflauum, nec humectum, graue, & minimè stuxum. quod ob sequacè lentitiã non faciliè abrumpitur tractumq; resilit in digitos. Mel abstergendi uim habet, ora uenarum aperit, humores euocat, qua ratione in sordida ulcera sinusq; commodissimè infunditur. Decoctum atque impositum, abscedentẽ carnem glutinat. Medetur impetigini coctum cum liquido alumine, & illitum: item aurium sonitui & dolori, cum fossili sale trito, tepidum instillatur: lentes & fæda capitis animalia illitum necat: nudã glandem recutitis operit, præsertim quæ circumsione aperta nõ est, si Melle præputiũ à balineo triginta diebus emolliatur: oculorum caliginẽ discutit, faucibus, tonsillis, angina collutum gargarizatũque medetur, urinam ciet, auxiliatur tussi, & à serpente percussis: contra haustum Meconium, cum Rosaceo calidum assumitur: aduersus uenena Fungorum, & rabiosi canis morsus linctum aut potum proficit: crudum tamen aliu inflat, tussim laceffit, & ea de re despumati usus aptior est. Primatum tenet in mellis genere uernum, deinde æstiuum, hybernum uerò, ut potè quod crassius constet, deterrimum reputatur, ceraginis halitum expirat. Quod in Sardinia gignitur. Mel, amarum est, quoniam apes inibi absinthio uescantur: quo uitia

tia cutis in facie & macula aptissime perunguntur. Heraclea in Ponto quibusdam anni temporibus, propria quorundam florum dote, mel coëstat, quod qui edere, mente ab alienantur, ac sudore diffuunt. Remedio sunt, esitata Ruta, & Salsamenta, aut epatum mulsum, resumpta. quoties uomitione reijciuntur, acre autem est, & olfactu sternutamenta mouet. Quod cum costo illitum, scissurarum cutem emendat, & cum sale sugillationes rapit. Est aliud concreti Mellis genus, quod Saccharon nominatur. In India uero & felici Arabia in arundinibus inuenitur: salis modo coactum est, dentibus. ut sal fragile, alio idoneum, & stomacho utile, si aqua dilutum bibatur: uexata uesica renibusque auxiliatur, illitum ea discutit, quae tenebras oculorum pupillis offundunt.

Mel liquor eximius, dulcoris & notitiae euulgatissima, satis superque expressum a Dioscoride. Duo praecipue nocentioris Mellis genera veteres recensuere. Vnum Sardon, quod in ibi ex Absinthio & quapiam Ranunculi specie apes pascantur. Alterum Ponticum, primo nocentius, quod Aconito & Nery floribus eo loci nutriatur. Ingens inter recentes meduos est controversia, sit ne id Saccharum quod sub mellis specie Dioscorides & Galenus describunt nasci in India, & Arabia felice, idem cum nostro Saccharo, & ab eadem ne planta prodeunt, è qua nostro saeculo è Medera, fortunatis insulis, & alijs multis locis in frustra condensatur. Et sanè antiquorum Saccharum est ipsarummet plantarum liquor extra cannam, ut gummi ex arboribus, erumpens, ac per poros resudans, & postea è sole supra condensatus. Nec enim Dioscorides aut Galenus id mel in ramos vel frondis deciduum è caelo faciunt, sed caninis insidens. Accedit ad hæc quod cum Dioscorides, Galenus & Plinius id Saccharum album salis in more clarum, friabile describant, satis declarant non esse ex rore concretum, sed quod (ut potè viscosum) adhereret caninis, ubi postea à sole coagmentaretur, eo artificio quo à nobis igne decoquitur, ut istud sit Saccharum factum à natura, nostrum arte & igne preparatum. Et quod ad Paulum Aeginetam & Auincennam attinet, qui sal Indum laudant ad scabrâ & siccâ linguam in acutissimis febribus, postquam spes lucri quotannis plantas hæc incidere docuit, impedita est ab operatione sua natura, & sicque deperit antiquorum Saccharum, in cuius locum recentibus medicis successit quod Candicū vocamus, arte coëctum. Scabra enim è siccitate linguæ multum prodest, & asper

ciat

tudini pectoris, maximè si æstate in vasis iulebi violati conficiatur: Aqua siquidem, & violarum infusio, vim humect. id leniendiq; augēt.

Cera.

CAP. LXXV.

NOMENCLATURA.

Græ. Κηρός. Lat. Cera. Ita. La Cera.

Gal. Cire. Ger. Wäcchs.

Cera optima est subfulua, subpinguis, pura, odorata, & halitū quadā tenus melleū referens, natione Pontica, aut Cretica: secundū locū obtinet candicans, & suapte natura pinguis, Candida fit hoc modo: Ex ea radunt albū syncerūq; atq; transfundūt in uas, quod satis habeat marinæ ex alto petitiæ, inspersoq; nitri momento decoquunt: cūq; iterū tertionē inferbuit, separatū uas refrigerant, ac Cera pastillū eximunt, deterfa sorde, si qua forte adhæsit: tum denuo indita noua maris aqua feruet, uti retulimus: & uase dempto ex igne, fundum ollulæ nouæ aqua frigida madafactum, in Cera summā suspensā manu intingunt, quò celerius concreseat, & quàm minima portio extrahatur. suscepto primo Cera orbiculo, iterū uasisimū aqua refrigeratū, tantisper in cerā immitti debet, dum tota excipiat. Orbiculi lino cōsuti, interuacante, spacio, suspendūtur, & interdū, cōtinuo sub sole, noctu sub luna aspergūtur, usq; dū perfectè albescat: uerū si eximus ille candor desideretur, eadē faciliari, & idē tide recoqui operæ pratiū est. Nec desunt qui pro marina, in muria quā acerrima semel aut iterū excoquāt, dein lagūcula tenui, rotūda, ansam habēte, extrahūt postea orbiculos, sub strato affatim cespite herbofo, insolāt, donec candorē summū cōtraxerit. Precipiūt hoc obeundū munus uere, cū sol remissa uehemētia humorē pariat, ut nō facile liquetur. Cera omnis molli, calfacit, modicè explet corpora. Datur in sorbitione dysentericis: ac Mily magnitudine, decem grana Cerae hausta, lac in nutricibus non patiuntur coagulari.

Cera

Cera Galeno mediat inter calida, frigida, humida, & sica. Substantie est spissa, & quadatenus viscosa. Et ob id non desiccatur tantum sed etiam fortuita quapiam operatione humeflat corpora, pororum transpirationem inhibens. At tamen Cera magis utimur medicamentis calidis & frigidis inserta, quam ipsa sola, quod modice digeratur: intus sumpta, pauxillum habet virtutis calidae digestorie, quae ei a Melle, quod illa abundat superest.

Propolis. CAP. LXXVI.

NOMENCLATURA.

Græ. πρόπολις. Lat. Propolis. Ita. Propoli.

Gal. & Off. nomine latino utuntur. Ger. Wbortstesz.

Propolis eligi debet flava, odorata, Styracem referens, in uehementi ariditate mollis, & Mastiches more ductilis. Magnopere calfacit & euocat: aculeos & omnia infixam corpori extrahit: in uetere tussi suffita proficit, impetigines admota tollit: ea in alueariorum foribus cerosæ naturæ inuenitur.

Propolis Dioscoridi & M. Varroni præ foribus alueariorum reperitur, seu ut planius dicam, præ spiraculis è quibus intrant & exeunt apes. Plinius crustam craßioris iam materię additis floribus, nondum tamen Cera, sed fauorum stabilimentum, quæ omnes frigoris aut iniuriæ aditus obstruuntur, odore etiamnum graui, ut quæ plerumque pro Galbano utantur. Populi ferunt in folijs guttam, ex qua apes Propolim faciunt. At enim Metys quam crustam facit saporis amari, primum eundem est, in apibus, operis fundamentum. Secundum Pissoceros, quæ supra eam ueniat, picantium modo, seu dilutior. Tertium Propolis. Valentinus aspergit Propolis, quam attrahat. Substantia constat tenui, & ob id excalfacit in fine secundi gradus, aut tertij principio.

Triticum. CAP. LXXVII.

NOMENCLATURA.


Græ. πυρός. Lat. Triticum. Ita. Grano.

Gal. Froment. Ger. Weysfen.

Opti



Trimestre .



Triticum.

Optima è Tritici generibus ad secundæ valetudinis usus habentur, quæ recentia & iam perfecte adulta, colorem luteum referunt: dein sequuntur trimestria, quæ nonnullis Sitania nominatur. Itaque cruda in cibis teretes tineas gignunt, canum morsibus prosunt, mansa & imposita. Confectus eorum similitudine panis, plus alit quam cibarius. E trimestrium farina panis leuiorem cibum præbet, & qui facile in membra demandetur. Farina eorum cum Hyoscyami succo illinitur aduersus neruorum fluxiones, quas Græci rheumatismos uocant. Item contra intera neorum inflationes, lentigines ex aceto mulso tollit. Furfures autem in acri aceto decocti, turgentes mammas sedant: Viperarum ictibus auxiliatur, & torminosi prosunt. Farinaceum fermentum calfaciendi extrahendiq; uim habet: priuatim callos pedum, cla

o

uosq;

uosq̃ extenuat, & cætera tubercula furunculosq̃ ex sale concoquit, & aperit. Sitaniorum farina contra uenenatos ietus cū aceto aut uino commodissimè illinitur. Eadem si decocta in glutini modum delingatur, cruentis excreationibus, proderit: contra tussim & exasperatas arterias, cum *Mentha* & butyro decocta, efficax est. Tritici pollen, si ex aqua mulsa, aut hydrelæo decoquatur, omnem discutit inflammationem. Panis & crudus & coctus cum aqua mulsa inflammationes omneis illitu mulcet: cum emolliat, & quadantenus refringeret: sed herbis succisue huic rei accommodatis admisceatur. Vetus panis aridus, adiectis conuenientibus, citam aluum cohibet: recens, muria maceratus, illitu uetustas impetigines sanat. Glutinum ex similagine & polline, quo chartæ glutinantur, sanguinem excreantibus prodest, si liquidum ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum.

Triticum, quod granum ob excellentiam vocamus & frumentum, omnibus notum est: Id in Lolium pluuia & admodum frigidam anni tempestate degenerat. fit è Tritico inter duas laminas modice ignitas stricto oleum, quod fistulis conuenit, cutia spera, & fissuris quæ ex frigore proueniunt. Triticum extrinsecus applicatum excalfacit primo gradu, & quamuis nec desicet nec infrigidet, quadantenus tamen viscosum est, & opillatorium. Idem si coctum manducetur, grauât stomachum, caput vento & vapore complet.


Hordeum. CAP. LXXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. *κριθή*, Lat. *Hordeum*, Ita. *Orzo*.

Gal. *Orge*. Ger. *Grosz geist*.

Hordeum optimum est candidum purumq̃: id minus quàm triticum alit. Ptisana tamen ob cremorem in decoctione redditum,



Hordeum.

resina & fimo columbarum concoquit: cum Meliloto autem & Papaueris calyce dolores finit, qui latus excruciant. Aduersus intestinorum inflationes cum Lini semine, Fœnogræco, & Ruta illini iuuat, strumas cum pice liquida, cera, oleo, & impubis pueri urina, ad concoctionem perducit: & cum Myrto aut uino, aut Malicorio, aut syluestribus Pyris, aut rubo, alui profluvia sistit: podagricis inflammationibus, cum cotoneis aut aceto prodest. Decocta in acri aceto, modo quo hordeaceum cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Cremor uero farinæ ex aqua, atque cum pice & oleo decoctus, puri mouendo est: cum aceto subactus itidem, & cum pice: contra articulorum fluxiones prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflammationesq; mitigat.

Multæ Hordei sunt species, vt è granis patet & spiciis. Grana quibusdam rotunda, parua, & in se contracta, in alijs longa & maiora. Spiciarum alia granorum ordines duos habent, alia tres, alia quatuor, & postremum alia quinque, & sex. Ad hæc spiciarum quæpiam longa sunt & rara, quadam breues & granis referta: quadam altius à folijs protensa, alia humiliores & folijs propinqua. Est & granis suum discrimen, siquidem alba & rubra sunt, ex quibus maior farinæ copia, quam ex albis colligitur. In Francia habetur Hord n̄ mundum, quod cribro excussum mundum exeat. Vertitur in Lolium iisdem de causis, quibus Triticum. Hordeum frigidum & sicum in primo ordine, & ali quantum absterforium. Paratum quouis pacto Hordeum nihilum magis extalscit: desiccat amplius, si primum torreatur ex eoque polenta fiat. humectat cum eo fit Ptisana. Recentes medici cum Ptisana è Galeni & antiquorum præscripto rationem inire non possent, Hordeum optimè decoquere docuere, & deinde in vase lapideo contritum, setaceo (vt dicunt) panno traducere, strobilosque saccharum, ac amygdalarum lac, aut papaueris semen adiungere. Panis Hordeaceus stomachum onerat, frigidos & crassos humores gignit, modicè nutrit, ventum precreat, sunt tamen qui dicant podagra prodesse.

Zitum. C A P.

LXXIX.

NOMENCLATURA.

Græ. Ζῖθος, Lat. Zytum. Ita. Zitho,
Gal. Bierre. Ger. Byer.

EX Hordeo potius fit, cui Zytho nomen est: is urinam cit, renes & nervos tentat: membranis, præsertim cerebrium uesientibus, officit, inflationem parit, uitiosum succum creat, elephantiasin gignit. Perfusum Zytho ebur, obsequiosum & operi tractabile redditur.

Curmi.

Curmi. CAP. LXXX.

NOMENCLATURA.

Græ. κοῦρμι Lat. Curmi.

Gal. Ceruoise.

Fit & ex hordeo potus, quem Curmi nominant, eoque sæpè potu pro uino utuntur. uerùm dolo rem capitis mouet, malum succum gignit, neruis nocet. Consimilia etiam potus genera ex Tritico fieri solent, in Iberia, quæ occidentem spectat, & Britannia.

Zytum & Curmi apud veteres vsitata quibusdã regionibus potacula fuisse, quæ tamen differunt à ceruisia & Biera nostratibus.


Zea, seu semen.

CAP. LXXXI.

NOMENCLATURA.

Græ. Ζεα. Lat. Zea, seu semen. Ita, Spelta.

Gal. Espeautre. Ger. Blüthen.



Curmi.

Zea duorum generum est: una simplex, altera in geminis putaminibus graminata. Ela genus, ob id Dicoccos appellatur: plus quam hordeum alit: ori grata, digeritur in panificia, minus quam triticum alens.

Zea ipsissima est Spelta, & ex ea in ligneo mortario contusa & trita fiebat antiquis halica. Zea, Galeno, medium tenet locum inter Triticum & Hordeum.

Crafsior farina.

C A P. L X X X I I.

N O M E N C L A T V R A.

Græ. κριμνον. Lat. Crimnon. It. Crimno.

Gal. Res non satis nota. Ger. Krietsz.

Crimnon crafsior est ex zea triticoq; farina, ex qua pultē faciunt. Abundē alit, facile conficitur: aluum uehementius astringit, si zea, ex qua fit, prius torreatur.

Crimnus crafsior zea, aut Tritici crafsior farina est, qua ad pultē conficiendam antiquitus utebatur, & diu locum panis tenuit.

Siligo. C A P. L X X X I I I.

N O M E N C L A T V R A.

Gr. ὀλυρα. Lat. Olyra. Ita. Olira

Gal. Espece d'Espeautre.

Eidem generi Siligo adscribitur, sed minus aliquanto nutrit: in panes, ut zea, cogitur. Fit quoq; è Siligine crafsior farina, quam Græci Crimnon uocitant.

Olyra zea species medijs temperamentis inter Triticum & Hordeum, non est nostrum Secale, siquidem ex Olyra dulcissimus fit panis, è Secali amarus & inspidus, & famelicis tantum utilis: Nec itidem antiquorum siligo, è qua antiquitus fieret candidissimus & leuissimus panis, & ex Olyra, dulcis. Quin & ipsi Galeno, vox hac, Σιλιγίς, qua Latinis siligo dicitur, græca non est dictio, nec ullam Græci habent, qua

Latinum

Latium nomen exprimant. Quod profecto dicturus non fuerat, si Olyra Siliginem reddidisset. Ex his apparet Olyram, Siliginem, Secale, frumenti species esse diuersissimas.

Athera.

CAP. LXXXIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀθήρα. Lat. & Ita. Athera.

Gal. res ignota. Ger.

Kindersapp.



Tragus

Athera exz ea fit tenuis
simè molita. Est autem
forbitio, quasi liquida pulicu
la, infantibus conueniens, &
cataplasmatibus efficax.

Athera forbitiuncula secun
dum diuersos authores, ex
Tritico, Hordeo & Amydo fieri
potest. Id pulvis genus germani
edendum panis vice, non lactanti
bus tantum apponunt, sed in ipsas
etiam mensas euocant. Id eis fit è
farina, lacte & butyro.

Tragos. CAP.

LXXXV.

NOMENCLA
TURA.

Græ. Τράγος. Lat. Tragus cerealis.

Ita. Trago. Gal. Ble Turguet. Ger.

Hamelsorn.

•

4

Tragos

Tragos quandam Halicæ frugis figuram gerit: multò minus quàm zea nutrit, quod multū aceris habeat: quare agrius conficitur, aluumq; magis emollit.

Tragus peregrinum & Orientale frumentum, nobis edacitate teporum deperijt, itidem vt alia multa plantarum genera quæ reteribus Romano florente imperio ex Oriente afferebantur, quæ postliminio quoquam in terras indigenas rediere.

Auena. CAP. LXXXVI.

NOMENCLATURA.

Gr. Βρώμη & Lat. Avena. Ital. la Vena.

Gal. Auoinc. Ger. Wberß; Haser.



Auena.

aceto. Panis Auenaceus cum oleo rosarum & aqua illitus, emollit abscessus, & cum aqua mellata duritias.

Avena genicula quædam habet: folio & stipula triticum imitatur & in cacuminibus dependentes paruulas ueluti locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur, utile ad cataplasmata uti hordeum. Pulvis huius laus sistitur, prodest iussentibus in sorbitione succus.

Est Avena frumenti species: Est Avena sterilis. Vim eandem cum hordeo habet, indita emplastris digerit, aliquantum astringentior, ut laxum corpus restringat. Galeno commo tempore Avena editur cum uino dulci sapa aut uino melato. Nauos tollit farina Auenacea illita cum

Oriza

Oryza. CAP. LXXXVII.

NOMENCLATURA.

Gr. ὄρυζα. Lat. Oryza. Ital.

Riso. Gal. du Ris.

Oryza frugū generis est, in palustribus riguisq; nascens. Mediocriter alit, sed aluum suprimat.

Oryza cui temperatum barbaries Riz i nomine indidit modice corpus astringit maximè si vt Halica coquatur, difficilius tamen digeritur, & minus nutrit, atque adeo i pso gustu insuauior est.

Halica. CAP.

LXXXVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. ὁρίδα. Lat. & Ital. Halica.

Gal. & Off. res nō perinde nota.

Halica fit ex ea quam Dicoccon appellauimus: plus alit quàm Oryza, aluum magis cohibet, stomacho longè utilior. Decocta in aceto illitaq; lepras tollit, unguium scabritias extricat, incipientibus agilops medetur. Decoctum dysentericis, quos excruciat dolor: infusum, idoneum est.

Plinius quo pacto antiquitus Halica fieret, docuit. Tundebatur in pila lignea donec granum à tunicis secerneretur: tundebatur rursus, sic tusa cribro secernebatur, pars subtilis à media, media à crassiori, atque ad eum modum tres Halicæ species fiebant, atque huic postremum creta alba miscebatur, quæ teneriuscula & candidiuscula è Puteolis afferebatur, addebatur & gypsum. Nec tamen putandum est non expurgatā prius à creta & gypso Halicā, aut manducasse veteres aut in vsus medicinæ sumpsisse. Siquidē manducatū gypsum, vias spirituum opilat & suffocat. Proinde veteres Halicam lauabāt, & hodie fit in gimbere, quod è terra rubra, qua illitum vt duret. eluitur. Halica Galeno frumeti species est validissima, viscosi natura humoris, vt aqua cum vino mellato incoquatur, aut cū vino dulci, aut austero, aut oleo, aut sale. Hæc vt decet concocta, colata, & condita, eis prodest qui punctiones

o s

sentiant


sentiunt in intestinis, aut ob humores biliosos, aut quavis alia de causa. Hæc scripsi non inscius Alicam diuersis apud antiquos frumenti speciebus fieri, sed hæc enumerare, cum ea vti desiderimus, superuacaneum fuerit, ratus satis ipsam apertius deliniasse, quando apud authores eius frequens fit mentio.

Milium. CAP. LXXXIX.

NOMENCLATURA.

Gra. Κέϋϋρος. Lat. Milium. Ita. Miglio.

Gal. Millet. Offi. nomine Latino utuntur. Ger. Hysen.



Sorgi.



Milium.

Milium in panes coactum, minus ceteris frugibus alit, sistit pulte sua aluum. Vrinam cit. Torretur Milium, feruensq; in sacco ponitur, ut torminibus, reliquisq; doloribus, si foueatur,

ueatur, auxilio sit.

Milium Harundineis folijs & iuba, frigidum est primo ordine, & siccum tertio, aut in fine secundi. Minus nutrit quouis alio frumenti genere, desiccatur & astringit corpus, calidum extrinsecus in sacculis applicatum, morbos discutit, qui mordacibus medicamentis non egeant. Desiccatur illud emplastri modo: at enim adeo detrita & sicca farina, ut difficulter liquoribus misceatur. E Milio panis aridus est & friabilis, arena & cineri similis, siquidem crassum est Milium, & aliquantulum viscosum. Rustici antiquitus edebant Milij farinam lactis permixtam. Et nostro hoc seculo carbonarij in valle Anania tantum se (ut faciunt) laborem ferre non posse Matthiolo nullo alio cibo assiruarunt, quam eo qui est Milij farina & lacte conficitur.

Panicum. CAP. XC.

NOMENCLATURA.



Panicum.

Græ. Ελυμος. Lat. Panicum. Ita. Panico. Gal. Paniz. Ger. Pfemich.

Panicum frumētaceis seminibus annumeratur, Milio simile. Eodemque modo in panes subigitur, eosdem habet usus, minus tamen & nutrit & stringit.

Non ignotum est Panicum Milio simile, & quod ad eius facultatem attinet, modicè nutrit & desiccatur. Fluxus corporis sistit, ut Milium, et extrinsecus applicatum, refrigerat et desiccatur.

Græ.

Sesama. CAP. XC I.

NOMENCLATURA.

Gr. Σησαμω. Lat. & Offi. Sesamum. Ita.

Sisamo. Gal. de la lugliome. Ger.

Leindotter.

Sesama stomacho inutilis cibus: halitus gravitatem facit, quoties inter mandendum commissuris dentium inhaesit, nervorum crassitiem illi discutit: medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerastæ morsibus: capitis dolores, qui aestuatione concitantur, ex rosaceo lenit: eadē efficit herba decocta in uino: praesertim inflammationibus oculorum doloribusq; prodest. Ex ea fit oleum, quo Aegyptij utuntur.

Sesami semen notum est officinis, & non perinde ipsa planta, nec in Italia feritur, quod terras admodum macilentiores reddat: è Graecia affertur & Peloponneso. Quidam frumenti, quidam leguminum generi adnumerant, culmo est farulaceo, solijs sanguineis, semine candido, quod vasculis ut papauer continetur, radice simplici & alba. Aestiva Sesama quadraginta diebus maturatur a flore. Sesami semen praepingue, ideoq; conditium oleum contrahit naturam, quapropter vescentes confestim implet, & redundantiam parit, stomachique in vomitiones effundit, tardè conquoquitur, pingue ministras alimentum: nec ventrem firmat, nec roborat, & cum crasso constet succo, nec descendit facile, nec permeat rarus solius usus. Melli tamen crudo permisetur, ut in placentas concreseat, quae Graeci Sesamides appellantur. Calida prae ditum est natura, quam ob causam siti mandentes excruciat. Epiphoris oculorum & doloribus illinitur decocta in vino herba.

Lolium. CAP. XC II.

NOMENCLATURA.

Gra. Αἰλα. Lat. Lolium. Ita. Gioglio.

Gal. yuroye.

Lolium

Lolium quod inter segetes nascitur, molitum, illitu nomas, putrescentia ulcera, gangranasq; emarginat. Sanat cū Raphanis, sale & aceto seros lichenas: & ex aceto & sulphure uiuo, lepras: strumas quoque discutit, cum fimo columbino & Lini semine decoctum in uino rumpit quæ ægrius ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua mulsa utilissimè ischiadicis illinitur: si cum polenta, Thure, Myrrha, aut Croco suffiatur, conceptionem adiuuat.

Lolium, Latinis degenerans frumentum, Dioscoridi inter hordeacea & triticea sata nascitur, terra humidior, aut vere pluuio & frigido. Pseudomelanthium, Lolium non esse ex capite de Phœnice quarto libro apparet. Ibi dicit Dioscorides, Phœnicem spicam proferre Lolio similem, quæ claret Lolium spicam, non caput, aut calycem proferre, ut Pseudomelanthium, Papauer, & similia. Lolium ebrietatem & somnolentiam inducit. Calidum est tertij ordinis initio, & siccum in fine secundi.

Amylum. CAP. XCIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀμυλον. Lat. Amydum. Ita. Amydo.
Gal. Amydum.

Amylum ex eo appellatum est, quod sine mola fiat. Optimum ex trimestri, natione Creticum aut Aegyptium. Ratio faciundi Amyli hæc est: Purgatum trimestre triticum madescit quinquies die, & si fieri potest, nocte: cum emollitum fuerit, effunditur sensim, sine agitatione, aqua, quo minus cremor utilis unà excludatur: ubi molliissimum esse uidetur, mutata aqua pedibus calcari oportet: rursus infusa, teri: tum demum enatantes ibi furfures incerniculo eximendi, reliquumq; quallo sportisq;

sportisq; siccatum tegulis novis confestim torreatur flagrantissimo in sole: namque si paulisper udum maneat, acorem concipit. Contra fluxiones oculorum, pustulas, cana q; ulcera efficax est: sanguinis reiectiones potu cohibet. Exasperatas fauces lenit, lachryae atque obsonijs admiscetur. Fit etiam Amylum ex Zea, quae maceratur ac eluitur uno aut altero die, & subacta farina modo manibus subigitur, pressaq; feruentissimo in sole, ut antè retulimus, exiccatur: nullius in medicina usus, ad alia tamen conueniens.

Selectum Amylum (quod Amydum officina vocant) probatur lenitate, lenore, atque ut recens sit. Plinius eius inuentionem Chio insula tribuit. Fit ex omni tritico & siligine, & maxime trimestri. Amylum Galenus ex tritico confici tradit, viribus partes exasperatas lenigandi pollere, quod ab arida constringente acrique proficiscitur corpulentia, ad quod obeundum opus, diluta quaedam facultas quaritur omnis qualitate expers. Amylum similem elotis panibus naturam sibi venduat, in alendo maiori tenuitate praeditum: nec tamè aperte calfacit, sicut nec elotus panis, quod tamen alijs est donatum panificijs. Amylum & ex Zea fit, macerata aqua die vel biduo, & axungiae instar manibus impresso, nec non accerrimo in sole resiccato. Est & placentae genus Amylum, sed hoc nihil ad Dioscoridem. Amylum membrorum aspretudines leuigat, sistit aluum, & sanguinolentam excretionem. Datur in doloribus vesicae aliquantum calidum, dimidiata unciae pondere, cum ovo & vna passa.

Fœnumgræcū. CAP. XCIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. τῆλῖς. Lat. & Offi. Fœnumgræcum. It.

Fœnogræco. Gal. Senegré. Ger.

fenigrec.

Fœnigræci farina vim habet emolliendi discutiendiq; in aqua mulsa decocta aduersus tam internas, quam externas inflammationes efficaciter illinitur: lienem cum aceto & nitro extenuat. Succus decocti eius fœminarum malis subuenit: & siue



Fænumgræcum.

sive tumor, sive præclusio sit
uulnæ, fouentur, & insidēt.
Fænigræci in aqua decocti
cremor expressus, capillos,
furfures, & manantia capi-
tis ulcera purgat: locos dila-
tat & emollit, si cum anseri-
no adipe pessi uice subijcia-
tur. Viride cum aceto utilis-
simum imbecillibus locis, et
ulcera sentientibus. Decoctū
eius prodest aduersus tenes-
mos fætidadāq; dysenterico-
rum proluuiē. Oleū quod ex
eo exprimitur, & Myrto,
capillos & genitalium cica-
trices abstergit.

Vulgare & notum officinis Fænigræci semen. Fænumgræcum cali-
dum est secundo ordine, & siccum primò, ideòque abscessibus cali-
dis illitum, amplius incendit. Eò fit vt minus calidis & durioribus con-
ueniat.


Linum. CAP. XC V.

NOMENCLATURA.

Græ. λίνον. Lat. Linum. Ita. Lino.

Gal. Lin. Ger. Lein.

Linum uulgo notum est, cuius semē easdē quas Fænumgræ-
cum uires habet. Discutit et emollit omnem intus forisq;
inflammationē, cū Melle, oleo, exiguaq; aqua decoctū, aut Melle
cocto



Linum.

cocto exceptū: vitia cutis in facie uarosq; crudū tollit. Illitū cum Nitro & ficulneo cinere, parotidas duritiasq; discutit: ulcera quæ serpunt, fauosq;, cum uino decoctum expurgat: ungues scabros eximit, cum pari modo Nasturtij & mellis: vitia pectoris extrahit, si ex melle in eclegmatis uicem substituatur: tuſſim lenit, uenerem stimulat, si farina Piperis & Melle exceptum, pro placēta largius adsumatur. Huius decoctum interaneorum uulnūq; erosionibus immittitur, alui excrementa euocat: ad uulnū

inflammationes in deſſeſſionibus perquam utile.

Oleum seminis Lini mirabilis est effectus in spasmus. Valet ad emolliendas neruorum & iuncturarum duritias, confert omnibus sedis malis, & duros ſeminarum locos mollit. Flotum cum aqua Rosarum aut Nenupharis, admodum prodest ambuſtis, & ad cauteriq; cruſtas emarginandas. Sunt qui in luteris dolore bibendum præbeant, triū aut quattuor dragmarum pondere, mirabili effectū, præcipuē cum recens datur, & ineunte morbo. Semen Lini calidū est ſere primo ordine, & medium inter ſiccū & humidū.

Cicer. CAP. XCVI.

NOMENCLATURA.

Græ. Επεβιβος. Lat. Cicer. Ita. Ceci.
Gal. Ciche. Ger. Riehern.

Cicer.

nes, scabiem, & impetiginem emundant. Discutiunt qui sub auribus enascuntur abscessus, in duritias testium atque adeo in vlcera maligna potentes sunt.


Faba. CAP. XCVII.

NOMENCLATURA.

Græ. Κύαμος. Lat. Faba. Ita. La Fava.

Gal. Feues.

Ger. Bon.



Faba.

Faba inflationem excitat, agrè concoquitur, tumultuosa somnia facit tuſſi confert, carnem gignit, media calidi frigidiq; natura. Decocta in poſca, & cum ſuo cortice eſitata, dyſenterias & cæliacorum profluua ſiſtit: contra uomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior contrahitur, ſi aqua prior inter coquendum abijciatur, uiridis plus negotij ſtomacho exhibet, maioremq; flatum parit. Lomentum eius & per ſe, & cum polenta illitum, inflammationes quas uulnus excitauit, mitigat, cicatrices cõcolores facit, turgentes grumoso lacte mamas, etiã ſi inflammatione tententur, adiuuat, lac reſtinguit, ſuvunculos, ſugillata, parotidasq; cum Fænigraci farina & melle diſc

discutit: cum Rosa autem Thure & oui candido, procidentes oculos, tumores, uuasq; reprimat. subactum uino, suffusiones & ictus oculorum recreat. Manducata sine cortice Faba, ad auertendas fluxiones fronti illinitur, Decocta in uino testium collectiones sanat, quò tardius pubes erumpat, pueris imò uentri illinitur, uiriliginem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascuntur, gracilescunt, & minus alimenti capessunt: cū polenta, scisso Alumine, & uetere oleo impositi cortices, strumas discutunt: decocto earum lanæ inficiuntur. Faba dempto cortice in illas partes diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluxionibus ab hirudine concitatis: nanque eas suppressit, si semisecta apprimatur.

Faba non multum absunt à temperamento desiccatorio & infrigidante. Pulpa absterforiæ quadantenus est facultatis, tunica aliquantum astrictoriæ sunt participes. Quantumuis Faba coquantur, flatuosam tamē (ut ptisana) qualitatem non exuunt. Fabarum substantia nec densa est nec grauis, ut fungosa & leuis, & ideo absterforiam aliquantum ut ptisana, vim habent, sordibusque cutis eluendis, poliendis & mundandis corporibus, seu virorum, seu faminarum, parem usum & gradum obtinet, quem Nitrum, spuma Nitri, & absterforia quæuis alia res. Illitæ facies itidem ut ptisana, lentigines, maculas è sole contractas, & omne genus pustulas tollunt. Tali facultate Fabe præditæ, tamen ubi nutriendi ratio habetur, non tardè transeunt, quod in viscosis & densis contingit, in quæis nihil absterforiæ virtutis inest, cuiusmodi sunt Tragum, Alica, Amylum, & similia. Frixæ Fabe ut flatum amittunt, non perinde faciliè digeruntur. Tarde è stomacho exeunt, & toto corpori grossum nutrimentum gignunt. Quæ recentes & immaturæ eduntur, multum humidi nutrimenti procreant, & ob id maiorem superfluitatum copiam, non in vijs tantum alimentarium & interiorum membrorum, sed in toto generatim corpore. Ed fit ut minus nutriant, & celerius pertranscant. Porro non ignorandum flatuosos omnes cibos cum his corrigendos rebus quæ exalessaforiæ & desiccatoriæ sunt facultatis.

Faba Aegyptia. CAP. XC VIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Αἰγυπτία & κὺμα. Lat. Faba Aegyptia.

Ital. Fava d'Egitto. Gal. res non satis nota.

Aegyptia faba, quam aliqui Ponticam uocant, in Aegypto plerunque prouenit, in Asia etiam Ciliciaeque lacubus inuenitur. Folia habet ampla, etiam si ad arborum frondes comparentur: caulem cubitalem, digiti crassitudine: florem roseum, dupla Papaueris amplitudine, & ubi flore exiit, fert folliculos uesparrum sauis similes, in quibus Faba supra operculum, bullantis ampullae modo, prominet. Ciborion ideo nominant, id est, arculam, quoniam seratur ipsa, humenti glebae mandata, & ita in aquam demissa. Radice firmatur harundine crassiore, quae cruda coctaeue estur, ei Colocasiae nomen est. Faba uirens manditur, & exiccata nigrescit, uulgarem magnitudine superat. Adstringendi facultatem obtinet, & stomacho utilem. Dysentericis, coeliacisque prodest, insperso, polentae uice, lomento: datur quoque in pulte. Cortices in uino mulso decocti, si terni inde cyathi bibantur, magis proficient. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio uiride spectatur, gustu amarum, si tritum & cum Rosaceo coctum instilletur.

Faba Aegyptia nihil nostratis Fabae praeter nomen referens, Colocasiae Aegyptijs ubi ab inundatione Nili nascitur, & Dioscoridi in Asia & Ciliciae lacubus, prouenit referente Matthiolo in quibusdam apud Venetias, & Neapolitanis hortis, quo loci uinere uidetur etiam aquae non implata. Fabae Aegyptiae, Galeno, ut nostratibus maiores itidem & humidiores, & magis superfluis humoribus replent corpus.


Lens. CAP. XC IX.

NOMENCLATURA.

Gr. φακὶς. Lat. Lens. Ital. Lenticchie.

Gal. Lentilles. Ger. Linsen.

Lens



Lens

Lens frequenti cibo
 aciem oculorum ob-
 tundit, ægrè concoquitur,
 stomachum malè habet,
 eumq; & intestina inflat,
 sed aluum cum cortice co-
 cta sistit. Præstat in cibo
 quæ facillimè coquitur, ni-
 hil atri in maceratione red-
 dens: uim habet adstringē-
 di, qua ex caussa aluum cohi-
 bet, si detractō antea cortice
 discoquatur acuratè, primaq;
 aqua inter coquendum effun-
 datur (quippe primum id de-
 coctum uentrem resoluit) so-
 mnia tumultuosa excitat: ca-
 piti, neruis, ac pulmōni inutilis: melius suo fungetur munere cō-
 tra alui fluxiones, addito cū aceto Intybo, aut Portulaca, aut Be-
 ta nigra, aut baccis Myrti, aut putamine Punici, aut aridis Ro-
 sis, aut Mespilis, Sorbisue, Pyris Thebanis, aut malis Cotoneis,
 aut Cichorio, aut Plantagine, cū t Gallis integris, quæ post deco-
 ctionē abijciuntur, uel unarum Rhois, quæ obsonijs insparguntur:
 uerum acetum cum eo diligenter percoqui debet, alias aluum con-
 turbat. Cōtra subuersionem stomachi, triginta grana lentis de-
 librata deuorari proderit. Decocta cum polenta, & illita, po-
 dagras lenit, sinus cum Melle glutinat, crustas rūpit, ulcera pur-
 gat. Decocta in aceto duritias & strumas discutit. Cum Coto-
 neo aut Meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisq;
 addito Rosaceo: sed in amplo sinu aut inflammationibus sedis,
 quæ maius remediū exigunt, cū putamine punici, ac siccis Rosis,

p 3

adie

adiecto Melle, decoquitur: nomis quæ in gangranam euaserunt, adiuncta maris aqua, pustulis, & his quæ serpunt, igni sacro per nionibusq; ut antea dictum est: contra mammas in quibus lac in grumos coit, & præ nimia sui copia profunditur, cocta in aqua maris, & illita auxiliatur.

Lentes temperamento sunt frigidum inter & calidum, & desiccant secundo ordine. Hic Dioscoridi Galenus non concinit. Cum enim ea Dioscoridis verba sint, Vim habet astringendi: quæ ex causa aluum cohibet, si detracto antea cortice discoquatur accuratè primaq; aqua inter coquendum effundatur, quippè primum illud decoctum ventrem resoluit. At Galenus. Cortex (inquit) Lentiū vehementer astringit, carnea tenuiter substantia, quæ & crassi succi & terrestris est. Succus porro Lētis astringenti est contrarius. Quocirca si elixa in aqua in sculum sale, garo, oleoq; conditum bibatur, aluum deiciet. At quod ex his decocta Lente ferculum apparatur, contrariam succo vim obtinet. Nam, quæ ventri obueniunt fluxiones, desiccant, os ventriculi, intestina, & totum deniq; ventrem corroboras. Quāobrem celiacis & dysentericis accommodatus est cibus. Lens vero decorticata, ut illam astringendi vehementiam, cumq; hac, alia videlicet omnia quæ consequuntur amittit: ita alibilior quam integra illa efficitur, crassum prauumq; succum gignens, tardè cōmeans alui tamen fluores haud desiccant, uti ea quæ cortice nō est spoliata. Hac sibi ex diametro cum pugnent, tamen ex Galeni sententia standum est, quem & doctrina clarum, & experientia eximium reddit. Porro quod ad Lentis cibum attinet, ipsa tantum Galeni verba describam. Solis quibus viciosa est habitudo, ob aquam in carne diffusam, Lens cibo vtiliter prebetur, cen aridis & squallentibus admodum damnosè. Eādem ob causam visum integrū & inculpatum hebetat, immoderatè exiccās. Ei vero qui contrario modo se habet, humidiori videlicet, opitulatur. Hæc cum scribat Galenus, qui Lentis edulium temerè sumpserit, quis nō Lenticula vnguentum credere dixerit? His enim nemo sana mentis vte tur, nisi cui è mala habitudine competet.

Phasioli. C A P. C.

NOMENCLATURA.

Gr. φασιόλι. Lat. Phasioli. Ital.

Fagioli. Gal. Phaseoles.

Phasi



Phaseoli.

Phaseoli inflāt, spiritus
cient, agrē coquuntur,
uirides cibo aluum emolliūt,
ad uomitiones idonei.

Sunt Phaseoli in Italia vul-
gares, & diuersarum specie-
rum. Sunt enim candidi, rubescē-
tes, fului, & è diuersis coloribus
variegati. Candidi quibus grae-
num reliquis pusillius est, semi-
nantur leguminū more. At ru-
bescētes, flauī, & variegati se-
runtur in hortis, alijsve locis ubi
vmbra aestiua aucupanda est.
Nam praeter id quod peculiarem
suum fructum reddunt, suis etiā
inuolucris, ac sequaci capreolorū
reptat, cameras, domunculas,
pergulas opacant, ac radios sola-
res inhibent, non aliter quam vi-
tes, Lupuli, Bryonia, Periclyme-

ni, plantaque aliae, quae arboribus & sepibus sese contorquent & in-
uoluunt. Id Phaseolorum genus censent. Matthiolus Smilacem esse hor-
tensem, Smilacēque eundem hortensem, Dolichos esse scriptos à Theo-
phrasto, iiij. Cap. viij. Lib. de Plantarum historia, & à Galeno primo
de facultate alimentorum, libro, & primo itidem Pauli libro. Non sunt
enim Dolichi id Pisellorum, ut ita loquar, genus, quod in Mediolanēsi
territorio Rouiglione, & alibi, Arabeia, quā sub Ocri nomine descri-
bit Galenus, ut claret eo quem modo citauimus loco. Porro hoc capite
Dioscorides de candidis Phaseolis aut Phaseolis loquitur, qui verē Pha-
seli sunt. Siquidem alijs distincti coloribus, Dolichi & Smilaces leues si-
ne satina doctis habentur, & eorum siliqua Lobi.

Eruum.

CAP. CI.

NOMENCLATURA.

P 4

Gra.

Græ. Οροβο. Lat. Eruum. Ita. Orobo.
Gal. Ers.



Eruum.

ERuum parvus frutex omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in ualuulis habens, è quibus farina fit, nomine Eruina, ad medendi usus conueniens. Eruum capiti onerosum est, aluum esu turbat, sanguinem per urinam extrahit: elixo boues saginantur. Paranda farina ratio hæc est: vberiora grana candidaq; deliguntur, permiscendoque aqua resperguntur, donec sufficienter combibant: postea torrentur, usque dum hians cortex disrumpatur: molitaq; farinario cribro incernuntur: postremo farina recoditur. Hæc aluo utilis est, urinam ciet, meliorem colorem efficit, sanguinem per uesicam aut aluum cum torminibus elicit, si largius in cibo aut potu assumatur, ulcera cum melle purgat: lentigines & uitia cutis in facie, & maculas, totumq; corpus emendat: nomas, gangranas, duritiasq; serpere non patitur: mammarum duritias emollit: atra ulcera quæ Therio mata uocant, fauosq; emarginat: carbunculos rumpit: cum uina subacta illitu morsibus uiperarum, canum, hominūq; medetur: urinae difficultates, tenebrosq; ex aceto mitigat. Eruum tabidis, qui alimentum non sentiunt, tostum, & ad nucis magnitudinem melle exceptum, sumptumq; conuenit. Eius cremor per

perniones, & pruritus in toto corpore, sanat fouendo.

EX Alexandria Venetias adfertur Orobi semen Vicia simile, sed id proculdubio nō est verū Orobi semen. Eruum non illa est, quæ Italis (vt diximus) Rouiglione dicitur, quā Galenus, Theophrastus, & Paulus Ocrum vocant, nulla nempe in ea sentitur amaritudo, nec quātumuis manducata, sanguinem per vrinā extrahit, quæ in Orobo verò requirunt Dioscorides & Galenus. Orobus inter frumenta nascitur, sed à paucis noscitur. Dioscorides farinam ex Erui candidis granis eligit, at Galenus candidos in medicina, ruffis & pallidis inferiores facit. Orobus primo ordine excalfacit, & desiccet in fine secundi, & è sua amaritudine abstergit, incidit, & aperit. Sumptus cum melle à flegmate & grossis humoribus pectus & pulmonem emundat.

Lupini. CAP. CII.

NOMENCLATURA.

Græ. *ἄρα*. Lat. Ita. & Off. Lupini.

Gal. Lupins.

Satius lupinus notus est. Cuius farina cū Melle delinctu, aut potu, ventris animalia expellit: ipsi quoque macerati, & cum sua amaritudine esitati, eadem efficiunt. Decoctum eorum idem munus præstat, cum Ruta & Pipere potum: quare lienosis prodest. Eodem ulcera tetra, quæ Theriomata uocant, gangrænas, incipientem scabiem, eruptiones pustularum, ulcera in capite manantia, vitiligines, maculasq; fouere utilissimum: menses & partus extrahit, cum Myrrha & Melle subditum in uellere. Eorum farina cutem liuoresq; corrigit: inflammationes cum polenta & aqua mitigat: tubercula, & coxendicum cruciatus ex aceto lenit: strumas in aceto cocta illitaq; dissipat, carbunculos rumpit. Decocti cælesti aqua, donec in cremorem lentescant, faciem abstergunt: medentur pecorum scabiei, cum radice nigri Chamæleontis, ita ut tepente decocto abluantur.

P S

Cit



Lupini.

Cit urinam radix cum aqua cocta. Lupini triti, ubi maceratu dulcescere ceperint, cum aceto poti, fastidium detrahunt, & cibi aviditatem faciunt. Gignuntur & sylvestres Lupini, sativis similes, sed omnino minores, qui eadem quæ sativi possunt.

Lupini notum legumē apud Dioscoride descriptum, nihil amplius annotationis requirit, præterquam quod eorum farina omnes decoctionis effectus reddit.

Rapum.

CAP. CIII.


NOMENCLATURA.

Græ. ρογγύλη. Lat. Rapum. Ita. Le Rape.

Gal. Naueaux.

Ger. Rueden.

Decocta Rapi radix alit, inflationem parit, humentem ac fluxam carnem creat, uenerem stimulat: decocto podagra, pernionesque foveantur: contritoque Rapo atque imposito iuvantur: si excauata radici Rosaceum ceratum adigatur, & feruenti cinere eliquefcat, exulceratis pernionibus proficiet. Cyma eius decocta manduntur, & urinam ciunt. Semen antidotis & theriacis, præsertim quæ sensum doloris auferunt, anodyna uocant, idoncum est: potum contra uenena salutare est. Uenerem concitat. Rapum muria conditum, minus alimenti sufficit,

*Rapum sitium.**Rapum sylvestre.*

cit, sed multò magis apertentiam recreat. Sylvestre Rapum in ar-
uīs nascitur, fruticosum, in cubiti altitudinem assurgens, ramo-
sum, laue: in cacumine folia fert laua, digitali latitudine, aut
maiora: & fructum in siliquis calyculatis: cumq̃ eorum inuolu-
cra aperiuntur, alia intus siliqua spectatur, quæ quandam capi-
tis speciem præbet, in qua semina paruula concipiuntur, foris ni-
gra, intus alba. Additur in medicamenta quibus ad detergen-
dam cutē in facie, totoq̃ corpore utimur, præsertim quæ ex Lu-
pini aut Erui, Tritici aut Loly farina, fieri solent.

Rapa domestica triū sunt generū, prassa lōga, rotūda. Quæ astate
seruntur immunia redduntur à bruchorū & erodentiū animalcu-
lorū iniuria, cōmixta sationis tēpore semini fuligine, aut macerato per
noctē in succo Aizoi semine. Columella id vt rē expertā asserit: hic obser-
uādū Rapū sylvestre fructicosius esse Raphano sylvestri, & multas alas
ramu

ramulosque ad latera spargere, in quibus lutei flores, nasci in arvis pinguibus, radice pollicem crassa: At Raphanum sylvestrem pallidioribus constare, & parua radice.


Napum. . CAP. CIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Βουβίς. Lat. *Napus*. Ita. *Nagoni*.
Gal. Raues.



Napum.



Radix

Coëla Napi radix inflat, modicum alit. Semen eius potum
uenenorum vires hebetat: antidotis admiscetur. Condi-
tur sale radix.

Napo

Naporum Theophrastus & Plinius plura faciunt genera, cum nostro tempore candidi tantum & crocei reperiuntur. Crocei crassiores licet, & oculis magis adblandiantur, in suauiores tamen gustu sunt candidis. Aegyptij è Naporum semine oleum conficiunt.


Radix. CAP. CV.

NOMENCLATURA.

Græ. ῥάφαν & . La. & Off. Radix, Rhabbanus.

Ita. Radice. Gal. Resort.

Ger. Raeticg.



Rhabbanus.



Rhabbanus sylvestris.

Radix, quæ Græcis Rhabbanus dicitur, excalfacit, flatus gignit, ori suavis est, sed stomacho aduersatur, ructus ciet, urinam pellit aluo aptior, summo tamen cibo sumi debet, quò magis eius distributionem adiuuet: cum autem præsumitur, cibum suspendit, quare uomituris commodissimè datur ante cibum

bum. Sensuum aciem excitat: decocta contra ueterem tuſſim.
 & pituita craſſitiem in pectore, efficax eſt. Cortex ex aceto
 mulſo, celerius uomitiones mouet: hydropicis commodiſſimè il-
 limitur, lienosis utilis ſugillata cum Melle rapit, & nomas amo-
 litur: contra uiperarum ictus auxiliatur, alopecias ad pilum re-
 ducit: lentigines cum Loliacea farina emendat: his qui ſungis
 ſtrangulantur, tam cibo quàm potu ſalutaris eſt. Semen uom-
 itiones facit, urinam mouet, menſes cit, lienē extenuat, cum ace-
 to illitum gangrenas ualidiſſimè emarginat, coctum cum ace-
 to mulſo, anginis per quā utiliter gargarizatur. Contra Ccra-
 ſtis morſus, potū ex uino, auxilio eſt. Sylueſtris Rhaphani, quā
 Romani Amoraciā uocāt, folia ſatiuo ſimilia, ſed magis Lam-
 pſanam imitantur: radix gracilis, tenera, ſubacris. Tam folium
 quàm radix in olera recipitur. Sed hæc excalfacit, urinam
 concitat, aſtuofa eſt.

Rhaphanus qui & radix, & Radicula Latinis, diſtinguendus ab
 herba lanaria radícula, quæ etiam Radicula ſimpliciter dicitur,
 Græcis ſtruthion, à Rhaphano diuerſiſſima. Eſt Rhaphanus ſatiuus,
 eſt ſylueſtris, qui Armoracia Latinis nuncupatur. Rhaphanus ſatiuus
 calidus eſt tertio ordine, ſucus ſecundo: Armoracia in his duabus qua-
 litatibus ſupereminet. Semen tota planta potentiſſe eſt. Digerit, ob idq;
 liuidis & cōtuſis conuenit. Acres ne ſint Radicula è folijs agnoſcitur, nā
 earū lauor etiam nō guſtata radice, minorem eius acrimoniam denotat.

Sifer.

CAP.

CVI.

NOMENCLATURA.

Græ. Σίσαρον. Lat. Sifer. Ita. Sifaro.

Gal. Cheruy.

Sifer uulgo cognitum, cuius radix decocta ori grata eſt, &
 ſtomacho utilis, urinam ciet, & appetentiam inuitat.

Sifer

*Sifer satium.**Sifer sylvestre.*

Sifer omnium radicum quæ edēdo sunt saluberrima. Hanc Tyberius princeps flagitabat omnibus annis à Germania: nonnihil amaritudinis cum astrictione pauca respicit. Radix grata stomacho. Urinā proritat. Galeno secundi est excoficientium ordinis. Paulus in tertium asserit. Sentit & semen tenuium esse partium, & discutiendi naturæ constare, ac idēo singultientibus & torminosis ex vino dari.

Lapathum, siue rumex.

CAP. CVII.


NOMENCLATURA.

Græ. ῥάπαθον. Lat. *Lapathum*. Ita. *Rombice*.

Gal. *Ozeille*. Ger. *Meugel*.

Ex generibus rumicis, Oxylapathū uocant, quod in acutū tendit, prædura habēs extrema, nō nisi palustribus nascēs.

Al.



Lapatum acutum.

aut uino utiliter bibitur cōtra dysenterias, & celiacorum affe-
ctus, stomachi fastidia, scorpionum iclus: quod si quis in potu
præsumat, nihil molesti ex iclu patietur. Radices ex aceto co-
ctæ aut illitæ crudæ, lepras, impetigines, & scabrosos ungues per-
sanant: sed antea locus aceto & Nitro in sole perfricandus est.
Pruritus corporis decoctum earum sedat, si soueatur, aut in so-
lis balnearum confricetur. Coctæ in uino & instillatæ, aurium
dentiumq; dolorem mulcent, strumas parotidasq; discutunt:
lienem cum aceto extenuant: Aliqui amoliendis strumis ra-
dicum gestamine utuntur, eas collo appendentes: tritæ & ad-
motæ sceminarum profluvia sistunt: cum uino autem potæ,
regio morbo medentur, calculos uesicæ comminuunt, men-
ses cient, scorpionum iclibus auxiliantur. Hippolapathon
olus

olus est magnum, in paludibus nascens: easdem habet vires, quas supradicta rumicis genera.

Rumicis seu Lapati multa produntur genera. Oxylapathum in palustris nascens, in cacumine acutiora duraque folia habet, ob id non strates officina Lapati acutum nuncupant. Alterum genus hortensis, illi dissimile. Tertium sylvestre, paruum, Plantaginis figura, molle, humiliter fructicans, Acidula aut minuta Oxalis vulgo dictum. Quartum genus alij Oxalidem, alij Anaxaridem, alij Rumicem syluaticum appellat. Huius folia sylvestri & exiguo similia sunt, caulis teres, sesquicubitu altus, semine rubro in mucronem acuminato, quod foliaceo vestitur inuolucro, sapore acris, ex scapo adnascantibus cauliculis erumpente. Id partim seritur, partim sponte in incultis provenit. Omnibus exploratum, quod plerumque iuribus incoctum valet, & in acetarijs crudum singularem habeat gratiam. Quintum, carnibus intingendis succi viridis accrementum subministrat, nec aliud in obsonijs maiorem sibi vendicauit auctoritatem. Omnes ferè, quod gratum acorem palato representet, Acetosam ceperunt appellare. Gallicum vulgus oxalim adhuc imitatione græca nuncupat, aliqui oxellam, alij vinetam. Huius semen rubrum in mucronem emissum desinit, ceteraque Dioscoridis pictura suffragantur, quare nemo Rumicem acetosum id esse genus, ibi inficias. Est & Hypolapathum olus magnum, officina grandem oxillam, vulgus parellam vocant, paludibus familiare. Lapathum discussoria facultate praeditum est. Oxilapathum mixtas sibi vires vendicauit. Nanque discutiendi & repellendi natura donatum est. Sed omnium semen, tum maxime Oxilapathi manifeste constringit, ita ut dysenteriae & alui profluuium medeatur.

Lampsana. CAP. CVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. λαμψάνη. La. Lampsana. Ita. Lasana.

Gal. Sanues blanches. Ger.

W. Bisd. Koel.

Lampsana sylvestre olus est: plus alit quam Rumex, & stomacho utilius. Cuius folia caulesque coquuntur in cibo.

Lampsana, Plinio, olus sylvestre est, pedalis altitudinis, trium foliorum Napi simillimum, nisi candidiore essent flore. hac se apud Dyrachium vixisse milites Iulio Casari, in triumpho, iocis militaribus exprobauerunt. Rura hanc sanuas albas vocant, quasi sylvestres napos.

9

Vulgares

Vulgares *Lampfana* flores amicissimos apibus creant, & fauorum ce-
tas exuberant. In cibo noxium humorem creant. Illa detergendi di-
scutiendique naturant habent.

Bunium. CAP. CIX.

NOMENCLATURA.

Græ. Βούβιον. Lat. *Bunium*. It. *Bunio*.

Gel. Herbe à charpentier. Ger.

Barbren.

Bunium caulem emittit quadrangulum, & in eo foliosos
ramulos, tenues, prætenuibus foliis & flosculis scatentes,
longitudine digitali: folia propter radicem, Apio similia, sed
multò tenuiora, & quæ modo quodam folia Tribuli imiten-
tur. flores Anethi semen odoratu, minus *Hoscyamo*. Excalfa-
cit bunium, urinam ciet, secundas detrahât, lieni, renibus & ue-
sicæ utile. Eo humenti aridûe utuntur, exempto radice & cau-
libus succo, ex aqua mulsâ.

Bunium vulneraria herba est, & vulgò carpentariâ dicitur, quod
vulneribus è securi & dolabra acceptis subito medeatur.

Blitum. CAP. CX.

NOMENCLATURA.

Græ. Βλῆττον. Lat. *Blitum*. It. *Biedoni*.

Gal. Porree rouge. Off. idem cum beta faciunt.

Ger. *Mayer*.

Blitum estur oleris modo, alio utile est: nullius in medici-
na usus.

Blitum rubes est & album, utrunque notum, iners olus, ac sine sa-
pore & acrimonia vlla, nullo in medicina momento, leuissulam
quidem alui deiectionem moliri potest, nullum tamen accrementum in-
trosum



Blitum.

nitrosum ve possidet ingenium,
quo valeat intestina ad iustam
excretionem laceßere.

Malua. CAP.

CXI.

NOMENCLA-
TVRA.

Gr. μαλάχη. Lat. & It.

Malua. Gal. Malue.


Ger. Moennsch

Sappel.

Malua satua esui lon-
gè aptior sylvestri,
stomacho aduersatur, aluum iuuat: sed multò magis cau-
les, interaneis & uesicæ utilis. Cruda folia cum salis exi-
guo manducata, ægilopas ex melle sonant: nerum cum cica-
tricem trahere cæperint, ea demum citra salem utendum est.
Contra aculeatos apium uespriumque ictus, illita efficax est:
eadem cruda cum oleo trita peruncti, non feriuntur. Vlcera
manantia in capite, fursurèsq; cum urina sanat: sacris igni-
bus & ambustis decocta folia, tritaque, utilissimè ex oleo im-
ponuntur. Eius decoctum uuluas in seßione mollit: prodest ero-
sionibus uesicæ, & intestinorum, uulvæ, sedisq; clystere insu-
sum. Ius decoctæ cum radice sua, contra omnia uenena au-
xiliatur, si continuò à bibentibus reuomatur. Contra Pha-
langiorum morsus remedio est, lac euocat. Semen in uino

q 2

potum

*Malva vulgaris,**Malva sativa.*

potum, addito Loti sylvestris semine, vesica cruciatus lenit.

MAlva hortensis est & sylvestris. Est etiam Rosam referens Malva, nostro tempore in hortis frequentissima. Malva, quam veteres hortensē vocarunt, penē nullibi nostra incuria colitur. Galeno Malva hortenses sylvestribus humidiores, proinde viscosum quippiam in se continent Malva hortenses. Eadem manifesta non infrigidant, nimirū tepida caliditate praeclata. Conditae cum oleo & sale citius descendunt, cum aliis tamen non tardent.

Atriplex. CAP. CXII.


NOMENCLATURA.

Græc. ΑΤΡΙΠΛΗΞΙΣ. Lat. Atriplex. Ita. Atriplice.


Gal. Arrouches. Ger.

Scherfj mastet.

Atriplicem



Satiuus.



Syluestris

A Triplicem aliqui Chrisolachanon uocant, cognitum olus est. Duo eius genera: syluestre & satium. Coelum est ut olus. Aluum mollit, panos discutit, siue crudum, siue coelum illinatur. Semen cum aqua mulsa potum, regium morbum sanat.

A Triplex vulgatum olus humidum in secundi ordinis medio, & frigidum in primo, & quod fluidum corpus faciat, permeat celeriter. Absterforium est Atriplicis semen, ac ideo regio morbo conueniet, quem flegmatis oppillatio, procrearit, Vomitus euocat, & soluit corpus.

Brassica. CAP. CXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. κράμβη. Lat. Brassica. It. Cauolo.

1

3

Gal.


Gal. Choux. Ger. Brey-
ter. Roel.




Brassica primum genus.

Secundum.

B *Rassica sativa* alio est idonea, si modo leuiter feruefacta
edatur (nam percocta alium sistit. sed multo magis bis co-
cta, aut quæ in lixurio coquitur) stomachum autem male ha-
bet: acrior est aestiua. In Aegypto propter amaritudinem non
estur. Cacutientibus & tremulis esse prodest: summo cibo sum-
pta crapulam discutit, & uini uoxam restringit. Melior stoma-
cho cyma: sed acrior, & ad ciendam urinam ualidior. Ea con-
dita stomacho inimica est, alium conturbat. Crudus succus cum
Nitro & Iri deuoratus, alium emollit: cū uino quoque epotus
uiperarum



Tertium



Quartum

uiperarum morsibus auxiliatur, cum Fœnigræci farina, podagris & articulorum uitjs illinitur. Prodest & sordidis ulceribus, & netustis, illitus, caput purgat naribus infusus, menses extrahit, cum Loliacea farina inditus. Folia per sese illita, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus: tumoribusque. Epinyclidas, igne sacrum, leprâsque sanant: carbunculos ex sale rumpunt, fluentes capillos retinent, coctâ. addito melle, aduersus depascentia ulcera, gangrænasq; ualent: lienosisq; ex aceto cruda prosunt. Mansa, deuorato succo, retusam uocem instaurant. Decoctum eius potu, aluum & menses ciet. Flos post conceptionem in pessa subditus, partum abortu uiuat. Semen eius, præsertim quæ in Aegypto

9 4

gypto

gypto nascitur, potum tinea repellit. in antidota theriaca additur, faciei cutem lentiginesq; expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci uetusto excepti, diuturnos laterū dolores mitigant.

Brassica sylvestris. C A P.

CXIII.

NOMENCLATURA.

Gr. κρεμνι ἀγρία. Lat. Brassica sylvestris.

Ital. Cauolo saluatico. Gal. Choux sauages.

Sylvestris Brassica, maritimis præruptisq; locis magna ex parte gignitur, satiuæ similis, sed candidior, hirsutiorq; amara. Cuius cyma in lixiua cocta, ori non insuavis. Folia illitu uulera conglutinant, & inflammationes tumoresq; discutunt.

Brassica marina.

C A P. CXV.

NOMENCLATURA.

Græ. κρεμνι θαλασσία. Lat. Brassica

marina. Ita. Cauolo marino. Gal. & Off.

Soldanella. Ger. Meer Roel.

Marina Brassica à satiuæ prorsus abhorret, quod folia ferat rotundæ Aristolochiæ, prælonga, tenuia: singula à ramulis rubentibus exeunt, singulari, ut Hedera, pediculo: albo succo prædita est, sed paucos, salso gustu, & aliquantum amaro, pingui concretu. Herba in totum stomacho inimica, acris: uehementissimè aluum ciet, in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniam cum pingui carne.

Brassica quæ & Caulis, Crambe græcis, multorū est generū. Est vulgaris, est crispa, quæ Appiana Catoni dicitur, est capitata & scissilis. Est cuius caulis inter folia Rapi in morē subinde crassecat, & mūdatus edēdo est ut rapū. Crabe Plinio speciali nomine coma est laui parua, rotūda, ra


da, ramis folijsq; permultis cōdita, satina cādidior, succo aspero & instar medicamēti amaro. Brassica cibov. l. exterius applicata quantūvis nō ad modū acris, desiccatur, ac quiddā abstersoria facultatis continet. Succus suus quapiā vi expurgat nec aliā ratiōe tota eius substantia ē siccitate sua restringit, & ob id cū laxādū brassica corpus, aquæ paucillū immergēdum modice incocta, probè cū oleo & sale cōdita, edēda: cū vero fluēs alius restringēdus, cocta ad secundā ebullitiōē, proiecta priore aqua, calidam oportet superinijcere, & ad eum decoquere modum vsque dum tenerescat. Brassica marina ea est, quam Soldanellam officina vocant.

Beta. CAP. CXVI.

NOMENCLATURA.

Gr. τεῦτλον. Lat. Beta. Ital. Bietola.

Gal. Porree. Ger. Korter mangost.



Beta.



Beta nigra.

Beta duorum generum est, ē quibus nigra coquitur cum Lenticula, ut ventrem sistat, quod magis radice eius præstat

statum. Candida alio utilis est. Vtraque tamen propter nitrosum humorem, quem habet in se, noxij succi est. Vnde succus earum cum melle naribus inditus, caput purgat, aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radices & foliorum, surfures lentesq; deterget, perniones fotu mitigat. Crudis folijs utiligines, nitro antè perfrictas: alopeciarum inanitates, scalpello prius exasperatas, atque depascentia ulcera, illini prodest. Eruptionibus papularum, igni sacro, ambustisq; cocta medetur.

Est Beta nigricantibus è Purpura folijs. Hac nigra vocatur Latini. eius radices Rapis magnitudine & forma similes sunt. Candida præterquam colore, quem folia eius in candido viridem habent, nigra similis. Est & quædam ruffa radice, Fastinaca non absimilis. Nitro sæ qualitatibus est Beta, & ideo discutit & abstergit, candida magis quàm nigra, sed eo cocta priuatur, siquidem nigra astringit, maxime radice. E Liene malè affectus, medicina potius est, quam ubus.

Portulaca. CAP. CXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. Αὐτὸς ἄνθη. Lat. Portulaca. Ita. Procacchia.
Gal. Pourpier. Ger. Buttzelen.

Portulacæ uis astringit: capitis doloribus, inflammationibus oculorum, ceterisq; cum polenta imponitur: ardoribus stomachi, sacro igni, uesicæ doloribus, auxilio est. Commanducata, dentium stupores sedat: stomachi & intestinorum æstuationem, fluxionesq; mulcet: renes & uesicam adiuuat, etiam si erosionem sentiant: ueneris impetus exoluit. Succus epotus simili effectu prodest, in febribus ualens. Contra teretes uentris lineas, cruentam excreationem, dysenteriam, hæmorrhoidas, & proflua sanguinis, percocta efficax est. Item contra sepius morsus. Ocularibus medicamentis utilissimè commiscetur: interaneis fluxione

*Portulaca sylvestris.**Portulaca sativa.*

xione laborantibus, atque uulnarum erosionibus infunditur. Contra dolores, quos aestus excitauit, caput ex Rosaceo & oleo fouetur: eruptiones papularum in capite, cum uino emendat: uulneribus quæ ad syderationem spectant ex polenta illinitur.

Portulacæ, notæ herbae. temperamentum, frigidum & aqueum est, pauillum de austero participans. Fluxus restringit & præcipuè biliosos & calidos, siquidem tertij est infrigidantium ordinis, & humefactantium secundi. Parum nutrit in cibis, ut potè humida, frigida, & viscosa. Stuporem dentium sedat, quod viscosa, non pungat.


Asparagi. CAP. CXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀσπάραγος. Lat. *Asparagus*. Ita.

Aspa-

Asparago. Gal. Asparge.



Asparagi.

tusis, atque defossis: quod, quantum e quidem sentio, planè à ueritate abhorret. Atilis autem Asparagus multis ramis fruticat, folijs Fœniculi, longis, numerosis: radice rotunda, grandi, spongiam habente. Huius teneri cauliculi triti in uino albo, renum dolores sedant. Assus autem coctusue, urinæ stillicidium, difficultatemq̃, ac dysenterias mitigat. Radix cum uino aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Decocta cum ficis aut ciceribus, sumpta, regium morbum sanat: coxendicis cruciatus stranguriamq̃, leuat. Alligata radix, aut haustum eius decoctum, conceptum adimit, & sterilitatem adfert.

Asparagus hortēsis, Galeno, Regius dicitur: palustris & syluestris, Helius. Abstergunt Asparagi non protensa tamen manifesta calidita

Corruda siue Syluestris Asparagus uulgaris est notitia. Huius cauliculi in cibo cocti uentrem emolliunt, urinam cient. Radicis decoctum contra urinæ difficultatem, regium morbum, renū uitia, & coxendicum cruciatus, in potu proficit: cum uino autem, phalangiorum moribus auxiliatur. Si decocti succus super dente contineatur, eius dolori medetur. Semen potum ad eadem ualeat. Canes, ut aiunt, si decoctum bibant, emoriuntur.

Asparagum etiam nasci prodiderunt, arietis cornibus cō-

lidity aut frigiditate. Grati sunt stomacho, vrinam proritant, & quāuis paruum prestent alimentum, plus tamen nutriunt, quā quāuis alia herbarum cyma.

Plantago. CAP. CXIX.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀρνόγλωσσον. Lat. Plantago. Ita. Pian-
tagine. Gal. Plantain.




Maior.



Minor.

Duo Plantaginis genera: minor folia habet angustiora, minora, molliora, leuiora, & tenuiora: caule anguloso, in terra sessili: floribus pallidis: semine summis caulibus emicante. Altera maior, latior, uirentiorq̃, latis constans fo'ijs, olera-

cei



Aquatica.



Media.

cei generis: cuius caulis cubiti altitudinem petit, angulosus, sub-
 ruber, à medio ad uerticem tenui semine circumdatus, radicibus
 nititur teneris, hirsutis, candidis, digitum crassitudine aequanti-
 bus. Nasitur in lacunosis, sepibus & locis humidis. Multò uti-
 lior magna est. Vim habent solia exiccatoriam, cōstringentem:
 quare omnibus malignis ulceribus, & fluxioni opportunis atq;
 elephanticis, sordidisq; illita prosunt: profluvia sanguinis, ulcera
 quæ serpunt, epinyelidas, carbunculos, nomasq; cohibent: uetera
 ulcera & inaequalia cicatrice obducunt, chiroma sanant, sinus
 conglutinant: morsibus canis, ambustis igni, inflammationibus,
 panis, parotidibus, strumis, agilopijs, illita cum sale prosunt. Co-
 ctum cum aceto & sale olus, dysentericis, cæliacisq; sumptum
 subuenit. Datur & in locum Betæ cum Lenticula coctum, Et
 ad

ad aquam intercutem, cui leucophlegmatia nomen est, datur et herba decocta post aridas epulas, sic ut media antecedit: comitia libus & suspiriosis data proficit. Foliorum succus, colluta subinde oris ulcera, purgat: cum Cimolia aut Cerusa igni sacro medetur: fistulis infusus prodest, lippitudinibus & aurium doloribus idem succus instillatur. Additur quoque in oculorum collyria. Gingiuis cruore suffusis, & sanguinis reiectionibus, potu confert: clystere dysentericis infunditur, contra tabem datur in potu: aduersus strangulationes uulue, in uellere subycitur, etiam si uulua fluxione laboret. Semen ex uino potum alui fluxiones & sanguinis excreationes sistit. Decocta radix & manducata, & collutione, dentium dolores sedat: eadem cum folijs, ulceribus renum & uesicæ in passo datur. Ferunt treis radices cum tribus uini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis. Sunt qui radices gestamine, discutiendis strumis utantur.

Est Plantago latifolia, quam vulgus herbariorum maiorem vocat. Est angustifolia, quæ minor. Tertia Latifolia similis, præterquam quod folijs constat longe minoribus & leniter hirsutis. Plantago mixta conflata est temperamento: aqueum enim quiddam, et frigidum, atque aded austerum obtinet. Quandoquidem terrestri est, frigida, & sicca substantia, ob idque infigidantis & desiccantis nature ordinem tertium usurpat. Porro quæ una infigidant & astringunt, vlcibus malignis, dysenteria, & omnigenis vlcibus & fistulis profunt. Et in eo principem locum tenet Plantago. Nam è sui temperamenti proportionē, desiccans, non mordicat: infigidans, non stupefacit.

Lauer, seu Sium.

CAP. CXX.

NOMENCLATURA.


Græ. Σίον. Lat. Lauer. Ita. Sio.

Gal. Berle.

Sion

Sion in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, folijs latis, Olu-
satro similibus, sed minoribus, & odoratis. Quæ cruda co-
ctaq; esu calculos rumpunt, atque excerpunt: urinas cient, menses
& partus extrahunt: dysentericis in cibo auxiliatur. De Sio
Crateus tradit, herbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem
rotunda, maiora quàm Mentha, nigra, & ad Erucā accedentia.

Nascitur Sium fontibus astate frigidis, hyeme calidis: Plinio,
Sium Apij est similitudine, glareosis & perennibus riuis pro-
uenit, coquiturque ut Olu atrum magna vesica utilitate. Cres-
sionis herba (ita vulgo vocata) folium, cum primum emicat rotundum,
& simul atque adoleuit in Eruca folium laciniatum, quod ab Apij fo-
lio dissidet, satis indicat, Sium Cressionem non esse. Sium Galeno quate-
nus nonnihil aromatis gustui re-
sipit, eatenus excalfaciendi na-
turam sortitur. Discutit autem,
urinam cient, renum calculos te-
rit, remoratos menses pellit.



Sium.


Sysimbrium.

CAP. CXXI.

NOMENCLA-
TVRA.

Græ. Σισύμβριον. Lat.
Sisymbrium. Ita. Menta Ro-
mana Gal. Mente aqua-
tique. Offi. Menta rubra.

Sisymbrium, alij Serpyllum sylvestre uocant, in solo incul-
to nascitur, Mentha hortensis similitudine, odoratius, la-
tiore

* *Sisymbrium*

tet. Folia primium rotunda prodeunt, adulta Erucæ modo finduntur. Id ex calfacit, urinas mouet, crudum estur, purgat lentigines, cutisq; uitiat in facie, noctibus impositum, matutinisque detractum.

Sisymbrium hortense Matthiolo, Balsamita est officinarum, & ea quam Mentham Romanam vocant, tum quod delineationes respondeant, tum quod facillimè non artificio exculta in Mentham degeneret: Atque adeò Dioscoridis Sisymbrium quod in incultis nasci prodidit, & hortense Sisymbrium vnâ & eandem esse plantam. Et perinde Dioscoridis Sisymbrium, non eum esse quem pingit Theophrastus. Nam si vna res esset: degenerante, non exculto Sisymbrio, in campis, non aliter quàm in Mentham permutatum, repperiretur, cum eo loci nullus sit qui colat. Sisymbriumq; aquaticum non aliud esse à Crescione vulgari, acris sapore, qui simul cum Sio in aquis nascatur, folijs primium rotundis, & deinde in Erucæ formam laciniatis, parumque & sapore & odore à nasturtio dissentiat. Id à Plinij opinione non discrepat.

r

Sisymbrium

tiore folio. Inseritur coronis: calfaciendi vim habet. Contra stillicidia urinae, calculosq; semen ex uino bibitur: tormina & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti aut temporibus illinuntur. Item contra uesperum apiumq; iclus: uomitiones potu cohibet. Alterum Sisymbrij genus, quod aliqui Cardaminam, alij Sion appellat: ea herba riguis gaudet, & eisdem in locis, quibus Sion, provenit. quæ ideo nonnullis Cardamina nominatur, quod gustu Cardamum, id est, Nasturtium, repræsen-

Sisymbrium tertij est inter desiccantia & excalsacientia ordinis, idque in singultu & torminibus bibendum prabetur cum vino. Nasturcinum, nempe quod Nasturcium referat, calidum est & siccum tertio ordine, & viride etiam secundum non excedit.

Crithmum. CAP. CXXII.

NOMENCLATURA.

Græ. κριθμὸν. Lat. Crithmum. Ita. Finocchio marino. Gal. Fenoil marin. Off. Creta marina.

Crithmum, seu potius, ut aliqui, Crithamon, fruticosa & undique foliosa herbula est, cubiti altitudinē fere petens. Nascitur in maritimis, & petrosis: folijs pinguibus, numerosis, albicantibus, ueluti Portulacæ, latioribus & longioribus, falso gustu: flores candidi sunt, & semen, ceu Rorismarini, odoratum, molle, rotundum, quod siccātū rumpitur, habet intus tritici modo nucleum: radices digiti crassitudine, tres aut quatuor: grati odoris & iucundi. Radix, semen & folia incocta uino, potu urinae difficultati & regio morbo auxiliantur: menses cient. Estur crudum coctū in oleo, seruatur etiam in muria.

Crythmon & Latinis Batis, duplex est. Vna marina, quæ fruticosa est herbula, cubitum vnum alta. Nascitur in maritimis, & petrosis. Hæc cretha marina vulgo dicitur. Altera Batis hortensiana, quam Plinius Asparagum Gallicum quibusdam dici tradit. hæc ab olitoribus ad quotidianos vsus confita nonnusquam spectatur comprehēdisse. Vulgus bacillas quasi baticulas ab Italis vocari didicit. Matthiolo apud Italos Finocchio marino nuncupatur. In hortos traducta, Herba di san Pietro. Batis empetron non est, bilem enim aut flegma non discutit, sed nec hydropinorum aquam, quod in Empetro requirit Dioscorides. Batis herba falso gustu, & quadantenus amaro, quandoquidem desiccatoria & absterforia est facultatis. Hanc tamen depresso rem habet, quàm alia quæ in amararum genus transeunt.

Coron

Coronopus. C A P.

CXXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. κορωνόπος. Lat. Coronopus. Ita. Serpentina. Gal. Corne de Cerf.

Ger. Craynnen.



Coronopus.

Coronopus oblonga herbula est, per terram repens, fissis folijs: coquitur in olerē: radicem habet tenuem, adstringentem, quæ in cibo cæliacis facit. Prouenit in aggeribus, & locis incultis, & secus uias.

Coronopus, patrum nostrorum memoria, Ranunculi species habita est. Nunc verò cognosci in acetarium olus, & seri cæpit. Herba stella ab Italis nuncupatur. Foliorum figura apud quosdam Cornu ceruini nomen dedit.

Sonchus C A P.

CXXIIII.

NOMENCLATURA.

Gr. σόγχης. Lat. Sonchus. Ita Cicerbita.

Gal. Laceron. Ger. merckdweye.

Sonchi duo genera: syluestrior quidam est, & magis spinis horret: alter teneritate quadam mollescit, cibis expetitus, anguloso caule, inani, interdum rubente: folijs in ambitu per interualla dissectis. Vtriusque uis refrigerat, modicè adstringit,

*Sonchus aspera.**Sonchus non aspera.*

git, unde aestuanti stomacho & inflammationibus illiti prosunt. Succus eorum stomachi rosiones sorbitione mitigat, lac elicit: in uellere appositus, sedis ac uulnæ collectionibus opitulatur. Tam herba quam radix illita uibratis à scorpione ictibus subuenit. Alter Sonchus tenerior, arboris instar, latis constans folijs: caulem in ramos exeuntem folia distinguunt: sed ad eadem pollet. **S**onchus, Italis acetarium è folijs & radicibus olus, siquidem teneritudo & dulcor gratum gustui prabet.

Seris, siue Intybus. CAP. CXXV.

NOMENCLATURA.

Græ. σέγισ. Lat. Seris. Ita. Endiuia.

Gal. Endiuie. Ger.

hærnsoel.

Seris



Seris sylvestris.



Seris sativa.

Seris duum generum est: altera sylvestris, quæ Picris & Cichorion uocatur: altera sativa, latioribus folijs constat, stomacho quàm hortensis utilior. Quæ iterum in duas species digeritur, una folio latiore prodit, Lactucarum simillima, altera angustiore est folio, & gustu amara. Vtraque refrigerat, & astringit, stomacho utilissima: aluum sistit cocta, si cum aceto adsumatur. Sylvestres stomacho meliores, quandoquidem aestuantem ipsum & quem imbecillitas uexet, cibo leniunt: cardiacis per se, aut cum polenta, utiliter illinuntur: podagris, & oculorum inflammationibus auxilio sunt. Herba cum radice illita, percussis à scorpione subuenit: igni sacro cum polenta medetur. Succus cum Cerusa & aceto, ualet ad illitus eorum, quæ refrigerationem desiderant.

r

β

Est Inti

Est Intybus sativus, est sylvestris. Sativus nostro etiā tēpore Endi-
ui adicitur Italis, sylvestri præter folia quæ tēriora & latiora sunt
similis. Sylvestris qui Cichoreum, Picris, Amarago Gase nuncupatur,
Cichorea pharmacopolis, floribus est cæruleis, quæ sese in solis sydus cir-
cum agunt, quæ è re Heliotropij apud quosdam nomen accepit, cum He-
liotropium diuersum sit herbae genus.

Condrilla. CAP. CXXVI.

NOMENCLATURA.

Gr. κούδριλλη. Lat. & Ita. Condrilla.

Gal. Espece de Cichoree.

Condrilla, quam aliqui Cichorion, alij Serin appellant, cau-
tem, flores & folia habet Cichorio similia: qua ex causa
nonnulli sylvestris Intubi speciem esse pronunciarunt, uerum te-
nuior tota est: in cuius ramulis, gummi Mastiches simillimum,
tuberculo Fabæ inueniri solet: quod cum Myrrha tritum, &
lintheo appositum, instar oliuæ, scæminarum menses trahit. Tusa
cum radicibus herba, adiecto melle, diuiditur in pastillos, qui
Nitro admisti uirilignes emaculant. Gummi inordinatos pilos
replicat: quod item tenera radix efficit, si intincta succo acus, pi-
lis admoueatur. Contra uiperas in uino potu proficit. Succus de-
coctus, in uino, aut per sese potus, aluum sistit. Aliud habetur Cō-
drillæ genus, folium ferens oblongum, circum rosum, humi spar-
sum, caulem succo madentem lacteo: radice tenui, rotunda, leui,
uegera, flauescente, succosa, Cuius & caulis & folia concoquē-
di uim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos reflectit.
Nascitur in latis & cultis.

Condrilla Intybacci generis in solido & gypso solo nascens, Ci-
choreo tenerior & minor, flore in aliquibus cæruleo, in alijs can-
dido. Altera Condrilla species luteo flore, pinguem & lutosum agrum,
& præcipuè hordeaceum campum amat.

Cucurbita.

Cucurbita. CAP. CXXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. κολόκυνθα. Lat. Cucurbita. Ita.

zucca. Gal. Courge. Off. Latinum nomen habent.



Rotunda.



Longa.

Cucurbita esui apta: cruda, trita illitu tumores, & abscessu mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quam Syriasi vocant, in sincipite illinuntur: oculorum inflammationes podagrasq; refrigerant. Succus è ramentis tuis per se, aut cum Rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliatur: adustiones cutis in ardenti febre illitu adiuvat: totius feruescentiæ & expressæ succus, cum melle exiguo & nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinum in Cucurbitam recentem excauatam infusum, si mistum sub diuo teneatur, potu aluum lenigabit.

r 4

Cucurbitæ


Cucurbita semen medicinale est, fructus quāvis multorum sint specie-
rum, tamen ut plurimum aut longi sunt, aut lati & sessiles. Nas-
tur sine semine, quæ perendie quā terra mādentur, oleo sesamino im-
maduerint.

Cucumer satiuus. C A P. CXXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Σίκυς ἡμερῶ. Lat. Cucumer satiuus. Ital.

Cocomero domestico. Gal. Concombre.




Citrullus.

Cucumis marinus.

Satiuus Cucumis aluo & stomacho perquā utilis habe-
tur, refrigerat, corruptionem non sentit, uesica prodest, olfa-
ctu reuocat, quos animus liquerit. Semen modicè urinam mo-
uet: cum lacte aut passo, uesica exulcerationibus subuenit. Illita

CXXX



Cucumis satiuus.

Pepo.

cum uino folia, morsus canum sanant, & epinyelidas, cum melle. Peponis caro in cibis, urinam cit, inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius contra adustionem infantium, quam Syriasin uocant, sincipiti imponuntur: fronti admota, oculorum fluxiones auertunt. Succus cum semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in smegmata, quæ faciem repurgant, & nitorem afferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota drachmæ pondere, uomitionem mouet. Si quisquam moderatè secundum cœnâ uomere cupiat, geminis obolis sit contentus. Sanat quoque illita cum melle ulcera concreta in modum saui, quæ ceria uocant.

PEponis nomine Græci & Cucumeres & Mellones & Citrios intelligunt. Est Italis Auguria Cucumeris genus, antiquis Græcis (ut Matthiæus putat) incognitum.


r s

Lactu

Lactucæ. CAP. CXXIX.

NOMENCLATURA.

Græ. ῥῆϊδαξ ἡμερος. Lat. *Lactuca sativa*. Off. *Itidem*.
Ita. *Lattuga domestica*. Gal. *Laiētue*.



Crispa.



Capitata.

Lactuca sativa, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho grata habentur, somnum conciliant, alium emolliunt, lac euocant: verum decocta magis alunt, stomachicis illotas esse prodest. Epotum semen, assiduas libidinum imaginationes in somno compescit, & ueneri refragatur. Ipsa uero frequentiores in cibo, claritati oculorum officiunt: inflammationibus & ignibus sacris opitulantur, muria condiuntur. Cum in caulem exierunt


runt, uim quandam nanciscuntur, succo aut lacti syluestris Lactuca similem.

Lactuca syluestris. CAP. CXXX.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀγρίδαξ ἀργία. Lat. Lactuca syluestris. Ita.

Lattuga saluatica. Gal. Laiētue sauua-
ge. Off. Endiuia.



Syluestris.

Syluestris Lactuca sativa similis est, sed longior caulis, & candidiora folia, graciliora, & asperiora: amaro gustu est, & uiribus aliquantum Papaueri similis, unde lacteum eius succum aliqui Meconio permiscuerunt. Aquam per aluum elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obolos argema caliginemq; repurgat. Contra adustiones efficaciter illinitur cum lacte mulierum. In summa somnum allicit, doloris leuamentum praestat, menses trahit, contra scorpionum & phalangiorum ictus bibitur. Semen, non aliter quam sativa, libidinum imaginationes in somno amolitur, ac uenerem arcet. Succus ad eadem ualet, sed uiribus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius, antea, ut in alijs liquaminibus moris est, insolatum.


Est

Est sativa, est sylvestris Lactuca, quæ Serriola siue Scariola Italis, quod folij pars exterior, serræ in morem, aspera sit. In totum, sola teneritudine, laetore, & candore distant.

Gingidium. CAP. CXXXI.

NOMENCLATURA.

Græ. γιγγιδιον. Lat. Gingidium. Ita. Gingidio. Gal. & Off. Cerefolium, sed falso.



* *Gingidium.*

ita pridem ijs è locis cœpit adferri. Hoc quibusdam Carui de Syria dicitur.

Gingidium, aliqui Lepidion, in Syria & Cilicia plerunque nascitur: herbula sylvestri Pastinacæ similis, tenuior, & amarior: radice parua, candicante, sub amara. Olius hoc crudum, coctum, conditumue estur magna stomachi utilitate, urinâ cit. Decoctum ex uino potû uesticæ prodest.

Cerefolium in Italia hortis nascens, non est Gingidium, non enim gustatum amaritudinem gustui representat, at acrimoniam potius, & aromaticum odorem. Cilicia & Syria peculiaris hac herba est, nec

Scan


Scandix. CAP. CXXXII.

NOMENCLATURA.

Græ. Σκάνδιξ. Lat. Scandix. Ita. Scandice.

Gal. non perinde nota. Off. Dauci
genus, sed falso. Ger.

Wißd moton.



* Scandix.

Scandix, sylvestre olus
est amarum, subacre,
quod crudum coctumue mā-
ditur, stomacho & uentri
utile. Decoctum in potu, ue-
sicae, renibus, & iecinori
confert.

Scandix Galeno, sapore est a-
maro, & aliquantum acris.
vt in fine sit secundi exalfacien-
tium & desiccantium ordinis,
aut in tertij principio. At cum
talis non sit, quæ pro Scandice
profertur, sequitur Scandicem
non esse geminam.

Caucalis. CAP.
CXXXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. καυκαλῖς. Lat. Caulalis. Ita. Petrosello

saluatico. Off. Pimpinella hirsuta.

Gal. Persil sau-
uage.

CAUCA



Causalis.

Causalis, quā alij ſt
ueſtre Daucum uocāt,
cauliculo eſt dodrantali, aut
maiore, ſubhirsuto: ſolys A-
pio ſimilibus, Fœniculi modo
per extrema multifidis, hiſpi-
disq̃, candida in cacumine
umbella, ſuauius olēte. Cru-
dum coctū mē olus eſtur, uri-
nam mouet.

Frequens apud Thuſcos Cau-
culus, nihilum abſimilis ab
ea quā pingit Dioſcorides.
Hanc vernacula diſtione, Petro-
ſello ſaluatico nominant, quod
adiacētia terræ ſolia multum
ad Apium hortens, Petroſeli-
linum, accedat, editioribus cur-
clis fœniculi modo incifis. Flos
albus & odoratus non alius,
quā Daucus.

ErUCA. CAP. CXXXIIII.


NOMENCLATURA.

Græ. Εὐζωμον. Lat. Eruca. Ita. Ruchetta.
Gal. Roquette.

CRuda Eruca uenerem largiore cibo concitat. Semen eodē
eſſectu prodeſt: urinam cit, concoctioni prodeſt, alio per-
quā commodata. Semine ad condimenta utuntur, quod, ut
in longum tempus aſſeruetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt
in paſtillos. Gignitur etiamnum ſylueſtris Eruca, maxime in
Iberia,



Sativa.



Sylvestris.

Iberia, quæ occidentem spectat, cuius semine pro Sinapi incolæ utuntur. Vrinam uehementius pellit, multò sativa acrior.

E Ruca acetarijs Italicis, & sativa & sylvestris omnibus notissima. Medicinalem eius vsum abundè docet Dioscorides.

Ocimum. CAP. CXXXV.

NOMENCLATURA.

Græ. Οκίμω. Lat. Ocimum. Ita. Basilico.


Gal. Basilic.

Ocimum uulgo cognitum. Id copiosiore cibo oculorum aciem hebetat, aluum mollit, spiritū monet, urinā pellit, lac euocat, ægrè tamen conficitur. Illitū cū polline polentæ, ace-

to



Ocimum mediocre.



Ocimum maius.

to & Rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est. Draconis marini & scorpionis iclibus per se prodest: & cum uino Chio oculorum doloribus. Succus uisus caliginem abstergit. Destillationes exiccat. Semen potum conuenit atram bilem gignentibus, difficili urina, inflatisq; naribus haustum, subinde mouet sternutamenta: quod idem herba efficit: sed oculos premi necessum est, cum sternutamentum urget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant, quandoquidem manducatum, & in sole positum, vermiculos creat. Aphri autem adijciunt, si feriantur à scorpione, qui Ocimum ederint, nullo confictari dolore.

Est Ocimū, siue Oximū, pro ratione foliorū, maius & minus, et sub Basilici nomine, satis cognitū. Herba stomacho inimica, ideo in cibis dānatur, cōuenientius quo maturet, & discutiat, exterius applicabitur.

Siqui-


Siquidem in secundo est ex calfacientium ordine, & superfluum, in se continet humiditatem.

Orobanche. CAP. CXXXVI.

NOMENCLATURA.

Græ. Οροβάρχη. Lat. & Ita. Orobanche.

Gal. Tigne.



* Orobanche.

Orobanche cauliculus est sesquipellalis, & interdum maior, subruher, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, & in luteum uergente: radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter quaedam legumina nasci constat, & ea strangulare, unde Orobanche sibi cognomentum usurpauit. Estur, ut olus, cruda, & in patinis, asparagi modo, decocta. Legumentis addita, coctionem accelerare creditur.

Orobanche, quam quod Eruum strangulet, Theodorus in Theophrasto, Eruegam nominauit, caulem profert sine folijs, & cymam paulo crassiore, ut non iniuria Plinio, Cynomorion, quasi simile quiddam genitali canis nominetur.

Barbula hirci. CAP.

CXXXVII.

NOMENCLATURA.

3

Græ

Græ. Τραγοπωγόν. Lat. *Barbula hirci*.

Ita. Barba di becco. Gal. Barbe de Bouc.

Ger. Bockhs bart.

Barbula hirci, quæ ab alijs Come uocatur, breui est caule: folijs Croci: radice longa, dulci, supina magno super caulem calyce, è cuius summo semen nigrum dependet, unde nomen inditum est. Herba esui apta est.

Ornithogalum. CAP. CXXXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ορνιθόγαλον. Lat. *Ornithogalum*.

Ita. Ornithogalo.

Gal. Churles.

Ornithogalum cauliculus est tener, candicans, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in cacumine mollibus adnatis: à quibus, flores prodeunt, foris herbacei, & cum hiantes se pandunt, lactei uisuntur: inter quos dissectum, cachryos modo, capitulum emicat. Coquitur cum pane, ut Melanthium. Radix bulbosa, cruda & cocta manditur.

Radix Barbae Hirci acetarijs, quod dulcis sit & gustu grata, inditur. Ipsa herba folia habet, Croci largiora tamen & longiora, florem luteum. Aqua per alembicum ex ea educta, recentes in carne plagas mirabiliter adglutinat. Ornithogalum pueris etiam cognitum, quod Churles vocant, nam huius radicem vomere eruptam colligunt, multo castaneis suauiore in cibis: cruda & cineribus incocta rusticis edendo est, ut quæ Tuberibus nihil cedat.

Tubera. CAP. CXXXIX.

NOMENCLATURA.

Græ. ὤδρα. Lat. *Tubera*. Ita. Tartuffi.

Gal. Truffles. Off. Cerui boleti.

Tubera rotundæ radices sunt, sine folijs, flavescentes: uere fodiuntur, cruda & cocta eduntur.

Th

TVbera secreta quapiam vi terræ agglomerantur in cibum: Gale-
no, humores generant crassos & melâcholicos omni plus alio ci-
bo, atq; adeò paralyfim apoplexiam, egre digeruntur, & grauant sto-
machum. Nā de terrestri magis, quā de aquea substantia participant.

Smilax hortensis. CAP. CXL.

NOMENCLATURA.

Græ. Σμίλαξ κηπαία. Lat. *Smilax hortensis*.
Ita. *Smilace de gli horti*. Gal. *Faseoles*. Off. *Faseoli*.

Hortensis *Smilax*, frutex, cuius semen à nonnullis *Lobia*
uocatur: folia habet *Hederæ*, molliora tamen: tenues cau-
les, & capreolos uicinis fructibus circumuolutos, qui tantū ado-
lescunt, ut topiorias scenas representare uideantur: siliquas *Fæ-*
nigræci profert, longiores & torosiores. in quibus semina re-
num similia, sed inæquali colore recluduntur: quæ quadam ex
parte fuluescunt. *Siliqua* cocta cū semine in oleribus, *Asparagi*
modo, estur. *Prinam* ciet, & tumultuosa somnia facit.

Smilacem hortensem iam superius diximus esse *Dolichum*, eum Ita-
lia vocat *Fagiuolo Turchescho*, nempe qui etiam *Phasiolus* dicitur,
ut differat à *Phaseolo*.

Medica. CAP. CXLI.

NOMENCLATURA.

Græ. Μηδική. Lat. & Ita. *Medica*.

Gal. *Foin de bourgoine*.

Gal. *Medisch Kraur*.

Medica cūm recenter prodijt, folijs & caule *Trifolio*
pratensi similis est: procedens uero folia contrahit, cau-
les ædens *Trifolij*, & siliquas corniculorum modo intortas,
in quibus semen *Lentis* magnitudine dependet. Id sicca-
tum, iucundi saporis gratia, conditaneo sali admiscetur. Vi-
ride, quibus refrigeratione opus est, illitu suffragatur.

s 2 Her

Herba tota pro gramine utuntur, qui pecora alunt.


Medica, Persarum bello in è Media in Graciã, & post è Gracia in Italiam translata, in iumentorum olim pabulum ferebatur, nunc rara est in Italia: in Gallia, per Ruellium frequens, & a rusticis Tri-
sofum maius appellatur.

Aphaca. CAP. CXLII.

NOMENCLATURA.

Græ. Αφάκη. Lat. Aphaca. Ita. l' Aphaca.

Gal. Vesse.



* *Aphaca.*

genera Aphacen reponit, quæ nihil ad nostram Aphacen.

Porrum capitatum.

CAP. CXLIII.

NOMENCLATURA.

Græ


Aphaca in arvis nascitur, altior Lente, tenuibus folijs siliquas Lenticula maiores fert, in quibus terna quaternaue semina nigra, Lente minora, continentur: quæ adstringendi vim habent: quare torrefacta, stomachi aluiq; fluxiones sistunt, si fresca lentis more decoquantur.

Aphace Matthiolo non est vitia, verum legumen folijs Vitæ similibus, maioribus tamē & crassioribus. Hanc rustici Vitiam sylvestrem vocant. Theophrastus inter intybacea

Græ. πρᾶσου κεφαλῶτος. Lat. *Porrum capitatum*.

Ita. *Porro capitato*.

Gal. *Porreau*.



Porrum capitatum.



Porrum sectium.

Capitatum Porrrum inflationem facit, noxium succum creat tumultuosum somnum parit, urinam ciet, aluo accommodatur, extenuat, oculorum aciem hebetat, menses pellit, sed lædit exulceratam uesicam, renesq, cum ptisana uerò coctum, esu pectoris uitia extrahit: coma eius in aqua maris & aceto cocta, in deseseionibus, ad præclusiones uulua & duritias, utilis habetur. Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida maceratum, dulcescit, & multò minus inflat. Semen acrius est,

Et quandam adstrictoriam vim habet. Quare succus cum aceto, addito Thure aut Manna, sanguinis profluvia sistit, maxime si naribus erumpat: uenerem stimulat, contra omnia thoracis uitia tabemq, pro delinctu efficax est, arteriam esu purgat: sed si assidue estur, uisus obscuritatem inducit, stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio est. Ipsum quoque cum aceto aut Thuris polline, lacte, aut Rosaceo, utiliter aurium doloribus, et sonitui instillatur. Varios tollunt folia illita cum uua Rhois, qua ad obsonia utuntur: epinyetidi medetur, crustas ex sale illita rumpunt, ueteres sanguinis reiectiones cohibet, si binis drachmis, et equali baccarum Myrti pondere bibantur. Ampeloprasum stomacho magis aduersatur, et plus Porro excalfacit. Urinam et menses uehementius ciet. Id contra serpentium morsus esse conuenit.

Cepa. CAP. CXLIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. κρόμμυον. Lat. Cepa. Ita. Le Cipolle.

Gal. Oignons.

Cepa longa acrior est quam rotunda, item flaua quam candida, et sicca quam uiridis, et cruda quam cocta, aut sale condita. Omnes tamen mordent, flatus gignunt, appetentiam inuitant, sitim mouent, et extenuant, fastidium pariunt, et expurgant, aluo utiles sunt. Ea detractis purgantibus in oleum coniecta, hæmorrhoidas, reliquosq, excreationum exitus referant, subdita pro balanis. Succus cum Melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis, et incipientibus suffusionibus auxiliatur, angina eodem perunguntur, suppressos menses pellit, caput purgat, naribus infusus, canis moribus cum aceto, Ruta, et Melle illinitur: cum aceto autem perunctas

in fo



in sole uirilignes sanat, & cum pari spodio, scabras lippitudines sedat, uaros cum sale reprimat: contra calceamentorum attritus, cum gallinaceo adipe utilis est, citæ alio prodest. In auribus sonitum ac grauitatem emendat: ad purulentas aureis, & eliciendam earundem aquam, ualet: alopecia earum succo perfricantur, qui celerius quàm Alcionium pilos euocat. Largiore cibo Ceba capitis dolores ciet, coctaq; uehementius urinā pellit. Eos lethargicos efficit, qui ualeitudinibus aduersis, ea etiam cocta, plus æquo uescantur, elixa, & cum passis uuis & Fico illita, tubercula concoquit, & celerrimè rumpit.

Allium. CAP. CXLV.


NOMENCLATURA.

Græ. Σκόροδος. Lat. Allium. Ita. Aglio.
Gal. Ail.


Allium quoddam satium atque hortense habetur, quod in Aegypto, singulari, ut Porrum, capite constat, dulce, in purpureum uergens, paruum: reliqua uerò magna & candida, ex pluribus coagmentatur nucleis, quos aglitas, id est, spicas, Græci nominant. Aliud est syluestre, quod Ophioscorodon, id est, Anguinum, uocant. Vis Allij acris est, excalfacit, mordet, excernit, aluum turbat, inflationes facit, stomachum exiccat, sitim gignit, flatum permonet, summam corporis cutem exulcerat, aciem oculorum esu hebetat. Eosdem effectus præbet Anguinum, quod & Elaphoboscorodon dicitur, latas uentris tineas in cibo sumptum abigit, urinas detrahit, contra uiperatum ictus, & priuatim hæmorrhoi, prodest, ita ut non aliud magis, si cum uino iugiter assumatur, aut tritū in eodem ebibatur: contra rabiosorū morsus & illitu & cibo ualet: magna &

*Allium hortense.**Sylvestre.*

Allio utilitates contra aquarum murationes, uocem clarificat, ueterem tussim crudum coctumue lenit, potum autem cum Origani decocto, pediculos & lendes enecat. Cremati cinis illitus sigillationibus cum melle, & alopecijs cum Nardino unguine, medetur: eruptiones papularum cum oleo & sale sanat, uitilignes, lichenas, lentigines, ulcera capitis manantia, lepras, & fursures, cum melle eximit. Cum Thure & Teda decoctum, dentium dolorem leuat, si in ore contineatur. Contra uenentos muris aranei morsus, cum ficulneis frondibus & Cumino illinitur. Feruesacta coma ius, sceminarum desessionibus additum, menses & secundas partus extrahit. *Alliu* eiusdem gratia suffitur. Factum ex eo & nigra oliua intritum, quod Mytoto



Sylvestre.



Vrfinum.

toton uocant, esu cit urinam, ora uenarum patefacit, hydropicis utile. Scorodoprasum magnitudine Porrum aequat, qualitatum Porri & Allij particeps: unde promiscuas sibi uires ex utroque uendicauit, effectus Allij & Porri præbens, inefficacius tamen. Coctum, porri modo, dulcescit, & in olerum uicem transit.

Porrum & eius species omnibus notæ, nam sub eodem genere continetur, Vlpicum, Scorodoprasum, Ampeloprasum, Alliu, Ophioscorodon, Porrum, Gathyum, & similia, Ampeloprasum copiosè in vineis prouenit, unde & nomen accepit. Ceba nota est. Non ignotum est Allium domesticum. Sylvestre spicæ non habet, minor est domesticus, ceterum sapore & odore simili, astrictis folijs, caule subtili, è cuius cyma flos rubens, unde nigrum semen profilit. Scorodoprasum non est Scordium (nam

s s

id sui

id sui generis herba est) at illud ex Allio & Porro latifolio, sic arte & cultura prodyt: Siquidem figura & temperamento inter utrumque medium est.

Sinapi. CAP. CXLVI.

NOMENCLATURA.

Græ. Σίνπι. Lat. Sinapi. Ita. Senape.

Gal. Seneue.



Sinapi.

Sinapi hortense, aliqui Napi uocant. Eligi debet adultum, ualde rufum, non magnopere siccum, sed quod fractum internè uirescat, & ueluti quodam succo madeat, caesium colore: siquidē recens id genus, tempestiuū habetur. Ad calfaciendum, extenuandum, extrahendum, efficax est: ad eliciendam capitis pituitam manditur. Contra præduros tonsillarum tumores, ac ueterem callosamq; arteria scabritiem, succus ex aqua & Melle conuenienter gargarizatur: sternutameta ciet,

tritum & naribus admotum: comitialibus quoque auxiliatur: sceminas uulue strangulatu oppressas excitat. Lethargicis, de-raso capite, illinitur, cum ficis admistum, donec rubescat locus: & ad coxendicum cruciatus impositum, ad lienes, & omne

genus,

genus dolores confert, cum permutandæ valetudinis causa, ex alto vitia extrahenda sunt. Alopecij illitum medetur, faciem purgat, sugillata cum Melle, adipe aut cerato rapit: feræ impetigines & lepræ, eo cum aceto perunguntur. Contra febrium circuitus aridum bibitur, aut potui, polenta modo, inspargitur: extrahentibus emplastris, scabiemq, extenuantibus, utiliter admisceri solet. Tritum, gravitati aurium & sonitui, cum fico impositum prodest. Succus ad hebetudines oculorum, & genarum scabritias magna utilitate illinitur. Expressus recenti semine succus, in sole siccatur.

Sinapi Plinio, trium est generum. Vnum gracile, alterum Rapium formam exprimit, tertium in Eruca folium laciniatur. Est Gallis Sanella vel Senella: est Mustarda blancha & nigra. Quod Eruca folium refert, musto quod nondum ebullierit inditum, dulcedinem in longum tempus prorogat.


Nasturtium. CAP. CXLVII.

NOMENCLATURA.

Græ. Καρδαμους. Lat. Nasturtium. Ita. Agretto.
Gal. Cresson de iardin. Off. Latino nomine
vntur.

Nasturtium optimum constat esse Babylonicum. Omnium semen est acre, excalfacit, stomacho aduersatur, aluum turbat, tineas excutit, lienem imminuit, partus exanimat, menses cit, uenerem stimulat, Sinapis & Eruca simile intelligitur. Lepras & impetigines absterget. Illitum cum melle, lienem extenuat, sanos expurgat, pulmonum vitia extrahit, sorbitionibus incoctum. Serpentium uenenis potum resistit, atque eas suffitu fugat: capillorum defluuia cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit: coxendicibus cum polenta

com

*Nasturtium hortense.**Sylvestre.*

*cōmodè ex aceto illinitur, tumores collectionesq̃ discutit, emit-
tit furunculos, illitum cum muria. Herbae ad omnia eadem effe-
ctus, licet minor.*

Nasturtium Cressio hortensianus seu mauiis Alenoyssus satis co-
gnitus, medicum patent e Dioscoride, Galeno, & Plinio.

Thlaspi. CAP. CXLVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Θάσπι. Lat. Thlaspi. Ita. Haud aliter.

Gal. Rasle. Off. incognita.

Thlaspi, herbula angustis folijs, digitali longitudine, in ter-
ram uersis, subpinguibus, in cacumine diuisis: binum do-
dran

* *Latifolium.**Augustifolium.*

drantum cauliculo, tenui, non sine adnascentibus ramis: fructu circa ipsum totum, ab extremo in latius se pendente semine Nasturtij incluso, lenticulae uasis effigie, nisi quod infringitur unde nomen accepit: flos albicat. Nasctur in semitis, & sepibus, fossisq;. Semen asperi gustus, excalfaciens: bilem utrinque extrahit: potum acetabuli mensura: prodest ischiadicis, infusum, sanguinem potu educit: internis suppurationes rumpit: menses ciet: sed partus enecat. Alterum Thlaspi tradit Crataeus, quod aliqui Persicon Sinapi uocat, latis folijs, radicibus magnis, utile ischiadicorum infusioni.

Qui Thlaspi Bursam pastoris existimant perperam iudicasse conuincuntur, tum foliorum habitu, tum gustato semine, & eius animaduersa figura. Hanc herbarij Nasturtium tectorum, & vulgus, Sinapi rusticum vocant.

Dra

Draba. CAP. CXLIX.

NOMENCLATURA.

Græ. Δράβη. Lat. Draba. Ita. Draba.

Gal. Draue. Off. & Ger. incognita.

Draba herba ad cubiti altitudinem assurgit, tenues spargens ramos, & ex utroque latere folia ceu Lepidy, sed molliora, & candidiora. in cacumine uero Sambuci umbellam gerit, candidos flores habentem. Herba hæc cum ptisana coquitur, in Cappadocia maximè. Semen aridum pro Pipere obsonijs admiscetur.

Serapium, Araba, Orientale facit Nasturtium, acris saporis semine, quod non reperiens in planta quam in valle Anania legit Matthiolus similem Araba, ut ipse de illa dubitat, sit necne vera Dioscoridis Araba, ita incertos nos esse cogit, utrum nascatur in Gallijs, ut Ruellius existimat.

Irio. CAP. CL.

NOMENCLATURA.

Græ. Εἰρύσιμον. Lat. Irio. Ita. Irione.

Gal. Tortelle. Off. & Ger. proprium nomen non habet.

Erysimon, Latini Irionem uocant, iuxta urbes, rudera, hortosq; nascitur, folijs Erucæ sylvestris: cauliculis in lori modum lentis & obsequiosis: floribus luteis, siliquis in cacumine gracilibus, ut Fænogreco, corniculatis: semine Nasturtij, exiguo, urentis gustus. Contra thoracis fluxiones efficax est, & si purulenta extussumuntur: regio morbo & coxendicibus prodest: contra uenena in delinctu cum melle datur. Illinitur ex aqua aut melle utiliter cæcis carcinomatis, parotidibus, duritijs mammarum, & testium inflammationibus: in totum extenuat, & calfacit. Mitius multo ad clysteris fiet: si aqua madescat atq; torreatur, uel linteo illigatum pinsita farina oblitum perassetur.

Irio

IRio Theophrasto frumenti est genus, Sesamo simile. Plinius huic opi-
nioni accedit 7. & 10. cap. lib. 28. Et 25. capite. 22. lib. ab historia
Discoridis describit. Nec aliter facit Galenus qui libro de facultate sim-
plicium 6. inter acres herbas ut Nasturtium & Sinapi connume-
rat. Et de alimentorum facultate primo, huic locum assignat inter fru-
menta. Attamen frumentarius, non ea est herba, quam Itali Formentone
nuncupant, non enim respondet Plinij in Erysimio descriptioni, quod
formentone, rubente sit caule, non folijs: & cum eo non multum anima-
lium genus pascatur, clarum est nihilum Sisumum r. ferre. Matthiolus
Trionem herbam, siquidem apud Italos nascatur, eam esse putat quæ in
locis & vijs publicis nascitur, Eruca folijs, floribus parvis & luteis, si-
liquis in cacumine gracilibus, duris, & corniculatis, in quæ semen acris
saporis.

Piper. CAP. CLI.

NOMENCLATURA.

Gr. πέρυρι. Lat. Piper. Ital. Pepe.

Gal. Poyure. Off. Latinum
nomen retentum est.

Piper in India nasci, breui arbore traditur: quæ inter initia,
prælongum fructum, ueluti siliquam promit, quod longum
Piper est: habet intus aliquid tenui Milio simile, quod tandem
in perfectum Piper euadit: id autem suis temporibus dehiscens,
pandensq; sese racemos emittit, grana ferentes qualia uidemus:
Ea acerbæ, candidum Piper faciunt, aptum ocularibus remedijs
antidotis & medicaminibus, quæ contra uenenata parantur:
theriaca uocant. Longum uero uehementius mordet: & quo-
niam prius quàm emature scat decerptum est, subamarum relinquit
antidotis & theriacis medicaminibus expetitum. Nigrum uero, ut
potè quæ tepestina maturitate collectum sit, odoratum esse constat can-
dido suauius, acrius, & ori gratius, necnon ad condimenta uti-
lius. Sed candidum, & adhuc in acerbum uergens, ante dictis in-
firmis

firmius est. Eligi oportet grauiſſimum, plenum, nigrum, ſine multis rugis, recens, minimè ſurfuſum, Inueniuntur etiamnū in genere nigri ſemina nutrimento deſecta, caſſa, inania, minimūq; ponderis, quod uocant Braſma. Viſ omnium excaſcit, urinam ciet, concoquit, extrahit, diſcutit, abſterget caliginem, quæ oculis obſeruatur. Piper febrium horroribus circuitu repentibus ſiue potu, ſiue illitu, ſubuenit, ſerpentium morſibus auxiliatur, partus extrahit, conceptum adimere creditur, ſtatim à concubitu ſuppoſitum: tuſſi, omnibusq; pectoris uitis: ſiue eclegmate, ſiue potu, ſuccurrit, angina eo & melle conuenienter perunguntur. Potum cum recentibus Lauri ſolijs, tormina diſcutit: cū uua paſſa manducatum pituitam à capite elicit, ualeitudinem tuetur, dolores finit, appetentiam mouet: concoctionem adiuuat, ad intinctus eſculentorum additum: ſtrumæ cum pice diſcutit, uitiſſigines ex nitro emaculat. Fiſtili nouo, ut Lenticula, motum torretur. Non eſt huius arboris radix Gingiber, ut aliqui exiſtimaue re, ſicuti, paulo poſt oſtendemus. Nanque Piperis radix Coſto ſimilis eſt, ora guſſantium accendit, ſaliuam ciet: hæc lienem reprimi, cum aceto illita, aut pota: caput etiam purgat, manducata cum ſemine Pedicularis herbe, quàm Staphidem agriam uocant.

Qui mare Athlanticum, Oriëntem, & Meridianum enauigarunt, planas nobis reddidere frutices Piperis eſſigies. Vnum, alba uiti quæ ſepibus prorepi ſimilem, racemoſo fructu, primum viridi, & ut in liguſtro coarctato. Hoc rotundum, quod nigrū, & album eſt Piper. colligitur, expaſis ſub ſole palmeis tegetibus, bacæ, antequam plane nigreſcant, mibi relicte donec ſolis æſtu corrugentur. Alterum, qui cōpactiles callos racematim coeuntes producat, pari cum nucis pontica uolo forma. Sunt Neapoli Piperis frutices, ſunt in alijs Italia locis. Eſt & in eadem regione frutex qui Piper racematim ferat, ſimilis planta quam uulguſ Ribes putat, nempe Venetijs in horto Maphai à Maphæo Medici clariſſimi, fructu Piperis & odorem & ſaporem exprimente.

Gin

Gingiberis CAP. CLII.

NOMENCLATURA.

Græ. γιγγιβέρις. Lat. *Gingiber*. Ita. *Gengeno*.Gal. *Gingenbre*.

Gingiberis sui generis planta est, in Troglodytica Arabia magna ex parte nascent: qua uirente, ad multa, perinde atque nos Ruta, utuntur, & primis potibus & eduljjs admiscunt. Huius radices, Cyperi modo, parue sunt, candicantes, & odorata, atque Piper sapore imitantur. Eligi debent quæ teredines non nouerunt. A multis tamen ob id condiuntur, quod celeriter cariem sentiant. Fictilibus in Italiam asportantur. *Gingiberis* cibo conueniens est, & cuius condimento assumitur. Ex calsa Etoriam uim & excoquentem habet: aluum leniter emollit, stomacho utilis est: efficax aduersus ea, quæ oculis caliginem offundunt. In antidota addi solet. In summa, Piperis uiribus respondet.


Gingiber radix est graminum in totum adsimilis, geniculatus serpens internodijs, è quibus nouas subinde radices, & ex acumine dispergit. Arundinacea folia bis tẽr uel in anno progerminat, exilitate tamen & fastigio breuiori. Ad nos ex Arabia & Aegypto adfertur siccum, & conditum viride. Conditur & siccum Venetjs, & alijs in Italia locis, pretij minoris.

Hydropiper. CAP. CLIII.

NOMENCLATURA.

Græ. υδροπέρρι. Lat. *Hydropiper*. Ita.Pepe aquatico. Gal. *Foyure*
de riuiera.

HYdropiper apud aquas nascitur, quæ stagnant, aut in pigro lapsu repunt: caulem adit geniculatum, prædurum, multis alis concavum: folia *Meutha*, maiora, molliora, & adidioraque



* *Hydropiper.*

gari, nulla habet quæ appareant internodia, semen non profert racemolum, ipsumque amarum est, non acre. Hydropiper si respiciam nascatur, illa est Persicaria species, quæ in alterius discrimen, nigra nota insignitur, Nam folijs est Menthe, non disparibus notis, quas Hydropiperi assignat Dioscorides.

radix gustu Piperis, acris, citra tamen ullam odoris gratiam: fructum acrem, in surculis parvus, prope folia racematim coherentem. Folia cum semine illita, tumores ueteresque duritias discutunt, sigillata delent: quæ postquam inaruerunt, tusa pro Pipere in obsonijs admiscuntur. Radix parua, nullius in medicina momenti.

H ydropiper Pseudopatoriam non esse his apparet argumentis. Pseudopatorium folijs est cannabinis, duris, pilosis, gustu amaris, & non ut Piperis acris: Odore est non vul-

Ptarmica C A P. C L I I I I.

NOMENCLATURA.

Græc. πταρμίκη. Lat. Ptarmica. It. Oliuella.

Gal. Herba esternuer. Ger.

Mieskrant.

P tarmica frutex est, surculos habens paruos, multos & rotundos, Abrotono non dissimiles: & circa eos folia Olæ, longa,

longa, multa, & in cacumine capitulum, uti *Anthemidis*, paruum, rotundum, quod suo acri odore sternutamentum excitat, unde nomen accepit. Folia cum floribus illita, sugillationes rapiunt. Flores sternutamenta efficacissime movent. Nascitur in montibus & petrosis.

Eptarmica, quā Oliuellam Itali vocant scopæ fiunt, nec huius apud eos alius est usus. Temperamento est calido & sicco. Viridis calida, secundo, & sicca ordine tertio.

Radicula, seu lanaria herba.

CAP. CLV.



Struthium.

NOMENCLATVRA.

Græ. στρουθιον. Ita. *Struthium*. Ita. *Radicetta*.

Gal. Herbe a soulon.
Off. *Saponaria*. Ger. *Seyffenkrant*.

S*truthium* herba vulgo nota, qua purgandis laniis utuntur, qui eas eluunt. Huius radix est acris, urinam ciet, prodest tussi, iocinorosis, orthopnœæ ex melle sumpta, cochlearis mēsurā, aliū soluit. Eadē cū panace et Capparis radice

t 2 cal

calculos frangit, & cum urina exturbat, duritiem lienis absūmit, menses imposita trahit, partus efficaciter enecat. Cum polenta autem & aceto illita, lepras tollit, tubercula discutit, cum farina hordeacea, & uino decocta. Miscetur & malagmatis, & ocularibus collyrijs, claritatis causa. Sernutamenta mouet, per os purgat, trita cum Melle, & naribus infusa.

Herba Lanaria ob frequentem eius in eluendis Lanis vsum antiquis cognitissima, hoc abolito, & vna eius cognoscendi iudicium decessit. Arabum sctarij Condisi nominant. Matthiolus hanc in Italia nasci non audet affirmare, sed nec è pharmacopolis promi, cum sa penumero in praescriptiones medicas, quas receptas vocant, addatur. Quinetiam Saponariam non esse: nam haec folia fert plantaginis leuia: Radicula, olea, caulem lauem internodijs distinctum, & non lanuginosum, sapore pene insipido.

Cyclaminus. CAP. CLVI.


NOMENCLATURA.

Græ. Κυκλάμινος. Lat. Cyclaminus. It.

Pan. porcino. Gal. Pain de porceau.

Ger. Seßbror.

Cyclaminus folia habet Hederæ, purpurea, uaria, in quibus supra infraq; d albicant macula: caule nudo, quaternos digitos aequante: floribus in eo purpureis, Rosarum effigie: radice nigra, & aliquantiū lata, ut Rapum uideri possit. Quæ cum hydromelite pota, pituitam aquamq; detrahit: menses potu appositū ciet. Tradunt, si prægnas radicem transgrediatur, abortum fieri. Partum appensa accelerat: contra uenena, præsertim leporis marini, ex uino bibitur. Illita contra serpentium ielus, remedio est: immista uino inebriat, regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum passō aut diluto mulso. Sed oportet eum qui ebibit, multis uestibus contectum, loco calido, & a perfriktionibus tuto recumbere, quò facilius exudet: eiectionibus autem sudores fellei colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus



Cyclaminus.

per se aut cum Melle medetur: lienem absorbit, vitia cutis in facie, & alopecias emendat. Eius decocto luxata, podagras, & capitis ulcuscula, pernionesq; foueri congruum est: ipsaq; in oleo uetere feruesacta, illito oleo, ulcera ad cicatricem perducit. Canata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdum Tyrrhenica cera momento, ut strigmenti crassitudinem unguentum contrahat, cum primis utile pernionibus. Radix, Scilla modo, concisa reponitur. ~~in melle affusa~~ ~~in melle affusa~~. Nascitur in umbrosis, maximè sub arboribus.

Altera Cyclaminus. CAP.

CLV II.

NOMENCLATURA.

1 3

Græ.

Græ. Κυλάμινος ἑτρεῖα. La. Cyclaminus altera.

Ita. Pan porcino minore. Gal. Seau de nostre dame. Off. Sigillum Marię.

Est & altera Cyclaminus, quam Cissanthemon aut Cissophyllon uocant: folijs Hederæ, sed minoribus: geniculis caulibus, crassisq̃, circa uicinas arbores, capreolorum modo, se uoluentibus: flore candido, odorato: acinis Hederæ mollibus, lentigustus, aliquantulum acris: radice superuacua: nascitur in asperis. Huius acini, drachmæ unius pondere poti, cū uini albi cyathis duobus, quadraginta diebus, linem per urinam & aluum absument. Ad orthopnoeam bibitur. Reliquias à partu purgat.

Cyclaminus quem Pan porcini uocant, nota & vulgaris est planta. Alterius Cyclamini, vsus, & cognosci desit. Minorem, Mesue. Panem porcinum, uidit Matthiolus copiosum in valle Anania radice Auellana.

Dracunculus. CAP.

CLVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. δρακόντιον. Lat. Dracunculus.

Ita. Dragontea. Gal. Serpentine.

Off. Serpentaria.

Dracunculus folio constat Hederaceo, magno, candidis notis insigni: caule recto, bicubitali, uersicolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguem planè referat, baculi crassitudine, fructus summo caule racematim cohæret, colore primum herbaceo, & cū ematurrit, croceo, gustu feruens, mordaxq̃, radice aliquantulum rotunda, bulbosa, Aro non absimili, tenui obducta cortice. Nascitur in sepibus umbrosis. Seminis succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat, naribus etiam ex lana



Dracunculi. 1. species.

Dracunculi. 2. species.

ex lana impositus, polypum absument: carcinomata illitu sistit: tri-
 ginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt. Odorem
 aiunt postea quam flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc
 teneros enecare. Radix excalfacit, orthopnoeis, ruptis, uulsis,
 tussi, destillationibus auxiliatur: humores pectoris excreatu fa-
 ciles reddit, siue cocta tostaq; cum melle, aut per sese edatur, siue
 farina eius ex melle delingatur: urinam pellit, uenerem excitat,
 cum uino pota: phagedaenas ulcerum, & quae cacothae uocan-
 tur, trita cum melle & Bryonia alba expurgat, & ad cicatri-
 cem perducit. Collyria ex ipsa ad fistulas & eyciendos par-
 tus fieri solent. Qui radice suas manus perfrucuerunt, à
 uiperis feriri negantur. illita ex aceto, uutiligines emaculat.

i

4

Folia.

Folia recentibus uulneribus lignamentorum uice, conuenienter imponuntur. Decocta in uino per uulneribus apposuisse prodest. *Ca* sens folijs inuolutus, à putredine defenditur. Succus radice ad nubeculas, albugines, & oculorum caligines, conuenit. Radix cruda coctae, ad sanorum usus pro oleris recipitur. Id *Gymne* sis insulis, quae *Baleares* uocantur, coctam radicem cum melle multo, in conuiujs placentarum loco offerunt. Radix mensibus effoditur, lota quæ frustatim conciditur: ligno traiecta siccatur in umbra, & ita reconditur.

Maior & Minor *Dracunculus* sedulis & peritis herbae notae sunt, ambasque species uidit *Matthiolus*. Enimvero *Bistorta*, *Dracunculus* esse non potest, cum hac frigido, illa calido constat temperamento.

Arum. C A P. CLIX.

NOMENCLATURA.



Arum.

Gr. *Agou*. Lat. *Arum*.
Ital. *Gigaro*. Gal. *Vid de*
hiç. Off. *Pes Vituli*. Ger.
Pfaffenpindst.

Aron, apud Syros *Lupha* uocatum, folia emittit *Dracunculi*, sed longiora, & paucioribus distincta maculis: caulem subpurpureum, dodrantalem, pistilli specie, e quo croceum semen exit, radice *Dracunculi* alba, quæ decocta estur, ut potè cum minus acris sit. Folia ad esum condiuntur, & arida per se decocta, manduntur

Radix

Radix, semen & folia, Dracūculi vires habēt. Priuatim radix ex simo bubulo podagris illinitur, & Dracunculi more reponitur. In totum, ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expetitur.

Arisarum. CAP. CLX.

NOMENCLATURA.

Gr. Ἀρίσαρον. Lat. Arisarum. Ital.

Arisaro. Herba non perinde nota

Gal. offic. & Ger.

Arisarum exigua herbula est, cuius radix oleæ magnitudinem implet, longe maioris quàm Aro acrimonie: unde illitu nomas sistit. Fiunt collyria ex ea, ad fistulas efficacia. Illitu radice, genitale animalis cuiuscunq; in perniciem agitur.

Fit ex Aro nota planta mulieribus aqua & lexiuum magni estimanda, quæ erugatam & candidam faciem reddant. Siquidem mixtio quam Italæ Gersa vocant, mirum in modum carni splendorem & candorē conciliat. Arisaron Matthiolo ostendit Venetijs Franciscus Pati pharmacopola. Et Aluigius Romanus herbarius hoc in negotio peritissimus, huic sapius affirmavit se in consinijs Romæ copiosum Arisaron reperiisse.

Hastula regia. CAP. CLXI.

NOMENCLATURA.

Gr. Ἀσφόδελλο. Lat. Hastula regia.

Ital. Amphodillo. Gal. Aphrodiles.

officin. Aphrodili.

Hastula regia vulgaris notitiæ est, folijs maioris Porri: caule læui, ferente in cucumine florem, quem anthericon appellant: radices subiacēt oblongæ, rotundæ, glandibus similes, gustu acres, quæ excalfaciunt. Urinas & menses epotæ ciunt, lateris doloribus, ruptis, conuulsis & tussibus, drachmæ pondere potæ ex uno, medentur. Ea uerò uomitiones adiuuat, ludicri tali magnitudine commanducata: à serpente demorsis datur aptissime

1 5

simè

simè, uerùm trium drachmarum pondere, folijs, floribus & radice ex uino, morsus illinire oportet. Item ulcera sordida & depascentia, mammarum quoque & testium inflammationes, tubercula, furunculosq; decoctis in facie uini bulbis: recentibus inflammationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adiecto uetere uino dulci, Myrrha & Croco decoquitur, fitq; perquam utile oculis medicamentum: ad purulentas aureis per se, cum Thure, melle, uino & Myrrha tritus, prodest: in contrariam aurem infusus, dentium dolorem mitigat. Cinis è radice illitus, alopecias ad pilum reducit. Oleum in excauatis radicibus igni decoctum illitu exulceratis, perionibus, & ambustis igni, conducit: surditati, instillatum in aurem, auxiliatur. Candidam uiriliginem, linteo antea præfrictam in sole, illita radix emendat. Semen floresq; in uino poti, scolopendræ & scorpionum uenenis mirum in modum resistunt: aluum purgant.

Vulgaris Italiae Asphodelus, & numerosa radice, Liliū conuallium seu Græcorum Hemerocallis non est, cum Asphodelus Pæonia sit radicibus, & Hemerocallis Lili, qua nullam cum Pæonia affinitatē habent.

Bulbus esculentus.

CAP. CLXII.

NOMENCLATURA.

Græ. Βολβὸς ἐσθλὸς. Lat. *Bulbus esculentus*.
Ita. Bulbo che si mangia. Gal. Eschialotte.

Esculentus *Bulbus* uulgo cognitus, à nobis estur, stomacho & aluo utilis, rufus, qui & ex Aethiopia defertur: amarus uerò & Scillinus, stomacho aptior est, & concoctionem adiuvat. Bulbi omnes acrimoniam habent, excalfaciunt, uenerem stimulant, linguam tonsillasq; exasperant, multum alimēti præbent,



Bulbus esculentus.

unguibusq³, ex polenta medentur. Iidem calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus: item cum cinere è manarum capitibus, impositi. Cremati uerò & cum Alcyonio misti, uitia cutis in facie, atrasq³ cicatrices in sole illiti, emaculant. Faciunt adrupta, si cū aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam nervos tentant.

bent, carnes creant, inflationem pariunt, luxatis, fractis, articulorum doloribus effica-
citer illinuntur, spicula extra-
hant, gangranas & podagras ex melle aut per sese, hydropicorum tumores, &
canum morsus cum melle et piperis polline illiti cohibent, sudores compescunt, stomachi dolores mitigant, fursures & ulcera, quæ in capite manant, cum tosto Nitro abstergunt: sugillata uarosq³, per se aut ex oui luteo, & lenticines cum melle uel aceto, emendant: fractis auriculis

Bulbus vomitorius.

CAP. CLXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Βόλβος ἐμέτικος. Lat. Bulbus vomitorius.

Ita. Bulbo che fa uomitare.

Bul

Bulbus quem uomitorium uocat, folia habet lentiora multo & longiora, quam Bulbus esculentus: radicem similem, cortice nigro. Ea radix mansa, aut decoctum eius potum, uesicae malis medetur: uomitiones mouet.

Quemadmodum qui edendo est Bulbus, & Vomitorius Dioscoridi & veteribus fuisse cognitissimi, a quibus hodie recentibus medicis & quotquot rem herbariam tractant, sunt ignotissimi.

Scilla. CAP. CLXIII.

NOMENCLATURA.

Gra. Σκίλλα. Lat. Scilla. Ita. & Off. Squilla.

Gal. Oignon marin.



Scilla.

quod maxime est medium, direptis uinotenus tunicis: quod frustum confectum coquitur, mutata saepius aqua, donec ipsa nec amari

amaritudinem, nec acrimoniam habeat, traiecta q³ lino frusta
 siccantur in umbra, ita ut ne ulla quidem parte se contingant.
 His Scilla segminibus ad oleum, uinum, aut acetum scillinum uti
 mur. Ad rimas pedum, interna pars crudæ Scillæ in oleo feruesca
 ta, aut cum resina liquefacta, imponitur. Decocta in aceto de
 morsis à uipera cataplasma est: ad singulas assæ parteis, adiectis
 octonis tosti salis: cochlear unum aut alterum damus ieiunis, ad
 emolliendam aluum. In potu autem & odoratis medicamini
 bus, & quibus urinam ciere uolumus, hydropicisq³ & stoma
 chicis, quibus innatat cibus, regio morbo, torminibus, in tussi ue
 tere, suspiriosis, & ore reycientibus tres obolos, in delinctu ex
 Melle sumpsisse satis est. Coquitur cum Melle, & estur eorundē
 gratia, maxime ut concoctionem adiuuet. Strigmenta per aluū
 extrahit. Cocta et simili sumpta modo, eosdem præbet effectus.
 Sed caueda Scillæ usus his, qui intestinū sentiunt ulcus. Ad pēsiles
 uerrucas & perniones, tosta efficaciter illinitur. Tritum semen,
 & in Garica aut Melle deuoratum, aluum emollit. ~~Scilla~~
~~minor, quæ siccata, in oleo feruescit, & in cataplasma~~

De Pancratio. CAP. CLXV.

NOMENCLATURA.

Græ. πᾶνκράτιον. Lat. Pancratium. Ita.

Squilla minore. Gal. Squille bastarde.

Off. Scilla minor.

Pancratium, quod aliqui Scillam appellant, radice est ma
 gni Bulbi, subrufo colore aut subpurpureo, gustu amaro
 ac feruente: folijs Lily, sed longioribus. Scillæ uires & præpara
 tionem habet, eodemq³ pondere in morbis efficaciter assumitur:
 cui tamen mitior quàm Scillæ facultas inest. Radicis succus cum
 Erui farina digeritur in pastillos, qui hydropicis splenicisq³ cum
 hydro

hydromelite, commodissimè dantur.

Vtilis medicinis Scilla, nempe sine qua bona & vera Theriaca confici non possit. Pancratio vti nostro hoc tempore desitum est, atque adeò quidnam sit animaduerti, fieri enim potest vt in Appulia, vbi & Scilla nascatur. Huius planta neglectum parit frequens illis in locis Scylla prouentus: vt pote quæ candida sit & nigra, quas Pancratij loco substituant. Nostra ætatis medici in cerebri & nervorum infirmitatibus frigidis, Scillam crudam, in minuta frusta concisam, in vas vitreum melle plenum injiciunt, ac tota æstate vase soli exposito, tum summa cum diligentia percolato, morbi caduci remedium faciunt excellentissimū. Alia fuit Galeno operandi ratio.

Capparis. CAP. CLXVI.

NOMENCLATURA.

Græ. Καππαρίς. Lat. Capparis. Ita. Capparo.
Gal. Cappres.

Capparis aculeatus frutex est, qui in terra stratus, magis in orbem euagatur: spinas, ut Rubus, habet, in hami modum aduncas: folia mali Coroneæ rotunda: fructum Oleæ similem, qui cum dehiscens panditur, florem candidum promit: quo excusso, nonnihil glandis oblongæ figura inuenitur, quod apertum grana acinis Punicorum similia ostendit, parua, rubicunda: radices lignosas spargit, grandes numerosasq̃. Tenui solo, asperisq̃ locis, in insulis & iuxta rudera nascitur. Caulis & fructus, cibi gratia condiuntur: aluum turbat, stomacho aduersatur, sitim gignit: cocta tamen stomacho quàm cruda utilior est. Fructus drachmis duabus in uino potus, quadraginta diebus, lienem absunit, & urinam cruentumq̃ excrementum emittit, bibitur utilissimè in coxarum doloribus, & nervorum resolutione, item ruptis & conuulsis: menses ciet, caput purgat. Dentium dolorem sedat semen ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus

duſ radiciſ cortex ad eadem proficit: ulcera omnia uetera, & ſordida: & quæ occalluerunt, expurgat: lienofis cum farina hor dei illinitur: dente demorſa, dolori eius auxiliatur: cum aceto trita, uirilignes albas abſterget. Radix foliaq; intrita, ſtrumias ac duritias diſcutiunt. Aurium uermiculos inſuſus ſuccus enecat. Aphrica, & præſertim Marmarica Capparis, uehementer inflat. Apula uomitus facit, & quæ à Libyco, & quæ rubro mari deſertur, mirum in modum acris eſt: ſiquidem in ore puſtulas excitat, gingiuſq; oſſe tenuis ex eſt: quare in cibis non ab re damnatur.

Alexandrini Cappares, noſtratibus magis oculis adblandiuntur, & gultu gratiores ſunt. Sale conditi ad nos adferuntur. Eloti ſic ut omnis ſalis ſapor abeat, cum pauciſſimo ſint nutrimento, ſiunt corporibus cibus & medicina. Siquidem morantem appetitum reuocant, dūq; ſlegma lateribus ſtomachi impactum eiiciunt, obſtructionibus hepatis & lienis proſunt, modo præponantur omni cibo acetariorum more, cum oleo et aceto, vel cum oxymelite.

Lepidium. CAP. CLXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. λεπίδιον. Lat. Lepidium. Ita. Lepidio.
Gal. & Off. Piperitis.

Lepidium aliqui Gingidium uocant, herbula uulgo nota: muria cum lacte ſeruatur. Viſ foliorum acris & exulcerans: quapropter iſchiadicis trita, præſentiſſimum eſt auxilium, ſi cum Heleny radice, quarta parte horæ, illinatur: lienofis ſimili modo prodeſt: lepras eximit. Radix appenſa collo, dolore dentium liberare exiſtimatur.

Lepidium & Iberis vna & eadem planta ſunt, Matthiolo Dioſcoridis Lepidium Italie ignota: Pliny Lepidium, Piperitis, quam uocant, & Piperella.

Ranum

Ranunculū. CAP. CLXVIII.

NOMENCLATURA.

Gra. Βάσραχιου. Lat. *Ranunculus*. Ita. Pie Corui
no. Gal. Bacines. Off. *Pes corui*.
Ger. Froschteffer.



Primum genus Ranunculi.

Secundum genus.

Complura Ranunculi genera, uis tamē omnibus una, acris,
et uehementer exulcerans. Nam unum Coriandri folijs
constat, latioribus, subalbidis, pinguibus, flore luteo, interdum
purpureo: caule gracili, cubitum alto: radice alba, exigua, ama-
rāque, multis capillamentis, Hellebori modo fibrata: nascitur in
limitibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, plu-
ribus



* Prima species.



Secunda species.

ribus foliorum incisuris, plerunque in Sardinia proueniens, quā acerrimum, quod syluestre Apium appellant. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo. Folia, flores & cauliculi recentes, illitu exulcerant, & crustas non sine dolore gignunt: quare ungues scabros extricant, scabiem eximunt, stigmata delent, formicantes verrucas, & pensiles aleopenciasq̃, paulisper illita, tollunt. Tepente decoctio per niones fouentur. Sicca radix, tritaq̃, sternutamenta ciet, naribus admota: dentium dolorem appensū leuat, ipsos tamen frangit.

Plures Ranunculi sunt species, quā hoc capite describat Dioscorides. Omnes sub flammula nomen cadunt. Nimirum id illis nomen indidit ignea, quæ eis inest, acrimonia.

Anemone. CAP.

CLXIX.

✓

Nomenclatura

NOMENCLATVRA.

Græ. Ανεμώνη. Lat. &

Ita. Anemone

Gal. Coquelordes. Off.
Herba venti.

* Anemone.

Vo. Anemones genera, *Enū sylvestre*, alterum in cultis nascens. Cuius multæ species, una phœniceū florem profert, altera candicantem, aut lacteum, aut purpureum: harum folia Coriandro similia, tenuioribus prope terram diffusis: caules lanuginosi, tenues, in quibus flores ut Papaveris, & in medio capitula nigra, aut cœrulea: radix oleæ magnitudine, aut amplius paulo grandescit, fermeq; geniculis quibusdā cingitur. Sylvestri amplitudo prorsus maior, latioraq; folia, & duriora: oblongius caput: flore puniceo, tenuibus & multis radicum capillamentis. Acrior est quæ nigra habet folia. Vis utriusque acris: ea de causa succus naribus infusus, purgat caput. Commanducata radix pituitam trahit: decocta in passo & illita, medetur oculorum inflammationibus: cicatrices eorundem & hebetudines emendat, sordida ulcera abstergit. Folia & caules si cum ptisana decocti edantur, copiam lactis præbent, menstrua ciunt, uellere apposita. Illita quoque lepras eximunt. Sunt qui errore ducti, Argemonem nominari Eupatorium putent: quoniam à sylvestri Anemone, Argemonen, &

nem, & Papauer, quod Rhæada appellant (de quo inter Papaueris genera referemus) propter colorum cognationem in floribus, distinguere non possunt. Verum Papauer & Argemone colore minus saturato spectantur, & utraque tardius floret. Quinetiam Argemone croceum succum, gustu admodum acrem, reddit: Rhæas uerò candidorem & acrem. Insuper Anemone & Rhæadi capitula sylvestris Papaueris similia insunt: sed in Anemone superne crassiusculum, in Rhæade subangustius. Anemones genera nec succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi Asparagi cacumen. In aruis illa sæpius nascuntur.

ANemone Papaueris sylvestris formam quampiam refert, sed non ideo eadem plantæ sunt. Diuersis enim capitibus de his à Dioscoride tractatum est.

Argemone. C A P.

C L X X .

NOMENCLATURA.

Gr. Ἀγριμόνιον. Lat. Argemone. It.

non aliter. Gal. & Off. non bene nota.

ARgemone in totum sylvestri Papaueri similis est: folia habet Anemones, diuisa: florem puniceum: caput in cauliculo Papaueris Rhæadis, oblongius, & summis partibus latum: radicem rotundam, succum croci colore, acrem, dimittit. Argemone & nubeculas expurgat. Folia illitu inflammationes compescunt.

ARgemone nullo non loco in cæpestribus Thuscia nascitur, cum his ipsis notis quas ei attribuit Dioscorides. Quæ medicorum & spectiariorum ignorantia est, qui hætenus Argemones loco Eupatorium usurparunt, quod Agrimoniam vocant.


v 2

Anag

Anagallis. CLXXI.

NOMENCLATURA.

Græ. ἀνάγallis. Lat. Anagallis. Ita.
Anagallide. Gal. Morgelline. Off.
Morsus gallinæ.



Anagallis mas.

Fœmina.

Duo Anagallidis genera, quæ tantum flore distât. Nam
quæ cæruleo flore est, fœmina dicitur: mas quæ phæniceo
Frutices sunt parui, in terra iacentes, folijs in quadrangulo cau-
le pusillis, subrotundis, ad Helxinæ folia accedentibus: semine ro-
tundo. Vtraque mitigandi uim habet, inflammationem arcet,
adactos corpori aculeos extrahit, nomas cohibet. Succus caput
gargarizatu purgat, & naribus infusus, dolorem dentium le-
nit,

nit, si in aduersam narem injiciatur: argema cum melle Attico emendat, retusa oculorum aciei auxiliatur. Contra uiperarum morsus, iocinoris & renum uitia, si ex uino bibatur, prodest. Tradunt eam, quæ cæruleum edit florem, prociduum sedem reprimere: quæ uerò phœniccum, illitu euocare.

A Nagallis qui & Morsus Gallinae, mas & femina nota sunt, sub classẽ tamen auricula muris nõ cadunt, nec cum ea confundẽda.

Hedera. C A P.

CLXXII.

NOMENCLATURA.



Hedera nigra.

Helix.

Græ. Κίσσος. Lat. Hedera. Itidem It.

Gal. Lierre.

v 3

Hedera

Hedera differentias multas in specie sortitur, summas autem genere treis. Nam quædam candida est, altera nigra, tertia helix. Candida, fructum fert candidum, Nigra, nigrum, aut Croci amulum, quam vulgus Dionisiam uocat. Helix fructum non gignit, sed albas habet uiticulas, & folia parua, angulosa, & concinniora. Hedera omnis acris est, & adstringens, nervos tentat. Flos trium digitorum carptu, facit ad dysentericos, in uino bis die potus: ambustus cum ceratò tritus illinitur. Recentia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborum succus, cum Irino unguento, Melle aut Nitro, naribus infunditur: & contra ueteres capitis dolores, caput eo cum aceto & Rosaceo persundi utile est: purulentis auribus, aut dolentibus, cum oleo medetur. Nigra Hedera succus, aut epoti corymbi, corpus infirmant, mentemq; turbant largius sumpti. Acini quinque triti, calfactique in Punici mali cortice cum Rosaceo, si instillantur à contraria aure, dolorem dentium mitigant: denigrant capillum, illiti corymbi. Folia in uino decocta, illinuntur omnium ulcerum generi, etiam si cacoëthe sint: uitia cutis in facie & ambusta sanant, uti antea diximus, decocta: mouent menses triti & subditi corymbi. Idem poti, post purgationes fæminarum, drachmæ pondere, concipiendi spem adimunt. Pediculus foliorum Melle irrigatus, ac uulæ inditus, menstrua & partus extrahit. Instillatus succus putrida tædia narium, graueolentiamq; emendat, & sanitati restituit. Lachryma Hedera Psilothrum est: illitu pediculos enecat. Succus radicum in aceto potus, contra phalangia prodest.

Hedera nota est, & eius vires abundè describit Dioscorides.

Chelidonium. CAP.

CLXXIII.

Momenclæ

NOMENCLATURA.

Græ. χελιδωνιον μεγα. La. *Chelidonium*
maius. Ita. *C helidonia*. Id nomen
 etiam Off. Gal.
 Esclere.



Chelidonium.

C *Helidoniū maius*, cau-
 le est gracili, cubitali
 aut altiore, adnatis foliosis:
 folijs *Ranunculi*, multis, mol-
 lioribus tamen, & colore
 cæsis: flore *Viola* albæ, secun-
 dum singula folia prodeunte:
 in eo succus *Croci* mordax,
 acris, & aliquantulum sub-
 amarus, grauitèr olens: ra-
 dix superne singularis, infer-
 nè in multa crocea cappilla-
 menta fibratur: siliqua, cen-
 corniculati *Papaueris*, tenuis,
 in metæ figuram longa: in
 qua semen *Papauere maius*
 recluditur. Succus in æreo

uase, cum *Melle prunis* decoctus, oculis claritatem adfert. Fo-
 lijs, caule, radice, succus exprimitur ineunte æstate, & sic-
 catus in umbra digeritur in pastillos. Radix cum *Aniso* & ui-
 no albo pota, medetur regio morbo, ulceribus quæ serpunt: im-
 posita cum uino aut manducata, dentium dolorem sedat. Hoc
 nomē sibi uidetur uēdicasse, quòd aduentu hirūdinū exoriatur,

v

4

& discessu

& discessu emarcescat. Sunt qui narrant, hirundines matres ex cacatis pullis, admota herba visum restituere.

Chelidonium minus. C A P.

CLXXIIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Χελιδόνιον μικρόν. Lat. *Chelidonium minus*. Ita. Fauescelo. Gal. La petite Esclere.

Offic. *Scrofularia minor*.

Chelidonium minus, quod Triticū sylvestre aliqui uuncu parunt, herbula pediculis ab radice pendens, sine caule: folijs Herderæ, multo rotundioribus & minoribus, teneris, & subpinguibus: radices habet ex eodem callo complures, pusillas, in granorum Triticum modum acervatim congestas: quarum tres aut quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas & lacus nascitur. Vis ei acris, & Anemones modo, summā cutem exulcerat, psoras & scabros ungues eximit. Succus radicibus expressus ad purgandum caput, naribus infunditur. Decoctum eius cū melle gargarizatum, magnificè id præstat, & omnia pectoris vitia extrahit.

Chelidonium quod sub aduentum hirundinum erumpat, & quod ea hirundines deperditum pulli visum restituant, nomen accepit. Maius Chelidonium ubique nascitur, & notum est. Minus locis aquaticis provenit. Mira huius in sanandis scrofulis virtus, Scrofulariæ nomen imposuit.


Othonna. C A P. CLXXV.

NOMENCLATURA.

Gr. Ὀθοννα. Lat. & Ital. *Othonna*. Res nobis & Officinis non comperta.

Othonnam aliqui maioris Chelidoniæ succum esse aiunt: quidam Glaucij. Alij succum floribus corniculati Papa

ueris expressum. Alij permistos cœruleæ Anagallidis, Hyoscyami, & Papaueris succos, esse contendunt. Alij Troglodytica cuiusdam herba succum, quæ Othonna uocatur, nasci, eam in eo Arabiæ tractu, qui ad Aegyptum spectat. Othonna folijs Erucae, perforatis cribri modo, & ueluti à tineâ deorsis, squalore obfitis, paucis: flore Croci, latifolio, quare quidam Anemones speciem esse putauerunt. Extractus succus oculorum medicamentis adijcitur, ubi expurgare est opus. Mordet enim & abstergit omnem caliginem, quæ oculis offunditur. Tradunt humorem quendam ex herba emanare, qui elotus, semotis calculis, in pastillos ad eadem digeritur. Aliqui tamen affirmant, lapidem esse Aegyptium, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, areo colore, gustu cum feruore quodâ & adstrictione mordaci.



Auricula muris.

○ Othonna non minus antiquis fuit incognita, quam nunc est nobis.

Auricula muris.

CAP. CLX.

XVI.

NOMENCLATVRA.

Græ. Μυρὸς ὤττα. Lat.

Auricula muris. Ital.

Orecchia di topo. Galice

Mourron.

γ δ

Muris

Muris auricula, quam Myosotida uocant, herba est caulis pluribus, ab una radice, aliquatenus ab imo rubentibus, & concavis: folijs angustis, oblongis, dorso acuto, elato, nigricantibus, per intervalla assidue geminatis, atque in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus: flore, ut Anagallidis, cœruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. Radix illita ægilopia sanat. Sunt qui Alsinen, muris auriculam uocitent.

Exemplariorum varietas hic probè à doctis viris distincta est, & nullibi non nascitur Auricula muris, & perinde à peritis noscitur.

Glastum. CAP. CLXXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. ἰσᾶσις. Lat. Glastum. Ita. Guado.
Gal. Guesde. Off. Indicum.

Satium Glastum, quo infectores lanarum utuntur, folium habet Plantagini simile, uerum pinguius nigrinsq̃, cuius caulis duum cubitorum altitudinem excedit. Illita folia tumores omnes discutunt, cruenta uulnera glutinant, sanguinis profluvia sistunt, ignem sacrum, phagedænas, putrescentia ulcera, & quæ serpunt, sanant. Sylvestre Glastum satiuo simile est. Folia fert maiora, lactucaceis proxima, caules prætenues multifidos, quadantenus rubentes: in quorum cacumine folliculi multi dependent, quandam linguarum effigiem referentes, in quibus semen, flore tenui, luteo. Eadem quæ & suprâ dicta præstat: potu & illitu lienosis auxiliatur.

Isa



sylvestre Glastum.

Glastum.

Isatis farina Gallie cognita Narbonensi, & alijs Galliarum tractibus (Nam sylvestris sola cultura ab alia differt) viuos in tingendis laniis colores omnes quibus miscetur asseruat. Quid in medicina possit Dioscorides & Galenus expediunt.


Telephiũ. CAP. CLXXVIII.

NOMENCLATURA.


Græ. Τηλεφίου. Lat. Telephium. Ita. Fava grassa.
Gal. La petite loubarbe. Off. Illecebra minor.

Telephium herba Portulacæ similis & caule & folijs, habens gemina tubercula, à singulis radicum geniculis enascentia: à quibus rami seni septennue fruticant, à radice refertis

cæru



*Telephium album.



Purpurascens.

cæruleis folijs, crassis, lentis, carnosis: flore luteo, aut candido. Nascitur, & locis cultis uere inter uites. Folia senis horis illita albam uiriliginem sanant: sed postea hordeacea farina illini debet: perunctam ex aceto etiam in sole uiriliginem tollunt: sed ubi inaruerunt, absterguntur.

Telephium quidam esse putant, quam fabam inuersam seu fabam crassam, herbarij vocant, cum tamen gustui nullam representet qualitatem, qua siccum & absterforium iudicari possit, quod in Telephio requirit Galenus, & folia Portulaca longè maiora producat, his rationibus Fabariam non esse Telephium contendunt. Hoc, si ita est, nobis ignotum istud erit Telephium. Siquidem quod in Αἰζοῖ minoris capite lib. 4. recenset, diuersum ab isto est.

Finis Libri Secundi.

PEDANI DIO

SCORIDIS ANAZAR-

bei de medicinali materia, Li-

ber tertius, Ioanne Ruel-

lio Suefsionensi

interprete.

*Ad puncta annotationes doctæ & com-
pendiosæ.*

PRAEFATIO.



V P E R I O R I B V S, charissime Arce,
commentarijs, tradidimus de aromatibus, un-
guentis, oleis, arboribus, earum fructibus &
lachrymis: ite de animalibus, cerealibus, ole-
raceis, & herbis acrimonia præditis. In hoc
autem tertio radices, succos, semina, herbas, & quæ uerna-
cula & inter se cognata censentur, quæq; pluribus scatent reme-
dijs, prosequemur.

Agaricum.


C A P. I.

N O M E N C L A T V R A.

Græ. Αραγινοϋ. Lat. & Off. Agaricum. Ita.

Agarico. Gal. Agaric.

A Garicum radix fertur Laserpitij similis, sed facie summa
solutior, & rariore, fungosoq; tota contextu. Duo eius
genera: semina, quæ præfertur, rectis intus uenarum discursibus
constat



Agaricum.

constat. mas rotundus est, et undique compactior. Viri- gustus in initio dulcis, mox in amaritudinē transit. Gignitur in Sarmatia regione, quæ Agaria dicitur. Sunt qui radicem esse plantæ affirmant: alij ut fungos nasci in arborum caudicibus, quadā putredine: Gignitur in Galatia Asia, & Cilicia, in Cedris, sed friabile & infirmū. Adstringendi calfaciendiq; naturam habet. Efficax est contra tormina, cruditates, & rupta: prodest iudem cōtusis, & ab alto deuolutis: datur duobus obolis in uino

mulso, febrim non sentientibus: febriculosus uerò, in aqua mulsa. Arquatis quoque, suspiciosus, iocinoris renumq; uitio laborantibus, dysentericis: item si urina agrè reddatur, si uulua strangulatus urgeat, si pallor membra decoloret, drachma una dari solet: si tabes infestat, ex passo: si lien negocium exhibet, ex aceto mulso: si dissolutio stomachi est, ita ut cibi tenax non sit, manditur, & sine ulla humoris sorbitione deuoratur: simili modo acida ruētantibus propinatur. Sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxendicum, & articularū dolores, & comitiales morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur: menses ciet, fœminis quas inflatio uulua uexat, utiliter æquali modo datur: horrores soluit datum ante februm accessio

cessiones: aluum purgat drachma una aut altera, si cum aqua mulsa bibatur. Venenorum antidotum est denarij instar, cum diluta potione sumptum: si serpentes ictum uibrarunt, morsumq; subfixerunt, tribus obolis ex uino potum mirè auxiliatur. In summa, internis omnibus uitij conuenit, pro uiribus & etate datum, nunc ex aqua, nunc ex uino, ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

Agaricum Fungi genus, non in Larice tantum prouenit, sed in omnibus etiam glandiferis arboribus. Aerea & Terrea substantia est, quam caliditas exilem reddiderit.

Rhaponticum. CAP. II.

NOMENCLATURA.

Græ. Ρῶ. Lat. Rhaponticum. Ita. Rhapontico.
off. & Gal. ignotum.

RHa, aliqui Rheum, latini Rhaponticum uocant, prouenit in ijs quæ supra Bosphorum sunt regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, Centaurio magno similis, sed minor & rufior, fungosa, aliquatulum læuis, sine odore. Optimum habetur, quod teredines non sensit, si gustatu cum remissa adstrictione lentescat, manducatumq; colorem reddat pallidum, aut ad Crocum inclinantem. Id epotum facit ad inflationes, stomachi imbecillitatem, & omne genus dolores, ad conuulsa, lienosos, hepaticos, tormina, ad renum, uesicæ, & pectoris uitia: aduersus intentæ præcordia, & uulua mala, coxendicum dolores, sanguinis excreationes, suspiria, singultus, dysenterias, & celiacorum affectus, contra februm circuitus, & uenenatorum morsus. Datur in singulis ualetudinibus eodem quo Agaricum potere, & cum eisdem liquoribus: si febris careant, in mulso: sin aliter, ex aqua mulsa: si tabem experiuntur, ex passô: si lienis exercet, in aceto mulso, si dissolutio est stomachi, id est, cum cibi tenax

tenax non est, manditur, & sine sorbitione ulla deuoratur: li-
uentia lichenasq; tollit, cum aceto illitum: inflammationes om-
neis ueteres ex aqua oblitum dissipat: summa eius uis adstrin-
gens, cum aliquanto calore.

Rhaponticum, quod Rheupoticum officina vocant, à Rha Ponti
fluuii cuius in ripis copiosè nascitur, nomen sortitum est. Paucis
ab hinc annis cepit verum asportari, superiori siquidem tempore Rha-
pontici loco, Centaurea maioris radix usurpata est, quod etiamnum ho-
die fit, à medicis & spectarijs quibus nondum veri Rhapontici noticia
patuit. Alius itidem probata fidei & doctrina medicos error incescit,
qui putarint (nempe ob non adhuc visum suo tempore Rhapontium)
• Rheubarbarum, Dioscoridis esse Rhaponticum. Quo viso à pristina di-
scessere sententia. E quorum numero eximius ille & singularis eruditio-
nis medicus Manardus extitit, quemadmodum eius epistola 6. lib. secun-
da: & 5. vltima testantur. Matthiolus ipse Venetys non rarò verum
Rhaponticum coemit, nihil à Dioscoridis delimitatione dissidens. Atenim
cum Galenus & veteres Græci nullam Rheubarbari nostri (illius incogni-
ti) rationem habuerint, Arabes confusane Rheubarbarum, ipso nomi-
ne & viribus cum Rhapontico confundunt. Eò fit vt in eis legendis ad-
hibenda sit cautio, nullibique non perpendendum, qua de re, & Græcis
ne perspecta, scribant. Rheubarbarum nostrum Paulus agnouit, 7. lib.
22. cap. in compositionibus, Diacorallion, Antidoti Agapeti, & Antido-
ti Atactos: sed per nebulam, siquidem id solutiuum facit, nec aliud à
Rhapontico existimat. Nam primi libri. 43. ca. cum dicit Terebinthinā
Faba magnitudine dormituri exhibitam, corpus soluere, quod si am-
plius laxandum est, pauxillum adijciendum è radice Pontica, per eam
Rheubarbarum solutiuum intelligens. Atenim eorum opinionem qui
præfate idem esse Rheubarbarum & Rhaponticum contendunt, nec
aliò distare, quam Pontici cæli ratione, quod Aquilonare, odorem in
Rhapontico aufert, qui in Rheubarbaro gratus percipitur, ita infun-
git Matthiolus. Si ita res habet, planta natura odorifera, quæ in Se-
ptentrione peraquè vt in Oriente & Meridie proueniunt, nullum Se-
ptentrionalibus spirarint odorem. Quod sanè falsum est. Nam et si eius-
modi plantæ, quæ in Septentrione nascuntur, ob climatis frigiditatem
imbecillius & remissius aspirent, & vigeant, non tamen intantum suis
dotibus à frigore nudantur, vt in totum earum & noticia & usus eua-
nescant, alioqui regionum frigiditas vniuersam earum qualitatem ab-
sumeret, immutaret species, nec quæ essent agnoscerentur. Spica Celtica
quæ

quæ è Germania adfertur: Acorus, quo hodie pro Calamo odorato utuntur, & è Lituania, Tartaria, & Ponto exportatur, vinum quidem illum & manifestum odorem, quæ Ligustica vel Istrica Spica Celzica, aut Acorus Orientalis non aspirant, ab illo tamen quodam suo & naturali odore non depereunt. Qui fit ut Rhaponticum non ob regionis frigus, sed quod a Rheubarbaro diuersa planta sit, odore priuetur. Accidit ad hæc radici in istarum dispar facultas. Soluit Rheubarbarum, densum est substantia, colore est admodum croceo, gustu amaro & desiccante, ponderosum. At Rhaponticum nullo est odore, corpus stringit, tantum abest ut soluat, nec amarum, nec aridum, at mucilaginosum: graue non est, sed leuissimum. Rhaponticum temperatura est mixta è frigido & terrestri, cui quippiam caliditatis adiunctum est, & qua de aerea & subtili substantia participet. Astringentium esse ostendit inuamen præstitum spūto sanguinis, fluxibus stomachalibus & dysentericis. Rheubarbari nota & vires a Mesue petenda, nam hic ea persequi de quibus auctor non tractauit, in animo non est.

Gentiana. CAP. III.

NOMENCLATURA.

Græ. *ρεῦσιανή*. Lat. Ita. Off. Gentiana.

Gal. Gentianne. Ger. *Creutzdorn*.

Inuentio Gentiana prima assignatur Gentio Illyriorum regi, a quo cognomentum habuit. Folijs partim proximè radicem, iuglandi Plantagine similibus, subrubris, partim à medio caule, & præsertim iuxta cacumen, paulum dissectis: caule cauo, & leui, digiti crassitudine, geniculato, & ex interuallis maioribus foliato, binum sæpe cubitorum: semine in calycibus lato sine pondere, acetoso, satis ad sphondyli semen accedente: radice longa Aristolochiæ, crassa, amara. Nasitur in sublimibus montium iugis, umbrosis locis, aquosisq;. Vis radice excofactoria, & adstringens: contra morsus serpentium, duabus drachmis, cum Pipere, Ruta & uino pota, auxiliatur. Extracti succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi deturbatis,

x

tis,



Gentiana

Gentiana species

tis, ruptis & conuulsis, prodest: hepaticis & stomachicis, pota cum aqua subuenit. Radix collyrij modo subdita, partus eijcit: imposita, ut Lycium, uulneraria est, & ulcerum cuniculatim depascentium medela. Succus præcipuè eodem effectu prodest, oculis inflammatione laborantibus illinitur: pro Meconio collyrijs acribus immiscetur. Radix utiliginem absterget. Succus extrahendi ratio hæc est: Contusa radix quinque diebus aqua maceratur: postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices: & ubi refrigit aqua, linteo excolatur: mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat, fictiliq; reconditur.

Gentiana planta vulgaris notitia. Hæc temperatioribus Gallie locis nascitur, & altioribus iuxta Tridentum montibus, è quibus valli Anania adiacentibus radices extrahuntur, hominis brachio crass

crassiores. Ex his radicibus per balneum Mariæ (quod vocant) aqua elicitur, quæ miro quopiam genio febres sanat, quæ ab oppilatione procedant, vermes in puerorum corporibus conficit, cunctasque faciei maculas, si ea colluatur, abstergit. Cruciata non ignota herbarijs, altera esse potest Gentianæ species. Valet in pestem & venena, demorsus & punctiones venenatorum animalium. Emplastri modo illita, puerorum corpori vermes occidit, & scrofulas sanat superposita.

Aristolochia. CAP. IIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Αρισολοχία. Lat. Aristolochia. Ita. & Offici.
Aristologia. Gal. Aristologie.

Aristolochia nomen ex eo sibi adoptauit, quod existimetur optimè puerperis opitulari. Tria eius genera traduntur. Rotunda, quæ fœmina vocatur, folijs hederaceis, præstanti odore, cum acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab una radice germinibus, prælongisq; palmitibus, floribus candidis, pilei similitudine, in quibus quod rubrum est, grauiter olet. Longa, mascula appellatur, nonnullis Daëtylis, longiore quàm rotunda folio, tenuibus ramulis, dodrantalibus: flore purpureo, grauiter olente, qui marcescens in Pyri similitudinem turbinatur. Radix rotundæ, in orbem conglobata, Rapi modo. Longæ uerò radix digiti crassitudinem, & dodrantis longitudinem implet, nonnunquam paulò maiorem. Ambæ colore intus buxæo, gustu amaro & graui. Est etiamnum tertia longa, quæ Clematidis vocatur, ramulos habes tenues, refertos folijs subrotundis minori Semperuino similibus: flores Rutæ: radices longiores, tenues, crasso cortice odoratoq; uestitas, priuatim unguentorum spissamentis conuenientes. Rotunda cæteris uenenis resistit.

x 2 Lon


*Aristolochia longa.**Aristolochia rotunda uera.*

Longa uerò aduersus angues & uenena, drachmæ pondere ex uino bibitur, & illinitur. Pota cum Pipere & Myrrha, menses, partus, & omnia uuluarum onera eicit: eadem efficit subdita in pesso. Rotunda ad eadem pollet: insuper singultibus, suspirijs, horroribus, lieni, conuulsis, laterum doloribus, pota cum aqua, singulariter auxiliatur: aculeos & spicula extrahit: ossium squamas illitu adimit: ulcera putrida exest, & sordida expurgat, caua cum Iri & melle explet: gingiuas & dentes extergit. Clematitis ad eadem pollere creditur, uiribus tamen inferior est.

Arist

Aristolochia, longa, & rotunda Matthiolo in Italia notissima, quantumvis copiosior in Goritiano comitatu notanda reperitur. Ibidem longa & rotunda à flore fructum emittunt cauli viridi incumbentem, nuci viridi immatura ad similem, pari in ambabus forma, nisi quod longa longior est: & rotunda, magis orbiculatus. Clematis Aristolochia folijs semperuius minoris, & Ruta floribus, eidem apud recentes medicos non est visitata, quandoquidem nullus est qui eam in Italia ostendat. Hanc tamē valerius Cordus simpliciter lōgam, vocari scribit. nempe radice, sarmenti vitis, more, longissima. Mirum si Cordo validum & in solidum pene sententiam ē germanicis nominibus asserenti, tres Aristolochia species patuerint, & vna (nempe Clematis) Matthiolum perspicacem & seditulum hominem, prater hac & Italum, la-
tuerit.

Dulcis radix. CAP. V.
NOMENCLATURA.



Dulcis radix.

Græ. γλυκύρριζα.
Lat. Dulcis radix.
Ita. Rogolitia.

Gal. Raygalisse.
Ger. Pechkritz.

Dulcis radix plurima
gignitur in Cappa-
docia & Ponto: fruticosa
est, ramis binum cubitorum
altitudine assurgentibus: fo-
lijs Lentisci, densis, pingui-
bus, taetluq; gummosis: flore
x 3 Hyac

Hyacinthi: fructu pilularum Platani magnitudinis, asperiore, qui siliquas Lentium modo habet rufas & paruas: radicibus longis, ut Gentiana, coloris buxei, subacerbis & dulcibus, quæ densantur in succum, Lycij exemplo. Is in arteriæ scabritia efficax habetur: uerum oportet ut lingua subditus eliquescat. Aestuanti stomacho, thoraci, ac iocinori conuenit: sanat uesicæ scabiem, & renum dolores, cum passo potus. Idem eliquatus sitim sedat. Vulneribus illitus accommodatur: commanducatus ori prodest: recentis radice decoctum ad eadem conuenit. Eiusdem farina pterygijs commodissimè inspargitur.

D Vlcis radice viua planta, quæ multis in locis hodie feritur, manifestus sit error Plinij, qui Glycirrhizam, echinatis, seu aculeatis folijs prodidit, falsus literarum in corrupto Dioscoridis codice metathesti, mutato. σ in ι. qui legerit ξιϖω, pro οξιϖω, quo Lentiscum signauit Dioscorides, cuius folijs similia sunt Glycirrhizæ folia.

Centaurium magnum.

CAP. VI.

NOMENCLATURA.

Græ. Κενταύριον μέγα. Lat. Centaurium magnum.

Ita. Centaurca maggiore. Gal. erronce, Reupontic.

Off. perperam, Rheu ponticum.

Centaurium magnum folia habet iuglandis, oblonga, uiridi Brassicarum colore, serrata in ambitu: caulem, ceu Rumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita, ceu Papauerum, in rotunditate oblonga: flos cæruleus: semen Cnico simile, ceu laneis floccis quibusdam inuolutum: radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo prægnaans, cum adstrictione aliqua & dulcedine acris, & rubescens. Amat solum pingue & apricum, ac syluas & colles. Copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Archadia, Helide & Messie

Messenia, pluribusq; locis circa Pholoen, Lyciā, & Smyrnam. Radix conuenit ruptis, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, ueteri tussi: sanguinem expuentibus, drachmis duabus tritatur, si febris sit, in aqua: ceteris, in uino. Item ad tormina, & uulue dolores. Ramenta eius in collyrij formam uulue subdita, menses atque partus extrahunt: succus eadem præstat: uulneribus prodest: nam recens tusa, aut arida antè madefacta, ea glutinat & coniungit. Carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro Lycio utuntur.

Centaurium maius, nihil plane aliud est, quā illustris illa radix, quam antiqui erroris sectarij, Rheuponticum vocant. Nascitur Centaurium maius in monte Apuliæ Gargano (S. Angeli vocitant) cum notis omnibus quas ei attribuit Dioscorides. Prouenit & in monte Baldo, supra Lacum quem vulgo Garda vocant, verum non æquē ut in Apulia maturescit. Cauendum tamen est, ne huius loco accipiat, planta caule cubitum alto, è quo bina per ordinem folia procedunt, supra viridia, subter candicantia, salicinis similia, flore uinido & rubro, quod totum à Dioscoridis Centaurio maiore alienum est, & Lysimachiae conuenientibus. Confundunt maius & minus Centaurium Mesue & Auicenna, ideo cum iudicio legendi. Et per æquē Serapium, qui minoris virtutes maiori attribuit. Plinius utrasque plantas dulces simul & amaras facit, cum amaritudo folius sit Centaurij minoris.


Centaurium minus. CAP. VII.

NOMENCLATURA.

Græ. Κενταύριον μίκρον. Lat. Centaurium minus.

Ita. Biondella. Gal. Fiel de terre. Off. Latinum nomen seruetur. Ger. Aurin.

Centaurium, Limneson aliqui uocauere, quoniam rigua amet loca: herba Origani aut Hyperici similis, caule anguloso, palmum excedente: flore Lichnidis, è puniceo in purpuram uergente: folijs Rutæ, prælongis & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, leui, & supernacua, quæ gustanti amaritudinem adfert. Herba recens tusa, suo illitu



Centaurium minus.

uulnera conglutinat: uetera
ulcera purgat, & cicatrice
obducit, bilem crassosq; hu-
mores per aluum exigit, si de
cocta deuoretur: Ius deco-
cti ischiadicis conuenientissi-
me infunditur: trahit enim
sanguinem & dolorem le-
uat. Succus oculorum medi-
camentis perquam utilis: si-
quidem cum melle caliginem
oculorum expurgat: in uelle-
re appositus, menses & par-
tus extrahit: epotus peculiari-
ter neruorum uitjs succurrit.
Succi extrahendi ratio: Legi-
tur herba semine pragnans,
& diebus quinque made-

facta, decoquitur donec superemineat aqua: mox ubi refri-
xit, linteolo exprimitur, & eiecta herba, iterum decoqui-
tur, usque dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam re-
centem grauidamq; contundunt, atque succum fœculi non picato
exprimunt, & in sole, lignea rude assidue mouentes, inspissant:
quod si quid concretum faucibus uasis adhærescat, deradunt,
reliquoq; humori permiscunt: noctu diligenter operiunt, namq;
ros nocturnus liquores coalescere non sinit. Quæ autē siccis ra-
dicibus aut herbis liquamēta exprimuntur, decocta, ut in Gen-
tiana mentione retulimus, præparantur, sed quæ ex corticibus
humidis, aut contusis herbis factitantur, in sole, uti antè dictum
est, coguntur: sic è Thapsia: sic è Mandragora, reliquisq; simili-
bus succus: sic ex acerbis uinis melligo elicitur. Lycium tamen,

¶

& Absinthium, Hypocistis & consimilia, decocta, eo quo dimus modo, coguntur.

Centaurium minus, Biondella Italis dicitur, quod eius decoctio feminarum flavescentes reddat capillos. De hac Papiæ peculiarē tractatum scripsit Galenus. hoc corpus laxat, non maius, ut Arabum sectarij somniant.

Chamæleon albus. CAP.

VIII.

NOMENCLATURA.

Græ. χαμαιλέων λευκός. Lat. & Off. Chamæleon albus. Ita. Carlina.

Gal. Carline.

Chamæleon albus Ixia ideo aliquibus uocatur, quod quibusdā in locis uiscum circa radicem eius inueniatur, quo pro Mastiche utuntur mulieres. Folia habet Silybo aut Carduo similia, asperiora, acutiora, nigroq. Chamæleone ualidiora: caulem non promit, uerum ex medio spinas, echini marini, aut Cinaræ modo, erigit: flores purpureos, ueluti papporum lanugines emittit: semē Cnici simile: radicem in latis collibus crassam, in montosis uerò graciliorem, in profundo albam aliquatenus aromaticam, graui odore, dulcem. Quæ pota acetabuli mensura, latus interaneorum tineas pellit, Bibitur autem in uino austero, cum Origani feruescenti succo: hydropicis commodissimè drachma in uino datur, etenim eos extenuat. Contra difficultatem urinae decoctum propinatur. Hausta in uino, serpentium uenenis resistit: occidit canes & sues: mures item necat, subacta cū polenta aut aqua, & oleo madefacta.

Chamæleonem album Carlinam Itali uocant, quod Carolo magno (ut aiunt) in pestis remedium ostensū sit, quæ causa est, ut quibusdam in id pernitiei summopere ualere credatur. Quidā Marianum Carduum autumnant, sed falso. Siquidē destituitur Chamæleon

x 5 albus

albus, hic sua proceritate hominem non raro superat, præterea nullo sensili odore, qui in Chamæleone grauis est.

Chamæleon niger.


CAP. IX.

NOMENCLATURA.

Græ. χαμαιλέων μελας. Lat. Chamæleon niger.

Ita. Chameleone nero.

Gal. Chardonnette. Off. Cardopatium.



Chamæleon niger.

oleo, & axungia, scabiem abigit. Eadem, cum sibi sulphur & bitum

Chamæleon niger, folijs Scolymo similis esset, nisi minora, tenuioraq, ac rubro distincta uiderentur: caulem emittit dodrantalem, crassitudine digitali, subrubrum: & in umbella flores spinosos, tenues, Hyacinthi æmulos, uersicolores, radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ desecta flauescit, commanducata mordet. Prouenit in campestribus, siccis: & cliuosis tractibus, & maritimis. Radix trita, addito attramenti sutorij exiguo, cedrimo

bitumen asciuit, & cocta in aceto illinitur, impetigines absterget. Decoctum collutione dentium dolorem mitigat. Cum pari Pipere & cera oblita radix, dolenti denti auxiliatur: radice concisa, & in aceto decocta, dentes fouentur: eos quoque frangit, si scriptorio stylo feruens admoueatur. Vitia cutis in facie, utiliginesq; cum sulphure emendat: erodentibus medicamentis admiscetur: phagedanas, tretraq; ulcera illitu sanat. Quare Chamaleo uocetur, à uarietate foliorum euenit: mutant enim cū terra colorē: hic uiridia, illic albicantia, aliubi cærulea, nonnusquam rubra inueniuntur.

Chamaleon niger per totam Italiam reperitur & in montibus & collibus vallis Anania, cum notis omnibus quas ei assignat Dioscorides. Si Galeno credimus, Chamaleon hic niger esui, potuiue in medicina offerri non debet, siquidem mortiferum quippiam eius radicem habere existimat. Probè miscetur medicinis quæ digerunt & emolliunt. Calidus est secundo ordine, siccus tertio, Arabum sectarij Chamaleon cum Chamalea (hæc Mezereon est) confundūt. Ixia nō in Chamaleonte tantum albo, sed etiam in nigro reperitur, quod in Candia clarescit, ubi plurima in utroque ad arcum vsus colligitur, ceterum mortiferum esui venenum.

Crocodilium. CAP. X.

NOMENCLATURA.

Græ. Κροκοδείλιον. Lat. Crocodilion.

Ita. Crocodilio.

Gal. Falso, Carline.

Crocodilion Chamaleonis nigri figurā habet. Nascitur in syluosis, radice longa, læui, aliquantum lata, odore, ut Nasturtij, acuto. Feruefacta in aqua & pota radix, sanguinē copiosum per nareis pellit. Dat lienosis, eos euidenter adiuuas. Semē ei rotundū inest, duplex uti scutum, quod si apte ui urinam ciet.

Crocodiliū licet aliqui cū Chamaleone cōfundant, doctōrū tamen hominum iudicio planta est nobis adhuc ignota.

Dipsa

Dipsacum, siue Labrum Veneris.

CAP. XI.

NOMENCLATURA.

Græ. Δίψανθ. Lat. Dipsacus. Ita. Labro di veneri.

Gal. Chardon à carder.



Dipsacū siue labrū veneris.

Sanat rimas sedis, fistulasq̃, si tusa & decocta in uino radix, usque dum sit crassitudo ceræ, immittatur. Medicamentum area pyxide recondendum. Aiunt fornicationibus, uerucisq̃ pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorum in folliculo alligati, collo aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

Dipsacum aculeatarum generis est: caulem habet altum, spinis horridum, folijs Lactucæ, spinosis, binis genicula singula complectentibus, praelongis, ceu quasdam bullas intus & extra aculeatas, in dorso medio habentibus, concauo alarum sinu, in quo imber aut ros asseruetur: unde Dipsaci, quasi sitientis, nomen traxit. In cacumine caulis, singula surculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis, quæ arefacta, candida spectantur, dissectaq̃ medullatenus, uermiculos ostendunt.


Not

Notum est Labrum Veneris, seu sativum, quo in vellicandis pannis Veneris Fullonum ars vitur, & sylvestre quod passim provenit. Atenim quamvis seplasis vocetur Virga pastoris maior, Serapion tamen & Auicenna pro Polygonio accipiunt, & ob id non ex Arahibus, sed à se id nuncupationis cōmenti sunt. Dipsaci radix desiccata secundo ordine, & aliquantum absterforia est.

Spina alba. CAP. XII.

NOMENCLATURA.

Gr. Ἀκάνθα λευκή. Lat. Spina alba. It. Spina bianca.
Gal. Eine blanche. Off. Bedegnar.



Spina alba.

Spina alba nascitur in montibus & sylvis: folia fert albi Chamaleonis angustiora, & candidiora, aliquātum hispida, & aculeata: caulem supra bina cubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine, albicantem, intus cauum: in cacumine capitulū inest spinosum, ecbini marini amulum, sed minus, & oblongum, flores purpurei, in quibus semen eū Cnicum, sed rotundius. Huius radix pota, cœliacis, stomachicis, & ijs qui cruenta extussum, efficax est: urinam cit: tumoribus illinitur. Decocto eius dentes

in dolore collui prodest. Epotum semen conuulsis infantibus, & a serpente demorsis auxiliatur: gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.

Spinam albam quam Bedegar Arabes vocant, quidam Carduum Benedictum, alij Carlinam, alij Carduum illum quo ad coagulum lactis vtuntur Tusci, alij aliam Cardui sylvestris speciem putant, quorum nullus est, qui impingens nō aberret à ianua. Sunt qui certius esse putent Carduum illum sylvestrem, quem vulgus, Carduum Mariæ, & Itali, herba del latte, quod crebræ maculæ superiori foliorum parte aspersæ decidui lactis notas preferant. Enimvero hic Carduus in planis & campestribus, vt aduertenti videre licet: & spina alba, Dioscoridi in montibus & syluosis nascitur. Adde his quod folia producit duplo maiora, nedum minora Chamaleone albo. Huic cœsuræ præst Matthioli iudicium, qui in altioribus vallis Ananiæ montibus vidit & legit Spinam albam omnibus insignitam notis, quæ ab ea hoc ex capite requiruntur. Nunc seplasiolum muneris erit, iam non in planis, sed in montibus Spinam albā studiosè perquirere, nempe pari futuro successu. Quod autem Spina alba, Italicorum Carduus quem Presuram vacant, non sit, hinc patet: Presura feritur in hortis, folia habet albo Chamaleoni maiora huiusque capitula Echino longe ampliora sunt. Spinæ albæ radix desiccatur, & aliquantum astringit. Semen subtili est substantia, & facultate calidum. Potu conuulsis conuenit.

Spina Arabica. CAP. XIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ακάρδα Αράβικη. Lat. Spina Arabica.

Ital. eodem nomine. Gal. Off. & Ger. ignota.

Arabicam spinam natura albæ spinæ similem esse constat: ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones: mensium abundantiam, ceterasq; fluxiones radix etiamnum ualet. Prouenit in asperis.

Id moris habet Dioscorides vt re eandem non sæpius repetat, nec herbis arbores immisceat: eò manifestū per Spinā Aegyptiā Acaciā hoc capite non designatā, quæ (nimirū arbor) nihil ad spinæ albæ, quæ herba est similitudinē accedit, præcipue cū ismet diuersa de vtriusq; tradat. Gaïeno Arabica hæc spina astringit & desiccatur, cū eadē, sed valētiori quā spina

spina alba facultate. Enimuerò quando hanc ex Orientalibus nostro saeculo non habemus, huius vice spina alba substituenda.

Carduus. CAP. XIII.


NOMENCLATURA.

Græ. Σκόλιμϑ. Lat. *Carduus*.

Ita. *Cardo*.

Gal. *Artichault*.

Offic. *Articocalus*.



Carduus, Græci Scolymon uocant, folia Chamæleonis habet, aut albæ spinæ, nigriora, crassiora: caulem longum ædit foliosum, capite spinoso: radice nigra & crassa, quæ illita, graueolentiam alarum totiusq; corporis emendat: item si decocta in uino bibatur: copiosam autem urinam fetidamq; expellit. Herba cum reces tenerescit, in olera, Asparagi modo, transit.

Carduus.

Cardui

CArdui sylvestris plures & diuersæ sunt species, quamuis Plinius duas tantum enumeret. At domesticorum & hortensium, qui magna hodie diligentia excoluntur, quos Carduos peculiari nomine, & Itali Cardoni vocant, primariū locū tenent. Hi singulari artificio albi & nigri sūt, & magna ex parte bellarij loco cū Pipere & sale in postremū cœnarū serculum offeruntur. Carduus quem Græci Cacton vocāt, hodie ad Thuscōs è Neapoli & Sicilia deportatur. Succedunt quos Articos vocamus, & Itali Carcioffie horū quidam aculeati compressi, & apertialij non aculeati, rotundi, longi, aperti, & clausi, sunt inter hos qui pineas nuces referant. Nascuntur sine pinis Scolymi, si seminum acmina priusquam terra mandentur, lapidis attritu retundantur. Idem fiet, si delibrata radice Lacluce, & in tenues particulas dissecta, singula semina singulis indita segminibus obruātur. Semine per triduū rosarū succo, aut alio quopiā suauiter olēte madesacto eundē odorē adultā plāta referet, quē liquor à semine absorbtus. Ficulneus cinis, suillū stercus, lana radicibus obuoluta, mures à radicum erosione, quas summopere appetunt, expedit. Scolymi sub secundum desinentem ordinem, aut tertij initio excalfaciunt, & secundo desiccant. Alimentum præbent non probum, nempe melancholicum.

Poterium. C A P. XV.

NOMENCLATURA.

Græ. ποτήριον. Lat. Poterium. Ital.

Poterio. Gal. & Off. Ignotum.

Poterium, Iones Neurada vocant, largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, Tragacanthæ proximis, folijs paruis, rotundis: flore exiguo, candidi coloris: semine nullius usus, sed gustu acuto & odorato. Nascitur in aquosis, & collibus. Radices demittit binum ternūque cubitorum, nervosas & firmas: quæ proxime terram recisæ, dant succum gummi similem: tusæ, præcisæ neruis & uulneribus glutinandis illinuntur, decoctum quoque eius neruorum affectibus prodest.

Poterium



Poterium.

Poterium nullus est qui in me-
dium producat, ne in Italia
quidem, nec nisi a quo iure inter
ignotas plantas reponetur, cum
in plana Dioscoridis historia,
nullus sit qui non mire implica-
tus, scitè se ab hoc extricet.

Acanthiū. CAP.

XVI.

NOMENCLA
TVRA.

Græ. Ἀκάνθιον. La.
Acanthium. Ita. Acan-
thio. Gal. Chardon
benist. Off. Car-
duus benedictus.

Acanthium alba spinæ simile, folijs aculeatis per extre-
mitates, & lanugine araneosa obductis, ex qua collecta
& neta uestes bombycinis similes texunt. Folia uel radices ad
remedia opisthotoni bibuntur.

EX Cardui quem Benedictum vocant, lanugine collecta & neta,
vestes bombycinis similes ut texi non posse clarum est, & peræquè
Acanthium, Carduum Benedictum non esse. Nec secus, cum nostro hoc
saeculo, planta fertili intantum Lanugine nulla obducatur, fateri cogi-
mur ignotum nobis Acanthium.

Acanthus. CAP.

XVII.

NOMENCLATVRA.

Græ. Ἀκάνθα. Lat. Acanthium. Ita,

J

Acantho.

* *Acanthus hortensis*.*Sylvestris*.

Acantho. Gal. Branche vrsine. Offic. Brancha vrsina. Ger. Berempoot.

Acanthus, Romani Paderotamuocant, nascitur in hortis petrosis, & riguis: folia habet multò lactucaceis latiora, & longiora, Erucæ diuisura, nigricantia, pingua, lævia: caulem binum cubitorum, digitali crassitudine, læuem, prope uerticem ex interuallis circumdatum foliolis, ceu nucamenta quædam oblonga referentibus, spinosis, è quibus flos prodit albus: semen oblongum, luteum: caput thyrsi specie. Radicibus nititur longis, mucosis, rubris, & glutinosis: quæ ustis igni & luxatis artibus illi

illit.e subueniunt. Potæ urinam ciunt, sed aluum cohibent. Ruptis, conuulsis, tabem sentientibus, mirè prosunt. Nasctur & syluestris Acanthus, Scolymo similis, aculeatus, breuior quàm satius, & is qui in hortis prouenit: cuius radix ad eadem ad quæ superior efficax.

Acanthum esse Brancam vrsinam cum ex alijs notis apparet, tum quod quæ humi procubunt amplissima folia, arearum puluillos inuestiant, atque adeo ei insit facultas omnis quam Acantho attribuit Dioscorides. Porro de Branca vrsina intelligendum, quæ Romana dicitur, non de umbellifera herba, quam Nicander & Plinius Bupleuron, veteres Græci Buprestini appellarunt. Agrestis Acanthus non perindè cognitus. Folia modicè digerunt, radix desiccatoria & incisoria est, è tenuibus partibus composita.



Anonis CAP.

XVIII.

NOMENCLATVRA.

Gr. Ανωρίς. Lat. Anon-
nis. Ita. Bonaga. Gal.
Bugraues. Off.
Acutella.

Anonis.

Anonis, quam aliqui Ononida apellant, ramos habet fruticosos, dorante maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitibus rotundis, folijs Lenticula pusillis, ad

γ 2

Rutæ

Ruta aut pratensis spoti folia accendentibus, subhirsutis, odoratis non iniucunde olentibus. Muria conditur ante quam spinosa fiat, cibis gratissima. Rami acutioribus spinis, & ueluti spiculis firmiter horrent. Radicem mittit candidam, quæ excalfacit, & extenuat. Huius cortex ex uino potus urinam ciet, calculos comminuit, margines ulcerum erodit. Radix cum decoquitur in posca, dolorem dentium collutione mitigat. Decoctum eius potu hamorrhoidas sanare creditur.

N Ascitur Onotis in cultis & inculcis, eque ramis & radice sese aratro implicantibus, aculeatisque spinis, quæ boues pungit, Restæ bouis dicitur. florem, Ononis profert croceum, ut plurimum verò purpureum & candicantem, pisellis similem, licet minorem. huius radix arenulas renum per urinam potenter attrahit, atque adeo comminuit quæ illius vias obstruant. Puluis cum vino epotus par remedium in plerisque conficit. Nec defuit qui ab hernia carnosæ magnitudinis non mediocris, desperantibus medicis nisi ferro posse curari, huius ope sanatus sit. Ononidis radix excalfacit tertio ordine, abstergit, incidit, urinam proritat, renum lapillos effringit. Decoctum colluto inde ore, dolorem dentium sedat.

Leucacantha. CAP. XIX.

NOMENCLATURA.

*Græ. λευκακανθα. Lat. Leucacantha. Ita.
Bianca spina. Gal. Off.
Ger. ishora.*

L eucacantha prædita est radice Cyperi, ualida & amara: quæ manducata dolorem dentium sedat: ueteri laterum dolori, atque ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex uino poto. Eadem ruptis conuulsis medetur. Radicis epotus succus eodem præbet effectus.

Leucacantha

L Eucacantha & Spina alba de qua superius tractatum, non eadem sunt planta. Nempè præter id quod separatim eas Dioscorides & Galenus describunt, secretas etiam ab invicem facultates assignant. At enim non deliniatis nec à Dioscoride nec à Plinio, folijs, caule, flore, semine Leucacantha, hand facile sit indicare quæ hodie planta sit Leucacantha, Matthiolus licet hæsitās, hanc Carduum Mariæ dici posse existimat, ut cui insidentes prægrandibus folijs lactea macula Leucacantha nomen inderè potuerunt, & quod valida sit & amara radice. Leucacantha radix amara est & incisoria. In desiccantium est ordine tertio, & exsiccantium secundo.

Tragacantha. C A P. XX.

NOMENCLATURA.

Græ. Τραγάκανθα. Lat. Tragacantha. Ita.

Gomma draganti. Gal. & Off.

Dragantum gummi.

T Ragacantha radix lata & lignosa, summo cespite nititur, unde surculos humiles, robustos, latissimè fundit, in quibus minuta folia, multa, nonnunquam tenuia exoriuntur, quæ sub se spinas albas, rectas & firmas occulunt. Est etiam nū Tragacantha lachryma, quæ vulnerata radice manans concretit. Præstat pellucens, gracilis, levis, sincera & subdulcis. Cutis spiracula, ut gummi, obstruit. Huius increbuit usus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas voces, cæterasq; destillationes, cū melle in delinctu. subdita quoque lingua liquefcit: & in passo madefacta, drachmæ pondere bibitur contra renum dolorem, & vesicæ rosiones, mixto cornu cerui usto & eloto, aut scissi aluminis momento.

P Lanta Hirci spina, è qua ferro incisa gummi distillat, quod Gūmi Dragāti vocant, copiosè in Candia, Achaia, Morea, & quibusdam Asia partibus nascitur. Quā habemus, è Candia ad nos exportatur & Gracia. Tragacantha similem gummi vim habet, & parimodo desiccatur, licet non eadem acrimonia.

γ

3


Eryngium.

Eryngium. CAP.

XXI.

NOMENCLATURA.

Græ. ἑρίγγιον. Lat. Eryngium. Ita. Tringo.
Gal. Panicault.



* Eryngium.

odorata. Nascitur in asperis & campestribus. Vim habet calfa-
etoriam. Pota menses & urinas pellit, tormina inflationesq; di-
scutit: contra iocinorum vitia. serpentium morsus, & hausta ue-
nena: cum uino prodest. Bibitur aduersus plurima, cum seminis
Pastinacæ drachma una. Appensa illitæne, tubercula discutere
proditur.

proditur. Pota cum hydromelite radix, opisthotonicis & comitialibus.

Eryngium spectanda foliorum forma, & capitulorum situ, candida, pallida, & carulea conspiciuntur, carduorum omnium bellissimum, radices habet quæ siccata saccharo condiuntur. Ad nascitur una Eyrngij species marinis littoribus, folijs montano maioribus, huius radices teneriores & longiores, ad condiendum magis idoneæ sunt. Hæc idem duo quod maritimi istius Eryngij nullam Dioscorides mentionem faciat. Hic submonendi Arabum sectarij, ne Serapionis aliorumve Mauritanorum Secacul (planta Græcis incognita) Eryngium esse putent. Nusquam enim Serapio è Dioscoride & Galeno mutuatur, ubi non illorum pariter nomen apponat, nec paribus viribus describantur. Proinde non probè agunt qui Eryngij radices cum Saccharo melle conditas, ad vehementius incitandam venerè offerunt, quod Serapio Secacul, suo nobis ignoto, attribuit. Eryngium paululum caliditate à temperatura secedit, subtilis tamen eius substantia, non parvam siccitatem habet.

Aloë. CAP. XXII.

NOMENCLATURA.


Græ. Αλον. Lat. & Ita. Aloë.

Gal. Aloes. Perroquet.

Off. Alë hepaticum
Succotrinum.

Aloes folium Scillæ similitudinem habet, crassum, pingue, modicè latum, rotundum, retrorsus pandum: folia utrinque gerit ex obliquo spinosa, rariusculè striata, brevia & curta: caulis emittitur non dissimilis Antherico: flos albus: fructus hastulæ regie cognatus:

3 4 grani



Aloë.

gravi tota est odore: & gustu amarissima: radice una, ceu palo, in terram depacta. Plurima præpinguisq; in Iudæa gignitur: ex qua coactus succus affertur. Nasctur etiã in Asia & Arabia, in locis quibusdam maritimis: & in insulis (ut in Andro) non ualde succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda ulnera sanè quam utilis, si detrita illinatur. Duo succi gnera: quoddam arenosum, quod sedimētum purissimè esse uidetur. Alterum ad iocinoris imaginem uergit. Eligi debet boni odoris, syncera, quæ nihil doli sensit, nitida, calculorum expers, rufi coloris, friabilis ac iecinoris modo cocta, facile liquefcēs eximia amaritudinis: improbatur nigra, & fractu contumax. Gummi eam adulterant: quod deprehenditur gustu, amaritudine, & ualido odore: eoq; argumento, quòd digitis friata non ad minima usque frustra resoluitur. Noc desunt qui Acaciam immisceant, Natura eius est spissare, exiccare, somnū allicere & corpora densare, aluum resolvere. Stomachum repurgat binum cochlearium mensura, in aqua frigida aut egelida pota. Sanguinis reiectiones sistit: regium morbum purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu. Deuorata cum resina, aut cum aqua uel melle cocto sumpta, aluum soluit. Purgationis perfectæ causa, tribus drachmis sumitur, alijs purgatorijs medicaminibus admixta, præstat ut minus stomachum infestent. Sic-
ca glu

ca glutinandis ulneribus inspargitur: uulcera ad cicatricem perducit, cohibetque: eadem peculiariter exulceratis genitalibus medetur: disrupta puerorum præputia iungit: condylomata, rimasque sedis ex passo sanat: hæmorrhoidum abundantiam & sanguinis eruptiones sistit: pterygia ad cicatricem ducit: liuores & insignita, ex melle tollit: priuatim scabras lippitudines, pruriginésque angulorum permulcet: dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita ex aceto & Rosaceo: capillum fluentem continet, cum uino: tonsillis, gingiuis, & omnibus oris ulceribus, cum melle & uino proficit, oculorum medicamentis torretus, in munda & candenti testa, pennaque subinde uersatur, ut possit æqualiter torreri. Lauatur, ut quod sit arenosissimum, tanquam inutile subsidat, & leue ac pinguisimum assumatur.

IN Aloe diligenda adhibendus est delectus, siquidem magna ex parte adulterata reperitur. Plætæ Aloes nomine, in Italia notissimæ sunt. Aloe desiccantium est ordinis tertij: & sub desinentem exsalfaciētū primum, aut secundi initio. Repercutit simul & digerit. Aliquantum abstersoria est, sed modicè, & t vulneribus nihilum molestæ sit.

Absinthium. C A P. XXIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Ἀψίνθιον. Lat. Absinthium.


Ital. Assanzo. Gal. Aluyne

Absince. Off. Latino

nomine.

➤ 5

Absinthi



Absinthium.

Absinthium, aliqui *Bathypicron*, herba uulgò cognita. Præstantius in Ponto & Cappadocia, in monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi & astringendi: bilem expurgat, quæ & stomacho & uentri in hæsit: urinam cit, & crapulam præsumptum arcet. Ad inflationes uentris, & stomachi dolores prodest, cum scfeli et Nardo gallico potû: fistidia discutit, et arquatos sanat madefacti dilutû, aut decocti ius, quotidie tribus cyathis haustum: menses cit

potum, aut cum melle appositum. Contra fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur. Aduersatur Ixiæ uenenis cum uino, item Cicutæ, & muris aranei morsibus, & draconi marino. Angina eo cum melle & Nitro perunguntur, & epinyelides ex aqua. Ad sugillata & oculorû caligines ex melle illinitur: item auribus, si manat sanies. Dentium auriumq; dolores decoctum uaporis suffitu compescit. Decoctum in passo dolentibus oculis oblinitur: item præcordijs & iocinori, tritum cû cerato Cyprino: stomacho quoque longa ualetudine laboranti, cum Rosaceo: cum ficis autem, aceto & loliacea farina, aquæ inter cutem lienosisq; subuenit. Vinum ex eo fit, quod Absinthiten uocât, præsertim in Propontide & Thracia quo ad antè dicta utuntur, cum febris carent: alioquin in æstate propinât, & acceptam huic uino incolumitatem reserunt. In sparsum arcis Absinthium,

Absinthium, uestes ab erodentium iniuria vindicat: culices ex oleo perunctum abigit, & à corpore arcet: atramentum librarium diluto eius temperatum, literas à murium erosione tuetur. Existimatur liquamentum eisdem præstare effectus. Attamen potionibus improbat, quoniam stomachum malè habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui cocta amurca, liquamentum adulterant.

Marinum Absinthium.

CAP. XXIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Αψίνθιον θαλάσσιον. Lat. *Absinthium marinum*. Ita. Assenzo marino. Gal. Barbotine.
Off. Barbotina. Mors uermium. Ger.
Hypercruyt.

Absinthium marinum, quod aliqui Seriphum uocant, copiosissimum in Tauro monte, iuxta Cappadociam, & in Taphorisi Aegypti gignitur, quo Isiaci pro oliuæ ramo utuntur. Herba est tenuis, Abrotoni parui similitudine, referta minutulis seminibus, subamara, stomacho inimica. Ea grauius olet, & cum quadam calfactione adstringit: per sese aut cum Oryza cocta, interaneorum animalia, teretesq; tineas, adiecto melle, enecat, alium leuigat: cum edulio autem uel Lenticula decocta, eadem præstare pot. Pecora maximè pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus Absinthio assignatur, quo Gallia alpihus finitima scatet: id patrio nomine Santonicum uocant, regionis in qua

qua nascitur cognomento, Absinthio non dissimile, uerum subamarum est, non adeo seminis fecundum. Eadem quæ Seriphium potest.


TRia Absinthij genera facit Dioscorides, Vulgare, Seriphium, & Santonicum, quod in Gallia cisalpina nascitur. Præcipuum est Ponticum, secundum Santonicum, tertium Seriphium. Abrotonum album, non est Ponticum Absinthium: sicut nec Cypressus herba, marinum est Absinthium. Seriphium siue marinum à Seripho insula nomen accepit. Eius semen à spetiarijs Alexandrinum semen vocatur. Semen sanctum, Italis Semen xina, & Seme santo, quod conditum cum Zuccharo pueris utendum datur ad conficiendos vermes, marini Absinthij (nephe exilius) semen non est, sed herba quæ in monte Gargano nascitur, & Absinthio nostro vulgari similis est. Marinum Absinthium in Italia pluribus maritimis locis provenit. Absinthium simul amarum est, astrictorium, & acre, & per æquæ excalfacit, abstergit, roborat, & desiccatur. Calidum est primo ordine, siccum tertio: & succus herba calidior.

Abrotonum. C A P. XXV.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀβρότονον. La. Abrotonum. Ita. Abrotano.
Gal. Auronne. Off. Latino nomine.
Ger. Stabbutt.

ABrotonum duorum est generum. Fœmina quadam arboris specie fruticans, candicat, circum ramulos folijs, seriphimodo, minutim incisjs: floribus referta est, comantibus in summo, fulgore auri, corymbis: quod per æstatem prodijt, suauiter olet, cum gravitate quadam, & amaro gustu. Id genus Siculū esse constat. Alterum mas uocatur, sarmentosum, gracilibus ramulis uti Absinthium. Plurimum in Cappadocia gignitur, & Galatia Asiatica, atque in Syriæ Hierapoli. Crudum semen tritum & feruesfactum ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, conuulsis, ruptis, coxædiciis, urinæ angustijs, mensibus suppressis

*Abrotonum.*


Abrotonum mas vulgaris est noticia, & itidē Abrotonum scæmina, id Itali vt nos, Cipresso, & Santolina vocant. Abrotonum tertij est desiccantium & excalfacientium ordinis. Terrena est substantia, quæ è multo calore subtilis euasit. Digerit & incidit plus Absinthio, ob minorem nimirum acerbitem, quæ gustu deprehenditur: & quod stomacho inimicum est, vt Seriphium: cum è diuerso Absinthij gratum, amicum, & nihil noceat stomacho. Amarus etenim sapor solus stomacho in totum incommodat: Contra amicissimus austerus, acerbus, & astringentius, Porro in diuersa qualitalis planta, ea vincet quæ potentior fuerit.

Hyssopum. CAP. XXVI.

NOMENCLATURA.

Græ. ὕσσωπος. Lat. *Hyssopum*. Ita. *Hissopo*.
Gal. *Hissope*. Off. Latino nomine.

Hyssop



Hyssopum.

hementius, addita Iri, Cardamomo, aut Irione, deijcit: colorem in corpore fouet: lieni, & aquæ inter cutem, cum Fico Nitrog³, inflammationibus quoque ex uino illinitur: cum feruente aqua impositum, sugillata discutit: cum decocto ficorum, optimè anginis gargariatur. Decoctum cum aceto, dentium dolorem in collutione sedat: inflationes auricularum uaporis suffitu discutit.


NEquicquam dubitandum Hyssopum nostrum vulgarem, Dioscoridis esse Hyssopum, ut non in Hyssopum montanum ea ducenda est, quem herbarij Gratia dei, & Itali, Stanca cauallio nominant. Humidis & paludosis nascitur, palmo paucillum altior, latis ut in Hyssopo folijs, flore albo aut purpurascente, qui inter folia per totum pene caulem
emi

emicat. Summa in gustando amaritudinis, qua cum stipticum quippiã sentitur. Manducata aut pota choleram & flegma soluit innocuè. Redacta in puluerem, plagas (inspersa) breui tempore coagmentat. Hyssopus tertio ordine excalfacit & desiccet, & tenuium est partium.

Stœchas. CAP.

XXVII.

NOMENCLATURA.



Stœchas.


Græ. Στίχας. Lat.

stœchas. Ita. Stecha.

Gal. & Off.

Sticha-
dos.

Stœchas, iuxta Galliam in insulis eiusdem nominis è regione Massiliæ gignitur, unde cognomentum accepit. Herba tenuibus surculis, coma Thymi, longiore folio, subamara gustu, & aliquantum acris. Cuius decoctum, Hyssopi modo, ad pectoris uitia efficax est. Antidotis miscetur

* *Spica.**Lauendula.*

scetur. Viscera omnia, & uniuersum animantis habitum extenuat, ab obstructionibus & farctu liberat.

Stichas in Narbonensi prouincia, & Stichadibus insulis quæ ex aduerso Massilia sitæ sunt, & in Arabia nascitur, vnde maxima ex parte cum Alexandrinis mercibus Venetijs importatur, Nascitur & in Gargano Apulia monte, Narbonensi tamen & Arabica inferior. Stichas gustu amara est, & modicè astringit. Terrena substantia, frigida, astrictoriam: alia terrena, subtilis reddita, & densior, amaram efficit.


Origanum. CAP. XXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. ὀρίανος. ὀνίτις. Ἀγριορίανος. Lat. Origanum. Onitis. Origanum sylvestre. Ita. Origano.

Onite

Onite. Origano saluatico. Gal. Origan.

Off. nomine
Latino.

Origanum.

Organum Heracleoticum, quod & Cunilam uocant, folium habet Hyssopo non dissimile, umbellamq; non in rotæ speciem orbiculatam, sed uelut multifidam, semine in summis uirgis haudquaquam denso. Excalscit: unde decoctum cum uinopotum, demorsis à serpente conuenit. Si Cicutam aut Meconion hauserunt, ex passo: si Gypsum aut Ephemerum, ex aceto mulso propinatur. Ruptis, conuulsis, hydropicis, cum fico esui datur. Ari-

dum acetabuli mensura potum in aqua mulsa, atros humores per aluum extrahit: menses ciet, & tussi cum melle linclum medetur: ad pruriginem, psoras, regiumq; morbum, decocti ius in balneis prodest. Succus uirentis tonsillas, unam, & oris ulcera sanat: & per nares, ex oleo Irino infusum, trahit: aurium dolores cum lacte mulcet, Conficitur ex eo, & Cc-pis, & Rhois frutice, quo ad obsonia utuntur, uomitorium medicamentum, & his omnibus in cupreo uase per dies his uicenos insolatis, dum canicula sydus flagrat. Herbae autem

z. substratu

substratu serpentes fugantur. Quæ Onitis appellatur, candidiore est folio, & Hyssopo similior. Semen ueluti coniunctos corymbos habet. Vis ei Origani Heraclei, sed multò inefficacior. Syluestre Origanum, aliqui Panaces Heraction, alij Cunilam uocant, ex quibus est Nicander Colophonius: Folijs est Origani, ramis tenuibus, dodrantem altis, in quibus umbellæ. Anethi insunt, flores candidi: radix tenuis, superuacua. Peculiariter percussis à serpente, folia & stores ex uino poti auxiliantur.

Tragoriganum. C A P.

XXIX.

NOMENCLATURA.

Græ. τράγορίανος. Lat. Tragoriganum.

It. Tragorigano. Gal. Mastic. Off.

herba Masticina. Ger.

ignota.

Tragoriganum tenuis frutex est, syluestri Serpyllo aut Origano similis, folio & ramulis. Quibusdam in locis latius uirentiusq; inuenitur, & latioribus folijs, satis glutinosum. Alterum exilibus surculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui Prasium uocauere. Optimum est Cilicium, & Cretense, & Smyrneum, & in Chio Chooq; proueniens. Omnia excalfacient, urinam cient, aluo accomodantur, decocto potu bilem deiciunt, lienosis ex aceto bibere prodest, contra pota ixiæ uenena in uino bibuntur, menses trahunt: peripneumonicis, tussietibus, ex melle in eclegmate dantur. Grata acmitis eorum potio est: quare cibum fastidientibus & stomacho acida ructantibus, imbecilloq; traditur. Item si à marina iactatione nausea, & æstus præ

astus precordiorum excitetur: tumores uerò cum polenta illi-
ta discutiunt.

O Riganum! Heracleoticum & Onite in Italia non nascitur, forsi-
tan nec in alijs Europa locis. Quod autem vulgo Origanum di-
citur, sylvestre est Origanum, nempe quod in syluis, non satum, proue-
niat. E Candia siccum Origanum affertur, flore albo, acerrimi & odo-
rati gustus. Ad Tragoriganum duci potest, quantumvis pro vero Ori-
gano in seplasis venundetur. Siquidem scribit Dioscorides Tragoriga-
num in Cilicia, Choo, Chio, Candia, & Smyrna nasci. Quod non per-
indè de Heracleotico dicit. Origani desiccant, incidunt, & excalfaciunt
tertio ordine. Praterèa Tragoriganum adstrictorium est. Italico Origa-
no, in aliorum omnium vicem, e Matthiolo vii possumus.

Pulegium. CAP. XXX.



Pulegium.

NOMENCLA- TVRA.

Græ. γλῆχων. Lat. Pule-
gium. Ita. Pulegio. Gal.
Poulior. Off. La-
tino nomine.
Ger. Poley.

Pvlegium herba vul-
garis notitiæ. Exte-
nuat, calfacit, decoquit: mē-
strua, secundas ac partus ej-
cit, pulmonis vitia ex mel-
le & Aloe potum extra-
hit, & convulsis auxilia-
tur, nausæas stomachique

z z inter

intercisiones, ex posca permulcet: atram bilem per aluum exigit. Bibitur in uino utilissimè contra serpentium morsus. Defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum: gingiuas arefacti cinere corroborat: illitum cum polenta inflammationes omneis sedat: podagris per se subuenit, impositum usque dum rubescat locus: cum cerato uaros extinguit: lienosis cum sale utiliter illinitur. Decoctum eius ablutas pruriges mitigat, conuersas uulnas corrigit, contra inflationes duritiasq; uulua, in desefsiones conuenienter adijcitur. Vocant aliqui Blechona, quoniam dum floret gustatum a pecoribus, balatum concitat.

Est Pulegium mas flore albo, semina rubeo. Nascitur in Italia, & Gallijs, sed præcipua laus ei qui in Prouincia Romana provenit. Est ubi mas tantū repperiatur. In valle Anania, & propinquis Germania locis in hortis feritur, cum acris alijs herbis. Folia habet Nepe- tæ similia: acris gustu est & amarifculo. Ad hæc potissime excalfacit & desecat.

Dictamnium. C A P. XXXI.

NOMENCLATURA.

Græ. δίκταμος. Lat. Dictamnium. Ita. Dittamo.
Gal. Gimembre de iardin. Off.
Diptamum.

Dictamnium, aliquibus sylvestre Pulegium uocatur, Cretensis herba est, acris, lævis, Pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomento quodam spissaq; lanugine pubescunt. Florem nullum aut semen profert. Præstat omnia quæ satium Pulegium, sed efficacius multo, non potum modo, sed appositum quoque aut suffitum, defunctos partus eicit. Produunt in Creta capras sagittis percussas, huius herbæ pasu eas excutere. Purgandi uim habet succus, illitus, aut cum polenta tritus. Herba
impactos

impactos pedibus reliquoue corpori aculeos, illitu refigit. Ad
 lienis dolorem efficax habetur: siquidem ipsum imminuit. Me-
 tunt æstate & autumno. Radix eius gustu calfacit, partus ac-
 celerat. Succus cum uino potus, contra serpentium morsus præ-
 sidio est. Tanta herbe facultas est, ut olfacta abigat bestias, quæ
 uenenato ictu sæuiant, appensaq; contactu exanimet. Vulneri-
 bus ferro illatis, & uenenatis morsibus, insusus succus præsen-
 taneo est remedio, si etiã ab instillatione statim in potu assuma-
 tur. Quod Pseudodiētamnium uocant, multis in terris nascitur,
 antè dicto simile, sed minus quàm illud acre. Eosdem effectus
 præbet, sed inefficacius multo. Defertur à creta alterum Diētā-
 mni genus, folijs Sisymbrij, ramis maioribus: in quibus flores
 sylvestris Origani, nigri, molles: odor foliorum inter Sisymbriũ
 & Saluiam iucundissimus. Efficax ad eadem, sed minus na-
 res ferit. Miscetur emplastris & medicaminibus, quæ aduersus
 serpentium iniurias confinguntur, Theriaca uocant.

Habet vera Diētamnus Pulegij folia, dẽsa vtrinq; lanugine
 vestrata, quibus solus medicinam facit, lignosas radices quarũ ra-
 rus est vsus. At quæ vulgo in seplasijs Diētamnus habetur, fraxineis est
 folijs, glabris, solis radicibus medicatur. Quò apparet nos vera Di-
 ētamno carere. Cum tamen constat veram Diētamnium è Creta Vene-
 tias afferri, hic eniti summopere debent pharmacopola, vt non ex alio-
 rum sermone, sed ò proprijs notis deprehensum & cœmant, & in suas
 officinas inuehant. Diētamnus Italica, quam albam vocant, & quidã
 à fraxini foliorum similitudine, Fraximello, flores habet flagrantissimi
 odoris, leues & vagos: radicem amaram, & ideò intestinorum vermes
 conficit. Medetur hac venenis & venenatis quorumuis animalium
 morsibus. Stomacho prodest, & quæstrictum est pectus. Aqua quæ è
 flore, in Maria balneo conficitur, absque eo quòd odoris est eximij, nari-
 bus attracta, antiquæ capitis frigiditati admodum prodest. Diētamnus
 subtiliore quàm Pulegium est substantia, cetera similis. Pseudodiētā-
 mnus, & alia Cretensis Diētamnus ad nos non afferuntur, licet sint qui
 dicant hanc postremam, vulgarem nostrum esse Diētamnium.

DIOSCORIDIS
Salvia. CAP.

XXXII.


NOMENCLATURA.

Græ. ελελίσφακος. Lat. & Ita. Salvia.

Gal. Saulge. Off. Latinonominine. Ger. Salbey.



Salvia maior.



Salvia minor.

Salvia siue Elelisphecon frutex est ramosus: longus, virgas habens quadrangulas, & canas: folia mali Cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quæ sensim attritarum quasi uestium scabritiem referant, hirsuta, subalbida, perquam iucundo odore, sed graui: semen summis in caulibus syluestri Ormino simile gerit. In asperis nascitur. Menses cit & urin as


urinas, decoctum foliorum ramorumq; potum: partus extrahit: Pastinacæ marinæ ictibus auxiliatur. Capillos denigrat, uuln-
rum sanguinem cohibet, tetra ulcera purgat. Testium pruritus
sedant rami foliaque, si decocto eorum foueantur.

Salvia nota est planta, domestica quam francam vocant, & sylue-
stris quæ candidior est, & in totum hispidior. Nec tamen illa est, ne-
quis fallatur, quam officina: Centrum galli vocant. In Candia & ali-
quot regni Neapolitani locis, fructum Salvia producit colore caesio, gal-
le quercinæ similitudine. Salvia manifeste excalfacit, & leniter
adstringit.

Mentha. CAP. XXXIII.



Mentha sativa.



Mentha sativa altera.

NOMENCLATURA.

Græ. κέϑοςμος. Lat. *Mentha*. Ita. *Menta*.

Gal. *Mente*. Off. Latino nomine.

Σ

4

Mentha,

Mentha, cognita herba est. Calfaciendi, adstringendi, atque exiccandi uim habet. Sistit sanguinem, potio ex aceto succo, tineas in uentre teretes enecat, si uenerem stimulat, singultus, uomitiones, cholerasque sedant terni ramuli cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illinatur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet: mammæ, si tendantur, aut lacte turgeant compefcit: cum sale canum morfibz illinitur: aurium doloribus cum aqua mulsa subuenit: uulua ante coitum admota, cōceptioni resistit: lingua scabritiem conficta leuigat: coire lac, densarique in caseum non patitur, si folia potionibus lactis immergantur. In summa, stomacho utilis est, & in condimentis peculiarem gratiam habet. Syluestris Mentha, Latini Mēthastrū uocāt, hirsutior est folio, & prorsus maiore, quàm Sisymbrij, grauiori odore: quare minus ad sanorū usus expetit.

Mentha & Mentastrum nota sunt plantæ, Galeno & Dioscoridi ad accendendam Venerē validae, Acres & calidæ tertio ordine, quāuis cultura humidiorē domesticā reddat. Mentha amara, & aliquātum acerbæ, & subtilissimis constat partibus.

Calamintha. C A P.


XXXIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Καλαμίνθη. Lat. Offic. & Ital. Calamintha.

Gal. Calament. Ger. Fich mintz.

Ex Calaminthæ generibus quædam montibus familiaris, folia Ocimi habens incana, surculos aridos, & caules angulosos, purpureum florem. Altera Pulegio similis est, sed maior: quam syluestre Pulegiū ideo appellarunt, quod odore ipsum æmuletur, Meperam Latini uocitant. Tertia Mēthastro cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maioribus quàm superioris, sed uiribus inefficacior. Omnium folia gustu impense feruentia & acria: radix superuacua. Nasitur in campestribus aspe



* Calamintha.

gant: nigris cicatricibus candorem reddunt, in uino cocta, & illita, sugillata tollunt. Calamintha ischiadicis imponitur, ut ex alto humores euocet, summā cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus.

Matthiolus in altissimis vallis Anania montibus Nepetam montanam frequenter collegit, folijs Ocymo similibus & incanis, surculis angulosis, flore purpureo, & in ipsa valle, tertium genus Mentastro cognatum, sed acrius, & magis incanum. Idem caltariam herbam, quæ Italis, Herba gatta, secundum sed nec tertium. Nepeta genus non esse contendit, quod herba cattaria folijs cõstet in totum Vrtica & Melisso phylli, & non, Pulegi sylvestris. Latina vox est Nepeta, Græca Calamintha. Videant Herbarij & pharmacopola ut has Nepeta vel Calamintha


2 3 mentha

mētha species, probè & è Dioscoride discernāt. Nepeta subtilis substātia, sicca & calida est tertio ordine, gustu acris, & aliquantum amaro. Montana reliquis valentior.

Thymum. C A P.
X X X V.

NOMENCLATURA.

*Gra. Θύμος. Lat. & Off. Thymus. Ita. Thimo.
Gal. Mariolaine d'Angleterre.
Thym. Ger. Thymim.*



Thymum.

cretum sanguinem dissoluit: verrucas Thymi colorem reddentes,

Thymum ab omnibus cognoscitur, sarculosus frutex, exilibus folijs multis & angustis circumdatus: capitulis in cacumine, flore purpureo refertis. Gracili solo et petroso prouenit. Vim habet hanc, ut cum sale & aceto potum, pituitam per aluum detrahat. Decocti ius prodest orthopnoicis, & anhelatoribus: tinea uetris exigit: menses, partus, & secundas pel- lit: urinas ciet: cum melle & eclegmate: faciles facit ex- creationes: recentes tumores discutit, cum aceto illitū: con-


tes, pensilesq; tollit, ischiadicis cum uino & polenta impositum subuenit: hebetibus oculis in cibo prodest. Perquam utile pro condimento, duntaxat ad usus eorum qui recte ualent.

Thymum duarum est specierum. Selectum, quod flore est purpureo, nec hoc viribus inferius, quod album florem profert. Itali Apulum summopere aestimant. Candianum spicatis est capitulis, & odore flagrantissimo. Thymum aromaticum seplasia vocant. Thymum potenter calidum & incisorium est.

Satureia. C A P.

XXXVI.

NOMENCLATURA.



Satureia.

Græ. *ὄμβρα*. Lat. *Satureia*. Ita. *Coniella*. Gal. *Sarriete*. Ger. *Satnrey*.

Satureia triuialis notitia est: gignitur in asperis locis, & tenui solo, Thymo similis, minor tamen & tenerior. Desert spicam florum plenam, coloris herbaei. Eadem potest quæ Thymum, si modo consimili sumptitur. Aptus sanis usus. Est etiamnum quædam satiuæ, syluestri prorsus minor, quæ propter mitiorem acrimoniam, commodius in cibos recepta est.

Quam

Quam Græci Thymbram, Latini Cunilam vocant. hæc domestica est, & sylvestris. Domestica tantum, Satureia dicitur. Sylvestris odoratior est, gustu acrior, Thymoq; proprio effectu validior: Satureia verò imbecillior, sed cibus aptior.

Serpyllum. C A P.

XXXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ερπυμος. Lat. & Offic. Serpillum.

Ita. Serpillo. Gal. Serpouller.



Serpyllum.

Serpyllum duorum generum est. Hortense odore Sampsuchum imitatur, atque in coronas addi solet, cui à serpendo nomen inditum est: quoniam si qua eius particula terram attingat, inibi radices demittet. Folia & ramulos Origani habet, sed candidiores: in maceris multò procerius assurgit. Sylvestre, Zygis appellatum, non serpit, sed in altitudinem incre-
scit, ramulos ædens tenues, surculosos, folijs refertos longioribus quàm Ruta, & du-
riori

rigribus, angustis: flores iucunde olent, gustanti acres: radicis nullus usus. Nascitur in petris, satiuo efficacius, atque magis excalfaciens, & ad medendi usum aptius. Menses trahit, urinam potu ciet, torminibus ruptis, uulsis, & iocinoris inflammationibus auxiliatur, & aduersus serpentes potu illitūe. Capitis dolores mulcet coctum, adiecto Rosaceo, & madesactum in aceto: maximè uerò phreniticis & lethargicis conuenit. Cruentos uomitus sedat succus, drachmis quatuor ex aceto potus.

Ipsa experientia docet satium Serpillum non serpere, sed è Plinio in palmi altitudinem sese subrigere. Est syluestre Serpillum nulli non notum, id serpit. Eò fit ut inuersus Dioscoridis textus esse videatur. Calidum est & acre Serpyllum. Satiui ingens est apud Thuscis copia, & ea de causa errant, qui id Pulegium nostrum esse putant.

Sampsuchū. CAP. XXXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Σάμψυχον. Lat. Sampsuchum. Ita. & Off.

Maiorana. Gal. Mariolaine.

Ger. Meyeron.

Sampsuchum in Cypro & Cyziceno laudatissimum: secundum sibi locum uendicauit Aegyptium. Amaracum gens Sicula & Cyzicena appellat. Herba est ramosa, per terrā repens, folijs eius Calaminthæ, quæ tenui folio constat, Leptophyllos appellatur, hirsutis & rotundis. Suauissimum odorem spirat, ideo coronis inseritur. Vis eius excalfaciens. Succus decocti potus, conuenit incipientibus hydropicis, & ijs quos urinæ difficultas, aut tormina excruciant. Illita ex melle arida folia, sugillata tollunt: menses subdita in pecto trahunt: contra scorpionis ictū ex aceto et sale illinunt: luxatis tumoribusq; cerato excepta imponunt.

imponuntur: aduersus oculorum inflammationes, tumoresq³ cū polline polenta illini prodest. Acopis malagmatisq³ calfaciendi gratia, commiscetur.

Sampsuchus & Amaracus idem sunt. Nam quod de his diuersis capitibus a Galeno & Paulo tractatur, ea causa est quod per Amaracum, Marum intelligunt, simile quidem Sampsucho, nisi quod amarius est et odoratius: & Cizici Marum, Amaracus vocabatur. Sampsuchus tenuium est partium, tertia classe digerit, desiccatur, & ex calfacit. Porro Amaracus, Galeno & Paulo, non aliunde Marum est, quam è codicum corruptela, (vt doctorum iudicium est) in quibus aliqua Amaracus inscriptus, ubi Marum esse debuerat.



Melilotos, siue sertula Campana.

CAP. XXXIX.

NOMENCLATURA.

Græ. μελιλωτος. Lat. Sertula campana. Ita. Sertola campana. Gal. Coronne de Roy. Off. Melilotus. Ger. Clautren.

Sertula Campana laudatissima in Attica, & Cyzico, & Chalcedone nata: cuius odor uicinus est Croco, boni odoris. Nasceitur & in Campania circa Nolam, colore in luteum languescente, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam. Inflammationem omnem emollit, præsertim quæ in oculis, uulua, sede, aut testibus crumpat, si ex passo cocta illinatur: interdum autem addito oui luteo assato, aut Fœnigræci farina, Lini semine, aut polline, capitulis Papaueris, Intybœue. Recentes meliceridas per se cum aqua, & ulcera manantia in capite, illita cum creta Chia, uino aut Galla sanat. Stomachi dolores & cruda & cocta cum aliquo ex antè dictis leuat: doloribus aurium mitigandis cruda
ex

*Melilotus.**Melilotus Italica.*

ex passo instillatur: in aceto aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit.

Officinarum Melilotus, vera est (quam quarto libro describit Dioscorides) Lotus urbana, Præcellens Melilotus in regni Neapolitani Campania multis in locis nascitur, indeq; semen & flos in alias regiones ceperunt exportari. Mixta est facultatis, cum aliquanta astringitione, digerit tamen & maturat, siquidem calida in eo substantia, frigida valentior est. Huius semen Serapioni in usum medicinae cedit.

Marum. CAP. XL.

NOMENCLATURA.

Græ. Μαροϋ. Lat. Marum. Ita. Maro.

Gal. Proprium & certum nomen non habet. Off. Lat.

nomine.

Marum

Marum herba cognita uulgò, surculosa, flore Origani, folijs multo longioribus, flore odoratiore. Vim habet Symbrio consimilem. Substringit enim & modicè calfacit: quae de causa illitu serpentia ulcera sistit, & in calidas illitiones additur. Iuxta Magnesiam & Tralleis copiosissima gignitur.

Marum Galeno & Plinio peregrina herba, huic Aegyptia, illi Asia-tica & Cizicina: hoc quidam Maioranam nostram gentilem seu minutam putant, verum cum Plinius inter peregrina odoriamenta recenscat, ut hanc non in Europa nasci credamus, facit. Porro, Marum, ut iam dixi, Amaraco amarius & odoratius est. Attamen Mari vicem, Amaracum nostrum minutum, supplere sine noxia poterit.



Acinos.

Acinos.

CAP. XLI.

NOMENCLATVRA.

Græ. Ακινος. Lat. Acino. Ita. Acino. Gal. Basilic menu. Off. ignota. Ger. Klein Basilien.

Acinos aut Aconos à Græcis dicitur, tenui siccoq; ramulo herba, Ocimo similis, odorata, sed hirsutior, qua corona factitantur: à nonnullis olitoribus colitur. Menses & aluum pota sistit. Illita panos

panos ignemq³ sacrum sanat.

Acinos Ocimum Caryophyllatum esset, ni Plinius diceret, Acinon nullum florem producere, at nostrum hoc Ocimum floret sub autumnii initium. Adde his, Acinos, ramulis & folijs hirsutior, & odore Ocymo inferior est. Manardus & Matthiolus in illustranda medicina praestantes viri, (Si quidem Acinos in Italia nascatur) herbulam esse opinantur, quæ in agrorum limitibus & semitis nascatur, hirsutam, & aliquantum odoratam, cui à quibusdam Basilici sylvestris nomen inditum est.

Baccharis. C A P.

XLII.

NOMENCLATURA.

Gr. Βάκχαρις. Lat. Baccharis. Ital.

Bacchara. Gal. Gant de nostre

Dame. Off. ignota.

Baccharis herba fruticosa, quæ in coronas additur: cuius folia aspera sunt, media Violæ & Verb. sci magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitudinem petēs, aliquantulum asper, non sine appendicibus adnatis: flore purpureo, subalbicante, odorato: radicibus Veratro nigro similibus, quibus odor inest. Cinamomo proximus. Asperum squalidumq³ solum amat. Radix in aqua decocta ruptis, uulsis, ex alto præcipitatis, spirandi difficultati, salutaris. Item diuturnæ tussis, & urinae difficili: menses pellit: contra serpentium morsus utilissimè datur in uino. Recens radix apposita, partum extrahit. Puerperis eius decoctum in desensionibus prodest. In diapsmata utiliter inseritur, iucundi odoris gratia. Folia ut potè quæ adstringant, capitis doloribus ilitu profunt: oculorum inflammationibus, mammis tumentibus à partu, egilopijs incipientibus, ignibusq³ sacris auxiliatur. Odor somnum gignit.

Baccharis, viuida & potēs, nō est Asarum, cuius hælenus vice Baccharis vsus increbruit. Ruellius, Dina Maria chirothecas (nam herba est

Α


ba est

ba est hoc apud Gallos nomine) esse putat. Matthiolus eorum opinionem improbat, qui Baccharem Caprifolium existimant, herbam quæ Officinis Matris sylva, & Italis Scarleggia domestica vocatur, nepe radicibus non ea quam requirit Dioscorides similitudine ad Veratrum nigrum accedentibus: & odore nihilum Cinnamomo propinquo. Si quidem radicibus constat raris, candicantibus, gracilibus, & inodoris. Et eo conjici difficile esse, Baccharem in Italia reperiri. Quid de Gallijs sperandum, quæ magis ad septentrionem vergunt, eam ne herbam producere, quam Galenus dicat odore Cinnamomo simili, coronariam, & acrè? Conferant, qui limato sunt iudicio, ac sententiam ferant.

Ruta. CAP. XLIII.

NOMENCLATURA.

Græ. ῥύανον. Lat. Ita. & Off. Ruta. Gal. Rue.



Ruta.

bo potuue extinguit: cum Anetho sicco decocta, tormina sedat. Facit ad pectoris lateruq; dolores: difficultate spiradi, tussis, pulmonis

Ruta montana sylvestrisq; sativa & hortensi acrior est, & in cibis damnata: sativa uero quæ sub Ficu arbore enascitur, magis in cibos admittitur. Vtraque urit, calfacit, exulcerat: urinam ciet, menstrua pellit, alui sistit potu ciboue: letalium medicamentorum antidotum est, si semen ex uino, acetabuli mensura, ebibatur. Folia per se præsumpta, aut cum nuce iuglande, aridisq; ficis, inefficaces uenorum uires reddunt: contra serpentes simili modo sumere conuenit: geniturâ ci-

monis inflammationē, coxēdicū articularūq; cruciatus & horro-
res febriū circuitu repetētes, pota ut antē dictū est. Itē ad infla-
tiones coli, uulua, reſtiq; intestini, cū oleo decocta & infusa. Fæ-
minas uulua strangulatu liberat, si à genitali sedetenus cū melle
subyiciatur. Feruefacta ex oleo, & pota, uentris tineas excutit:
articularijs doloribus ex Melle, aqua inter cutē cū ficis illuntur.
Eisdē in potu auxiliatur, decocta in uino ad dimidias partes, &
oblita. Cruda cōditaq; cibo, uisus acie excitat: dolores oculorum
illita cū polēta lenit, doloribus capitis cū Rosaceo & aceto illita
auxiliatur: profluētē naribus sanguinē sistit, trita & indita: te-
stiu inflammationibus cū laureis folijs imposita, & eruptionibus
papularū cū Myrto & cerato prodest. Cū pipere autē, uino &
Nitro affricta, albæ uutiligini medet. Cū eisdē illita, formicatio-
nes tollit, & uerrucas quæ Thimi florē repræsentāt: cōtra impe-
tignes cū alumine & Melle utilissimē imponit. Succus in mali
Punici calyce calfactus, auriū dolori efficaciter infundit: hebetu-
dinē oculi qui sensere, Ruta cū Fæniculi succo ac Melle peructi iu-
uatur: ignē sacrū, ulcera quæ serpūt, aut in capite manāt cū aceto
Rosaceo & Cerusa persanat. Māsa alliorū cepearūq; acrimoniā
domat. Mōtana si copiosius estur, interficit. Dū florē promit, &
ad murias colligitur, cutē inflat: & rubore quodā inficit, cū pru-
ritu ac uehemētī inflammatione. Oportet itaq; eā unctis antea ma-
nibus & facie colligere. Tradūt succū gallinaceis pullis inspar-
sum feles arcere. Adyctū eā quæ in Macedonia circa Haliacmō
amnē prodeat, comedētes interimere. Montosus autē is locus, ui-
peris scatet. Semē eius potū, cōtra intestina uitia efficax est: in an-
tidota cōmodē addit: cōtra incōtinētiā urina tostū, semē septenis
diebus potui datur. Radix huius montanū Moly uocatur. Sylue-
stris Ruta satiuæ similis est. Prodest comitialibus & coxēdicū
doloribus: mēstrua mouet, partus enecat. Acrior est uiribus quā
hortensis, & ualidior. Syluestris, utpotē noxia, cibis abdicatur.

Syluestris ruta. CAP. XLIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. ῥήγαμου ἄγριου. Lat. Syluestris ruta

Ita. Ruta saluatica.

Gal. Rue sauuage. Off. Harmela.

Vocant etiamnum Syluestrem Rutam, quod in Cappadocia & Galatia Asia finitima Moly dicitur. Frutex est qui ab una radice multos emittit cauliculos: folijs multò quàm alterius Rutæ longioribus, tenerioribusq̃, odore graui: flore candido: capitulis in cacumine paulò maioribus, quàm satiuæ Rutæ, quæ tribus maximè partibus constat: in quibus triangulum semen, subrusum, gustu amarum recluditur, cuius est usus. Semen autumnno maturescit: quod cum melle uino, Croco & Fœniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem. Sunt qui eam Harmalam uocent, Syri, Besasan. Qui Cappadociam incolunt, Moly, quoniam quandam cum Moly seruet similitudinem: radice nigra, flore candido. In collibus, & lato solo provenit.

Moli. CAP. XLV.

NOMENCLATURA.

Græ. μῶλυ. Lat. Moly.

Ita. Moli.

Gal. Off. & Ger. ignota.

Moly folia habet Graminis latiora, humi sparsa: florem albæ Violæ similem, sed minorem, lactei coloris: caulem

lem candidum, quaternum cubitorum, in cuius cacumine inest aliquid quod *Ally* speciem referat. Radix parua, bulbosa, quæ mirum in modum ualet ad aperiendas uuluas, si trita cum Irino unguento, in pesso subijciatur.

Ruta & hortensis & syluestris notæ cuius sunt planta. Syluestris (non de hac loquor cui 44. Cap. peculiare fecit Dioscorides) in campestribus nascitur, & montibus iuxta Montem Pessulanum, & alijs calidioribus Galliarum locis. Italia in montibus Diui Valentini, & Gargano, & Goritiano comitatu. Domestica similis est, nisi quod acrior & odoris grauior. Ruta syluestris in excalfacientium est ordine quarto, domestica tertio. Herba non acres tantum, sed etiã amara. Digerunt, & potenter desiccant. Ruta in venena virtutem nouere Mustella, hac siquidem se præparant cum serpentibus dimicatura. At Ruta syluestris qua de separatim tractat Dioscorides, cuiusque natales peregrinos facit, differt à Ruta syluestri, cuius præcedenti capite mentione facit. Galeno, radice est nigra, flore lacteo. Reperitur in Gallia Narbonensi cum omnibus notis, quas ab ea Dioscorides expostulat. Præter has tres Ruta species, est etiam Ruta capraria, quem Itali Galega vocant, & Thusci, Lauanese. Nascitur in ipsis fossarum summitatibus, Fœnogræco similis. Huic mirandam vim in pestem attribuunt, in venena, & maximè serpentiũ, cibo sumpta, seu illita morsui. Pota semiuncia ponderet, pueros sanat epilepticos, Attamè hæc Ruta capraria, nõ est Polemonia. Moly Homero, ad excutiendas fascinationes valentissimum, inuentori Mercurio tribuitur, radice rotunda nigraq; magnitudine Cephæ, Folio Scyllæ, flore candido, Gracis alijs luteo. Plinius Moly sibi allati meminit, in Campania agrè inter difficultates saxeas effossi, radice triginta pedes longa, ac nec sic quidem solida, sed abrupta. Moly nostro tempore ignotum, nec est, qui è locis ubi nascitur, proferat.

Panaces. CAP. XLVI.

NOMENCLATURA.

Græ. πανακες ἡράκλειον. Lat. Panaces heracleum.

Ita. Panace heracleo.

Gal, Off. Ger, ignotum,

Panaces nonnullis Heracleum dicitur, ex quo Opopanax colligi solet. Plurimum in Bæotia & in Phocide Arcadiæ nascitur: ibiq; compendij & quæstus, qui ex eo liquore facilitatur, gratia studiosè colitur. Folijs est asperis: in terra iacentibus, herbacei coloris, multum ad ficulnea accedentibus, in ambitu quinque partito diuisis: caule, ut Ferula, altissimo, qui lanugine quadam incanescit, folijs etiam minutioribus obsitus, muscarijs, ceu Anethi, in cacumine: flore luteo, & semine odorato feruenteq; radices habet multas ab origine una, candidas, graneolentes, crassi corticis, & subamari gustus. Nascitur in Cyrene Libya, & Macedonia. Excipitur succus incisa radice, recenti caulium pullulatu: ea candidum succum emittit, qui siccatus, in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentem autem succum excipiunt, folijs excauato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo caule mesibus inciso, profluentem succum eximunt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, distentæq; sicca, quæ cariem non sentiant, aromatica, feruentes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur quàm amarissimus, internè albus, aut subfuluus, foris ad Croci colorem inclinans, lauis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquescent, graui odore. Niger improbatur, ac mollis. Adulteratur Ammoniaco aut cera. Sed Snceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluitur, & lactescat. Excalfacit, mollit, extenuat: horroribus febrium circuitibusq; uulsis, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio urinæ conuenit. Contra uesicæ scabiem ex aqua mulsa aut uino bibitur: menses trahit, sætum enecat, inflationes quæ uuluam malè habent, duritiasq; ex melle dilutus, discutit. Ischiadicis illinitur, acopis & capitis medicaminibus admiscetur, carbunculos rumpit, podagricis cum uua passa illitus subuenit, dolore dentium liberat, canis inditus, oculorum aciem

aciem illitu excitat. Ex eo & pice optimum fit emplastrum, cōtra bestiarū morsus, quæ in rabiē efferantur. Radix in ramēta conscissa, uulua admota, partus extrahit: ad uetera ulcera efficax est, nudata ossa, corpore operit, si trita cum melle illinatur. Semen cum Absinthio sumptum, menses pellit: cum Aristolochia prodest aduersus animalia, quæ uenenum eiaculantur. Et contra uulua strangulatus in uino bibitur.

Panaces Asclepij. CAP.

XLVII.

NOMENCLATURA.

Græ. πᾶνακες ἀσκληπιῶν. Lat. Panaces Asclepij.

Ita. Panace d' Asclepio.

Gal. Off. Ger. ignotum.

Panaces Asclepij, caulē à solo emittit tenuē, cubitalē, geniculatū, circa quem folia Fœniculi fundūtur, sed maiora tamē hirsutioraq̃, odorata: in cacumine umbella, ubi flores emicāt aurei, odorati & acris gustus: radix parua est & tenuis. Auxiliare uim habēt flores & semina, contra ulcera, phagedanas, & tubercula, si trita cū Melle imponantur. Aduersus serpentes ex uino bibuntur, & cū oleo illinuntur. Aliqui Panaces syluestre Origanum uocant: alij Cunilam: de qua in Origani mentione diximus.

Chironium Panaces. CAP.

XLVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. πᾶνακες χειρῶνιον. Lat. Chironium Panaces.

Ita. Panace Chironio.

Gal. Off. Ger. ignotum.

✠ 4

Chiro

C Hironium Panaces in Pelio monte maximè provenit. Folium eius Amaraco simile: flos aureus: radix parua, quæ non altè demittitur, gustu acris. Pota radix serpentium ueneno resistit. Illita coma, eadem præstat.

Panaces ab inuentoribus agnomen sortitum, nempe primum ab Hercule, secundum ab Aesculapio, tertium à Chirone, ipso suo nomine morborum omnium remedium pollicetur. Panaces Herculeum spontè in Italia provenit, maximè in Apulia, in Apennini iugis, & in monte quem sibi proximum Senenses, Argentæo vocant. Seritur & pluribus in hortis, ostentationis & publici spectaculi gratia. Atenim in nullo Italia loco extrahitur is liquor, quem Opopanacem vocant. Hic Venetijs ex Alexandria assertur, magna ex parte adulteratus, reperitur tamen quandoq; singularis, nitidus, & sincerus. Semen & radix Panacis ad nos hodiè non asseruntur, quantumvis hæc sanè necessaria. Ideò diligentes Chirurgi ad inducenda quæ carne nudata sunt ossa, radicum fragmenta magna sedulitate inter condensatum gummi perquirant, quæ puluerem in id remedium efficiant. Opopanax qui incisa sit radice, vel caule Panacis Herculei, excalfacit, emollit, & digerit, tertioque excalfacientium est ordine, & desiccatum secundo. Radicis cortex calida & sicca est, minus tamen succo, ut quæ aliquantum absterforia sit. Panaces Aselepium & Chironium nemo est qui ostendat, aut in Europam asserat.


Ligusticum. CAP. XLIX.

NOMENCLATURA.

Græ. Λιγύστινον. Lat. Ligusticum. Ita. Ligustico.

Gal. Liuesche. Off. Leuisticum.

Ligusticum, quod alij Panaceam, alij Panaces uocant, plurimum in Liguria nascitur, in monte Apennino, Alpibus contermino, unde nomen traxit. Panaces incolæ non ab re appellant, quoniam & radice & caule, Heracleotico Panaci simile sit: & uiribus eisdem præditum. Gignitur in altissimis asperisq; montibus, ac umbrosis, maximè iuxta fluentia. Cauliculum fert Anethi, geniculatum, tenuem, & in circuitu folia sertula campanæ, molliora, odorata, prope uerticem graciliora

* *Ligusticum.*

lora, & longè magis di-
uisa: in cacumine muscariū,
in quo semen dependet ni-
grum, solidum & oblon-
gum, fœniculo proximum,
gustanti acre, & aroma
olens: radix candida, Hera-
cleotici Panacis similis, odo-
rata. Radicis seminisq; uis
excalfactoria, cōcoques. Pro-
dest ad intestinos dolores,
tumores, concoctiones. Item
ad inflationes, præsertim
quibus stomachus turgeat:
& cōtra serpentium iētus:
urinas & menses potu tra-
hit. Eosdem præstat effectus
apposita radix. Semen cum
radice oxyporis & medi-

camentis decoquentibus admiscetur: ori perquàm utile: quare
pro Pipere utuntur eo indigenæ ad obsonia. Adulteratur semi-
ne quodam simili, quod facile gustu discernitur: amarum enim
est. Alij semen Fœniculi aut Seselis admiscentes Ligusticum
dolo utiant.

Ligusticum, à Liguria ubi plurimum nascitur, Galeno Libysticum,
non est Leuisticum vulgare. Siquidem Leuisticum non nisi in hor-
tis prouenit. Caulem facit altissimum, concavum, & crassum, & non
tenuem, ut de suo narrat Dioscorides. Folia nihil ad Sertulam campa-
nam accedunt, at ut Apij incisa, crassiora tamen & maiuscula. Semen
licet Fœniculo proximum, tamen solidum non est, nec aroma olens, sed
friabile, & squamosum. Porro cum verum Ligusticum Genuæ & per
totam Liguriam copiosè nascatur, & inibi semen in ciborum condi-

A 5 men

mentum veniat, publice tamen in alias Italia partes non exportatur.
Eius etiam summa abundantia est in altissimis vallis Anania & Go-
ritiani comitatus montibus.

Pastinaca. CAP. L.

NOMENCLATURA.


Græ. Σταφυλίν & ἄγρι &.

Lat. Pastinaca sylvestris.


Ita. Pastinaca saluatica.

Gal. Carrotes sauages. Off. Latino nomine.

Ger. Wild Pasteney.



Pastinaca domestica.



Sylvestris.

Pasti

Pastinaca sylvestris folia Gingidij habet, latiora, subamara caulem rectum, scabrum: umbellam similem Anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio purpureum quiddam, sermè croceum: radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen potum uel impositum, menstrua mouet. Iis conuenit in potione, quos urinæ difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si a qua cutem subiit. Serpentium morsibus ietibusq; prodest. Præsumentes id nulla affici iniuria à serpentibus traduntur: conceptus adiuuat. Radix urinam pellit, uenerem stimulat, partus apposita eijcit. Folia trita, & cum Melle imposita, phagedenas ulcerum purgant. Satina ad eadem pollet, inefficacior tamen, & cibo aptior.

Pastinaca domestica & sylvestris, utraque nostro tempore in hortiensi re nota est. Nec tamen Pastinaca domestica Carota est, nimirum quod nullus vnquam scripserit, Pastinacam domesticam, radice purpurea & sanguinea. Eodem in errore versantur, qui pro Dauco, syluestris Pastinacæ semen accipiunt, de illa loquor quæ in umbellæ medio paruum florem & purpureum producit. Et quamuis Dauci & Pastinacæ sylvestris sic vires conueniant, ut vnum pro altero usurpari queat, non ideo sequitur idem esse Daucum & Pastinacam sylvestrem. Hæc in totum domestica valētior, præcipuè semen & radix, & absterforium in se quiddam continet.

Seseli. C A P. LI.

NOMENCLATURA.

Gr. Σεσέλι Μασσαλιώτικον. Lat. Seseli

Massiliense. Ital. eodem nomine. Gal.

Ser mōtain. Off. Siler montanū.

Seseli Massiliense folia Fœniculi habet crassiora: caulem uetgiorem: umbellam Anethi, in qua semen oblongum, angulosum, degustanti statim acre: radix longa est, iucundi odoris. Semē & radix excalfaciēdi uim habēt, potu stranguriæ & ortho



Massiliense Sefeli.

longa: frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis, ramis sesquipedalibus, capitulo Anethi, semine in tritici morem denso, nigro, amaro, Massiliensi odoratiore, & acriore, multū suavi. Peloponnense folia habet Cicutæ, latiora, & crassiora: caulem supra Massiliensis magnitudinem, serulaceum, & latam in cacumine umbellam, in qua semen latius, odoratum, & carnosum pendet. Eisdem uiribus præditum est. Nasitur in asperis, riguis & collibus, inuenitur etiamnum in insulis.

Creticum seseli. CAP. LII.

NOMENCLATURA.

Græ. Τορδύλιον. Lat. *Tordilium*. Ita. *Tordilio*.

Gal. Off. Ger. non satis cognitum.

Tor



* *Creticum seseli.*

non rarò, quod delineationi Dioscoridis nō respondeat, in quo nihil præter amaritudinē & cimicū odorē sentiatur. Sefeli Aethiopicū, Peloponnesiacum, & Creticum ad nos non asseruntur, ac proinde eorum notitia deperijt. Ceruæ à partu Sefeli se purgant.

Sison. CAP. LIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Σίσωυ. Lat. Sison. Ita. Sifone.

Gal. nomen nō habet. Off. perperā semē Amomi.

Sison exiguū semen est, in Syria natū, Apio simile, nigrū, feruēs, oblogū. Cōtra lienis vitia bibitur, urinæ difficultatē potu emēdat, remoratos mēses citat. Quo in cōdimētis cū cucurbita, & aceto, indigenæ utūtur. In cacumine granula multa gerit.

Quidā semen illud quod pro Amomi semine officinā ostēdūt, eadem qua petroselini vulgaris forma, colore pullū, cū tunditur odora-
tum

Tordyliū, quod aliqui Creticū Sefeli uocāt, iuxta Ciliciā in Amano mōte nascit, herbula surculosa, semine duplici, rotūdo, scutuli effigie, odorato, subacri. Cōtra urinæ difficultatē bibitur, potu cit mēses. Succo seminis caulisq, uirentis, ternis obolis ex passo decē diebus hausto, renes sanantur. Efficax est radix ad ciēdas pēcloris excreationes, in delinētū cum melle.

Sefeli Masiliense tum in vicinis Masilia locis, tum in omnibus Tridentinis montibus enascitur, & speciarie quāuis quādoq; probatū, habēt tamen


tum, gustu acri, linguamq; flagrantia vellicante, Sisonis esse semen putat. At ignota nobis planta, qui tandem de semine statuere possumus? Nec enim expeditum hisde rebus iudicium, quae de praecipua partes & nota depicta non sunt.

Anisum. CAP. LIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. *Ανισον*. Lat. *Anisum*. Ita. *Aniso*.

Gal. *Anis*. Off. Latino nomine. Ger. *Anisz*.



Anisum.

Anisi & plāta & semē vulgaris sunt notitia. hoc vtile admodum est, acre, & amarumculum, & natura ad exurentia accedens, tertia calidorum & siccorum classis.

Carum. CAP. LV.

NOMENCLATURA.

Græ. *Κάρε*. Lat. *Carum*. Ita. *Caro*.

Gal.

Gal. & Off. Carui. Ger. *Wöl Comitn.*

Carum, semen est vulgaris notitiæ. Excalfacit, urinam concitat, stomacho utile, os commendat, cōcoctionē adiuuat, utiliter miscetur antidotis & oxyporis, Anisi uicem præbet. Radix cocta, Pastinacæ modo manditur.


Carum pratensis herba cum semine nota est. Id Germani panibus immittūt, eoq; in ciborum condimentum vtuntur, vt nos Aniso. Tertio fere ordine excalfacit, & desiccāt, & modicā acrimoniā respicit.

Anethum. CAP. LVI.

NOMENCLATURA.

Græ. *Ανέθον.* Lat. *Anethum.* Ita. *Anetho.*

Gal. *Anet.* Off. Latino nomine.



Aridi Anethi coma seminisq; decoctum, potu lac euocat, inflationes, & tormina sedat, aluū, uomitionesq; sistit, urinas ciet, singultus lenit, oculorū acie hebetat, geniturā restinguit, assidue potum. Fæminis uulua malo opportunis, ad deſſiones utile. Condylomata illitus eius cinis tollit.

Anethi planta feniculo adſimilis, latius tamen ſemē. Calidum eſt Anethum ſub finē ſecundi gradus, aut ineunte tertio. Vſum calidum & ſiccum eſt tertio ordine.

Anethum.

Cumin

Cuminum satium. CAP. LVII.

NOMENCLATURA.

Græ. Κύμινον ἡμερῶν. Lat. Cuminum satium. Ita. Cimino domestico. Gal. Cumin. Off. Cuminū romanū.


Cuminū satium ori gratū est: sed multo magis Aethiopicū quod Hippocrates regiū appellauit. Secundum locū tenet Aegyptiū, reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Teretia, & plerisq; alijs tractibus. Excalfacit, adstringit, exiccat. Ad tormina inflationesq; cōuenit, coctum & cum oleo inditū, aut cū hordeacea Farina illitū. Orthopnoicis datur in posca: demorsis à serpēte, in uino. Testiū collectionibus auxiliatur, impositū cū uua passa, aut Loly farina ceratōue. Mensiū abundantia inhibet. Cōtritū autē in aceto, & naribus obiectū, sanguinis profluvia sistit. Colorem bibentium, aut perunciorū, mutat in pallorem.

Syluestre Cuminum. CAP. LVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Κύμινον ἄγριον. Lat. Syluestre Cuminum. Ita. Cimino saluatico. Ga. Cornuete. off. Cōsolida regalis.

Syluestre Cuminū, plurimū efficaciusq; in Lycia, & Galatia Asia, atq; Carthagine Hispania gignitur: frutice paruo dodrātalī caule, ac tenui, quaternis aut quinīs folijs tenuibus, ueluti serratis, & Gingidy diuisura. In cacumine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda, in quibus est semen acerosum, gustu satiuo acriore. Nascitur in collibus. Bibitur semē ex aqua aduersus tormina inflationesq;: itē cōtra uenenatas bestias, ex uino: singultus ex aceto sedat: stomacho utile, quē humor uexat, sugillata tollit, si manducatū cū Melle & uua passa illinatur. Testiū inflammationibus, adiectis eisdē illitū medetur. Est & aliud Syluestris Cumini genus, satiuo nō dissimile, quod à singulis



Ammi.

lis floribus pensilia promit
cornicula, in quibus semē est
Melanthio simile: quod po-
tum omnium serpentū mor-
sibus praesidio est. Calculosis
& ijs qui urinae stillicidio ue-
xantur, aut concretum san-
guinem cum lotio reddunt,
auxiliatur: sed Apij semen
feruefactum postea biben-
dum est.

Cuminum sativum folijs
est sceniculi, caule unico, ē
quo plures ramuli prodeunt: flo-
rescit in umbellā, & ex ea copiosi-
ssimum semen emittit. Radice
est candida, subrotunda, quasi
bulbosa. Nascitur in putribus

& maximè calidis locis. Ruellius & Valerius Cordus vtrunque Cumi-
ni sylvestris genus in Consolida regali, & Cornuta, noscitant. At Mat-
thiolus neutrum in Italia reperiri scribit, quod ē Licia, Galatia, & Hi-
spania ubi summa copia nascuntur non afferantur. Cuminum excalsa-
cientium ordinis est tertij.

Ammi. CAP. LIX.

NOMENCLATURA.

Græ. Αμμι. Lat. & Ita. Ammi.

Gal. & Off. Ameos. Ger.

Ammey samē.

Ammi Aethiopicum Cuminum appellant: plerique hoc
natura diuersum ab illo existimant. Vulgo notum est se-
men exi


B

men exi

men exile, multò minus Cumino, Origanum resipiens. Eligendum est purum, minimè surculosum. Vis ei excelsa et calida, feruens & exiccans. Facit ad tormina, urinæ difficultatem, serpentium iclus, cum uino potum: menstrua ciet: miscetur dero-
dentibus cantharidum medicamentis, quæ ecdoria uocant, ut inde exortis urinæ difficultatibus resistat. Sugillata cum Melle tollit, colorem potu aut illitu mutat in pallorem. Suffitum cum una passa aut resina, uulvas purgat.

Ammi Matthiolo ex autoritate D. Aluigij Romani herbarij, & Simpliciarij excellentissimi in Italia non nascitur, è que tot diuersis seminibus quæ Ammi nomine in seplasis vaneunt, nullum est quod verum Ammi semen referat. Id natura calidum & siccum est, & cum

subtilibus constet partibus subamarum & acre est. Calidum itaque & siccum in tertij ordinis fine.



Coriandrum.

Coriandrum.

CAP. LX.

NOMENCLATVRA.

Græ. κόριον.

Lat. Coriandrum aut Corianum. Ita. Coriandro. Gal. Coriandre. Off. latino nomine. Ger. Coriander.

Corian

Coriandrum aut Corianum, uulgaris est notitiæ, uim refrigeratoriam habens. Quare illitum cum pane aut polenta, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt, medetur: epinyctidas cum Melle uel uua passa, testium inflammationes, carbunculosq; sanat: cum Faba fresca, strumas & tubercula discutit: tineas interaneorum expellit semen, cum passo potum, & generaturam adauget, largius tamen sumptum, mentem non sine periculo mouet: quare continuo, & copiosiore usu abstinendum. Succus cum Cerussa spumæ argenti, necnon aceto & Rosa-ceo illitus, ardentes summæ cutis inflammationes emendat.

Notū est Coriadrū, & eius semen quod in cōdita cedit. Herba ipsa essentia amaræ habet plurimum, aquei humidi tepentis parum, & strictionis tantillum, ut ab ea refrigeret, quemadmodum ex amarore, excalfacit: deterget, digerit, & tenuum est partium.

Hieracium. C A P.

L X I.

N O M E N C L A T V R A.

Gr. Ἱεράκιον μέγα. Lat. Hieracium magnum. Ita. Hieracio maggiore. Gal. Cichoree iaune. Off. Cichorea lutea.

Hieracium magnū, caulem emittit asperum, subrubrū, spinosum, caui. folia ex interuallis rariusculè diuisa, similia

B 2

Soncho



Hieracium.

impendit.

Hieracium Plinio ex accipitribus nomen accepit, quod eius succo vnguibus elicto, oculos à caligine expediant. Herba in totum Soncho similes, & rusticis nota: maius Cichora lutea: minus Intubi sylvestris nomine. Harum nullam Galenus aut Paulus mentionem faciunt.

Soncho per ambitum: luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modice substrin-
gendi. unde illitum, stomacho aestuanti, inflammationibusq; prodest. Succus erosionem stomachi sorbitione mitigat. Herba cum radice illita, uibratis à scorpione ictibus auxiliatur. Hieracium paruum, folia ex interuallis habet, diuisa in ambitu: cauliculus teneros, uirentes, in quibus lutei flores orbem circinantes, emicant. Vim suam ad eadem ad quæ superior

Apium CAP.

LXII.

NOMENCLATURA.


Græ. σέλινον. Lat. Apium. Ita. Apio.

Gal.

Gal. Persil. Offic. Latino
nomine. Ger,
Epffich.

Hortensis Apij herba ad eadem ad quæ Corianum conuenit: inflammationibus oculorum, cum pane aut polenta illinitur: æstuantem stomachum mulcet: mammarum duritiam ex lacte concreto contractam reprimat: urinam ciet, siue crudum, siue coctum edatur. Decoctum eius radicisq. potum, uenorum noxa resistit, quum uomitiones excitet: aluum cohibet. Semen uehementius urinam pellit: contra serpentium uena, aut epotam argenti spumam auxiliatur: inflationes discutit. Admiscetur medicamentis quæ dolorum leuamenta præstant, theriacis quoque, ac tussis remedijs. Eleoselinum in humidis nascitur, satino grandius, ad eadem efficax. Oreoselinum, caule est dodrantem alto, ab radice tenui exeunte: per cuius ambitum rami & capitula Cicutæ, multò tamen tenuiora: semine Cumini, oblongo, acri, & odorato, tenui. Nascitur in petrosis & montibus. Urinam ciet, semine ac radice in uino potis: menses trahit. Antidotis, necnon medicamentis urinam cientibus & excofactorijs inseritur. Nec hallucinari nos oportet, existimantes Oreoselinum esse, quod in saxis prouenit: aliud enim est Petroselinum. Petroselinum in Macedonia prouenit, in præruptis locis, semine Ammij, odoratiore, sapore acri, aroma olente. Urinam cit ac menstrua. contra stomachi & coli inflationes, & tormina prodest: laterum, renum, & uesicæ doloribus in potu subuenit. Admiscetur antidotis urinam cientibus. Hipposelinum, Latini Olusatrum appellant, aliqui Smyrnion, quamuis aliud sit quod propriè Smyrnion dicitur,

B 3 ut pau



Apium.

da coctāne estur. Folia cum caulibus decocta manduntur, & per se aut cum piscibus præparantur, crudaq; muria condiuntur. Vim hanc habet, ut poto semine ex mulso uino, menses cicut: algentes calfacit potu aut illitu: urinae stillicidio auxiliatur. Radix eosdem præstat effectus.

Medicorum bona pars qui lapsam in barbariam medicinam restituere, Apium domesticum antiquorum, vulgare nostrum Petroselinum esse contendunt. Porro Apium quod officina pro Apio domestico obtrudunt, Apium est palustre, domestico maius. Attamen non illud est quod Itali Macerone vocant, ut in sequenti de Smyrnio capite patebit. Nam multum inter se differunt Macerone, Apium palustre, & Hipposelinum. Montanum Apium non semel Matthiolo ostensum est.

cum no

cum notis omnibus quas ei assignant Theophrastus & Plinius, nempe Cicuta folijs, radice gracili, caule & umbella Anethi. Quod ad Petroselinum Macedonicum attinet, eo nos caremus. Et cum Petroselini semen, Ammio candido & minimo semini comparetur, Officinarum semen illud grande, & nigrum Oreoselini semen esse non potest. At enim quod sub huius nominis sativum in hortis visitur, cultura mansuesactum, illius speciem præse fert. Hipposelinum Matthiolo Leuisticum est vulgare, nec est Macerone, quod Hipposelinum radice sit candida, & Macerone nigra. Quod autem in historia Hipposelini non sibi conveniant Theophrastus & Dioscorides videtur Theophrastus de alio quam Dioscorides Hipposelino intellexisse, nimirum de Smyrnio, maxime cum Galenus dicat, quibusdam nihilum inter se differre Hipposelinum & Smyrnum. Valerius Cordus semen quod pharmacopœia pro Petroselino Macedonico venditant, Olusatris esse contendit.

Smyrnum. CAP.

LXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. *Σμύρνιον*. Lat. *Smyrnion*. Ita, *Macerone*. Gal. *Leueche non probe*.
Off. *Angelica*.

SMyrnion, quod in Cilicia Petroselinum uocant, passim in Amanio monte gignitur. Caulem habet *Απυ*, & stolones multos: folia latiora, subpinguia, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia, iucunda, colore in luteum languescente: capitibus caulium orbiculatis, ut *Anethi*, semine *Brassicæ*, rotundo, nigro, acri, *Myrrhæ* sapore, ita ut alterum alterius loco cedat: radix quoque odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis: cortex eius foris niger, intus viridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis, & collibus, atque

B

4

Squalis

squalidis, & limitibus terrenis. Vis radices, herba & seminis, excalfacere. Folys muria maceratis ad obsonia utuntur: aluum sistunt. Radicem contra serpentium ictus bibere conuenit, tusses & orthopnœas mitigat, urina difficultati medetur, recentes tumores, collectiones duritiasq; discutit. Illita, uulnera ad cicatricem perducit, partus abortu uitiat, si feruesfacta subijciatur. Semen, lienis, renum & uesicæ uitys prodest: menses & secundas pellit, commodè datur ischiadicis in uino: inflationes stomachi lenit, sudores ciēt, & ructus. Peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus.

SMyrnion Matthiolo ea herba est, quam Thufci Macerone vocant, siquidem caulem habet Apio similem, stolones multos, folia lata, subpinguia, in terram infracta, quadantenus acris, pallida, odore medicato: caput caulium orbiculatum, ut Anethi: semen Brassicæ. Et reliqua peraque nota, & vires Dioscoridis delineationi respondēt. Seris Smyrniū cepit iam senescente Plinio, hodieq; in Italia feritur. Errant qui Hippofelinum, syluestre Smyrniū esse cōtendunt, nec minus hallucinantur, qui id esse autumant, plantam quæ vulgo Imperatoria vocatur. Valerius Cordus Smyrniū, Angelicam facit, nō illam vulgarem, sed quæ in Pomerania & Brisgoia nascitur, nigra foris radice. Nam vulgare Myrrhis quibusdam videtur, quod impugnat Matthiolus.

Elaphoboscum. CAP.

LXIIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Ελαφοβοσκου. *Lat.* Elaphoboscum.

Elaphoboscho. Gal. & Off.

Gratia dei.

Elaphobosco fœniculaceus caulis est, aut Rorimarino similis, geniculatus: folijs duum digitorum latitudine, ut *Terebinthi*, pralongis, aliquantum asperis, circumfractis: adnata multa habet, ferentia umbellas *Anethi* similes, & semina eiusdem

dem: florem subluteum: radice ternum digitorum longitudinis
& crassitudinis unius, candida, dulci, esui apta. Caulis tener
pro olere manditur. Contra serpentium ictus, datur semen in ui-
no. Fama autem est, hoc pabulo cernas serpentium morsibus re-
sistere.

Elaphoboscum hanc non esse herbam, quam herbarij Gratiam dei
vocat, & è qua sui nominis unguentum conficitur, hoc cõjicitur,
quod gratia dei, similis Hyssopo sit, & non fœniculo. Vidit Matthio-
lus in valle Anania & in comitatu Goritiano plantam tantum El-
aphobosco similem, ut ouum ouo nõ magis accedat. Excalfacit Elaphobo-
scũ ut potè è subtilibus partibus cõpositum, & desiccat secundo ordine.


Fœniculum. CAP.

LXV.

NOMENCLA-
TVRA.

Gr. μαράθρον. Lat. Fœ-
niculum. Ital. Finocchio.
Gal. Fenoil. Off. nomine
latino. Ger. Fenchel.

Fœniculum si herba eda-
tur, aut semen cum ptisa-
na bibatur, mammas lacte
replet. Comæ decoctum in
renum doloribus subditum
proficit, quippe quòd urinam
excitet. Contra serpentium
ictus in uino conuenienter bi-



Fœniculum.

B §

Litur

bitur, menses ciet. In febris nauseam & stomachi feruorem, ex aqua frigida potum, sedat. Contrita radices & cum melle illita, morsibus canum medentur. Succus caule & folijs exprimitur, & in sole siccatus, in medicamenta adijcitur, quæ ad excitandam oculorum aciem commodè temperantur. Extrahitur succus ad eadem ualens, etiam semine uiridi, ramulisq; & radicibus prima germinatione incisis. In Iberia quæ ad occidentem spectat, succum reddit gummi similem. Caulem medium, dum herba floret, rustici demetunt, igniq; admovent, quò facilius ui caloris exudans gummi remittat: quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorum.

Fœniculum erraticum, siue Hippomarathrum. CAP. LXVI.

Græ. ἵππομαραθρον. Lat. Hippomarathrum. Ita.

Finocchio saluatico. Gal. Fenoil sauage. Off. ignotum.

Est & sylvestre Fœniculum, magnum: fert autem semen Cachryi simile, cuius radix iucundè olet, potaq; stranguriæ medetur, menses imposita ciet, uentrem sistit: radice aut semine poto contra serpentium morsus auxiliatur, calculos comminuit, et regium morbum expurgat, lactis abundantiam facit. Decoctum foliorum haustum, scēminas à partu purgat. Traditur aliud Hippomarathri genus, longo, exili, & angusto folio, semine Coriandri, rotundo, acri, & odorato. Excalfaciendi naturam habet, & uiribus Fœniculo respondet, sed ad omnia infirmus.

Nulli non notum fœniculum satium, & sylvestre. Seritur sub ueris initium aprico & modicè saxoso loco, mense februario, planta non minus condiendis cibis quàm medicinae utilis. Fœniculum nobilitauere serpentes, dum ab eius gustu senectam exuunt, ac obtusam oculorum

aciem

aciem eius succo reficiunt. Quo perspectum caliginem in hominibus dis-
cuti. Potenter excalfacit Fœniculum, nempe tertio ordine, & desiccatur
primo. Hippomarathrum valentius quàm domesticum desiccatur. Est &
aliud Hippomarathri genus, semine acri & rotundo vt Coriandri, cum
alio simile, sed debilioris operæ.

Daucum. CAP. LXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. Δαῦκος. Lat. Daucus. Ita. Dauco.

Gal. perperam, Carotes sauages.

Off. Principij errore, Caro-
ta sylvestris.

DAUCUM aliqui Daucium uocant. Creticum folijs Fœni-
culo simile, minoribus & tenuioribus: caule dodranta-
li: umbella Coriandri flore albo: semine acri, candido, hirsu-
to, suauissimi odoris in mandendo: radix digitali crassitudi-
ne & dodrantis longitudine adolefcit. In saxosis nascitur, &
locis sole illustratis. Aliud eius genus sylvestri Apio simile, a-
cre, odoratum, aroma olens, feruentis gustus. Probatissimum
Creticum. Tertium assignatur genus folijs Coriandri, floribus
albis, capite & semine Anethi, muscario Pastinacæ, semine ob-
longo, ceu Cumini, acri. Omnium semen excalfacit. Potum uri-
nam, menses, & partus extrahit, torminibus liberat, ueterem
tuſſim mitigat. Phalangiorum morſibus potum in uino auxilia-
tur. Tumores illitu discutit. Seminis duntaxat in alijs generibus
inualuit usus: in Cretico, etiam radicis, quæ maxime contra ue-
nenatorum iniuriam in uino bibitur.

ETſi Daucum pro Pastinaca sylvestri, & veteres & ipse Dioscorides
accipiant, atque adeo reuera ipsum Daucum Pastinaca sylvestris
ſit ſpecies, non ideo tamen ipſa eſt Paſtinaca ſylueſtris. Siquidem diuerſis
de iſs capitibus tractauere Dioſcorides et Galenus. Creticum aſportatur
è Candia. Quod uerò ſimile eſt Paſtinaca in Senenſi territorio & multis
in Thuſcia locis naſcitur. Tertiuſ genus Folijs Coriandri et ſemine Cumini

in multis Italiae locis puenit. Daucū exsiccant et desiccant. Radix v̄eto-
sum quid in se habet, & venerem proritās. Semen ipsa herba valentius.
Cordo, Germania omnes Dauci species, sub Pimpinellæ nomine produ-
cit. Ruellio, Creticum Daucum ea est herba quam, Carotam sylvestram
vocant. Secundum & tertium Dauci genera, Asinini Dauci ab herba-
rijs nomine insigniuntur.

Delphinium. CAP. LXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Δελφίνιον Lat. Delphinium. Ita. Delphinio.

Gal. non probatè, Trompetiere.

Off. Buccinaria.

Delphinium surculos emittit à radice una sesquipedales,
aut maiores, à quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa,
prælonga, quæ Delphimorum effigiem representant: unde tra-
ctum nomen est. flos Viola albæ non dissimilis, purpureus: & se-
men in siliquis Milio proximum, quo non aliud utilius bibi po-
test ab scorpione percussis. Aiunt enim obiecta herba scorpiones
resolui, atque ignauos torpescere: semota uerò ea, sese recollige-
re. Prouenit in asperis & apricis. Alterum est Delphinium,
quod Romani Buccinum uocant, superiori simile, sed folijs &
ramis longè gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita effica-
cibus.

Hoc de Delphinio caput, Matthiolo et Cordo adieclitium videtur,
quod Galenus & Paulus nullam huius in recensione simplicium
mentionem faciant, quos Dioscoridem imitasse nulli non compertum est.
Adde his quod id antiqua exemplaria non habent: nec vllam Dioscoridi
fuisse causam, cur siliquiseram, umbelliferis herbis immisceret, instituto
suo compugnans.

Pirethrum. CAP. LXIX.

NOMENCLATURA.

Græ. πύρεθρον, Lat. & Off. Pyrethrum.

Gal. Pied d'Alexandre.

Pyre

* *Pyrethrum*.

Pyrethrum saluarem
uocant, folia caulemq;
emittit ut Daucum syluestre
& Faniculum: umbellamq;
Anethi, circinata & rotundi-
tatis. Radix longa est, polli-
cis crassitudine, gustu ferui-
dissimo. Pituam elicit, ideo
in dolore dentium, decocta
in aceto, colluto inde ore, au-
xiliatur. Mansa pituitam ex-
trahit. Sudores ciet, perun-
cto ex oleo corpore: diutur-
nis horroribus efficax, con-
tra perfrictiones membro-
rum, resolutionesq; eximie
conducit.

Pyrethrum radice tantum pharmacopolijs cognitum, quamuis in
quibusdam Italia montibus nascatur, non ea tamen est acrimonia,
qua id quod Venetijs ex oriente affertur. Vidit Matthiolus dum apud
Germanos ageret, in horto D. Biazij Sbaiger praeclentis medici, radi-
cem & folia quae Pyrethri descriptioni responderet, caule tamen in sum-
mo Anethi muscario non ornato. Nec aliter de Gallico Pyrethro Ruel-
lius prodidit, quinetiam utrunque flores camomillae producit. Excalsa-
cit & desiccatur in tertio, & quibusdam in quarto abscessu.

Rosmarinus. CAP. LXX.

NOMENCLATURA.

Græ. Ῥοσμάρις. Lat. & Off. Rosmarinus.

Gal. Espece de Rosmarin. Off.

Horum usu carent.

Duo

Duo Rosmarini genera. Vnum sæcundum frugiferumq̃, cuius semen Cachrys uocatur. Folia Fœniculi habet, crassiora & latiora, in rotæ speciem, humi sparsa, iucundè olentia, caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis concuum alis: in cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphondylion simile, rotundum, angulosum, resinaceum, quod in mandendo linguam exurit. Radix Thus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrum uti sphondylion: odoratum, minimè exurens, radice foris nigra, intus si frangatur, alba. Verùm id quod sterile dicitur, illorum planè similitudinem refert: sed neque caulem, neque florem, neque semen promit. Nasctur in saxosis & asperis. Trita omnium herba communiter hæmorrhoidum profluuiâ sistit, sedis inflammationes & condylomata mitigat, cocoquit strumas & abscessus, qui ad maturationem egrè perducuntur. Sicca radices, cū Melle ulcera purgant: torminibus medentur cum uino potæ: & contra serpentium morsus conueniunt: menses & urinas cient, ueteres tumores illitu discutunt. Tam radices quàm herba succus, adiecto Melle illitus, oculorum aciem exacuit. Potum semen ad eadem pollet: si comitiale malum sentiatur, aut uetus pectoris uitium, auxilio est: regio morbo laborantibus cum uino & pipere datur: sudores mouet, cum oleo perunctum: ruptis & conuulsis prodest: podagris, cum loliacea farina & aceto tritū, illinitur: purgat utiligines, addito aceto quàm acerrimo. Semine in potionibus utendum, eius quidem quod Canchryn non ferat, quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinū cum Erica nasci, folijs Lactucæ syluestris amara asperioribus, candidioribusq̃, radice breui, Theophrastus autor est, potuq̃ idipsum alterutra parte purgare. Canchrys uim habet excalescentiæ, & uehementer exiccandi, quare abstergentibus medicamentis inseritur. Contra oculorum fluxiones capiti illinitur, ita ut

ter

tertio die solvatur.

Rosmarinum coronarium.

CAP. LXXI.

NOMENCLATURA.

Græ. Λιβανώσις σεφανωμάσηκν. Lat. Rosmarinum
coronariū. Ita. Rosmarino coronario. Gal.
Rosmarin. Off. Rosmarinus.

Rosmarinum quo coronarij utuntur, ramos mittit tenues,
& circa eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter in-
cana, supernè uirentia, graui odore. Excalfactoria ui præditum
est. Regium sanat morbum, si decoctum in aqua, ante exercita-
tiones bibatur: & ubi laborans exercitationi se crediderit, in
balnea descendat, & merum potet: acopis, glucinoq; unguento
admisceri solet.

Rosmarini primū genus Venetijs visitur in horto D. Maphæi &
Maphæo medici clarissimi, omnem referens Dioscoridis effigiem, ut
è visu refert Matthiolus. Et perindè se aliud genus in Italia non vidis-
se. Ruellio primū id genus vulgaris incensaria est. Rosmarinus seu Li-
banotis coronaria, vulgo iandiu hortensi mangonio (nempè topiaria)
percognita. Nascitur spontè quibusdam Italiæ locis, & in Narbonensî
Gallia. Rosmarini omnes vim habent absterforiam & incisoriā.

Spondylium. CAP. LXXII.

NOMENCLATURA.

Græ. Σφονδύλιον. Lat. Spondylium. Ita.
sphondilio. Gal. l' Austruce.
Off. ostrutium.

Spon

Spondylium folia quadantenus Platani & Panacis habet, caules fœniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius, assurgētes, in quorum cacumine semen duplex, Seseli simile, sed latius, candidius, & magis paleaceum, grauis odoris, flores eius albi, aut pallentes, radice Raphani, candida. Nasctur in palustribus & aquosis. Potum semen pituitam per aluum extrahit: medetur iocinoris uitij, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, uuluarum strangulationi. Veternosos suffitu reuocat. Cum oleo commodè infunditur capitibus phreniticorum & lethargicorum, item capitis doloribus. Cum Ruta illitum, serpentia ulcera cohibet. Datur radix contra regium morbum, & iocinoris uitia: circumrasa eadem & iniecta, callos fistularum derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisq; accommodatur: qui caterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

Spondylium, Matthiolo frequēs in pratis Anania paludosis, nascitur & eis maximè quæ montibus proximiora quàm planities sunt. Ruellio Gallis Panaia est syluestris. Acre est Spondylium & incisorium.

Ferula. C A P. LXXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Νάρθηξ. Lat. Ferula. Ita. Ferola.

Gal. Off. & Ger. ignota.

Eviridi Ferula medulla pota, utilis est ad cruentas excretionē, cœliacosq;: contra uiperarum morsus in uino datur, erumpentemq; naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosi auxiliatur, sudores ciēt, uncto ex oleo corpore. Caules, si edantur, capitis dolores faciunt: muria condiuntur. Ferula itaque caulem profert ternum saepe cubitorum: folia Fœniculi, longè asperiora & latiora: qua ab imo caule uulnerata sagapenum efficitur.

Nasci

N Ascitur ferula copiosissimè in Apuliae campestribus, & Romano patrimonio, regiones inter, quas vernacula lingua, Corneto & Thoscanelle nominant, & in territorio Senensi. E ferulis cum primum nascuntur, medullam quamprimum pastores eliciunt, vitello oui persimile qua carta obuoluta, & cineribus incocta, gratissimus profectò est cibus, cum Pipere & sale manducata, & in venerem mirè accendit. Ferula semen excalfacit & desiccat: verum medulla astrictoria aliquantum virtutis est particeps.

Peucedanum. CAP.

LXXIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. πευκέδανος. Lat. & Off. Peucedanum.

Gal. natium nomen non habet.

Peucedanum caulem emittit tenuem, gracilentum, Fœniculo similem: comam habet statim à terra foliosam, spissamq; flore luteo: radice nigra, crassa, plena, graui odore, succo sa. Gignitur in montibus opacis. Tenera radix cultello cōciditur, profluensq; è plaga succus umbræ mandatur: in sole siquidem cōfestim euanesceat. Colligitur capite prius & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor premat, & uertigo sentiatur. Assationi radix inutilis fit. Tam lac quàm succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti è Mandragora: uerum inefficacior succo lacryma habetur, & uelocius expirat. Interdum etiam concreta inuenitur lachryma, Thuris similitudine, caulibus radicibusq; ad hærens. Præfertur succus è Sardinia & Samothrace, colore rufo, odore graui, feruens gustu. Ex oleo & Rosaceo illitum Peucedanum prodest lethargicis, phreniticis, uertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, cōuulsis: omnibus in uniuersum uitijis neruorum, ex oleo & aceto illitu, prodest. Eius olfactu respirant uulua strangulatus, & ueterosi reuocantur. Incensum serpentes ambigit. C
bus con

bus conuenienter ex Rosaceo instillatur, cauernis dentium inditum, mitigat dolorem: contra tuſſim efficaciffimè ex ouo aſſumitur, ſuſpirijs, torminibus & inflationibus ſubuenit: uentrè leniter emollit, lienem abſumit, difficiles partus mirè adiuuat. Facit ad uſicæ cruciatus, & renum diſtentiones potum, uulnà aperit. Radix ad eadem utilis eſt, ſed inefficacior: eius decoctum bibitur. Farina eius ſordida ulcera purgat, & uetera cicatrice obducit: ſquamas oſſium extrahit. In cerata & calſacientia malagmata additur. Radix eligi debet recens, quæ cariem non ſenſerit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaris nucibus, aut Ruta aut pane calido aut anetho reſoluitur.

Reperit Matthiolus in pallis Ananix montibus, quos ipſiſſimis pucherrimorum ſimplicium theatrum poſſis dicere, Peucedanum radice crassa, gravis odoris, & ſuccoſa. At Peucedani pharmacopoliorū radices, præter id quod nigra ex timo cortice non ſunt, odorem vt debuerant grauem non reſerunt. Adde his quod radix illa ſicca, noſcitandi è ſe Peucedanirationem inire non queat. Qui diligentiores erunt è Sardinia petent, ubi copioſum, & Dioſcoridi probatum naſcitur, Valentior in Peucedano ſuccus, radice, & liquore, hique excaſcit, concoquit, incidit, & deſiccet. Herba ipſa ſecundæ eſt excaſacientium claſſis, & ineuntis terciæ.



Gith, ſeu Melanthiũ. C A P. L X X V.

N O M E N C L A T V R A.

Græ. μελαθιον. Lat. Melanthium. Ita. Nigella.

Gal. Poiurette. Nielle. Off. Nigella Romana.

Gith exilibus ſurculis fruticat, ſæpe binos dodrantes excedens: folijs ut Senetionis minutis, ſed multò tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo, ceu Papaueris, oblongo, intercurſantibus intus membranis, quibus ſemē includitur nigrū, acre, odoratū, quod panibus inſpargitur. Capitis doloribus, illitū fronti, ſubuenit: diſcutit recentes oculorum ſuſſuſiones, tritum ex Irmo, & inſuſum naribus: tollit lepras, leſigines, duritias, tumoresq;

* *Melanthium sativum.**Sylvestre.*

moresq; uetustos, cum aceto illitum: circumscarificatos clauos excutit, cum uetere urina impositum: dentium doloribus, decoctum cum aceto & Teda, prodest: teretes uentris tineas expellit, peruncto ex aqua umbilico: destillatione laborantes adiuuat: tritum in linteo & olfactum, urinam & menstrua ciet, multis diebus sumptum, & lac extrahit: difficultatem spirandi cum uino potum leuat: phalangiorum moribus ex aqua drachma pondere haustum auxiliatur: incenso serpentes fugantur. Tradunt largius e potum enecare.

Melanthium domestica & hortensis herba, ea non est qua in segetibus hirsuta & longo folio, & purpureo flore prouenit. Melanthium tertio ordine calidum & desiccatorium est, & e subtilibus partibus compositum esse videtur, potensque remedium ubi incidere opus est, abstergere, desiccare, ex calfacere.

Laserpitium, & Laser. CAP.

LXXVI.

NOMENCLATURA.

Græ. σιλφιον. Lat. Laserpitium It. Laserpitium.
Gal. & Off. Benioin. & Assa fœdida.

Laserpitium in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo (quē Maspelum uocant) folijs Apio similibus, lato semine. Radix excalfacit, in cibis egre concoquitur, uesicæ noxia, sugillatis illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cerato, medetur: ischiadicis conuenit cū Irino aut Cyprino cerato: excrescentibus circa sedem tollendis illinitur, cum putamine mali Punici, & aceto decocta: uenenis pota resistit: os commendat, cibis aut sali permista. Laser è radice atque caule scarificatis colligitur. Præfertur autem rufum, translucens, Myrrha emulum, non porraceum, odore ualens, suauis gustu, quod dilutum facile albescit. Cyrenaicum si quis degustarit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore: adeo ut ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicum & Syriacum minus uiribus ualent, & magis uirosum reddunt odorē. Laser omne antequam siccescat adulteratur Sagapeno, aut Fabæ lomēto, quod maleficium deprehenditur gustu, odore, uisu, & dilutione. Caulē aliqui Silphion, radicem Magudarin, & folia Maspelon uocauere. Efficacissimum Laser, mox folia, postremo caule. Ac crem uim habet: inflationes facit: perunctas cum aceto, Piperis & uino alopecias sanat, oculorū aciem exacuit, & incipientes suffusiones, illitum cum melle, dissipat: cauernis dentium in dolore inditur, aut cum Thure in linteo circumligatur, aut cum Hyssopo, ficis coctis in posca, os colluitur. Ijs prodest, quos bestia in rabiem efferata momorderit, uulneribus immixtum: ualeat ad-

κλινος

uersus uenena telorum, & animalia omnia quæ uirus eiaculatur, potum aut illitum. Scorpionum plagis oleo dilutum circumlinitur. Gangranis præcoërcitis immittitur: & cum Ruta, Nitro & Melle, uel per se, carbunculis: clauos callosq; prius circūrasos uellit: cerato aut aridorum ficuum carne pramolitum, recentes lichenas ex aceto sanat, & excrescentia in carne, polyposq; si aliquot diebus cum atramento sutorio, aut æruginè illinatur: extuberantia cum forfice extrahit. Veteribus faucium scabritijs opitulatur, grauem subitoq; irrauescentem uocem, dilutum aqua, sorbitione confestim expedit: uuam illitum cū melle reprimat: anginis ex aqua mulsa utilissimè gargarizatur: uescētes latiore colore mangonizant: tussi commodè in sorbili ouo datur, & pleuriticis, in sorbitionibus: in fellis suffusione, & aqua inter cutem, cum aridis ficis: horrores discutit cum uino, Pipere, & Thure potum: neruorum contractionibus, opisthotonicisq; datur oboli pondere deuorandum: hærentes gula hirudines, gargarizatum cum aceto decutit: ad lac intus coagulatum bibitur: comitialibus ex aceto mulso proficit: menses ciet, cum Pipere & Myrrha potum: cæliacos adiuvat, in acino uuæ sumptum: cum lixiuio autem potui datum, repente conuulsis ruptisq; prodest. Ad potiones resoluitur, nucibus amaris, aut Ruta, aut calido pane. Foliorum succo ad eadem proficitur, sed multò in efficacius. Cum aceto mulso manditur, ad expediendam arteriam, maxime cū uox retunditur. Eo cum Lactucis utuntur, exitq; in uicem Erucæ. Fertur & altera Magudaris in Libya nasci: radix Laserpitio similis, sed minus crassa, acris & fungosa, ex qua nō profluit succus: eiusdem cum Lasere facultatis.

Arabum sectarij Assam (quæ eis est Laserpitium) in sctidam, & odoriferam diuidunt. Id ipse etiam Dioscorides indicat, cū Cyrenaicum blandissimi odoris, Medicum uero & Syriacum virosum odorem reddere testatur. Ludouici Romani patricij Aethiopice, Aegyptiæ, Arabia felicitis & deserte, Syriacæ, Indica intra uel extra Gangem na-

nigationis historia abunde ostendit sincerum & verum Belzuinam Las-
serem esse odoriferam, ut idem ut Assam fetidam, fetidum Lasserem. Is
sexti libri capite nono, Indica urbis (Tarnasari) mentionem faciens, qua
ratione defunctorum corpora comburant, Belzumi his verbis mentione
facit: Cum comburant mortuorum corpora, omnisariam odores in rogum
conijciunt, Aloen videlicet, & id genus arboris, cuius gummi elegantis-
simum illud unguentum gignit, quod vulgo Belzoi nuncupatur, Laserpitium
eruditores ab arbore Lasseris dicunt. Idem decimo quarto eiusdem libri cap.
mercatores dicit Christianos Sarnare Indica civitatis incolis, in urbe
Bangalla reperiri, qui praeter ea quae velut in emporium eo conuehant,
Lasserem etiam, e quo gummi quod Belzuinum vocant est, impor-
tent. Et decimo nono eiusdem libri capite, dum Sumatra insula mentio-
nem facit. Illic conspicitur (inquit) Lasser, gummi producens quod Las-
serpitium appellant, & vulgo Belzuinum. Eo fit ut selectissimum Belzui-
num Matthiolo liquor sit Cyrenaeici Lasseris, & Assa fetida, liquor La-
sers Medici & Cyriaci. Et quod eis satisfiat qui Silphium ferulacei ge-
neris herbam & non arborem esse contendunt, Ferula ipsa arborum ge-
neri adscribitur, quoniam teneritudo eius processu transit in lignum.
Quod idem in Silphio contingere potest. Vulgaris Angelica, vel, San-
cti spiritus radix, Ruellio, Laserpitium est Gallicum.

Sagapenum. CAP. LXXVII.

NOMENCLATURA.

Gra. σαγαπένυρον. Lat. Sagapenum. Ita.

Serapino. Gal. & Off. Serapinum.

Sagapenum ferulacea herba succus est, quae in Mediana-
scitur. Optimum est, translucens, fuluo forinsecus colore, &
intus albo, nescio quid inter Lasser & Galbanum redolens, gu-
stu acri. Prodest laterum & pectoris doloribus, tussibus uetu-
stis, conuulsis & ruptis. Crassam pulmonis pituitam expurgat.
Datur comitialibus, opisthotonicis, lienosis. Item contra neruo-
rum resolutionem, perfrictiones, & febrium circuitus, in potu.
In unguenta probe admittitur: menses pellit, sed foetum exani-
mat, cum hydromelite potum. Prodest ex uino haustum, serpen-
tium ictibus, Olfactum ex aceto uuluarum strangulatus excitat,
oculorum

oculorum cicatrices, offusam caliginem, habetudines, suffusionesq; detergit. Resoluitur ut Laser, Ruta, aqua, & amaris nucibus, aut Melle, aut calido pane.

Prostat Venetijs Sagapenum selectissimum, quantumvis inibi & vaneat ingens adulterati copia. Quæ Sagapenum producit ferula, in aliquot Italicis locis, & præcipue in Apulia provenit, unde iam Sagapenum cepit exportari, sed orientali in bonitate inferius. Sagapenum liquor calidus & tenuibus partibus constans, aliquantum abstersori est. Ipsa tamen planta in totum est inutilis.

Euphorbium. CAP.

LXXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. εὐφωρβιον. Lat. Euphorbium. Ita. Euphorbio.

Gal. & Off. Latino nomine.

Evphorbium Libyca arbor est, Ferula speciem habens, quæ in monte Atlante iuxta Mauritaniam, inuenitur. Ea acerrimo succo turget, cuius eximium feruorem expauescentes incolæ, ouillos uentres elutos arbori circumligant, & eminus caulem contis incidunt, confestimq; è plaga, perinde atque uase quodam, in uentriculos copiosus lactis humor effluit, præter id quod humi sparsum, uulnus ei aculatur. Duo succi genera. Vnū Orobi magnitudine, Sarcocolla modo emicat. Alterum in uentriculis concrevit, atque uitreum spectatur. Eligendum est translucens, & acre. Euphorbiū adulteratur Sarcocolla & glutini mistione, sed difficile quidem experimentum: quippe cum leui gustu, os ac sensum diu detineat, adeo ut quicquid ori obijciatur, planè Euphorbium resipiat. Eius inuentio tempore Iubæ regis Libyæ cognita extitit. Succus illitu suffusiones discutit: Potus tota die exurit: quare Melli colyrysq; pro acrimoniæ ratione admisceri debet. Coxarū doloribus prodest in odorifera potione haustus. Squamas osium eadem die eximit, uerum eo utentes, ne-

C 4 cesse est

cesse est linamentis aut ceratis communire corpus quo ossa conuestiuntur. Aliqui memoria prodiderunt, percussos à serpente nihil molesti passuros, si incisa osse tenuis capitis cute, intritus succus infundatur, unguisq; postea consuatur.

Evphorbium seplasis notum, satisq; perspecta liquoris acrimonia, ab Euphorbio Iuba regis Lybia medico, & Musa Augusti Caesaris medici, fratre, nomen accepit. Virtutem illius solutiua ab Actio & Actuatio didicimus, qua flegma, & aqua maxime per inferiora purgat. Cholici datur, & corporibus frigesactis. Cū eo tamen, semen quopiam aromaticum apponendum. Dosis tres (non amplius) oboli cum hydromelite. Iuuat & in catapotijs in melle coctum. Quarto abscessu calidum & siccum est.

Galbanum. C A P.

LXXIX.

NOMENCLATURA.

Gr. γαλβάνη. Lat. Galbanum. Ital. Galbano.

Gal. & Off. Galbanum.

Galbanum succus est nascentis in Syria Ferula, quod nonnulli Metopium uocant. Maxime laudatur cartilaginoseum, merum, Thuris effigiem praebens, pingue, minime lignosum, retinens nonnihil adiecti seminis & Ferula, graui odore, neque ualde humidum, neque nimis aridum. Adulteratur Fabula fresa, Resina & Ammoniaco. Galbanū excalfacit, urit, extrahit, discutit: menses ac partus trahit appositum uel suffitu: lentigines aceto & Nitro perunctas tollit. Deuoratur ad tussim ueterem, difficultatem spirandi, suspiria, rupta, conuulsa. Aduersatur toxicis, potum cum uino & Myrrha: simili modo sumptum mortuos partus extrahit. Imponitur lateris doloribus, & furunculis. Comitiales & uulue strangulatus, & uertiginosos olfactu suscitatur. Si uratur, fugat nidore serpentes & perunctos feriri non patitur: serpentes cum oleo & Sphondylo circumpositum, necat. Dentium dolorem oblitum, aut

caner

cauernis inditum, mitigat, urinæ difficili prodesse, existimatur. Resoluitur ad potiones amaræ nucibus, aqua, aut Ruta, aut calido pane, mulsæue: alias Meconio, ære uisito, aut felle liquido. Si purgare Galbanum uoles, in feruentem aquam demittito, namque cum liquefactum fuerit, eius sordes fluitabunt: quas hoc modo facile separabis: mundo linteo raroq; alligatum in fictili aut ærea pyxide ita pendeat, ut innum uasis ne tangat: opertoq; uase in feruidam aquam demittito: sic enim sincerum, ueluti per colum eliquescet, & lignosum in linteo remanebit.

Venetis verum & non adulteratum Galbanum Seplasiae magis in monile habent, quam ut uaneat. Quod vulgo venditur parum respondet bonitati, quam ex eo requirit Dioscorides, nempe sexcentis mixtionibus oppletum. Diligentis erit pharmacopola aut sincerum comparare, aut eo quo Dioscorides docet modo expurgare. Siquidem eo pacto bona corruptionis pars eruetur. Excalfacientium tertia est classis, aut secunda desinentis, & desiccantium ineuntis secunda.

Ammoniacum. C A P.

LXXX.

NOMENCLATURA.

Gr. Ἀμμωνιάκον. Ital. & Off. Armoniacum.

Ammoniacum ferulae succus est, quam iuxta Cyrenem Aphrica gignit, cuius fruticem cum radice Agasyllim vocat. Probatum bene, colatum, ligni & calculorum expers, Thuris similitudine, minutis glebis, densum, sincerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. Hoc genus Thrausma, id est, friaturam appellant: quod uero terram & calculos collegit, Phyrma. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit: tubercula duritiasq; discutit. Potum alium soluit: partus extrahit, lienem consumit, drachma pondere cum aceto haustum. Articulorum coxendicumq; doloribus liberat: auxilio est

C S

lio est

lio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. Item quibus humor in pectore coit, si cum Melle delingatur, aut cum ptisanæ succo sorbeatur: cruentam urinam pellit, albugines oculorum absterget, genarum scabritiam absomit. Tritum autem cum aceto, & impositum, iocinoris lienisq; duritias sedat: discutit tofos, qui in artubus concallucrunt, cum Melle aut cum Pice illitum: lassitudines & coxendicum dolores eo perungi utile est, cum Nitro & Cyprino oleo, uice acopi.

Iouis Ammonis in Lybia delubrum, iuxta quod ingens Metopij copia, unde is colligitur liquor, Ammoniaco liquori nomen dedit. In hoc itidem seligendo iudicium apponendum. Quod habemus terra & lapillis immixtum, Phyrana, non Trausna esse videtur.

Sarcocolla. CAP. LXXXI.

NOMENCLATURA.

Græ. Σαρκοκόλλα. Lat. & Ita. Sarcocolla.

Gal. & Off. eodem nomine.

Sarcocolla, lachryma est arboris in Perside nascentis, polli-
ni Thuris similis, rufa, gustu amara. Vulnere glutinat, oculorum fluxiones inhibet: emplastris inseritur. Adulteratur admisto gummi.

Non adulterata Sarcocolla nostro tempore affertur, cum gummi Arabico & alijs gummi. Atenim non presente gustui amarore adulterium deprehendetur. Mesue solutiu. am facit Sarcacollam, eaque virtutem augeri, Gingiberi, & Cardamome permixtam. Vires habet è viscosa substantia & pauxillo amarore compositas, & ob id sine mordicatione desiccatur.

Glaucium. CAP. LXXXII.

NOMENCLATURA.

Græ. γλαύκιον. Lat. Glaucium. Ita.

& Off. Memithe.

Glauc

Glaucium, succus est herbae quae ad Hierapolim Syriae nascitur, folijs ferè corniculati Papaveris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris tetri, gustus amari: tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semifrigidis clibanis calfaciunt indigena, usquedum flaccescant, deinde contusis succum exprimunt: cuius est usus ad oculorum medicamenta, utpotè cum inter initia refrigeret.

Quod nunc in usu est Glaucium, specie licet diuersum sit, viribus tamen & notis satis respondet. Experientia siquidem compertum, id oculis esse salutare. Cum vero ex terrea et aquea substantia, utraque frigida, sine excessu tamen, componatur, aqua fontis conferri potest.

Glutinum. CAP. LXXXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. κόλλα. Lat. Glutinum seu gluten. Ita. Colla.

Gal. Colle. Off. nomine Latino.

Glutinum, quod Xylocollan, alij Taurocollan uocant, præstantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis corijs conficitur, id candidum est & translucens. Nigrum uerò minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines leprasque, cutis delet, ambustis igni ex aqua calida dilutum illitumque, pustulas erumpere non patitur. Vulneribus prodest, Melle aut aceto madefactum.

Glutinū piscium. CAP. LXXXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. ιχθυοκόλλα. Lat. & Off. Ichthyocolle. Ita.

Colla di pesce. Gal. Colle de bouche.

Ichthyocolle, gluten piscium, uenter est piscis ceracci. Præstat candidans, natione Ponticum, subasperum, minime scabrum, & quod celerrimè liquecit. Vtile emplastris, capitis & leprarum medicaminibus, & tetanothris, quæ cutem faciei erugant & extendunt.

Gluti

Clutinum notum est, itidem & Ichthyocolla, quàm collam Mor-
ua, & collam bucca vocant. Enimvero aurum glutinat santeria,
ferrum argilla, aris micæ cadmia, Laminas alumen, aramenta stagnū,
argentum stagnum, marmor & plumbum resina, plumbum nigrum id
quod album est, plumbum album seipsum.


Viscum. CAP. LXXXV.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἰξός. Lat. Viscum. Ita. Vischio.

Gal. du Guy. Off. Viscum.

quercinum.



Viscum.

Viscum optimum est
recens, intus porra-
ceum, extrâ fuluum, quod
asperum nihil, aut fursurosi cō-
ceperit. Fit acinis in Robore
nascentibus, buxæ fruticis
folio. Contusum acinum la-
uant, & postea in aqua de-
coquunt: sunt qui comman-
ducādo ipsum efficiant. Gi-
gnitur quoque in Malo,
Pyro, & plerisque alijs ar-
boribus: quinetiam inueni-
tur in quorundam fruticum
radicibus. Emollit, discutit,
extrahit. Parotidas, tuber-
cula, ceterasq; collectiones
ad maturationem perducit.


Cum Resina autem & Ce-
ra

ra pari, epinyctidas in splenio sanat. Vetera ulcera abscessusq;
quos cacoëthes uocant, ex Thure mollit: lienē cum calce, Gaga-
te, aut Asio lapide coctum & impositum absumit: cum Sanda-
racha, aut Auripigmento illitum, unguēs extrahit. Mistum cum
calce & uini fece, suam uim intendit.

Viscum nunquam in terra nascens, semper in arbore proueniēs, præ-
sertim Quercu, Robore, Ilce, Pyro Maloque syluestribus, Salice,
Betula, Corylo, Abiete, Castanea, atque adeo vite. Fit viscum præter a-
lia & è cortice radice plantæ quam Itali Agrifolio, & ex arbuscula
quam ijdem Lantana & Entisde uocant, quæ Theophrasti Fluida est.
Viscum è substantia ærea & aquea & paucissima terrea componitur,
discutit, mollit, extrahit, concoquit.

Aparine. CAP.

LXXXVI.



Aparine.

NOMENCLA-
TVRA.

Græ. Απαρίνη. Lat.

Aparine. Ita. Speronella.

Gal. Glatton. Off.

Aspergula.

Aparine ramis multis
& paruis fruticat,
asperis, quadrangulis, per
intualla orbiculato folio-
rum ambitu, ut in Rubia:
flos albus: semen durum, ro-
tundum, concavum, album,
umbilici figura, asperitate
uestium tenaci. Ea pastores
coli uice utuntur, ad eximē-
dos

dos è lacte pilos. seminis, caulium, ac foliorum succus, potu contra uiperarum phalangiorumq; morsus auxiliatur: infusu aurium dolori medetur. Herba cum Axungia trita strumas discutit.

A Parine aspretudine vestibus tenacissimè adharens, nota planta absterfòria & desiccatoria est, & tenuium aliquantum partium.

Alyssum. C A P. LXXXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. Αλυσσόν. Lat. Alissum. Ita. Rubbia minore.

Gal. Rubca minor. Off. Mater sylvæ.

A Lysson fruticosa herbula est, unicaulis, subaspera, rotundis folijs: fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semen quadrantenus latum: in montibus & asperis locis emicat. Eius decoctum singultus sine febre, potu discutit. Idem efficit si quis eam aut teneat, aut odoretur. Cum Melle trita, vitia cutis in facie, & lentigines emendat: contusa in edulio, rabiei canis mederi putatur. Domibus appensa salutaris esse creditur, & hominibus atque animalibus fascini amuletum. Purpureo linteo circumligata, pecorum morbos abigit.

A Lysson Plinio Rubia est minor: Aëtio, Sideritis heraclea, quæ herba Robertiana est. Galenus Marrubio similem facit. spinosiore & asperiore in summo caule. Ruellius herbariorum rusticam cannabim, putat. In hac sententiarum diuersitate quid pro certo statuendum sit non video, nisi (quod certius est) à Galeno standum esse dicamus. Nam deliniationis huius herba, Matthiolo teste, per totam Italiam vulgaris. Alysson modicè desiccet & concoquit, & aliquantum abstergit.

Asclepias. C A P. LXXXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ασκληπιὰς. Lat. Asclepias. Ita. Asclepiade.

Gal. non probate, Le Lierre terrestre.

Off. Hirundinaria.

Ascle

* *Asclepias.*

Asclepias, ramos emit
tit longos: folia He-
dera, longa: radices numero-
sas, tenues, odoratas: floris vi-
rus graue: semen Securida-
cæ. Nascitur in montibus.
Radices ex uino potæ tormi-
nibus auxiliantur, & con-
tra serpentium ielus. Folia
aduersus uulnæ mamma-
rumq; ulcera, quæ cacoëthe
uocant, illinuntur.

Falluntur qui pro Asclepia-
de, Hederam terrestrem ac-
cipiunt. Nam præter id quod
Asclepiadem non dixit per ter-
ram serpere: folijs Hedera lon-
gioribus, non rotundioribus pin-

xit. Fuchsius Asclepias Vincetoxicum est, at Matthiolus collatis notis nõ
satis respondere opinatur, quemadmodum & haudum in valle Ana-
nia uidisset, sæpe summa cura perquisitum.

Atractylis. CAP. LXXXIX.


NOMENCLATURA.

Gra. Ατράκτυλις ἑτέρα. La. *Atractylis alter.* Ita.

Atratile. Gal. non probate, Chardon benist.

Off. *Carduus benedictus.*

Atractylis, spina est Cnico similis, folia multò longiora
ferens in summis uirgis, magna parte nuda, aspera que,
qua

*Atractylis. 1.**Atractylis. 2.*

qua fœmina pro fufis utuntur : capitula in cacumine fpinis horrent: flos luteus: quibusdam in locis purpureus inuenitur: radix tenuis, fupervacua. Coma, femen & folia cum Pipere & uino teruntur utiliffimè contra fcorpionum iélus: percuffos tradunt quàm diu ea teneatur herba, nullum experiri dolorem, ipfumq; depofita ftatim recrudescere.

Atractylidem non effe Cartamũ fylueftrem è Theophrasti. 6. Lib. cap. 4. de plantarum hiftoria claret, vbi feperatim & de Cartamis, & de Atractylide tractat, & fingularem illi facultatem refudandi è folijs fanguinis, & non Cartamis attribuit.

POLYCNEMUM. CAP. XC.

NOMENCLATURA.

Græ.

Gr. πολύνημον. Lat. Polycnemon. It. Polycnemone.

Gal. Off. Ger. ignota.

Polycnemon, frutex est surculosus, folijs Origani: caule, ut Pulegij, geniculis multis intercepto, sine umbella: tenui tamen in cacumine corymbo, boni odoris & acris. Vulneribus agglutinandis recens, aut aridū cū aqua, efficaciter illinitur: sed quinto die solui debet: ad urinæ stillicidia ruptaq;, cum uino bibitur.

Polycnemon ut duæ præcedentes inter nostro æuo incognitas herbas reponetur, donec exactus quissiam plantarum censor huic perspetæ lucem offeret.

Clinopodium. CAP. XCI.

NOMENCLATURA.

Græ. κλινόποδιον. Lat. Clinopodion. Ita. Clinopodio.

Gal. Pouliot de montaigne. Off. Poliū montanū.

Clinopodion frutex est folijs Serpyllo similis, surculosus, duum dodrantum altitudine. Nascitur in petrosis: flores, Marrubij modo, ex interuallis distincti speciem lecti pedum præbent. Bibitur herba & succi eius decoctum, ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus: menses & partus pellit, & pensiles verrucas, quas acrochordonas uocant, eijcit, aliquot diebus potum. Alium sistit decoctum ad tertias, potumq;, si febrim sentiunt, ex aqua, alioquin ex uiuo.

Clinopodium in montibus vallis Ananiæ copiose nascitur, folijs non Serpillo tantū simile, at etiam Calamento montano. E subtilibus partibus compositum excalfacit & desiccat tertio abcessu.

Leontopetalon. CAP. XCII.

NOMENCLATURA.

Græ. λεοντοπέταλον. Lat. Leontopetalon.

Ita. Rapeione.

Gal. Pate de Lyon. Off. Pata Leonis.


D

Leon


Leonopetalon caulem emittit dodrātalem, aut altiore, plurimis alis concavum, & in cacumine semina parva duo aut tria, in siliquis, Ciceris modo: flores Anemona similes, punicei coloris: folia Brassicae, sed Papaveris diuisura: radicibus nigris, Rapae similibus, strumosis. Nascitur in aruis & segetibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus, ex uino pota, nec alia res celerius dolorem finit. Miscetur ischiadicorum clysteribus.

Domesticū Leontopodiū visitur in multis Italiae hortis, & syluestre Matthiolo multis in Thuscia locis nascitur. Radix cōcoquit, exalfacit, & desiccatur tertia classe.

Teucrium. CAP. XCIII.
NOMENCLATURA.



* Teucrium. 1



Teucrium. 2

Græ

Græ. Τεύκριοϋ. Lit. Teucrium. Ita. Teucurio.

Teucrium, siue ut alijs placet, Teucris, herba est uirga referens effigiem, Trissaginis similitudine, tenui folio, non multum à Cicere alieno. Hæc in Cilicia iuxta Gentiadem Cissademq; ubertim prouenit. Recens cum posca, aut arida seruescenda ius, potu lienem potenter absūmit: lienosis cum aceto & ficis illinitur. Item serpentium morsibus ex aceto solo, sine ficis.

Officinarum Germanicarum Chamædrys Cordo Teucrium esse putatur. Tragus Veronicam Teucrium facit. Verum Teucrium in valle Anania deprehendit Matthiolus. Errant qui id, Fabā inuersam, existimant. Incidit, & tertio ordine desiccat, & calfacit secundo.

Trixago. CAP. XCIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Χερσίδεϋς.

Lat. Trissago.

Ita. Querciuola.

Gal. Petit Chesne. Off. Chamædreos.

Chamædrys Græcis, alijs Chamædrops: Latinis Trissago dicitur. Sunt qui eam Teucrion appellauere, propter eam quam cum Teucurio seruat similitudinem. Nascitur in petrosis & asperis. Frutex dodrantalis, folia habens exigua, amara, effigie & diuisura Quercus: flore paruo, penè purpureo. Carpitur semine prægnans. Recens in aqua decocta, potu iussibus, indurato lieni, urina difficultati, incipientibus hydropicis, auxiliatur, cit menses, partus extrahit. Lienem ex aceto pota consumit. Aduersus serpentium uenena ex uino, potu illitūque

D 2 effic



* Trixago. 1



Trixago. 2

efficacissima. Trita digeritur in pastillos ad supradicta. Purgat
ulcera, cum Melle: cum oleo illita, caliginem oculorum discutit.
Natura eius est calfacere.

Trixago Italica herba febrium dicitur, quod continuis aliquot ma-
tutinis epota decoctio, a tertiana liberet. Thuscis acetarij vice co-
mesta, à peste securos reddit. Amara qualitas (quantumvis aliquan-
tum astringat) vincit in Trissagine. Tertij est excalfacientium & de-
siccantium ordinis.

Leucas. CAP. XCV.

NOMENCLATURA.

Græ. λευκός. Lat. Leucas. Ita. Leuca.
Gal. Off. Ger. ignota.

Leu

Lucas montana, latioribus quàm urbana folijs, semine
 acriore, amariore, ori ingrato, efficacior tamen quàm sa-
 tiua habetur. utraque ex uino contra animalium uenena, præ-
 cipuè marinorum opitulatur.

Lucas inter herbas nostro seculo incognitas reponēda. Siquidē ni-
 hil habet commune cum Mercuriali vinacea.

Lychnis. CAP. XCVI.

NOMENCLATURA.

Græ. Λυχνίς σεφανωμάσικη. Lat. *Lychnis coronaria*.

Ita. *Lychnide coronaria*.

Gal. Girofles sauuares. Off. herba Tunica.



Lychnis sativa.



Sylvestris.

D 3

Lychn

Lychnis coronaria, flore est alba Viola simili, quo corollæ factitantur. Contra scorpionum ictus semen in uino potum auxiliatur. Lychnis sylvestris, omnia urbana similis. Bilem per aluum detrahit, semine duabus drachmis potio: ictus à scorpione subuenit. Aiunt huius herbae appositu scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

Difficile sanè sit Lychnidem reperire, quamuis Matthiolus se in Italicis hortis herbam effigie Lychnidi persimilem vidisse scribat, quæ etiam sylvestrem congenerem habeat. Calida & sicca est ordine secundo desinente, aut ineunte tertio.

Lilium. CAP. XCVII.


NOMENCLATURA.

Græ. Κρίνον. Lat. Lilium. Ita. Giglio

Gal. Lis. Off. Latino nomine.

Lilia coronamentis se dedunt, Liria à quibusdam uocata. E quibus unguentum temperatur, quod aliqui Lirinum, alij Susinum appellant, nervos & priuatim uulvæ duritias emolliens. Folia herbae illita contra serpentium ictus auxiliantur: feruescēta, ambustis proficiunt: aceto condita uulceribus opitulantur. Succus adiecto Melle aut aceto, in aereo uase coquitur, conuenienti medicamento uetustati ulcerum, & ad recentia uulnera. Inassata radix & ex Rosaceo trita, igni ambusta sanat, uulvam emollit: menses ciet, ulcera cicatrice obducit: cum Melle detrita nervis præcisis, luxatisq; medetur: uirilignes, furfures & lepras emendat, ulceraq; in capite manantia expurgat: abstergit faciem & erugat. Teritur in aceto cum Hyoscyami folijs, & farina tritici, mulcendis testium inflammationibus. Semen potum moribus serpentium aduersatur: ignibus sacris semen & folia cum uino illinuntur. Tradunt & rubra esse Lilia. In Syria autē & Pisidia Pamphylia, efficacissima unguentis nascuntur.

Lilia



Lilium.

Lilia nota sunt, & ut purpurea prodeat ratione docuit Plinius, satis nostro tempore perspectam. Hoc tam. n. in loco de albis Dioscorides intelligit. Liliorum radix prima detergentium est classis, modicè emollit, & concoquit. flos substantia constat mista ex tenui, terrea, & aquea. Coctus ex oleo mollit & citrà morsum digerit.

Ballote.

CAP.
XCVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Βάμβη. Lat. & Off. *Marrubium nigrum*.

Ita. Marrobio nero.

Gal. le Marrubium noir.

Balloten, nomine alio nigrum *Marrubium* uocant: caules ædit quadrangulos, nigros, subhirsutos, complures ex una radice: folijs maioribus quam *Marrubij*, hispidis, intercedente spacio, subrotundis, graueolentibus, *Apiastro* proximis: unde aliqui *Apiastrum* eam uocauerūt. Candidi flores uniuersi uerticillato ambitu caulem coronant. Vis eius efficax aduersus canis morsus, folijs ex sale illitis. Feruenti cinere flaccescunt folia, ut condylomata reprimant. Purgant & sordida ulcera cum Melle.

D 4

Ball

B Allote adeò Apiastro similem profert effigiem, vt nisi odor ingrat-
tus errorem proderet, attento etiam oculo imponeret. Ballote acris
est, & absterforia. Cum sale valet ad morsus canis rabidi.

Apiastrum. CAP. XCIX.

NOMENCLATURA.

Gr. μελισσόφυλλον. la. melissophyllō. It. Cedronilla.
Gal. Melisse. Off. Melissa.



Apiastrum.

Melissophyllon siue
Melittana, id est,
Apiastrum, id sibi nomen
usurpauit, quoniam apes
ipsa herba delectantur. cau-
liculi & folia Ballotæ, de
qua paulo antè diximus, si-
milis essent, nisi maiora, te-
nuioraq; nec ita hirsuta spe-
clarentur. Citreum malum
olent. Folia cum uino pota
aut illita prosunt cōtra ictus
phalangiorum, scorpio-
numq;. Item aduersus canis
morsum. Decocto eorun-
dem gratia, foueri prodest.
desessionibus fœminarum
ad ciundos menses conuenit.

Dentes eodem in odore col-
luuntur. Dysentericis infunditur. Fungorum strangulationibus
folia, addito Nitro, potu auxiliatur: torminibus & orthopnoi-

tis, delinētu illita cum sale strumas discutiunt, ulcera purgant, articularios dolores illita sedant.

A Piastrum ad passionē cordis multum efficax, A uicennæ calidum & siccum secundo ordine. Mirum in modum latificat & roborat cor, odor siquidem gratus, obstipans facultas, & disgregans deopilatio, rtilem in omnia etiamnum viscera faciunt. hac vi soluit. sed quatenus spectat ad exoluēdos ab humoribus melancolicis spiritus, qui in sanguine qui circa cor est, versantur. Quod in alijs membris nec in toto corpore conficit. Hæ Melissophylli dotes, Galeno, & cæteris græcis fuerunt ignota.

Marrubium. CAP. C.

NOMENCLATURA.

Græ. ῥαῖσιον. Lat. Marrubium. Ita. Marrubio.

Gal. du Marrubin. Off. Marrubium album.

Marrubium, frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis: folium pollicem æquat, subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amaro: semen in caulibus, & ex interuallis: flores uerticillato ambitu, asperi. Nascitur propter ædificia, ruinas, & rudera. Huius folia sicca, cum semine decocta in aqua, aut uiridum succus datur cū Melle suspiriosis, tussientibus, & ad tabitudinem redactis. Crassam è pectore pituitam, cum sicca Iri eicit: mulieribus à partu nō purgatis datur, ut menstrua & secundas extrahat, item in difficili partu, & his qui uenena hauserunt, aut à serpentibus demorsi sunt. Vesicam renesq; ledit. Folia cum Melle illinuntur sordidis ulceribus purgandis, pterygia nomasq; sistunt, laterum dolores mitigant. Succus folijs cōtusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet. Cum uino & Melle illitus, oculorum claritatē adiuuat. Naribus regium morbum expurgat: aurium doloribus conuenienter instillatur, per se aut cum Rosaceo.

D 5

Mar

Marrubium notius, quàm ut manifestius quippiam à Dioscoride, quo virtutes eius patent, dicendum sit. Calfacientium desinentis est secunda classis, & desiccantium media, aut desinentis tertia.

Stachys. CAP. CI.

NOMENCLATURA.

Græ. Σταχys. Lat. Stachys. Ita. Stachi.

Gal. Sauge rendre. Off. nomen non habent.

Stachys frutex est Marrubio similis, sed longior: folia ferè numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucundi, & complures uirgas ab radice exeuntes, Marrubio candidiores. Nasitur in montibus & asperis. Vim habet excalfactoriam & acrem. Foliorum decoctum, potu pellit menstrua & secundas.

Stachys itidem non incognita, & nequicquam in ea cōtrouersia est. Herba Marrubio similis, gustu acris & amara, tertio ordine excalfacit.

Phyllitis. CAP. CII.

NOMENCLATURA.

Græ. Φυλλίτις. Lat. Phyllitis. Ita. Phyllitide.

Gal. & Off. Lingua ceruina.

Phyllitis, folia promit Rumici similia, longiora, & uiridiora, sena aut septena, recta, quæ parte anteriore læuia cernuntur, à tergo autem pensiles, quasi uermiculos tenues ostendunt. In umbrosis & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbior: neque caulem, neque florem, neque semen profert. Folia in uino pota serpentium morfibz aduersantur: quadrupedibus per os infusa auxilio sunt: & si dysenteria aut resoluta aluus exercet, potui datur.

Qui sedulo Dioscoridis notis in delinianda Phyllitide animum aduerterit, hanc ut procuidubio eam, quæ vulgò, Lingua ceruina dicitur, esse cognoscet: ita hætenus falso, pro Scolopendrio, quod Arabum sectarij Cetrach nuncupatur, usurpatam. Et quod ad fo-

lior

liorum numerum attinet, multas videre est plantas, contra Dioscoridis sententiam cum quinquaginta folijs, quæ ille sex tantum assignarit: ac extracto è terra Lingua ceruinæ cespite, foliorum multitudinem è numerosa radice prodire manifestum est.

Phalangium. CAP. CIII.

NOMENCLATURA.

Græ. φαλάγγιον. Lat. Phalangium. Ita. Phalangio. Herba hodie ignota.



Phyllitis.

Phalangium à quibusdam Phalangites vocatur: ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresque, in diuersa tendentes: flos candidus, Lilio similis, multas incisuras habens semine nigro, lato, ad Lenticula dimidiata figuram, multo tenuiore: radice parua, tenui, herbacei coloris dum à terra eruitur. Prouenit in collibus. Huius folia, semen, flos cum uino posita, auxiliantur, contra scorpionum Phalangiorumque ictus: tormina quoque discutunt.

Phalangium è subtilibus & desiccantibus partibus, non aliter à Plinio quam à Dioscoride descriptum, inter ignotas plantas referuntur, sicut nec in Italia reperitur.

Trifo

Trifolium. CAP. CIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. τρίφυλλον. Lat. Trifolium. Ita. Trifoglio.
Gal. Trefle. Off. inusitatum.



Trifolium.

Trifolium. 2

Trifolium, Græci Triphyllon, alij oxytriphylon, alij menyanthes, alij asphaltion uocant. Frutex supra cubiti altitudinem attollitur, uirgas habens tenues, iunceas & nigras, unde ramulares enascuntur appendiculæ, in quibus terna singulis germinationibus exeunt folia, Loto arbori similia: ijs recentior enatis Rutæ odor inest: ubi autem adoleuerunt, Bitumen olent. florem adit purpureum, semen quadantenus latum, subhirsu

hirsutum, ex altera extremitate exertum, antennæ modo corniculum gerens: radix tenuis, longa, ualida. Semen & folia in aqua pota pleuriticis, urinæ difficultati, comitialibus, & ijs qui aquæ intercutem principia sentiunt, scæminis quoque uulnæ uitio opportunis, auxiliantur, menses ciunt: terna drachmæ è semine dari debent, è folijs uerò quaternæ. Contra serpentium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, præsidio sunt. Tradunt aliqui, totius fruticis, radicis, foliorumq; decoctum solum dolores eorum finire, quos serpentes percusserint. Qua autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui ulcus habuerit, perinde afficitur ut à serpente demorsus. Quidam terna folia aut semina in tertianis, cum uino potui dedere: & in quartanis, quaternæ, ut quæ februum circuitus discutereant. Radix antidotis inseritur.

Tria sunt Trifolij genera. Vnum Menyanthes vocant Græci, alij Asphaltion, Archigenes Asfaltitum, maiore folio, quo coronarij utuntur. Alterum acuto, Oxytriphylon cognomine. Tertium minutissimum ex omnibus. Tria hæc genera Gallica & Italica præta nouere, primum rotundis & magnis, secundum, longis: tertium, rotundis & minutis folijs. Hæc mense Maio flore alias purpureo, alias albo visuntur. Est etiam Trifolij species, quem Trifolium acetosum, & panem cuculi vocant: seplasia, Alleluja. Trifolium odoratum, quem Romani Tribolonuncupant, Dioscoridis est Cytisus. Arabum Andaioca, è quo oleum fit ad dolorem & tremorē membrorum, Lotus est syluestris & Aegyptia, cuius in sequenti libro neminit Dioscorides. Errant qui è Trifolio vulgari id oleum conficiunt. Tertio abscessu exalfacit & desiccat.

Polium. CAP. CV.

NOMENCLATURA.

Græ. πολιον. Lat. Polium. Ita. Polio.

Gal. Poliot. Off. Latino nomine.

Duo genera polij. Montanum, cui Thentrio nomen est, & cuius est usus. Tenuis frutex est, candidus, dodrantalis


talis, semine refertus: capitulo in cacumine quandam corymborum speciem præ se ferente, paruo, canis hominis simili, graui-ter olente, non sine quadam suauitate. Alterum fruticosius, non usque adeò ualens odore, & uiribus infirmius. Potum feruefactius auxiliatur serpentium iectibus: hydropicis, morbo regio, & lienosis ex aceto: stomachum malè habet: caput doloribus afficit: aluum & menses ciet: substratum suffitumue serpentes abigit: uulnera conglutinat.

Verum Poliū in Thuscia & Gallia Narbonensis montibus enascitur: id gustu acre & amarū est, atque in eo, minus, seu syluestre, ualētius. Nēpē tertij desiccantiū ordinis, & excalfacientiū in fine secūdi.

Scordium. CAP. CVI.

NOMENCLATURA.

Græ. Σκόρδιον. Lat. & Off. Scordiū. Ita. Scordio.
Gal. Chamaraz.



* Scordium.



Ailaria.

Scordium in montibus & palustribus nascitur, folijs Tris-
saginis, maioribus, non sic in ambitu diuisis, aliquantum
Allia redolentibus, gustu amaris & astringetibus: quadrāgu-
lis caulibus: subrubro flore. Herba uim excaletoriam habet: uri-
nam cit. Cocta recens, aridaue cum uino, aduersus uenenatos ser-
pentium morsus bibitur: ad stomachi quoque rosiones, dysente-
ria & urinæ difficultatē, binis drach. cum hydromelite: crassa
men parulentum peēlore expellit. Facit arida farina ad uete-
rem tuſsim: rupta, conuulsa, si cum Nasturtio, melle & resina
misceatur in eclegmate. Inflammata modicè præcordia, cerato
excepta, recreat. Cum aceto acri aut aqua, podagris conuenien-
ter illinitur: menses imposita mouet, uulnera conglutinat, uete-
ra ulcera purgat, & ex melle cicatricem perducit. Sicca excre-
scientias in carne cohibet. Succus ad eadem uitia bibitur. Inter
prima efficax Ponticum natione, Creticumq̃.

Scordium non ita pridem cepit agnosci, & perinde desijt Allium
syluestre eius loco vsurpari. Scordium Chamædry simile, odore Al-
lium referens, in palustribus prouenit, & ea de causa Romanis Tris-
sago palustris dicta est. Galeno optimum est Scordium Creticum. Ama-
rum est Scordium, acerbum, & acrimonia satis ad Allium accedens.

Tussilago. C A P. C V I I.

NOMENCLATURA.

Græ. Βήχιον. Lat. Tussilago. Ita. Vnghia
di cauallo. Gal. Pas d'Asne. Off.

Vngula Caballina.

Tussilagini folia sūt maiuscula quā Hederæ, sex aut septē-
à radice, subalbida à terra, supnè uirētia, in plures angu-
los

los exeuntia: caulis palmum altus, flos luteus: in uere, flore & caule confestim exiit: inde nonnulli his uacare existimauerunt. Radix tenuis est & superuacua. Nasitur in amœnis & riguis. Folia ex Atelle trita, igni sacro & omnibus inflammationibus illitu medentur. Arida fumus per infundibulum hianti ore raptus, hos sanat qui sicca tussi atque orthopnœa infestantur: pectoris uomicas rumpit. Eundem effectum præbet suffita radix. Decocta in hydromelite, & pota, emortuos partus eicit.

Tusilago vulgaris & nota est planta, caule & flore fugacissimo ut enatis vigor & longissima mora, sit biduum. Namq; die vno locum vniuersum caule & floribus pubescere, postride prorsus cõtabuisset, frondêque sola virefcere, videbis. Ea causa est ut sine caule & floribus plerique qui tam citâ caulis iacturâ non inspexerunt, existiment. Acris herba, & aqueæ substantiæ, minus tamen, viridi etiamnum & tenera planta. Nâ sicca Tusilaginis folia acriora sunt, quam requirant flegmones. E radice lana extrahitur, quæ parata accendêdo igni idonea est.

Artemisia. C A P.

C V I I I.


NOMENCLATURA.

Gr. Ἀρτεμισία. Lat. & Off. Latino nomine.

Gal. Armoise. Ger. Reinfarn.

Artemisia magna ex parte in maritimis nascitur, Absinthij modo fruticosa, maioribus & pinguioribus folijs, ramisq;: huius quidem genera duo: unum letius habitiusq; folijs uirgisq; latioribus: alterum tenuius, flore paruo, tenui, candido, graucolente: æstate floret. Sunt qui in mediterraneis unicaulis nomine appellêt, tenuem herbulam, simplici caule & minuto, floribus scatentem tenuibus flauo colore: hæc incüdiorem quã præcedês efflat odorẽ. Vtr aq; excalfacit, extenuat. Feruescētæ conuenienter in muliebres desessus adijciuntur, ad detrahendos menses, partus, secundasq;: item ad præclusiones uulvæ, & eiusdem inflammationes: calculos comminuunt, remorata m urina

nam

*Artemisia maior.**Minor.*

nam cient, menses pellunt pubi illita. Succus uulue inditus ex Myrrha, eadem quæ in sepsio trahit. Coma tribus drachmis eorundem educendorum gratia bibitur.

Artemisia tria genera facit Dioscorides, inter quæ prima duo non ignota, maioris & minoris Artemisia nomine sapore & calore nihilum dissimili, tantum differunt surculorum & foliorum, floris, & seminis magnitudine. Nec censendum secundam Artemisia speciem esse matricariam, quæ verum est Dioscoridis Parthenium: nec tertia, eadē cum Athanasia seu Tanaceto ducenda: nam vnicaulis, Dioscoridi, Artemisia: Tanacetum, multis ex vna radice & validis constat frondibus. Non iniuriâ tenuifolia Artemisia caput à doctioribus expunctum, tū quod huius antea mentionem fecerit, tum quod in antiquis codicibus græcis non reperiatur. Matthiolo tertia Artemisia species Italia nostro tempore ignota.

Ambrosia. CAP. CIX.

E Nomenclatura

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀμβροσία. Lat. Ambrosia. Ita.


Latino nomine. Gal. Rue de

vigne. Off. Ruta

vinacea.

Ambrosia tenuis frutex est, ramosus, trium ferè palmorū: folijs Ruta, circa inum caulem exiguis: cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, qui nunquam florem pariunt, odore uinoso, suauis: radice tenui, sesquipedali. Coronatur ea Cappadoces. Vis eius reprimere ac repellere, & illitu adstringere humores, quin aliquam partem incumbunt.

Ambrosia in aruis & vineis prouenit cum notis quae ei attribuit Dioscorides. Repercutit & reprimat. Hac rustici ad arcendum aestum coronaria est. Quam officina ostendunt non est Ambrosia, sed Polemonia.



Botrys.

Botrys. CAP.

CX.

NOMENCLATURA.

Gr. Botrys. La. Botrys

Ita. Botri.

Gal. Pymen. Off. ignota.

Botrys furticosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa: semen circa totos ramulos prouenit: folia Cichorio similia: tota


tota suauem odorem spirat : quare uestimentis interponitur . Inuenitur in torrentium ripis , & conuallibus . Pota orthopnæas mulcet . Hanc Cappadoces Ambrosiam uocant , alij Artemisiam .

Botrys Ruellio ea est , quam rustici in corbibus portantes , Pymen magno clamore d. nuntiant , probè adaptato nomine , nam si prægnans suo liquore premeretur , in gummi lætesceret , ex se pigmentarij institoris vice unguentū efficiens . An adsimiliū racemulorum hortensæ herba , quantumuis summatim racemuli dependeant , non tamen in ramulorum omnium ambitu , ut in Botry , innascuntur .


Geranium. C A P.

C X I.

NOMENCLATURA.



Geranium. 1.



Geranium. 2.

E 2

Græ

Græ. γεράνιον. Lat. Geranium. Ita. Geranio.

Gal. Aguille de bergier. Off.

Acus pastoris.

Geranion folijs Anemones, diuisuris longioribus: radice subrotunda, cum estur dulci: Quæ drachmæ pondere in uino pota, uulnæ inflationes discutit. Geranium alterum, caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus: folijs Maluæ in summis alis sursum spectantia gruum capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina usus.

Tres Gerani species, Vna latinorum, duæ Græcorum. Plinij Latinorum, Geranium, est quæ Herbariorum vulgus, Rostrum Grui Rostrum Ciconiæ, & Acum muscatam nominant. Primam Græcorum Gerani speciem vidit non semel Matthiolus, in valle Anania, quæ tamen ea non sit, quam Acum pastoris dicunt, ut quæ radicem nullam rotundam faciat, nec folijs sit Anemones, diuisuris longioribus. At in totum similis est, Plinij, Latinorum Geranio. Quod tamen Myrrhis non est, nempe huius separatim meminit Plinius Libri vicefimi quarti sexto capite. Secunda est, Pes columbinus vulgaris.

Gnaphalium. CAP. CXII.

NOMENCLATURA.

Gr. γναφάλιον. La. Gnaphalium. It. Gnaphalio.

Gal. Lin de pré. Off. Centumculum.

Gnaphalij folijs mollibus minutisq; pro tomento utuntur. Bibuntur efficaciter folia in uino austero ad dysenteriam.

Gnaphalium pauperum olim fuit herba, e qua ob mollitiem & Lanuginem culcitras farciebant.

Typha. CAP.

CXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. τύφη. Lat. Typha. Ita. Μαχχα sorda.

Gal. L'herbe à masse. Off. non perinde vsitata.

Typha



Typha.

fortis homines apud Italos, *Mattaraxia* (vt vocant) conficiunt: vasa vinararia, nempe vulgares flascones, & multi bres cathedras, huius folijs contexunt & inuestiunt.

TYpha folium edit Cyperidi simile: caulem album, leuem, & quabile: florem in acumine ambientem, densum, qui in pappos soluitur, quod Paniculam aliqui nominat. Huius herbe flos, sullo adipe eloto exceptus, ambustis medetur. Gignitur in plaustribus & aquis stagnantibus.

TYpha nota est planta, paludibus, stagnis, lucubus innascens, Μαζζα sorda Italis dicitur, quod surdos reddat quorum auribus indatur eius lanugo. Ex eius Lanugine postremae

Circæa. CAP.

CXIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. κίρκαϊα. Lat. *Circæa*. Ita. *Circea*.

Gal. Off. Ger.

ignota.

Circæa, quam & *Dircæam* aliqui uocant, folijs est hortensis Solani, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso: semine Mili, nascete in quibusdam ueluti corniculis: dodrantali

E

3

radice

radice, triplici fermè aut quadruplici, candida, odorata, exca-
 lente. Nascitur in apricis, saxis, & uento perflatis. Radicis tu-
 sa pondo quatuor, in sextarijs tribus uini dulcis, per diem & no-
 elem macerantur, potuq; triduo uulvas expurgant. Semen in sor-
 bitionibus datum, lacte mammas nutricum explet.


Circa ignota nostro saculo planta, A Circe nomen accepisse vi-
 detur, quod eius maleficijs inferuaret.

Oenanthe. C A P.

C X V.

NOMENCLATURA.

Græ. Οἰνάνθη. Lat. Oenanthe. Ita Enanthe.



Oenanthe.

Gal. non probatè Sa-
 xifrage rouge. Off. pa-
 ri. Filipendula.

Oenanthe folia habet
 Pastinacæ: florem
 candidum: caulem crassum,
 palmi altitudine: semen A-
 triplicis: radicem magnam
 in multa rotunda capitula
 extuberantem. Nascitur in
 petris. Caulis eius & fo-
 lia, cum mulso uino pota,
 secundas eijciunt, Radix è
 uino urinæ stillicidio con-
 uenit.

Oenanthe

Oenanthe nihilum amplius à nobis quam Circea agnoscitur. Nec Filipendula in pratis nascens, & non inter saxa: & quòd radicem magnam non producat, nec semen proferat Atriplici simile, quæ in Oenanthe requirunt Dioscorides & Plinius, eadem cum Oenanthe plantâ esse non potest.

Conyza. CAP. CXVI.

NOMENCLATURA.

Græ. Κορυζα. Lat. Coniza. Ita. &

Off. Pulicaria. Gal. herbes
aux pulces.

ConYZa duo genera: quæ parua uocatur, odore præstantior est: maior uerò frutice altior & folijs latioribus, graui odore. Vtriusque folia Oliuæ similia, hirsuta, pingua. In maiore caulis binum cubitorum altitudine attollitur. In minore pedem æquat Flos fragilis, lutei aut fului coloris, qui in pappum abit: radices superuacua. Suffitu substratūq; frutex totus serpentes fugat, culices abigit, & pulices necat. Folia conuenienter illinuntur serpentium plagis, & tuberculis, ac uulneribus. Flores & folia cum uino ad menses partusq; eijciēdos bibuntur. Itē contra urinæ stillicidia, arquatū morbum, & tormina: comitiales pota ex aceto adiuuant. Decoctum in desefsionibus medetur uulua malis. Impositus succus abortum facit. Ex oleo efficaciter horroribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita sanat. Est tertium Conyza genus, caule crassiore, ac molliore, folijs quàm parua maiusculis, minimè pinguis, & maiore minor, multo grauioris odoris & inuicundioris, sed inefficacior. Prouenit locis non riguis.

Coniza eiusque species non incognita, quas magnitudo soli ubi nascuntur natura, & odoris grauitas nullo negotio discriminat. Coniza maior & minor pari facultate & temperamento, gustu amarorem & acrimoniam præse ferunt. In excalfaciendo & desiccando

E 4 classem


classe[m] sibi tertiam asciscunt. Tertia harum species, odoris gaurioris, & virtutis ab alijs minoris est.

Hemerocallis, siue Lilium sylvestre.

CAP. XVII.

NOMENCLATURA.

Gra. Ημεροκαλλίς. Lat. Hemerocallis. It. Giglio
saluatico. Gal. Lis sauuage. Off. Falso
Asphodelus siue Hyacinthus.



*

Hemerocallis.

Hemerocallis folium
& caule[m] habet Li-
lij, porraceo colore, flores in
caule per singulos exortus,
terni aut quaterni erumpunt,
Lilij diuisura, quoties dehisce-
re ceperunt, colore per quā
pallido: radix magna est at-
que bulbosa: quæ pota, aut
cum Melle & lana in pecto
apposita, aquam educit &
sanguinem. Folia trita mam-
marū inflammationes à par-
tu contractas, oculorumque
collectiones mitigant. Radix
& folia igni ambustis uti-
lissimè illinuntur.

Hemerocallis seu sylvestre Lilium nullibi nō provenit. Errāt qui p
Hemerocalle, Lilij vocatū conuallij accipiunt, nam nota non cō
sentiant


sentiunt. Nec sanius sentiunt, qui verum Asphodelum existimant, cum
huius radix nec amara sit nec acris. Hemerocallis non effigie tantum,
sed virtute etiam Liliū exprimit.

Leucoium, siue Viola alba.

CAP. CXVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. λευκόιογ. Lat. Leucoium, Ital. Viola
bianca. Gal. Giroflee. Off. Keyri. Ger.
Weiß; Hornungs blum.





Leucoium luteum.



Leucoium purpureum.

Leucoion vulgaris est notitia, sed in floribus differentia
quadam: namque aut cœrulei, aut albi, aut purpurei, aut
lutei inveniuntur. Luteum uerò præcipui in medicina usus. Huius

E S aridi

*Leucoion Luteum.**Purpurascens.*

aridi flores feruesfacti in descensionibus, ualent contra uulua inflammationes, & menstrua expellunt: sanant oris ulcera, cum Melle: cum cerato, rimas sedis. Semen duum drachmarum pondere ex uino potum, aut cum Melle inditum, menses, secundas et partus extrahit. Radices cum aceto illitæ, lienem reprimunt, & podagricos iuuant.

Vulgares iam esse cæperunt Leucoij species omnes à Dioscoride enumerata, præter ceruleas, siquidem hæ nec in Italia nascuntur. Lutea magis ad medicinales vsus accedunt. Viola omnes virtutis sunt absterforiæ, & tenuibus è partibus componuntur. In his flores desiccati, vires virtute præcellunt.

Cratæogonum. CAP. CXIX.

NOMENCLATURA.

Græ.

Græ. Κράταγονον. Lat. Cratægonon. Ita. Crate-
gono. Gal. non probatè, Curaige.
Off. Persicaria.

Cratægonum, siue, ut alijs placet, Cratænon, folijs Melampyro simile est, multis calamis ex una radice emicantibus, multorumq; geniculorum, semine Mily. Nascitur in opacis & fruticosis, summoperè acre. Traditum est quibusdam, hoc si bibat ieiuno ore, ter die post menses purgatos, tribus obolis, in cyathis aquæ duobus mulier, ante conceptum quadraginta diebus: & uir modo consimili, totidem diebus ante coitu hauriat, uirilis sexus partum futurum.

Cratægoni ignota est planta, nec secunda Persicaria species est, refragantibus notis. Est etiam hoc nomine arbor Theophrasto, quæ Italiâ Aquifoliam vocat.

Phyllum. CAP. CXX.

NOMENCLATURA.

Græ. φύλλον. Lat. Phyllum. Ita. Folio.
Gal. Off. & Ger. ignota.

Phyllum, quod Elæophyllum uocatur, in saxosis nascitur, duum generum est, quod autem Thelygonum appellant, uuas habet floribus oleæ similes, pallidiores tamen: folijs itidem oliuæ est: caule tenui, breui: radice exili: florem album profert: semen papaueris maiusculum. Sed Arrhenogonon cetera huic simile, solo fructu distat: habet enim racemosum quiddam defloretibus oleis non dissimile. Arrhenogonon potu, masculi sexus facere partus, ut Thelygonon fæminei, proditur. Horum Crateuas author est. Sed huiusmodi historia tenuis mihi produxisse uisum est.

Folium

Folium, nullius herba peculiare est nomen. At enim ingenti nos molestia liberat, Theophrasti de plantarum historia libri noni cap. 19. Quo loci herbam ponit duarum specierum. Vnam Arrhenogonon, quod masculos: Alteram, Thelygonon, quod epota, feminas concipi faciat. Porro cum Dioscoridis Phyllon in Arrhenogonon & Thelygonon & scriptione & viribus distribuatur, constat idem esse Dioscoridi Phyllon, quod Theophrasto planta quæ in Arrhenogonon & Thelygonon diuidatur. At enim cum Phyllon nullum habeat proprium genus, & tamen Arrhenogonon & Thelygonon vocetur, necesse est ut sub alio nomine lateat. Quod clarum euadet, qui Mercurialis historiam & vires ab hocce auctore descriptas, cum Theophrasti Arrhenogono & Thelygono conseruat. Siquidem vna & eadem planta sunt Arrhenogon, Thelygonon, Phyllon, & Mercurialis, cuius duæ sunt species, ut postea suo patet loco. Crateus herbarius, eatenus Dioscoridi (è cuius scripto nobis hac prodidit) imposuit, nec tamen ob id de tanti hominis fide dubitandum.

Testiculus. CAP. CXXI.

NOMENCLATURA.

Gra. ὄρχις. *Lat.* Testiculus canis. *Ita.* Testicolo.
di cane. *Gal.* Couillon de chien.
Off. Latino nomine.

Testiculus, quem Græci Cynosorchin uocant, folijs circa caulem mollis Oleæ similibus, in terra stratis, longioribus angustioribus, lauibis: caule dodrantali: floribus purpureis: radice bulbosa, oblonga, Olivæ modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est: inferiore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices coctæ, ut Bulbi: ex quibus si maiorem edant uiri, mares generari dicuntur: si minorem femina, alterum sexum. Addunt, in Thessalia mollem mulieres in lacte caprino bibere, ad stimulandos coitus: aridam uerò, ad inhibendos: & alterum alterius potu resolui. Nascitur in petrosis et sabuletis. Testiculus alio nomine



Orchis.



Cynosorchis.

mine Serapias, *Andrea* autore, uocatur, quoniam radix ad multa utilis sit: folijs est Porri, latioribus, oblongis, pinguius, ex alarum sinu inflexis: caule palmeo: floribus penè purpureis: radice testiculis simili, quæ illita tumores discutit, ulcera purgat, & serpere eadem non patitur. Abolet fistulas, & illitu inflammationes lenit. Aridæ radices nomas inhibent: sanantq; putredines, et oris ulcera, cacoëthe: aluum sistūt è uino potæ. De hac, eadē quæ de Testiculo canis, produntur.


Satyrrium. CAP. CXXII.

NOMENCLATURA.


Græ. Σάτυριον, Lat. Satyrrium. Ita. Satirio.

Gal. du Satyrion. Off. Lat. nomine.

Saty



Satyrium Trifolium.



Basilicum.

Satyrium aliqui Trifolium uocant, quoniam tria fert folia, ad terram infracta, Rumici aut Lilio similia, minora tamē, ac rubra: caulem cubitalem, nudum: florem Lili effigie, candidum: radicem bulbosam, Mali magnitudine, fuluam, intus ut ouum candidam, gustanti dulcem, & ori non ingrati: quam in uino nigro austero libere conuenit, contra opisthotonū. Vtendum ea dum concumbendi incesit cupiditas, siquidem ea proniores ad uenerem fieri affirmant. Est & alterum Satyrium Erythronium siue Erythraicon, id est, rubrum, semine Lini, maiore, duro, leui, splendente, quod fertur non secus atque Scincus, libidinem excitare. Cortice radice gracili, rufo: intus autem albū includitur, sapore dulci, non ingrato ori. In montosis & apricis enascitur. Venerem, ut prodūt, si omnino manu teneatur radix, stimu

stimulat: eoq; magis, si bibatur in uino.

Errant qui Testiculos canis & Satyriones pro eodem ducunt. Nam dissimili effigie, licet non admodum imparibus sicut viribus. Verè Satyriones vix hodiè reperiuntur, sed horū loco Testiculis canis utimur, & in Italia non nasci Matthiolus testatur, idq; è radice cognosci, quæ in Testiculis canis bifida, cū sui nominis effigie, in Satyrione vuica, mali in rem rotunda, fulua, intus ut ouum candida. Quinque Testiculus canis sub se species cōtinet, præter eas quæ, quòd manui hois similes, Palma Cristi vulgo dicuntur, & Auicenna, Digiti citrini. Hæc planta duarū est specierum, maior & minor: vtraque Seplasis cognita. Minoris flores desiccati præsentaneum dysentericæ remedium afferunt, idem efficiet aqua ex eis per alembicū extracta. Radices Auicenna calidæ & siccæ sunt secundo abscessu. Semen maioris, matutinis nouem continuis, granatim tritum in vino, & epotum, medetur morbo caduco. Idem efficiet radices decoctio, si quis ea miscendo vino utatur. Vtriusque Testiculi canis radices virtutē habet calidā & humidā, & gustu dulcorē quēpiā præferunt. Satyrio tēperamēto est calido et humido, et ob id manifeste dulcis est gustu.

Horminum. CAP. CXXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ορμίνιον. Lat. Horminum. Ita. Hormino.

Horminum herba est, folijs Marrubio similis, caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ siliquis similes prodeunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur: siquidem in syluestri rotundum, fulcumq; inuenitur: in altero, nigrum, & oblongum, cuius est usus. Ad uenerē stimulandam, cum uino bibi uolunt. Purgat cum melle argemas albuginesq;. Illitum ex aqua tumores discutit: eo etiam extrahuntur aculei ex corpore. Idem effectus est illitæ herbæ. Syluestre magis uiribus pollet: quare unguentis, præsertim Gleucino, permiscetur.

Horminum domesticum vulgò ea ducitur esse planta, quæ admodum odorata Sclarea aut Starleggia nomē accepit: Syluestre verò ea quæ Gallitrici aut Centriū galli nuncupant. At cū videre sit huiusmodi

modi plātas sapē in duū cubitorū altitudinē subrizi, folijs Marrubio grādiōribus, siliquis in cymā, & non in radicē spectatibus, eos proculdubio errare, qui ita cēsent nō abs rē scribit Matthiolus, maximē cū domestica & syluestris Scalaria semē rotundū proferat, & nō ut vult Dioscorides, syluestris sit rotundū, alterius oblongū. Adde his quod verosimile nō est Dioscoridē (siquidē ita sensisset) odoris flagrantia data opera prateris se, nā aspirat suauissimē Scalaria. Qui sit ut nostro saculo depicti a Dioscoride Hormini, ignoscātur. Plinius duarū harū vocum Prasion, & Prasion, proximitate deceptus, quarū prima Marrubiū, altera Porriū designat, Horminiū Porri, & nō ut debuerat, Marrubij folijs delinquit. Est etiā Theophrasto, Plinio, et Galeno Horminiū inter frumētū genera.

Securidaca. CAP. CXXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. πελεκίνος ἡδυσαρόν. Lat. Pelecinus hedyssaron. Ita. Hedsaro. Gal. Febue de Loup.

HEdysarō, anguētarij Peleciniū, idest, Securidacā uocāt: fruticosa est, folijs Ciceris: semē rusum in siliquis fert, corniculorū modo adūcis, qđ ancipitē securim æmulat: unde nomē accepit, amarum gustu. Stomacho utile in potu. Additur in antidota. Cum melle ante coitus subditum, concipiendi spem adimit. Nasctur in segetibus & hordeis.

HEdysaron seu Securidacā rustici Galli, Grauiam vocāt, quod tritico & hordeo cum quibus alitur, suo complexu molesta sit. Lenti inimica Aparine, non Securidaca, ut putat Plinius: licet & ipsa Aphaca, quæ Vicia species est, mortem inferat.

Onosma. CAP. CXXV.

NOMENCLATURA.

Græ. ονοσμα. Lat. Onosma. Ita. eodem nomine.

Gal. Off. Ger. ignota.

Onosma, oblonga folia habet, ad similitudinem Anchusæ, longitudine quatuor digitorum & unius latitudine, mollia, in terra iacentia, sine caule, sine semine, sine flore: radice niti

nitur longa, tenui, infirma, rubescence. Gignitur in asperis. Folia in uno pota partus extrahunt. Pregnans si eam supergrediat, abortum facere dicitur.

Nymphæa palustris et lacustris herba vulgatissima, sub Nenuphar nomine noticia. Nymphæa semen & radix desiccant sine morfu. Valentior est quæ candidam radicem producit, ut in abstersoria facultate potentior, quæ nigra radice constat.

Nymphæa. CAP. CXXVI.
NOMENCLATURA.

Græ. νύμφαία. Lat. Nymphæa. Ita. Off.
Gal. Nenuphar.



Nymphaea lutea.



Nymphaea alba.

Nymphæa nascitur in paludibus & stagnantibus aquis, folijs Faba Aegyptiæ, minoribus, & longioribus, alijs
F in sum

in summa aqua, alijs demersis pluribus ex radice eadem prodeuntibus: flore Lilio simili, albo, & in medio crocos habente, cum defloruerit, ut rotundum Malum, aut Papaueris caput, extuberal: nigro semine, denso & lato, lenti gustus. Caulis est laevis, niger, minimè crassus, ciborio cognatus: radix nigra, scabra, clauæ similis, quæ autumnò secatur. Sicca cū uino pota cæliacis, dysentericisq; auxiliatur, licnem absomit. Radix stomachi ac uesicæ doloribus illinitur: uirilignes ex aqua emendat: imposita cum pice, alopecijs medetur: eadem contra ueneris insomnia bibitur, siquidem ea prorsus adimit. Pota assiduè aliquot diebus, genitale infirmat. Idem semen potum efficit. Nymphææ nomen sibi uendicasse uidetur, quoniam aquosa amict. Plurima inuenitur in Elide, in Anygro amne, & in Bæotiæ Aliarto. Est & altera Nymphæa, cuius flos Blephara dicitur, folijs antedictæ, radice alba, scabra, flore luteo, nitente, Rosæ simili. Huius semine & radix contra fœminarum profluvia efficaciter ex uino nigro bibuntur. Nascitur in Thessalia, amne Peneo.

Androsaces. CAP. CXXVII.

NOMENCLATURA.

Gr. Ἀνδρόσακες. Lat. Androsaces. Ita.
Androsace. Gal. Off. Ger. ignota.

Androsaces herba est amara, tenues spargens iuncos, sine folijs, folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur. Gignitur in Syriæ maritimis. Ea drachmis duabus in uino pota, copiosam hydropicis urinam ciēt. Idem effectus est semini poto, & herbæ decocto: podagris utiliter illinitur.

Nostro tempore Androsaces è Syria non affertur, quare in incognitarum herbarum classem reponetur.

Asple

Asplenium. CAP.

CXXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ασπληνον. Lat. *Asplenium*. Ita. *Aspleno*.

Gal. & Off. Citerach.

Asplenium, aliqui Scolopendrion uocant, alij Splenion, alij Hemionium: folijs est multis, scolopendra animali similibus, ab radice una prodeuntibus. Nascitur in, parietibus, saxisq³ siliceis, & opacis: nec caulem, nec florem, nec semen habet. Folia Filicula modo diuiduntur, subter flauescencia hirsutaq³, superne uiridia. Vim hanc habent folia in aceto seruesacta, ut per dies quadraginta pota lienem absument: quibus etiam contritis liene ex uino illini oportet: siranguria & regio morbo prodest, singultum sedat, calculos in uesica comminuit. Conceptum adimere creditur, per sese, aut cum muli liene appensa. Tradunt non esse, silente luna, huius rei gratia effodiendam.

Obrita prisce seculi barbarie, iam iam agnoscere cepit, *Asplenium*, esse plantam quam *Seplasia* Ceterach nominant, & non linguæ ceruinam, quæ Dioscoridis est *Phyllitis*, ut supra ostensum est. Nascitur in petris, parietibusque opacis, humidis. Laudatissima in Creta, ubi repperit Vitruuius affirmat circa Potereum amnem, qui duas urbes Gnoson & Cortynā interlabitur, parte quæ ad Cortynam spectat, pecoribus sine liene inuentis, quia herbam hanc roderent, altera parte quæ ad Gnoson est, lienem habentibus, quia ibi Herba illa non appareret. Scolopendria quantumuis subtilibus partibus constet, calida tamen non est: & ob id lapillos comminuit, & lienem absument.

Hemionitis. CAP. CXXIX.

NOMENCLATURA.

Græ. Ημιονιτις. Lat. *Hemionitis*. Ita.

Hemionite. Gal. & Off. non probatè,

Lingua Ceruina.

F

2

Hemio

Hemionitis, quam aliqui Splenion uocant, folium emittit Dracunculi, lunatū: radicibus coheret multis, tenuibus: nunquam flores, neque semen, neque caulem gignit: in petrosis nascens, austero sapore. Ea ex aceto pota lienem absunit.

Phyllitida linguā esse ceruinā, iam in capite de Phytitide patuit, & perinde Hemionitida non esse Linguam ceruinā. Hemionitis & lingua ceruina diuersa, copiosa in territorio Romano nascitur, quod fide digni simpliciarij Matthiolo constanter assauerunt, quam etiam postea inde transpositam, suis hortis implantarint. Plinius Teucrium & hemionitida, diuersas plantas, confundit.

Anthyllis. CAP. CXXX.

NOMENCLATURA.

Græ. *Ανθυλλίς*. Lat. *Anthyllis*. Ita. *Anthillida*.

Gal. & Off. prima ignota. Secunda,
non probatę, luanon
muscata.

Anthyllis duplex est. Quædam enim lenti similima, folijs mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine: radice parua, tenui. Nascitur in salsis terris, & à sole illustratis, non insulso gustu. Altera est folijs ramulisq; *Aiugæ* similis, hirsutioribus tamen, breuioribus & asperioribus: flore purpureo, odoris admodum grauis: radice Cichorij. Pota drachmis quatuor, urinæ difficultati, renibusq; plurimū prodest. trita uulvæ pituitas emolliunt, cum Rosaceo & lacte impositæ. Vulneribus medentur. Quæ autem *Aiugæ* similitudinem refert, præter alia, potu cum aceto mulso: comitiales sanat.

Nentra Anthyllidis species quæ pictura Dioscoridis responderet, se haudum in Italia uidisse, homo attentus, & in Italia & medicina natus, Matthiolus testatur, quāuis Ruellius dicat vulgo *Salsola* vocari, quod ex ea salē fieri memoriæ proditum sit. Cordo, Anthyllis altera, *Aiugæ* ramulis similis in apricis Herciniæ sylvæ locis nascitur, tam manifesto salis sapore, ut ex vsta & nō vsta sal excoqui possit. Hūc salē Arabes *AlKabi* vocant. Parum descat utraque Anthyllis, attamē quæ

Aiugæ


Ainza similis est magis tenuium est partium, ideòque in morbum cadu-
cum proficit, & potentius astringit.

Anthemis. CAP. CXXXI.


NOMENCLATURA.

Græ. *Ανθεμὶς.* *Lat.* *Anthemis.* *Chamæmelon.*

Ita. *Camamilla.* *Gal.* *Camomille.*



Chamomilla sativa.



Chamomilla vulgaris.

Anthemidis genera tria, tantum flore distantia. rami do-
drantales, fruticosi, alis multis concavi: tenuibus foliolis,
parvis numerosis: rotundis capitulis: floribus in medio aureis, fo-
rinsecus orbiculato ambitu candidis, melinis, aut purpureis, ma-
gnitudine foliorum *Rutæ.* Nasitur in asperis, & iuxta semitas.

F

3

Colligi

Colligitur uere. Vim habent radices, flores & herba exca-
 ciendi, extenuandiq;. Potu & infusione, pellunt menstrua, par-
 tus, urinam, calculosq; aduersus inflationes, & ilei tormenta bi-
 buntur, bilem suffusam expurgant, iocinorum uitia sanant. De-
 cocto earum uesicae fouentur. Ex omnibus his generibus ad cal-
 culos efficacissima est, quae florem purpureum habet, cuius ampli-
 tudo maiuscula est. Hanc proprie Heranthemon uocant. Ea cui
 Leucathemo nomen est, item quae Chrysanthemon dicitur, ue-
 hementius urinam ciunt. Aegilopijs illae medentur: comman-
 ducatae ulcerum eruptiones in ore sanant: nonnulli in clysteribus
 ex oleo utuntur. Teruntur in farinam, ad abigendos februm cir-
 cuitus. Flores & folia recondi debent, & priuatim tusa, in pa-
 stillos digeri: radix quoque siccari, dumq; ingruit necessitas, bi-
 nae partes herbae dari, modo floris aut radice pars una, modo cō-
 tra, floris partes duae, & herbae una, permutatim duplicato pon-
 dere, alternis diebus: bibere autem oportet in uino mulso, diluto.

Inter Anthemidis generata tria, ad calculos efficacissimam facit Diosco-
 rides, eam quae florem orbiculatam purpureum habet: at pharmacopolia
 id solum nouere genus, cuius flores in medio aurei, per ambitum candidi.
 Siquidem id genus frequens, alia rara, & inuentu difficilia. Anthemis
 desiccantium & excalescentium prima est classis, tenuium partium
 con quoquit, emolit, rarefacit.

Parthenium. CAP. CXXII.

NOMENCLATURA.

Gr. παρθέλιον. Lat. Parthenium. Ita. Amarella.

Gal. Matricaire. Off. Matricaria.

Parthenium, aliqui Amaracon uocant, folijs est Corian-
 dri, tenuibus: flore per ambitum albo, intus melino, odore
 graui, sapore amaro. Siccatum, cum aceto mulso aut sale potum,
 non secus atque Epithymum, & bilem & pituitam detrahit:
 suspiriosis prodest & melancholicis. Herba sine flore à calculosis
 & anhelatoribus magna utilitate bibitur. Valet decoctum ad
 insiden



insidendum in duritia uulua-
rum, & inflammationibus
illinitur, sacro igni, & colle-
ctionibus cum flore.

PArtheniū quid & Amara-
cum, Matricaria est, &
secunda Artemisia species, ingra-
ti odoris. Errant pariter qui id
Cotulam esse putant. Nam huic
solum fœniculi, Parthenio Co-
riandri tribuitur. Sapor in Par-
thenio amarus est, in Cotula nō
item. Parthenij nuncupationem
Plinius, Parietaria attribuit.

Buphthalmum.

CA. CXXXIII.

NOMENCLA-

TVRA.

Parthenium.

Gr. Βούφαλμος. Lat. Buphthalmum. Ita.

*occhio di bue. Gal. & Off. non satis pro-
batè. Cotula non foetida.*

Buphthalmum, quidā Cachlā uocant, tenues emittit cauli-
culos, mollesq; folia Fœniculi: luteū florē, Anthemide ma-
iorē, oculi similitudine, unde nomen traxit. Circa oppida na-
scitur, & in campestribus. Flores cum cerato triti, tumores du-
ritiasq; discutunt. Aiunt epotam post exitum à balneis, regio
morbo correptis, colorē tractu temporis reddere.

Dva sunt plantæ quibus Buphthalmi nomen sed falso tribuitur.
Vna cubitalis in pratis nascens, & circa sata, modica foliorū in-
cisura, flore intrinsecus croceo, forinsecus per ambitū cādido, longe quā
Chamameli maiore. Altera Cotula est, nō foetida. Harū utraque licet
croceo sit flore, ambiēs per circuitū habet vallū, velut cādicās. Quo si sepi-
retur Buphthalmō, qua est diligentia, nō id prætermisurus erat Diosco.

B

4

PAON

Pæonia. C A P.

CXXXIIII.

NOMENCLATURA.

Gr. παιονία, Lat. Pæonia. Ital. Peonia.

Gal. Πίυοεςνε. Off. Lati-
no. nomine.

Pæonia.

Pæonia siue Glycyfi-
de, Græcis aliquibus
Pentoboron dicitur: sunt qui
idaos dactylos, radicem Pæ-
oniam uocant. Caulis altitu-
dine sesquipedis adolescit.
comitantibus multis stolo-
nibus. Huius duo genera:
mas, folia iuglandis habet:
in fœmina uero, Smyrni mo-
re diuiduntur. Summo cau-
le siliquas emittit, ueluti gra-
cas nuces: in quibus, quum
dehiscunt, multa granula
rubra acinis Punicorum si-
milia inueniuntur, & in
medio nigra, quinque aut
sex, purpurea. Radix maris tenuis, digitali crassitudine, & pal-
mi longitudine, gustu astringens, alba: fœminæ radicibus ceu
glandes circiter septem aut octo inherent, ut in Hastula re-
gia. Fœminis à partu non purgatis sicca radix datur: ciet men-
ses nu

ses nucis Græca magnitudine pota: sic uentris doloribus cum uino auxiliatur. Valet contra regium morbum, & renum ac uesicæ dolores. Decocta in uino aluum sistit. Rubra grana rubentis menses sistunt, decem uel duodecim pota in uino austero & nigro: stomachicis & erosionibus ea esse prodest: à pueris pota initia calculorum eximunt. Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, uulvæ strangulationibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua mulsa, aut uino. Nascitur in altissimis montibus & præruptis.

Inuentu antiquissima Pæonia, retento Authoris nomine. Fæmina non infrequens. Mas non ita perspectus, siquidem paucis in locis reperitur. Muliebri folia Myrrham redolent, & densiora sunt. Radix sex aut octo glandibus constans videtur. Mas glandosam quoque habet radicem per intervalla torosam, palmi altitudine, digitum crassam & candidam, siemina numerosiore. Pæoniæ radix leniter astringit cum quadam dulcedine, at si exactè commanducetur, acrem quâpiam amaritudinem proferet: desiccatoria etiam est. Galeno pueri comitiali morbo correpti, haustu eius integrum conualescunt, modo radicet gestem, à collo in pectus propendentem.

Lithospermum. C A P.

C X X X V.


NOMENCLATURA.

Gr. Λιθόσπερμον. Lat. Lithospermum. Ital.

Gal. Off. Milium solis.

Lithospermon à seminis duritia nomen accepit, folijs est. Olea longioribus, & latioribus, mollioribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt: ramulis surculosis, rectis, tenuibus firmis, crassitudine acuti Iunci, in quorum cacumine bifidi exortus cauliculorum speciem exhibent: folijs longis, inter quæ paruum semen, rotundum, Erui magnitudine, duritia lapidea. Nascitur in asperis & æditis locis. Vim hanc habet, ut semine cum

F S uino

*Lithospermum maius.**Minus.*

uino albo poto calculos frangat, pellatq^{ue} urinam.

Phalaris. CAP. CXXXVI.

NOMENCLATURA.

Græ. φάλαρις. Lat. Phalaris. Ita. Phalaride.

Gal. Off. Ger. non vulgo nota.

Phalaris cauliculos emittit & culmis similes, minutis, ac nullius usus radicibus, multos, duum palmorum, geniculis cinctos, graciliores tamen, ac dulces: semen candidum, oblongū, Mili magnitudine. Tunditur, & in aqua aut uino succus ad uesciæ cruciatus utilissimè bibitur. Semen cochlearis mensura potum, ad eadem efficax est.


Septa

Sepalsia duo Lithospermi genera ostendunt, maius & minus. Nas-
tur macro solo locis eminentibus. Hanc inter omnes plantas admira-
tus est Plinius: Lithospermon maius Matthiolo prouenit in multis Thu-
scis locis, minus per totam passim Italiam. Lithospermon minus Phala-
ris esse poterat, si cauliculos culmis & ea similes emitteret.


Rubia. CAP. CXXXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ερυθρόδανον. Lat. Erythrodanum. Ita. Robbia.
Gal. Garence. Off. Rubea tinctorum.



Rubia sativa.



Rubia sylvestris.

Erythrodanum radix rubra est, qua tinguntur lane. Vna
sponte prouenit, altera seritur, ut in Thebana Gallia, &
Rauen

Rauenna Italia: in Caria inter oleas, ut in aruis, solo creditur. Hanc non sine quæstu serunt: namque maximum ex ea sentiunt prouentum. Asperi caules & quadranguli, longi, Asparinae non dissimiles, robustiores, et multo prorsus maiores: folijs per intervalla certa circum articulos stellatim decussatis. Semen eius rotundum, inter initia uiride, mox rubrum, postea cum ematurus, nigrum: radix tenuis, longa, rubra. Urinam ciet: qua de causa regio morbo opitulatur, pota cum aqua mulsâ: item ischiadicis & resolutis. Crassam, copiosamque urinam pellit, nonnunquam & sanguinem: bibentes tamen quotidie lauari oportet, & excrementorum quæ redduntur differentiam spectare. Aduersus serpentium morsus, ramulos cum folijs uino bibere prodest. Semen ex aceto potum, lienem absuit. Imposita radix trahit partus, menses, secundasque. Alba utiligini illita ex aceto medetur.

Rubia tam domestica quam syluestris non ignota, in Gallijs & in Thufcia nascitur, in territorio maxime Senensi, & patrimonio Romano. Italice femina folijs & caulibus nempe asperis & rudibus vasa stagnæ perpurgant & expoliunt. Amara est & acris radice Rubia. Reliquæ eius vires è Dioscoride patent.

Lonchitis. CAP.

CXXXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Λογχίτις. Lat. Lonchitis. Ita. Lonchite.

Gal. & Off. non perinde nota.

Lonchitis folia habet Porri, latiora, rubentia, plurima, ad radicem circumscripta, ueluti in terrâ procumbentia, pauca in caule, in quo flores, ceu galericuli, hiantibus comicis personis similes, nigri, & è rictu albam exerentes uelut lingua, quæ ad labrum inferius spectet: semen inuolucris clausum lanceæ simile, triangulum, unde sibi cognomen arrogauit. Radix Dan-

ci.

ci. Nascitur in sitientibus & asperis. Radix ex uino pota urinā ciet. Altera est Lonchitis, quam aliqui asperam Lonchitim dicunt: folia scolopendrij emittit, sed asperiora maioraq̃, ac multo magis diuisa. Vulneribus mirum in modum prodest, in eisq̃ inflammationes excitari non patitur. Pota ex aceto lienem absumit.

Prima Lonchitis species Ruellio cognita, ea esse ducitur, quā Galli-
ci pueri, Nigros capetos vocant. Attamen eorum opinionem infir-
mat, qui secundam Lonchitis speciem, Bursam pastoriā autumant, cū
ista Eruca folijs, & non Scolopendrij visatur. Secunda hæc species Cordo
non ignota, effigie est media inter Scolopondrium & Polypodium. Ve-
rum enim uero Matthioli nullam inire rationem potuit, qua hæc sibi
perspecta essent, atque adeo utranque inter incognitas herbas enu-
merat.



Althæa.

Althæa. C A P. C X X X I X.

N O M E N C L A - T V R A.

Græ. Αλθαία. Lat. Al-
thæa. Ita. Maluanisco. Gal.
Guimauue. Off. Malua-
niscus.

Althæa, quam alij ibi
scum uocant, in sylue-
striū Maluarum genere
est, cui folia ut Cyclamino,
rotunda, lanugine canescūt:
flore rosaceo: bicubitali cau-
le:

le radice lenta, intus alba. *Althæa* appellatur, quòd inter primas sit utilis, & pluribus polleat remedijs. Decocta enim in uino aut aqua mulsa, & per se cum imponitur tusa, efficax est contra uulnera. Item ad strumas, parotidas, abscessus, mammarum inflammationes, fracta sedis, inflationes, neruorum rigores: si quidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. Cocta ut dictum est, adiecto suillo adipe, aut anserino, *Terebinthina* uel, ut malagmatis lentor fiat, facit ad uulua inflammationes, praeclusionesq; in pectus subdita. Decoctum eodem fungitur munere: onera uulua: reliquiasq; à partu extrahit. Decocta succus ex uino potus, succurrit urinae difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis: dentium mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen siccumq; tritum, uirilignes in sole perunctas emendat. Eodem cum oleo & aceto peruncti, à uenenatis non feriuntur. Valet contra dysenteriam & sanguinis reiectiones, aluiq; profluium. In posca aut uino decoctum bibitur, contra omnes uestparum, apum, similiumq; aculeatos ictus. Folia cum olei momento, morsibus, & igni ambustis illinuntur. Constat aquam trita radice addita, sub diuo addensari.

Alcea.

CAP. CXL.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀλκῆα. Lat. *Alcea*. It. *Malua* uel schio saluatico.
Gal. *Guimauue* sauuage. Off. *Herba Simeonis*.

Alcea syluestrium maluarum generi assignatur: folia habet diuisa, Verbenace proxima: caules treis aut quatuor, cortice cannabino uestitos: florem Rosæ, paruum: radices albas, latas,

* *Alcea.*

cum supplet, ubi discutiendi facultas requiritur. Huius speciatim non meminit Galenus. Paulus Aegineta pares ei cum Dioscoride vires attribuit.

latas, quinque aut sex, cum plurimum cubitales: quæ cū uino aut aqua potæ, dysentericis ruptisq; medentur.

Althea quæ Latinis Hibiscum, græco nomine se medicam herbam esse profitetur, nimirum ob ingentem in medicina usum. Digerit partibus suis omnibus, laxat, phlegmonem leuat, mitigat & excoquit abscessus coeli diffuiles, adipibus incocta & subacta. Radice & semine tenuium est partium, & his amplius desiccatur & deterget. Alcea bisimalua est syluestris. Manardus eam esse putat, quæ Italis, herba Vugarica vocatur, à vulgari herbariorum, Alcea, diuersa. Hæc Althæa lo-

Cannabis. CAP. CXLI.

NOMENCLATURA.

Græ. Κάνναβις. Lat. Cannabis. Ita. Canape.
Gal. Chanure. Off. Lat. nomine.

Cannabis sativa planta magni in uita usus ad robustissimos funes faciliatōdos: folijs Fraxini, graui odore: caulibus pœris, inanibus: semine rotundo, q̃ largiore cibo genitarū extinguit.

Succus



Cannabis.

Succus ex ea recente, conueniēter aurium doloribus instillatur. Sylvestris Cannabis uirgas fert Alibææ similes, minores, nigriores & asperiores, cubiti altitudinem æquantes: folio satiuæ, nigriore & asperiore: flore Lychnitis, subrubro: semine & radice Alibææ. Decocta radix, illitu inflammationes mulcet, tumores discutit, tosos articulorum dissipat. Huius cortex torquendis funibus accommodatus.

Cannabis satiuæ nulli non cognita semen, diuersum quippiam in hominibus & galinis operatur. Nam ut hominum genituram extinguit, ita vere à gallinis manducatum, generandorum ouorum miram facultatem tribuit, cum alias hyeme, ijs producendis penè inertes sint. Cānabis decoctio in lumbricorum cauernas iniecta, foras exire compellit. Perperam agunt mulierculæ, quæ seminis Cannabis decoctionem pueris epilepticis offerunt. Nam id eis non parum incommodat. In eligenda sylvestri Cannabis indicio & delectu opus est, siquidem paucis in locis vera prouenit.

Anagyris. CAP. CXLII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀνάγρις. Lat. Anagyris. Ita. Eghelo.

Gal. Boys puant. Off. Malua terrestris.

Anagyris, frutex est arboris instar, grauis odore: folijs Agni, uirgisq; flore Brassicæ: semen in corniculis non breuibus

nibus gignit, subrotundum, firmum, uersicolori facie, simile renibus, quod durefcit uua maturefciente. Tenera folia trita tumores illitu reprimunt: si partus hareat, & fecunda mensesq; morantur, drachmæ pondere bibuntur in passo: sic & fufpiriofis dantur, & contra capitis dolores in uino. Difficulter parientibus adalligantur, ita ut à partu ftatim auferantur. Radicis cortex concoquendis difcutiendisq; adhibetur. Semen commanducatiû uomitiones uehementer ciet.

A Nagyris in omnibus Tridentina iurisdictionis fyluis prouenit, iufte proceritatis arbor, Hoc lignum intrinsecus propè medullam nigrum, forinfecus eft luteum, in morem Guaiaci quod ex India affertur. Eo loci ruflici vineaticos palos cõficiunt, nam folidiorem materiam ob neruorum robur non reperiunt. Anagyris facultatis eft maturantis & calida, folia ut potè humida minus acria funt. Sicca incidunt & deficcant. Radicis cortices pari uirtute praditi. Semen tenuium eft partiû.

Cepæa. CAP. CXLIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Κηραία. Lat. Cepæa. Ital.

Cepæa. Gal. Off. Ger. non
probè cognita.

Cepæa Portulacæ fimilis eft, fed nigriora habet folia, & radicem tenuem. Folia in uino pota, urine ftillidid, & ueficæ fcabie laborantibus opitulantur: maxime id præftat, fi cû decocto radicum Afparagi eius, quem Myacanthon, hoc eft, Corrudam uocant, bibatur.

Cepæa ab hortis nomine defumpto, in littoribus tamen arenofis nafcitur, & hortenfis non eft, at potius littoralis Portulaca.

Alisma. CAP. CXLIIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Αλισμα. Lat. & Ital. Alisma.

Gal. non probate, Plantain de riuicre,

Off. eodem errore, fiflula paftoris.

G

Alisma

Alisma, alij Damasonion appellāt: folia ei Plantaginis, nisi angustiora essent, laciniosa, conuexa q̄ in terram: caule simpliciter tenui, cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, cādido, palleſcente: radicibus tenuibus ut Veratri nigri, acribus, odoratis, modicē pinguibus: aquosos amat tractus. Radix, si drachma una aut altera, bibatur, his conuenit, qui leporem marinum deuorauerunt, aut à rubetis ranis demorsi sunt, aut Opiū hauserunt: torminibus atq̄ dysenteria, per se, aut cum pari modo seminis Dauci, potui datur. Conuulsis, & contra uitia uuluae prodest. Herba sistit aluum, mēstrua pellit, tumores illita mitigat.

Damasonium quidam fistulā pastoriā existimant, quidā Plantaginē aquaticā. At enim cū Plātagine aquatica, nota Damasonij non conueniūt. Siquidem folium fert Arnoglossō angustius, terrā instratum, caulem vnicū & gracilē: An plantago aquatica folijs est Arnoglossō grandioribus, quae in lanceae modum desinentia, sursum versus aspectant: caule non constat vnico, at pluribus, vnāque ē radice prodeūtibz. Eō fit vt in agnoscendo Damasonio inhibendum paulisper iudicium sit, donec certi quippiam ab homine singularis & experientiae & doctrinae nobis obuēiat. Plura Damasonij genera se cognosse Cordus scribit, sed scribit tantum, & rem acu non deliniat. Decoctiōnem Damasonij lapillos renum comminuere, ipsa experientia Galenū docuit, & ideo absterforium est.

Onobrychis. CAP. CXLV.

NOMENCLATURA.

Gr. ονοβρυχίς. Lat. Onobrychis. Ital. Onobrichi.

Gal. Off. & Ger. non nota.

Onobrychis, folia habet Lentis, longiora paulo, caulem dodrantalem: florem purpureum: radicem paruam. Nasctur in uliginosis & incultis. Herba suapte ui, si trita illinatur, tubercula dissipat: cum uino pota, strāgurias sanat: illita ex oleo, sudores mouet.

Ignotarum plantarum classi Onobrychis ascribenda, quando quidem sollicitē à Matthiolo perquisita, in Italia reperiri non potuit.

Hy

Hypericum. CAP. CXLVI.

NOMENCLATURA.

Græ. ὑπερίκον. Lat. Hypericū. It. & Off. Perforata.
Gal. Mille pertuis.

Hypericum, alij Androsamon, alij Corion, alij Chamapityn appellant quoniam semen odore Resinam imitatur, surculaceo frutice, dodrantali, rubente, folio Ruta: flore alba Viola, luteo, qui digitis tritus, sanguineū succum remittit, qua ex causa Androsamon cognominatur: subhirsuta siliqua, & tereti, hordei magnitudine: semine intus nigro, resinosi odoris. Gignitur in cultis & asperis. Urinam cit: menstrua pellit appositum: tertianis, quartanisq; cum uino potum liberat. Semen quadraginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Folia cum semine illita, ambusta sanant.

Ascyron. CAP. CXLVII.

NOMENCLATURA.

Græ. ασκυρον. Lat. Ascyron. Ita. Asciro.
Gal. Espece de mille pertuys.
Off. Hypericonis species.

Ascyrum siue Ascyroides, Hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosius, maiores habens ramos, surculosiores, rubentesq;: folia tenuia: flores luteos, & fructum resinosum, Hyperico non absimilem: cuius attritu digiti ferè cruentantur, qua de causa Androsamon uocauere. Vsus semine ad ischiadicos, potum hydromelitis sextario: nam biliosa recrementa amplissimè detrahit: sed assidue dare oportet, donec sanitati restituantur. Illinitur & ambustis efficaciter.

Androsæmum. CAP.

CXLVIII.

NOMENCLATURA.


Græ. Ανδροσαίμου.

Lat. Androsæmon.

Ita. Androsæmo.

Gal. Autre espèce de Millepertuis.

Off. Hypericonis species.



Androsæmon.

quam exorbere oportet. Herba ambustis illita medetur: uuln-
ribus sanguinem cohibet.

Androsæmon ab Hy-
perico, Ασχροῦ, dif-
fert, quod fruticet ramulis
surculosis, ac tenuibus: ru-
bentibus uirgis, & folijs ru-
te, triplo aut quadruplo ma-
ioribus, quæ trita uinoso suc-
co manant: complureis alas
habet in cacumine, utrinque
expensas, pinnatasq;: circa
quas flores pusilli, lutei: &
in calyculis semē Papaueris
nigri, insigne lineis. Huius
coma trita resinosum odo-
rem reddunt. Semen tritum
drachmis duabus potum,
biliosa alui excrementa pel-
lit: ischiadicis maximè me-
detur: sed à purgatione a-

Cor

Coris. CAP. CXLIX.

NOMENCLATURA.

Græ. Κόρις. Lat. Coris. Ita. Cori.

Gal. Espece de Millepertuis.

Off. Hypericonis Species.

Coris, quod aliqui Hypericon uocant, frutex est folio Erica, rubro, pinguiore, ac minore, non altior dodrante, suavis, odoratus, acris. Potum semen menses trahit & urinas: contra phalangiorum morsus, ischiadicos & opisthotonicos ex uino potum auxilio est: horroribus ex Pipere, sed opisthotonicis ex oleo, aptissime illinitur. Radix uino decocta pota, defeculis opem ferre creditur: sed laborantem inter potadum quam optime cooperiri licet: siquidem corpus totum desudabit, ex qua re pristinam agilitatem recuperabit.

Hypericum, Ascyrum, & Androsamum eiusdem generis sunt, sola in caule & folijs est differentia, quatenus, aut caules & folia amplius de purpura & virore participant, & ut ea magnitudo & paruitas discriminet. At quod Cori vocatur, minus ad Hypericum accedit, quam Ascyrum & androsamon. Cori id nominis habuit, quod odoris grauitate odores imitetur. Baccas profert iuniperi baccis non ab-similes, minores tamen, quæ una cum folijs attrita, medium inter Iuniperum, Pinum, & cimices odorem remittunt, alioqui non ingratum. Hypericum non, ut Plinius vult, semine cum hordeo maturescit, siquidem huius sub finem Maij, illius sub desinentem Iulium maturitatem concipit. Hypericum excalscit & desiccatur, & tenuium est partium.

Aiuga, siue Chamæpitys.

CAP. CL.

NOMENCLATURA.


Græ. χαμαίπυτος. Lat. Aiuga. Ita. Chamepitio.

Gal. Iue Arthetique.

Offic. Iua Arthetica.

G 3

Aiug



Chamæpitys. 1



Chamæpitys. 2

Alga herba in terra repens, incuruæ similis: folijs Sem-
peruini minoris, multis, multò tenuioribus, hirsutis &
pinguioribus, circum ramos densis, odore Pinus: flore tenui, lu-
teo, uel candido: radicibus Cichorij. Folia septem diebus in uino
pota regio morbo medentur: & quadraginta diebus ex hydro-
melite, ischiadicos sanant. Dantur peculiariter urinæ difficulta-
tibus, iecinoris & renum uitys: torminosis prosunt. Ea apud
Heracleam Ponticam, perinde atque antidoto contra Aconi-
tum utuntur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum
polenta iure decocti subacta. Trita in farinam, & cum Fico in
pilulis sumpta, aluum emollit: excepta melle, cum æris squama
& Resina denscit: apposita ex melle: uulua uitia extrahit: mam-
marum duritias discutit, uulnera glutinat, ulcera quæ serpunt,
cum

cum

cum Melle illita, cohibet. Alterum est genus *Ainga* cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis, pratenuibus, coma superadacta: flore candido: semine nigro. Hæc etiā *Pinum* redolet. Tertia mas nominatur, paruula, folijs exilibus, albis, scabris: caule aspero, candido: luteis floribus, semine iuxta alas. Resipit & hæc *Pinum*. Hæc duæ uim superioris obtinent, sed non usque adeo efficacem.

Non dispari in errore versantur, qui *Chamapityn*, quæ olim *Latius* omnibus *Ainga*, aut *Abiga* dicebatur, aut *Chamapencem*, aut primam sideritis speciem, aut *Chamadryn* esse contendunt. At reuera *Chamapytis* illa est herba, quam *Iuā* cognomine *Muscatam* *Seplasia* nominant, non illa, quæ illis est, *Chamapytis*. Tria eius habentur discrimina. Vnū sesquipedalibus surculis, flore *Pinus* & odore: Alteriū breuius, & incuruum: tertium, folijs scabris, digitali caulis crassitudine. Mira similitudo inter *Iuam*, & verum *Polium*. sibi tamen non succedanea.

Finis Libri Tertij.

G 4

Pedan

PEDANII DIO-
SCORIDIS ANAZAR-
bei De medicinali materia, Li-
ber Quartus, Ioanne Ruel-
lio Sueffionensi in-
terprete.

*Ad puncta annotationes doctæ
& compendiosæ.*

P R A E F A T I O.



RIBVS antè libris, amantissime *Aree*, tra-
didimus odoramenta, olea, arbores, unguenta,
animalia, frumenta, olera, radices, succos, herbas,
seminaq;. In hoc autem Quarto differemus de
radicibus, & eis quæ restant herbis.

Betonica. CAP. I.

NOMENCLATURA.


Græ. Κέσροϋ. Lat. Ita. & Off. Betonica.

Gal. Betoine.

Cestron *Psychotrophon* uocitatur, quoniam frigidis locis
inueniatur, Latini *Betonica* appellant: herba est caule
ferens tenuem, cubiti altitudine, aut maiorem, quadratum: folia
Quercus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicem
maiora: in summis caulibus semen ueluti *Satureiæ* spicatum inest.
Decerpta huius folia siccant plurimos ad usus: radicibus nititur,
ut ueratri, tenuibus, quæ ex hydromelite in potu, pituitosam uo-
mit



Betonica. 1



Betonica. 2

mitionem euocant. Folia dari debent ruptis, conuulsis, mulieri-
 bus uulua malo opportunis, & ad laxandos uteri strangulatus,
 denarij pondere cū hydromelite. Tres in uini sextario drachmæ,
 contra serpentium morsus ebibuntur. Herba magna utilitate
 illatis à serpente uulneribus illinitur: aduersus etiā uenena dra-
 chma ex uino pota conuenit: præsumpta ea, si uenenum hauria-
 tur, nihil nocebit. Urinam ciēt, aluum subducit, medetur comi-
 tialibus & insanis, pota ex aqua: & iocinoris, lienisq; uitijis,
 drachmæ pondere in aceto mulso, concoctionem adiuuat, si quis
 eam Fabæ magnitudine secundum cœnā cum melle cocto deuo-
 rarit: modo consimili acida ructantibus propinatur. Stomachi-
 cis eam manducare & succum deuorare proderit, si postea di-
 lutum uinum sorbeatur. Datur sanguinem excreantibus, tribus

G 5

obo

obolis, cum diluti uini egelidi cyatho, ischiadicis, renum & uiscera doloribus, ex aqua: aquæ intercutem binis drachmis ex hydromelite, si febricitant: sin aliter, ex mulso: regio morbo laborantes recreat, menses pellit, drachmæ pondere cum uino pota: alium purgant drachmæ quatuor pota, in hydromelitis decem cyathis. Facit cum Melle ad tabem & purulentam excreationem. Folia sicca tritaq; fœtili uase reconduntur.

Antonius Musa Augusti Caesaris medicus, scripsit de Betonica peculiare volumen, in quo præcellentes illius virtutes explicat. Vetonas, ut inquit Plinius, in hispania eam inuenere: quæ in Gallia, Betonica, dicitur, in Italia Serratula, ante cunctas laudatissima. Effectus non ablimili, specie diuersa est, quam Paulus Aegineta vnicaulē facit, Pulegi ramulis, sed tenuioribus, gustu satuo, in petrosis fere nascentem. Incisoria virtutis est Betonica, amara, & modicè acris.

Britannica. CAP. II.

NOMENCLATURA.

Græ. Βῆτανικὴ. Lat. Ital. Off. Britannica.

Gal. Natium non habet.

Britannica aut Vetonica, folia habet syluestris Lapathi, sed nigriora, & densiora, gustu adstringentia: radicem tenuem & breuem: caulem paruum emittit. Folijs exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Vim habet adstringentem, priuatim depascentibus oris & tonsillarum ulceribus accommodatum. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione est opus.

Germanica, herba est Britannica, quam frisijs Romanis, cum illic Germanicus res ageret, ostendere, in mali remediū, è fontis cuiuspiam potu contractum, quo dentes intra biduum decidebant, compagesque in genibus soluebantur. Id morbi medici, Stomaccacen, & Sceletirben vocabant. Ruellio Italis Pittamana dicitur, quæ Matthiolo Italo homini sagaci & curioso plantarum indagatori, haud dum ostensa sit. Non secus errant, qui hanc, Bistortam esse existimant. Nam quamuis

Bisto



Bistorta, folia producat Lapa-
tho sylvestri similia, attamē nec
nigra, nec pilosa sed laxia, & su-
periori parte purpurascētia, in-
ferioricaesia. Radice Britannica
constat tenui, & breui: Bistortæ
grossa est, rubens, & serpentis
in modum contorta. Britanni-
ca, eiusque succus astringunt,
cetera è Dioscoride patent.

Lysimachia.

CAP.

III.

* Britannica.

NOMENCLATURA.

Græ. Λυσιμάχιοϋ. Lat. & Ital. Lysimachia.
Gal. Lysimachie. Offic. Salicaria.

Lysimachia, quam aliqui Lytron appellant, caules emit-
tit cubitales, altioresue, fruticosos, tennes, prodeuntibus
geniculatis folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringenti-
bus: flore rufo, aut aureo. Gignitur in aquosis & palustribus. Fo-
liorū succus adstringente sua vi sanguinis reiectionē supprimit:
dysentericis potui datur, aut infunditur: mensiū abundantia si-
stis, in pello: sanguinis pfluuiō subuenit, si nares ea herba obturē-

tur

* *Lysimachia.* 1*Lysimachia.* 2

tur: uulnerum cruorem cohibet: acerrimum nidore suffita reddit: qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

Lysimachia ab inuentore Lysimacho rege, celebri desumpto nomine, corneola non est, qua inficiendis in colorem viride pannis tinctorum utuntur, & qua Thuscus Cerreta, aut Braglia dicitur. Siquidem Corneola Matthiolo, caule & folijs est Lini, non Salicis, flore luteo, semine, ut in Genista, è folliculis enascente. In pratis prouenit, nec gustu astringit. Lytron pro, Luteum, in Dioscoride & Plinio deprauatum censet Ruellius, & hanc esse herbam quam, Vitruvius auctor, caruleo inficiendo, cum non possint Chrysocolia propter raritatem vi, tinctorum usurpant. At hac Cordo sui generis herba, quæ Græcis, Isatis, dicitur, Glastum & Lutea Latinijs. Verum Ruellij Lutea, eadem cum Glasto esse non potest, nempe Glasto superinducta, è caruleo colore, quo Glastum tingit, viridis color inficitur. Qui fit ut Luteum, siue Lutea, nec

Gla

Glastum sit, nec *Lysimachia*. Planta etiamnum alia ostenditur, quæ in quadrangularem caulem assurgit, folijs *Salicis*, flore rufo. At quod com manducata, nullam gustui astrictiorem expromat, *Lysimachia* esse non potest. His ductus rationibus *Matthiolus* *Lysimachiam* veram, nostro hoc tempore, in Italia non reperiri concludit, nec secus duco, in Gallijs. *Ruellio*, *Pellibossa*, vera est *Lysimachia*.

Sanguinaria, siue Polygonum.

CAP. IIII.

NOMENCLATURA.

Græ. πολύγονον. Lat. *Polygonum*.

Ita. & Off. *Corrigiola*.

Gal. *Corrigiole*.

Polygonum mas, ramos habet teneros & molles, frequentibus geniculis cinctos: qui per terrā, ut *Gramen*, repunt: folia *Rutæ*, sed molliora longioraq; semine sub folijs turgescēte: unde marem appellari uolunt: flos eius candidus, aut puniceus. Vis epoti succi est spissare, ac refrigerare: prodest cruetæ excretioni, cholera, alui fluxionibus, & urinae stillicidio: urinā aperte ciet, cum uino potus, contra serpentium morsus auxiliatur. Datur in febribus per horā ante significationes, Fœminarum profluvia impositu sistit: idem succus purulentis auribus instillatur: facit eximie ad genitalium ulcera, cum uino, adiecto Melle, decoctus. Stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, ulceribus quæ serpunt, ignibus sacris, collectionibus, tumoribus, & recētib; uulneribus folia illinuntur. *Sanguinaria* fœmina fruticat uno caule, arundini tenero simili, densis geniculis, & in se tubarum modo sarctis. Articulos in orbē cingūt apices, foliolis *Piceæ* similes: radicis nullus usus. Nascitur in riguis. Huic quoque spissandi refrigerandique natura, ad eadem ualens, sed inefficacior.

Polygonon mas, campestris & vulgaris plāta, Polygonon fœmina, non æquè passim frequens & copiosa. Nomen utriusque à frequentia geniculorum, aut seminis multitudine. Mas vulgò *Centimodia*: Fœmina

Gall

Gallis, Aquatica pinus. Nāque ea in humidis fructicat, vno caule Arundini tenera simili, densis geniculis in se tubarum modo farctis, quorum torulos folia pinus in orbem cingūt, radice nullius vsus. Vis vtriq; spissandi refrigerandiq; Sed imbecillior in fœmina.

Polygonatum. CAP. V.

NOMENCLATURA.

Gr. πολυγόνατον. Lat. Palygonatū. Ita. Fraßinella.

Gal. La Genouillee. Offic. Sigillum Salamoninis.



Polygonatum mas.

Fœmina.

Polygonatum nascitur in montibus, frutice cubito altiore: folijs Lauri, latioribus & lauioribus, sapore mali Cotoniei, aut Punici, cum quadam adstrictione: flores per singulos foliorum exortus promit, candidos, folijs numerosiores, incepta à radice supputatione: radicem habet albam, mollem, longam, crebre

brò geniculatam, densam, graueolentem, digitum crassitudine
æquantem: quæ uulneribus efficaciter illinitur: quinetiam ma-
culas in facie delet.

Polygonatum sic dictū, quòd radix frequētibus geniculorum nodis
per interualla tumet. Ex eius radice mulieres aquā, earū lex iuys
peculiarem, efficiunt. Atenim polygonatū, non est Secacul. Nāque Sera-
pio Secacul describens, nullam Dioscoridis mētionē facit, ut ei moris est,
cum quippiam ex hoc authore mutuatur. Ad hac Serapio suo Secacul,
pisellorum, non Laur. folia attribuit. Porro ipsæ vires non consonant.
Siquidem polygonatum, græcis, maculas in facie delet: cum Arabum
Secacul, semen, & venereas vires adaugeat. Polygonatū facultatis est
mista, hinc è modica astringione & acrimonia: inde è fastidiendo gustu,
qui ne explicari quidem possit. Est hac in planta mas & fœmina, è Va-
lerij Cordi industria. Errant tamen qui hanc cum Dictamno & Helle-
boro albo confundunt.

Clematis.

CAP. VI.

NOMENCLATURA.

Græ. Κληματίς δ'αφροειδής.

Lat. Clematis Daphnoides. Ita. Prouenca.

Gal. Petit Liseron.

Off. Vinca Peruinca.

Clematis humi serpit: lato, pinguiq, solo prouenit, uiticu-
las spargens crassitudine iunci, exiguas: folio Lauri signi-
ra & colore, multò minora. Ea cū caulibus in uino pota, alui
profluvia & dysenterias sedant. Subdita in pessa cum lacte &
Rosaceo, aut Cyprino, cruciatibus uulnæ medentur. Dolores den-
tium commanducata finit: imposita serpentium morsibus, in-
uamentum præstat: fertur etiam contra aspidum ictus ex aceto
pota opitulari. Gignitur in terrenis. Est & altera Clematis,
quæ uiticulosum emittit ramulum, rubescentem, lentum: fo-
lium gustu admodum acre, ac exulcerans: repit per arbo-
res, ut Smilax. Semen tritum, pituitam bilemq, detrahit, in
aqua aut hydromelite potum. Folia eius illata lepras purgant.

De Dⁿⁱ Manuel Casti Cum

110

*Cum Lepidio conditur ad
cibos.*



Clematis.

Clematis astrictoria, & ea
qua de primo loco scribit
Dioscorides, ea proculdubio est,
qua Vinca peruinca Officinis
dicitur. Nec tamen Peruinca,
Chamadaphne, Laureolæ
erit, quantumvis hanc Clema-
tida, Chamadaphnem Plinius
nuncupet. Secunda Clematis,
multum à prima differt, &
quemadmodum è notis concipi
potest, quam Galli Viornam
vocant, & Itali, Vitalbe, &
Vitezze, Clematis erit altera.
Namque viticulis constat rube-
scentibus, lentis, & obsequiosis,
Smilacis folijs, gustu admodum
acri, ac exulcerante, sese sepibus
inuoluit, ac per arbores vt Smi-
lax repit. Sic non erit genus il-

lud Conuoluuli, cuius flos rudioris Lilij figuram habet, & vulgo Cam-
panella, Latinis Cymbalaria, à Cymbalorum effigie dicitur. Non dissi-
milis eorum prodetur error, qui Vitem nigram, quam Dioscorides, fe-
rè sub huius libri finem, describit, secundam Clematida esse putant, cum
ad illius caput deuenimus. Quam Itali, Flammola vocant, folijs,
flore, semine, & peracri sitpore, a Clematide non admodum disidet,
vtut in arbores & dumeta non reptet, sed caules cubitū altos producat
foliaq; intoleranda acrimonia. E queis in balneo mariæ, aquam limpi-
dissimam, non discrepante acrimonia Matthiolus eduxit, qua in frigi-
dos effectus vsus est, non improbato successu. Flammula referente Pla-
reario, quarto ordine excalscit & desiccat. Siccitas in Clematide cate-
ru qualitibus praualet, id gustus indicat, cui astrictionis quippiam
modicæ, cum vehementi amarore expromit. Siccatur tamen, id, ne citrà
mordicationem. Postremam humi capitis partem, de Clematide soluti-
ua, è Galeni scripto didicimus, cum solutiuis herbis in fine huius libri
rect

rectè vt erat ab authore, collocatam, ac processu à curioso quopiam, illi a-
strictioris Clematidis nullo iudicio coniunctam.

Polemonia. CAP. VII.

NOMENCLATURA.

Græ. πολέμωνιον . Lat. Polemonia . Ita. eodem.

nomine. Gal. Sauge sauuage. Off.

Behen album.

Polemoniam alij Philiteriam, Cappadoces Chiliodyna-
min appellant, ramis exilibus, utrinque pinatis: folijs pau-
lo quàm Rutæ maioribus, ac longioribus, Calaminthæ Sangu-
nariæ proximis, quibus in summis uelut corymbi dependent, ni-
gro semine: radice cubitali, albicante, radícula simili. Nasctur
in montosis & asperis. Bibitur in uino Radix contra serpentes
& dysenteriam: & ex aqua, aduersus urinæ difficultatem, &
coxendicum cruciatus. Datur ex aceto drachmæ pondere lieno-
sis: eadem scorpionis plagæ alligatur. Tradunt, eum qui radi-
cem gestauerit, à scorpione non feriri: eumq; si iclus sit, nihil mo-
lestipassurum: dentium dolorem mansa mitigat.

Vidit Polemoniam Matthiolus in altioribus & asperioribus val-
lis Anoniæ montibus, gracili & quadrato, caule, flore serè Ne-
petæ, coma corymbacea, nigro refertâ semine, radice longa & candida.
Id tamen quæ est modesta, non affirmat. Atenim Rutam caprariam,
quæ Galega Italus, non esse constanter per asseuerat, vt quæ omni, sua
sua effigie scenungræ, reserat, nec corymbos in cyma producat, sed follicu-
los quæ rubescens semen includitur, & natales non conueniunt, Bosci-
salua, quam Ruellius pro Polemonia profert, Cordo ad id extorta vi-
detur, folijs & radice, oculata experientia diuersis. Polemonia tenuibus
partibus constat, & inusoria virtutis est.

Symphytum, siue Alus. CAP.

VIII.


NOMENCLATURA.

Gr. σύμφυτον πέτραιον. La. Symphytum petræum.

H

off.

*Ita. Symphito petreo. Gal. Bugle & Sanicle.
Off. Prunella.*



Symphiton. Petraeon.

Symphyton petraeon, id est, *Alus*, nascitur in petris: ramis tenuibus, parvis, Origano similibus: capitulis Thymi: surculosum totum, odoratum, gustu dulce, saluam ciens: longa radice, subrusa, digitali crassitudine. Decoctum in aqua mulsa & potum, pulmonis uitia purgat: sanguinem reijcientibus, & renum malis, ex aqua datur: ad dysenteriam, rubrag, sceminarum profluvia, in uino decoctum: ad conuulsam uero & rupta, ex aceto mulso bibitur. Quin & comanducatum sitim sedat, faucibus asperis subuenit: uulnera recentia enterocelasq, conglutinat, & illitu cohibet: carnes autem cum Symphyto decoctae coalescunt. Est & alterum Symphyton, quod alicui Pecton uocant: id caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassum, leuem, an

uem, angulosum, ut Sonchi inanem, circa quem breui interuacante spacio: folia exeunt angusta, Buglosso proxima, oblonga, hirsuta: caule secundum angulos quosdam striato: folijs tenuibus ex alarū sinu prodeuntibus, in quibus flores lutei & circa caulem uelut Verbasci semina emicant. Tam caulis quam folia, aspera lanugine horrent, tactūq; pruritum concitant: radices demittuntur foris nigrae, intus candidae, viscosae: quarum est usus. Trita, & pota cruentis excreationibus, ruptisq; proficiunt. Recentia ulnere illita conglutinant: carnes quoque si concoquantur, cogunt addita: inflammationibus praesertim sedis, cum Sectionis folijs utiliter illinuntur.

Symphytum Petraeum in Italia nostro tēpore non videri Matthiolus, nescio si in Galijs quāuis ita esse Ruellius assēneret. At quod secundo loco ponitur Symphytum, nulli dubium est, quin illa sit planta, quam Consolidam maiorem vulgus herbariorum vocat. In pratis nascitur, floribus non croceis tantum, sed rubescentibus etiam & candidis, vni-formibus tamen. Errant qui Consolidam minorem, Symphytum Petraeū esse contendunt, siquidem diuersissima sunt effigie. Nec saniori iudicio, erit Cōsolida media, quae folia profert supramodum carulea, & Italis Laurentina: Senensibus, Morandola dicitur. Duae haec plantae Graecis & Arabibus ignotae, praestantia modernis remedia proferunt, sed quae sedulo praetereo, ne prolixior, & quod in manus omnium venerint, qui haec ad vnguem prodiderint. Germani inter Consolidas Sanniculā etiam reponunt, quae duorum est generum. Est etiam Consolida regalis, Italis, Sperone di caualiere. Empirici haec plantae, earūque perspetae vires. Symphyton excalsfacientium, desiccantium, & contrahentiū ordinis est secundi.

Holostium. CAP.

IX.

NOMENCLATURA.

H. 2

Græ.

Græ. ολέσιον. La. Holostium. Ita. Holestio.

Gal. & Off. ignota.

Holostion quadrantalibus herbula est, humi repens: folijs uiticulisq; Coronopo aut Gramini proximis: gustu adstringentibus: radice alba, pratenui, usque in capillamenti speciem, longitudine quatuor digitorum. Nascitur in collibus terrenis. Vsus eius ad rupta, in uino pota: nam & carnes coguntur, decoctionibus addita.

Holostium herba non vulgò cognita, ut quam in Italia Matthiolus non cognovit. Licet Ruellio Gallico ruri, Denticulus canis vocetur, attamen vulgaris Pillosella non est. Namque cum facie Coronopum non exprimat, unico reptandi habitu conformis, folia habet per intervalla geminatim copulata, obtusiori quàm in Gramine mucrone. In summa, effigies, nihil cum Holostio conuenit. Pillosella inimica pecori, ob astringendi vim, ut ab eius pastu præ nimia astringitione commoriantur, & ideo arcendis fluxibus omnibus, & maxime capitis idonea. Caterum desiccata & astringit Holostium.

Stœbe. C A P. X.

NOMENCLATURA.

Græ. Στοιβη. Lat. Stœbe. Ita. Stebe.

Gal. la Scabieuse. Off. Scabiosa.

Stœbe vulgaris est noticia, cuius semen & folia stringunt, quapropter decoctum dysentericis infunditur: auribus quoque purulentis instillatur. Illita folia oculis ab ictu cruentis prosunt, erumpentis sanguinis impetus cohibent.

Stœbe, quæ & Phleum Theophrasto dicitur, frutex est caule, perinde ut folio, aculeatus, molli semine & rubido, radice pecoris pabulo gratissima, non alibi quàm in aquaticis nascent. Hæc delinatio, satis ostendit aberrare eos, qui hanc, vulgarem Scabiosam esse contendunt. Nam Scabiosa, folio est Erucae, laciniato, subhirsuto, non tamen spinis horret, flore specioso, diuturno, cerulei coloris, & ex casio albicantis. Hæc decoctione, potu, & inserto vnguentis succo, scabiei medetur. Vallet in pectoris, diaphragmatis, & membrorum spirituum affectus, & inibi generatos ascessus infringit. Anthracibus pestiferis illinitur: siquidem à

tribus

tribus horis, hac lue defungitur corpus. Stæbes folia & fructus, astringunt, & nihilum mordicant. Desiccat sub tertij ordinis initium.

Clymenum. CAP. XI.

NOMENCLATURA.

Græ. κλύμενον. Lat. Clymenum. Ita.

& Off. Saponaria. Gal. du Stego.

Clymenum caulem fert Fabæ, quadratum: folia Plantaginis, folliculis supra caulem in sese inflexis, ut in polyporum cirrhis. Probatissimum est è montibus. E frutice toto cum radice succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones in potu efficax est. Cæliacos, rubraq; sæminarum profluvia, refrigerando infrenat: sanguinem naribus erumpentem suppressit. Trita folia, aut siliquæ recentibus uulneribus impositæ, eâ ad cicatricem perducunt.

Ignotarum plantarum classem inibit Clymemum. Poterat quidem videri, Saponaria, si ea ut folijs Plantaginem, itidem caule, qui rotundus est & nodosus: & flore, qui dispar est, Clymenum referret.

Periclymenum. CAP. XII.

NOMENCLATURA.

Græ. περικλύμενον. Lat. Periclymenum.

Ita. Vincibosco. Gal. Vincibosque.

Off. Caprifolium.

Periclymenon, simplex fruticat, ex interuallis parua folia habens ipsum amplectentia, subcandida, hederacea: inter folia surculi exeunt, in quibus bacca, hederæ similes: flos Fabæ, candidus, aliquantum rotundus, & quasi in folium procumbens: semen durum, & quod difficile euellatur: radice rotunda, crassa. Nascitur in aruis ac sepibus, conuolens se adminiculis propter assidentibus. Semen eius postquam ematuruit collectū, & in umbra siccatum, si drachmæ pondere detur in uino quadragenis diebus, linem absorbit: lassitudinem discutit, sed urinam

ciet statim à sexto die cruentam, orthopnææ & singultui prodest: partum accelerat. Folia sunt eisdem uiribus prædita: quæ tricenis septenis diebus epota, sterilitatem facere produitur. Perunctis ex oleo, februum algores abigunt.

Quemadmodum eruditorum consensus, Periclymenon & Matrisyluam, in unam & eandem plantam copulauit, ita emendationis examen, Caprifolium, & Matrisylua segregauit. Siquidem Caprifolium, Dioscoridis vera est Pixyacantha. Ianius a vigo Chirurgicus, è Galeni libro de simplicium facultate octauo, Matrisyluam in tibiæ ulcerum commendat, At id: ut ex hoc loco patet, non scripsit Galenus.

Tribulus. CAP. XIII.

NOMENCLATURA.


Græ. τριβόλος. Lat. Tribulus. Ita. Tribolo.
Gal. Macres. Saligorcz. Off.
Tribulus marinus.

Tribuli genus unum terrestre, folijs ad effigiem Portulacæ, tenuioribus uiticulis, in terra stratis: spinis secundum folia rigidis, præduris. Iuxta amnes & rudera nascitur. Est & alterum genus, aquis familiare, quod in fluminibus natum commā exerit, aculeos condens: folijs latis: & pediculo longo: caule parte summa quam ima crassiori: capillamenta quedam inde dem exorta spicantur: semen durum, ab altero non abhorrens. Vterque refrigerantis & inspissantis est natura: ideo inflammationes omnes cataplasmate adiuuat. Ulcera in ore erumpentia, putredines, gingiuas, tonsillasque persanat. Succus ex his colligitur ad oculorum medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis iuuamentum affert. Drachma terrestris Tribuli pota, illitæue, icteros à uipera recreat. contra uenena cum uino aptissime bibitur. Decoctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad

Strymona

Strymona amnem habitant, uirenti Tribulo equos sagināt, & è dulci semine & esculento panem quo uestuntur faciunt.

Tribulus terrestris Dioscoridi, vnius, Theophrasto & Plinio diu
est generū. Vni Cicercula folia, alteri aculeata. hic & serius flo-
ret magis que septa obsidet villarū, Semen ei rotundius, nigrum, in sili-
qua. Folium idem habet secundum spinam, alteri acanaceum, & Sesa-
ma figura. Aculeatum hoc tribuli genus nostro saculo p'anta est inco-
gnita. At qui solijs Portulacam refert, Venetijs visitur, propter diuī
Nicolai cathedram. Calcatreppa, quæ Italis Cacatrepola, viticulos nul-
los, sed nec siliquam qua semen includatur, producus, cum Tribulo spi-
noso non admodum facit. Aquaticus tribulus in lacis Mātuanis, & Fer-
rariensi nascitur, & Venetijs in lacunis, maritimis locis adiacentibus.
Editur fructus, castaneæ similis, cineri calido incoctus. Tribulus compo-
nitur partim ex essentia humida, pauxillum frigida, partim è sicca, nō
modice frigida. In terrestri essentia, frigidum terristri praualet, in a-
quatica, aqueum terrestre.



Limonium.

Limonium. C A.

XIIII.

NOMENCLA-
TVRA.

Græ. λειμώνιον. Lat.

Limonium. Ita. Limonio.

Gal. Reparee de pré.

Off. Pyrola.


Limoniū folia habet Be
te, tēuora & lōgiora
H 4 decem

decem, sæpe plura: caulem tenuem, rectum, Lilio æqualem, seminibus rubris scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum, & ex uino acetabuli mensura epotum, dysentericis celiacisq; prodest. rubra fæminarum profluvia sistit. Nascitur in pratis & palustribus.

Limonium Plinio, Beta est sylvestris, quam Nomoidem à quibusdā vocari scribit. At Galenus libro de facultate alimentorum secundo, nullam Beta sylvestris speciem agnoscit, nisi fortè ex illa, Rumicem quis intelligat. Qui fit, ut sui generis herba sit Limonium, non infrequens à Matthiolo in vallis Ananie paludibus animaduersa. Quæ, sit necne Ruta pratensis, aut Officinarum Pyrola, iudicium alijs relinquo. In remedia, Limonium acetabuli mensura offerendum.

Lagopus. CAP. XV.

NOMENCLATURA.



Lagopus.

Gr. Λαγοπους. Lat. Lagopus. Ital. Lagopo.
Gal. Pie de lieure. Off.
nō nota. Ger. Katzent-
lee Hasenpfontsin.

Lagopus herba sistit
aluum in uino pota:
aut in febris, ex aqua. Ea-
dē inguini alligatur, in inflā-
matione. Nascitur in seg-
tibus.

Nullam

Nullam Lacopi effigiem Dioscorides exhibet. Id nobis eius cognoscendi certum tollit argumentum. Matthaeus saluaticus, Caryophyllatam esse putat. Sed eius opinio à nullo penè recipitur, quod ea in montibus nascatur, non in segetibus & aruis. Ruellio, ea ducitur, quæ Trinitatem, vulgus vocat. Nempè humilis Trifolij genus, in segetibus & armis enati. Germani pro Lacopo herbam ostendunt, caulibus rotundis & hirsutis, folijs Loti pratensis, semine in paniculis muscosis lanuginosisque, pedi leporino admodum similibus. Hæc gustu astringit, & exiccantis est facultatis.

Medium. CAP. XVI.

NOMENCLATURA.

Gr. Μέδιον. Lat. Medium Ital. Medio.

Gal. Off. Ger. ignota.

Medion in saxis & opacis nascitur. Folia habet Iridis: caulem tricubitalem, & in eo florem grandem, purpureum, rotundum: semine Cnici, minuto: radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quæ trita in farinam, & ex Melle decocta, rubros menses scæminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in uino potum, menstrua pellit.

Exemplarium diuersitas, in depinguendis Medij solijs, cum hæc Iridi similia, alia Seridi faciunt, satis extricari non potest. Plinius qui Iridi satiuæ similia depingit, Seridem intellixisse videtur. Nam Iris Theophrasto culturam non desiderat. Sed hæc Delio natatore indigent. Medij radix, austera est, & refrenat fluxus, etiam muliebres. Contra semen, menses elicit, nempè tenuium partium & incisoriæ facultatis.

Epimedium. CAP.

XVII.

NOMENCLATURA.

Græ. Επιδιον.

Lat. Epimedium.

Ital. Epimedio.

Gal. Off. Ger. ignota.

H S

Epime

E *Pimedium*, caulis est non magnus, *Hederæ* folijs, denis atque duodenis, neque florem, neque fructum ferens: radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo. Nascitur in humidis. folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, mammas increfcere non sinunt. Radix cōceptum adimit. Folia trita quinis drachmis, post menstruas purgationes quinque diebus in uino pota, præstant mulieribus ne concipiant.

Incognita herba *Epimediū*, sed nec herba est, *Trinitas* vocata, ut vult *Cordus*. Nam *Trinitas*, caulem & florem producit: *Epimedium*, caule & flore destituitur. Præter hæc, nota alia, & vires non consentiunt.

Gladiolus. CAP. XVIII.

NOMENCLATURA.



Xiphion.

Græ. Ξίφιον. Lat. Off.
Xiphion. It. *Gladiolo*. Gal.
Glais.

X *Iphion*, alij *Phasgannon*, alij *Macharonion*, Romani *Gladiolum* uocant. Nomen inde accepit, quod solum gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus & angustius uideretur, & gladij modo mucronatum, neruosumq;. In caulem exit cubitale, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant: rotundo

tundo semine: radicibus geminis, una, bulborum modo, super alteram insidente: quarum inferior gracilis est, superna uberior. Nascur in aruis. Superior cum Thure illita, admisto uino, spicula & aculeos e corpore extrahit, panos cum Lolij farina & hydromelite discutit: qua de re huiusmodi emplastris inseri solet. Menses imposita trahit. Superiori radice ex uino pota, uenerem stimulari, & inferiore sumpta sterilescere tradunt. Superiorem quoque utiliter infantium enterocelis, cum aqua potui dari precipiunt.

ET si veteres omnes herbas, quæ gladiolis simile esset folium, Gladio los vocauere, ut Iris, Sparganium, Acorus, Xiris, & alie. Est tamẽ sui generis herba, Gladiolus, quem Græci Sphaganon, Xiphion, & Macheronion appellant. Hic in Thuscia inter segetes nascitur, nulla refragante nota. Flores Thuscis, Monacuccie, dicuntur. Plinij Gladiolus in humidis nascens, is Gladiolus esse videtur, quem pro Acoro, vulgus usurpat. Rura Gallica verum Gladiolum, Spatham, aut, Segetalem Gladiũ appellant. Radix Gladioli maximè superior, attrahit, concoquit, & desiccatur.

Sparganium.

CAP. XIX.

NOMENCLATURA.

Græc. σπαργάνιον. Lat. Sparganium.

Ital. Spargonio.

Sparganium, aliqui Xiphidion uocant. Folia habet Gladioli, sed arctiora, & in terram magis procumbentia. In summo caule ueluti pilula prominent, in quibus semen. Contra serpentis uenena, radix cum uino datur.

Sparganium non esse Cotulam foetidam, hinc probatur. Spatula fetida folia habet latiora & longiora Gladiolo, quæ in terram nõ procumbant. Ad hæc, Spatula fetida pillulas in summo caule, indidẽ semine incluso, non profert. Ex Spatule fetidæ succo (ut id obiter dicam) scabies, & impetigo medicantur. Vidit Matthiolus Sparganium in territorio Romano, loco quem Tolpa, vocant, ubi rupeum Alumen conficitur ad radices mōtis, Rōcone, nuncupant, consuetudine notis omnibus. Desiccatorium est Sparganium.

Xyris

Xyris. CAP. XX.

NOMENCLATURA.

Græ. ξίρις. Lat. Xyris. Ita. Xiride.

Off. Spatula fœtida.



Xyris.

& collectionibus illita cum aceto medetur. Radix ex passo bibitur, ad conuulsa, rupta, coxendicum dolores, strangurias et alui profluvia. Semen tribus obolis potum, urinam uehementius impellit: & cum aceto, lienem absumit.

XYris in varijs Italiae locis, in Thufcia, & Gallijs prouenit. Cordo ea est, quā Itali Spatulam fœtidam vocant. Sed huius rei non meminit Matthiolus, proculdubio, si eo pacto se haberet, non prateriturus. Tanta hominis est sedulitas. Xyris vim habet abstergendī, digerendī, & desiccandī, non radice tantum, sed amplius etiam semine.

Anchu

Anchusa. CAP. XXI.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀγχούσα. Lat. & Ita. Anchusa. Off.

Buglossa rubea. Gal. Orchanette.

Anchusa, quæ alio nomine Calyx, aut Onoclia appellatur, folia habet Lactucæ, in acumē fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, quoquoersum humi sparsa, spinis horrida: radici crassitudo digitalis, quæ æstate prouenit, ac manus inscit sanguineo colore. Lato solo nascitur. Radix adstringit, ad ambusta & uetera ulcera, ex oleo & cera efficax est. Igni sacro cum polenta medetur, lepris & uuliginibus illinitur ex aceto, partus extrahit, uulua indita. Eius decoctum renum uitijs, lieni, & bile suffusis datur: & si febris sit, ex aqua mulsa. Sistunt aluum folia in uino pota. Radice pigmentarij utuntur ad unguentorum spissamenta. Est & altera, quàm aliqui Alcibiadion, aut Onochiles appellarunt. Hæc à priore distat, quòd minora habeat folia, sed simili modo aspera: ramulos exiles: florem purpureum in puniceum uergentem: radices rubras, oblongas, quæ menses sanguineum succum fundunt. In sabulosis nascitur. Vis ei folijsq; inest, quæ contra uirus cum reliquorum serpentium, tum maxime uiperarum, auxilietur, siue cibo, siue potu, siue alligatu. Nam si quisquam mandens, in serpentis os inspuat, eum necabit. Est & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam interficiet. Radix acetabuli mensura cum Hyssopo & Nasturtio pota, latus uentris tineas excutit.

Anchuse quartum genus facit plinius, primò generi admodum ad simile, quàm pseudanchusam vocat. Atenim hæc, prima hirsutior est, lanuginosior, & minus spissa, folijsque constat gracilioribus & languidioribus. Ruellio pseudanchusa aruis arenosis innascitur, & menses sanguineum humorē exudat. Matthiolo, pseudanchusa non visa, cum

Anchu

Anchusa genera tria à Dioscoride descripta, in multis & varijs Italia locis, inspexerit, succūque ex earum radice, per astatē, rubentem extraxerit. *Anchuse* omnes, flores per totum caulem producunt, è casio purpurascētes penē forma vulgaris Buglosi, sed rubent, & explicantur magis. *Anchusarum* radices astristoria facultatis, & amara sunt, infrigidant, & abstergunt. Folia licet minus possint, desiccandi tamen & astringendi virtute non priuantur. *Lycopsis* in astrictione, *Onoclea* valentior. *Alcibiadion* aut *Onochile*, plus in re medica potest, siquidem gustata acrior, est.

Lycopsis. CAP. XXII.

NOMENCLATURA.

Græ. λυκοψις. Lat. *Lycopsis*. Ita. *Licopside*.

Gal. Langue de chien. Off.

Lingua canis.

Lycopsis, quæ à nonnullis *Anchusa* uocatur, folijs *Lactuca* longioribus, asperioribus, latioribusq̃, crassius, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis multis, cubitalibus: flore paruo, purpureo: radice rubra, & astringente. Nascitur in campestribus. Cum oleo radix illita uulneribus medetur: & cum farina hordeacea, ignibus sacris. Sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

Echium. CAP. XXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. εχιον. Lat. *Echium*. Ita. *Echio*.

Gal. Buglosse sauage. Off.

Buglossa uulgaris.

Echion folia habet prælonga, hirsuta aliquantum tenuia, *Anchuse* proxima, minora tamen, subrubra, & pinguia, spinulis tenuibus horridula: cauliculos exiles, numerosos: minutaq̃, utroque latere folia, expansa, pinnataq̃, nigra, in summo caule

*Echion domesticum.**Sylvestre.*

caule minuscule: flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti uiperarum similia insunt. Radix nigricat, digito tenuior, quæ non percussis modo à serpentibus ex uino prodest, sed eos qui antea biberint, feriri non patitur. Folia & semen idem præstant munus. Lumborum dolores sedat. In uino aut sorbitione sumpta, lac extrahit.

Echium inde nomine accepto, quòd semine sit viperarum capitibus non absimili, & possit in earum morsus: siquidem, Echis, græcis Viperam sonat. Alcibijs, dormiens in genu à Vipera demorsus, hausto Echij succo, applicataq; morsui herba quam expresserat, cum ex insperato conualuisset, quod planta huius esset remedium ostēdit. Plinio duū est generum. Vnum Pulegio simile, coronatum folijs. Alterum, lanugine distinguitur spinosa, cui capitula sunt uiperæ. Hoc proculdubio, herba Hircina est, quam sic vocant, quòd constet, eius pabulo hircos capellæq; delectari. Nasçitur non in Italia tantum, sed etiam in Gallijs.

Ocima

Ocimastrum. CAP. XXIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. ωκυμοιδες. Lat. Ocimoides. Ita. Basilico saluatico. Gal. Basilic sauuage.

Ocimoides, Latini Ocimastrum uocant, folia fert Ocimi, & ramos dodrantes, hirsutos, siliquas Hyoscyamo similes, semine, ut Gith, nigro prægnautes. Vim habet semen in ui no potum, qua uiperarum caterarumq; serpentium morsibus medeatur. Datur ischiadicis cum Melle, uino, Myrrha, & Pipere. Radice nititur tenui & superuacua.

Ocimastrum, seu Basilicon sylvestre, ea est herba, quam vulgo Potulariam nominant, quod siliqua, pocillorum quibus bibamus, imaginem quandam referant. Namq; Siliqua Hyoscyami debiscunt capaci ventris sinu, arctis vasculi faucibus, & leuiter per ambitum denticulatis, in quibus Gith semen occultitur. In Ocimastro consentionibus Matthiolo & Ruellio, Cordus notas discrepare contendit, at solis nititur verbis.

Erinus. CAP. XXV.

NOMENCLATURA.

Græ. Ερίνος. Lat. Erinus. Ita. Basilico aquatico. Gal. Basilic d'eau.

Erinus nascitur apud fontes & fluuios, folijs Ocimi, sed minoribus, parte superna diuisis, quinis, senisue, dodratalibus surculis: flore candido: semine nigro, & acerbo. Folia & caules lacteo succo turgēt. Semen drachmis duabus in quatuor Mellis cyathis oblitum, oculorum fluxiones cohibet. Succus cum sulphure & Nitro instillatus, aurium dolores sedat.

Erinum, Echinum vocat Galenus, prout etiam in antiquioribus Dioscoridis codicibus habebatur. Herba succo manat lactis, tum colore, tum dulcedine, unde Lactaris nomen apud vulgus inualuit. Erini semen tenuium partium, desiccat sine morfu.

Gramen

Gramen. CAP. XXVI.

NOMENCLATURA.

Gr. Αἴρωσις. Lat. Gramen. Ita. Gragmina.
Gal. Dent de chien.



Gramen.

Babylone: idq̃ iuxta uias nascitur. Quod in Parnaso monte gignitur, dēsius fruticat: folijs hederaceis: flore odorato, candido: semine paruo, nō inutuli: radicibus quinīs aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, & admodum dulcibus. Succus si in uino cum Melle pari, & Myrrhæ dimidio decoquatur, adyctiaturq̃ Piperis & Thuris tertiæ portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum. Id in ærea pyxide reconditur. Deco-

Gramen geniculatis
serpit ramulis, à qui-
bus crebrò radices spargit
dulces, articulis præcinctas:
folia dura, & ut Arundi-
nis parua, lata, in exilitatē
fastigiantur, eāque iumenta
& boues pascunt. Trita ra-
dix illitu uulnera congluti-
nat. Decoctum eius in potu,
torminibus medetur, & u-
rinæ difficultatibus: calculo
sa etiam uesicæ excrementa
comminuit. Est & arundi-
naceū Gramen, priore mul-
tò maius, quod iumenta ne-
care traditur, præsertim in

I

clum

Etum radicis, idem quod herba præstat. Semen uehementius ur-
nam impellit, aluum uomitionesq³ sistit. Natum in Cilicia Gra-
men, quod incolæ Cinnam appellant, boues inflammat, si eo ui-
renti sæpe pascantur.

Notum est primum Graminis genus à Dioscoride descripti. Nam
Babylonium & Parnassæum, nostris regionibus non nascuntur.
Plinius tria facit aculeati Graminis genera. Dactylon vocant, cui in ca-
eumine aculei sunt, plurimum quini. Hac Thusci vocatur, Sanguinel-
la, vel Capraria. Alterum Aixoo simile, quo ad paronychia vnguium,
& cū in eis caro excreuit, vtuntur: Ideo Dactylon appellant, quia
digitus medeat. Tertium genus Dactyli, sed tenuius, nascitur in parie-
tinis & tegulis. Huic caustica vis inest. Sistit vlcera qua serpunt. Ra-
dix Graminis tenera mandendo est. Hac modicè frigida & sicca, parū
mordet, tenuibus partibus constat, qua calculos potu comminuit.

Sideritis. C A P.

X. X V I I.

NOMENCLATURA.

Græ. σιδῆρις. Lat. Sideritis. Ita.
Siderite.

Sideritim alicui Heracleam uocant: folia habet Marrubij,
sed longiora, satis ad frondem Quercus aut Saluæ acce-
dentia, minora tamen, & aspera. Caules ædit quadratos, pal-
mum sæpe excedentes, non iniucundi gustus, aliquantumq³
substringentis, in quibus per interstitia orbiculatæ uertebræ, uti
in Mar



Sideritis.

in Marrubio, spectantur, & semen in eis nigrum. Nasctur in petrosis. Illius folia, suapte ui, sine inflammationis periculo iungunt. Altera Sideritis binum cubitorum, ramulis exilibus: folio Filicis, numero, utrinque per oras diuiso: pediculo longo: prodeuntibus è summo alarum sinu surculis, longis, tenuibus: capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen continetur, quam Betæ rotundius aliquanto, ac durius. Huius uis, foliorumq, ad uulnera præcipua est. Siderit in

aliā esse tradunt, quam Crateuas Heracleam uocat, in macerijs & uineis nascentem, folijs ab una radice multis, Coriandro similibus, circa cauliculos dodrantes, teneros, læues, subcandidos atque subrubicundos: flore puniceo, paruo, gustanti amaro, & lento. Huius ea uis est, ut quamuis recenti uulneri imposita, sanguinem supprimat.

Sideritis genera tria, Matthiolus vir in inuestigandis plantis miræ solertia, & ingenij penè diuini, primam & tertiam Sideritis speciem in ualle Anania, qua ad Tridentum vergit, non semel uidit & collegit: secundam haud dum reperire in Italia potuit. Quod uero ad foliorum delineationem attinet, quam nunc Marrubij, nunc Quercus, nunc Saluie similitudine Dioscorides repræsentat, ita intelligendum: Quæ longa sunt, ad Saluie, qua supernè hirsuta & candida, ad Marrubij: quæque per ambitum incisa, ad Quercus foliorum similitudinem accedere.

dere. Eo explicato, non difficile erit, tria hac genera secretim agnita seligere, eamque non in primum ducendam genus, quæ spicatos flores in ipso caulium cacumine, & non in ipso caule, vt Marrubium producit. Auicenna auctoritas, qui per herbam Iudaicam, Eruum intelligit, factis eorum errorem coarguit, qui hanc Sideritim esse contendunt. Quod si per Herbam Iudaicam, quam & Paganam vocant, ea planta intelligatur, cui vulgus, Virga aurea nomen imposuit, est Virga aurea caule rubenti, binum cubitorum alto, & non infrequenter sublimiore, pellucido & leui, cui folia Oliuæ incumbunt, orbiculatim denticulis minutissimis incisa, & in superiori parte lauia: flores profert in summo caule spicatos (dissimiles tamē Camomilla) aurei coloris, qui vt ematuruerint, in pappos & ventos abeunt. At hæc, primum Sideritis genus esse non potest. Sideritis facultatis est abstersoria, maiori tamen ex parte humida, & modicè frigida est, ac aliquantum astringit.


Achillea. CAP.

XXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀχιλλεῖος. Lat. Ita. Achillea. Off.
Millefolium mains. Gal. la grande
Millefeuille.

Achillea, quibusdam Achillea Sideritis, dodrantales aut maiores gerit scapos, fusorum effigie, quasi minutis folijs circumdatos, crebris in latere foliorum sectionibus, Coriandri similitudine, subfuluo colore, odore multo, non insuauis, medicato & glutinoso: umbella in cacumine rotunda, floribus candidis, purpureis, & aurum emulantibus. Prouenit lato solo. Trieta coma, sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tue



Achillea.

culo tuetur. Erumbentem sanguinem inhibet, & cruenta uulua profluvia, in uellere. Decocto, quoque insident fœmina, fluxione uulua laborantes. Ad dysenteriam bibitur.

Achillea in plantarum incognitarum classem relegabitur. Nam si notas, quas hoc in capite Achillea attribuit Dioscorides, cum eis quas Stratiote Millefolio (quod nostrum est vulgare Millefolium) idē author huiusce libri cap. 88. assignat, uel oscitanter contuleris, nimirum eandem plantam non esse cognosces. Errori ansam præbuit Plinius, qui 25. Libri,

cap. 5. latinis Millefolium vocari scribit. Sed ut videtur, Achilleam eo loci non descripsit, at Dioscoridis Myriophyllum. Quod apparet, quanam vera esset Achillea dubitasse Plinium, & ideo solidum ex eo argumentum auferri non posse. Serapio Achillea succum, qui rubens ab ea exprimitur (& constat e vulgari Millefolio similem non educi) Sanguinem draconis appellat, in cuius locum in seplasijs omnibus adulteratus habetur, cum resina, hyrci sanguine, Sorbis siccis, & sexcentis alijs mixturis. Cordo Achilleia Millefolio cognata planta Germanis, Feldtgarbe. dicitur. hæc sit necne, Officinarum Millefolium maius, planè affirmare non audeo.

Rubus. CAP.

XXIX.


NOMENCLATURA.

I 3

Græc.

Græ. Βάτος. Lat. Off. Rubus. It. Ro uo.

Gal. Ronce.



Rubus.

Caules cum folijs tunduntur, exprimiturq̃ succus, mox sole co-
gitur, singulari remedio contra omnia quæ modo dicta sunt.
Mori in Rubo nascentis quàm optime maturi succus, ad oris
medicamenta conuenit. Si situr alius præmaturi cibo, necnon
flore in uino poto.

Rubus, notitiæ uulga-
ris. Vim habet siccan-
di & adstringendi: capillum
tingit. Ramorum decoctum
potu aluum sistit, & fæmi-
narum profluvia: presteris
morsui accommodatissimum:
gingiuas firmat. Oris uitijs
folia commanducata meden-
tur: cohibent ulcera quæ ser-
punt, ulceribus in capite ma-
nantibus, oculisq̃ prociden-
tibus remedio sunt: condylo-
matis & hæmorrhoidibus
folia illinuntur: cardiacis,
& stomachi doloribus, tri-
ta conuenienter imponuntur.

Rubus Idæus. C A P.

X X X.

NOMENCLATURA.

Gr. Βάτος ἰδαίχ. Lat. Rubus. Idæus. It.

Ampomole. Gal. Framboise.

Idæus

Idaeus Rubus appellatus est, quoniā passima Id in proueniat. Est autem longē tenerior priore, ac minoribus spinis horrens, quanquam & sine spinis inueniatur: insuper eadem præstat quæ supradictus. Ceterum flos cum melle oculorum collectionibus commodissime illinitur. Ignem sacrum extinguit, stomachicisq; ex aqua bibendus datur.

Rubi tres maximè sunt species. Quidam fructueta sepes & arbores inscendit. Alius humilis, cubitum vt plurimum altus, spinis horrente caule, non raro singulari est fructu a Solstitio maturo. Tertius per arua & humi ramulis seu viticulis aculeatis repit, ideòque Græcis Chamabatos, & Theodoro Gaza, è Theophrasto, Humirubus interpretatur. Nascuntur in omnibus Tridento adiacentibus montibus, Rubi qui mora sine nucleis producant, quos rustici Ampomole vocant, Fragis similia, gustu, per æstatem admodum grato. Hos puto nostras esse frambofcias. Idæus Rubus patriam designat quidam frambofciam vulgarem existimant, quæ liberè in dumetis & syluis sub vmbra crescens, Gallico nomine inde mutuato, siquidem Idæus erit hic Rubus, illò ab Idæo puero in coloniam deductus est. Rubi omnes vim habent astringendi. Folia tenera & recens nata, & gemmule, aqueum quiddam cum astrictione possident. Temperamento sunt hinc è frigida & terrea essentia composito: inde ex essentia aquea tepida. Fructus cum maturuit, calidè temperatus, nempe dulcis: hòcque liquore, & astrictione modica gratus est gustui. Immaturus terrestre quippiam continet, nempe acerbus & desiccatorius. Flos eiusdem est virtutis. Radix astringit, & tenuium est partium.

Helxine. C A P.

XXXI.


NOMENCLATURA.

Gr. ελξίνη. Lat. Helxine. It. El sine.

off. Volubilis.

Helxine cognomento Cissampelos, folijs est Hederae, minoribus, ramulis exilibus, quibus amplectitur, quodcunque cōtigerit adminiculum. Nascitur in sepibus, uinctis, & segetibus:

I 4 tibus:

*Helxine minus.*

nem reddere debuerat, hancque Theodorus, Carduum pineam interpre-
tatur. Helxine digerendi vim habet.

tibus: foliorum succus potus
deicit aluum.

Helxine Cyssampelos, siue
Vitis Hederacea, Convol-
uuli aut volubilis est species, sed
que, satis non statui potest, nisi
ea sit, quaestate candidas cam-
panulas producit. Hunc florem
Sernius in virgilium, Ligustrum
perperam esse putauit. Est &
& alia Helxine, qua Parieta-
ria, Muralium, & Perditium
dicitur, in parietibus, muris, &
sub stolidiis nascens. Alsines, hu-
ius consinis qua in syluis nascitur
caput, non probe in secundum li-
brum à quibusdam transpositum
ducitur. Plinius in 21. libri, cap.
16. Carduum quendam descri-
bens, male huic Helxines nomen
indidit, quod est Theophrasto, Ixi-

Elatine. C A P.

XXXII.

NOMENCLATURA.

Gr. Ελατίνη. Lat. Elatine. Ital. Elatine.

Gal. Lierre terrestre. Off. Hedera

Elatine folia habet Helxina minora, rotundiora, pilosa: do-
drantalibus ramulis, quinis senisue, à radice foliosis, gustu
adstringentibus. Nascitur in segetibus & cultis. Oculorum flu-
xionibus & inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta
tritiss



*

Elatine.

trititis & impositis. Eadem
cocta sorbitionis usu dysen-
teriam sistit.

R Vellius dum Elatinem cā
pestre Rapistrum, rusticis
nominari scribit, non id tamen
cum Rapo sylvestri confundit, sed
eo rura ut Rapo sylvestri in ver-
nis acetarijs uti. Elatine modi-
cè desiccat & infrigidat.

Eupatorium.
CAP. XXX/
III.

NOMENCLATURA.

Gr. Ευπᾶτοριον, Lat. Eupatorium. Ital.


Eupatorio. Gal. Aigremoine. Off.

Agrimonia. Ger. Agrimonien

Odermenig. Lebertletten.

Eupatorium fruticosa herba est, unicum efferens caulem, li-
gnosum, nigricantem, rectum, tenuem, hirsutum, cubitale
interdum ampliorem, folijs per intervalla Quinquesolij aut Cā-
nabis magis similibus quinquepartitò amplius diuisis, nigrican-
tibus, per ambitum serratis: semen medio caule crumpit, pilo-
sum, deorsum spectans, quod siccatum uestibus inharet. Contra
huius folia, & cum suillo adipe imposita, ulceribus quæ agrè ci-
catrice trahūt, medetur. Herba aut semen in uino potū dysente-

I 5 ria

*Eupatorium.*

vermes) infantibus bibendum offerunt. Mensura, cyathus dimidius cum mirando effectu. Nascitur in campestribus. Hic submonendi Arabum se Etarj, ut in compositionibus Mesue, pro Eupatorio, herba Giulia utantur: in Auincenna suo utidem Eupatorio: in Gracorum, Agrimonia. Eupatorium tenui est partium, & extrinseca vi excalectoris, incidit, et emundat.

ria, iocinoris uitijs, & serpētium ictibus liberat. Nec desunt qui aberrantes, Argomonem hanc appellarint, cum tamē longē alia sit, uti exposuimus.

Nunc tandem verum Eupatorium in Agrimonia, priorisque saculi aberrans barbaries cepit agnosci. Plūta quā olim pro Eupatorio utebantur, ipsissimum est Auincenna Eupatorium. Mesue Eupatorium, ab Agrimonia, & Auincenna Eupatoria diuersum. Enimvero ea est planta, quam herba Giulia, vocant. Hanc Itala mulieres per noctem in vino albo infusam, mane (ad occidendos

Quinquefolium. CAP.

XXXIII.


NOMENCLATURA.

Gr. πενταφύλλον. Lat. Quinquefolium. Ita.

Quinquefoglio. Gal. Quintefueille.

Off. latino nomine.

Quin



Quinquefolium.

scabritias, gargarizatu leuigat. Contra alui profluvia, & dysenterias auxiliatur. Item articulorum coxendicumq; cruciatibus potum. Cocta in aceto, & illita, serpentia ulcera cohibet: strumas, tumores, duritias, abscessus & collectiones discutit, ignes sacros, reduuias, condylomata, psorasq; sanat. Tenuis radicis succus, contra iocinoris pulmonumq; uitia prodest. Item aduersum uenena. Cum hydromelite autem uel diluto uino, & Piperis exiguo, bibuntur folia, contra febrium circuitus, in quartana quidem, quaternum ramuloru: in tertiana uero, ternum: in quotidiana, unius. Ea quoque folia, tricenis pota diebus, comitialibus profunt. Folioru succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerime regio morbo medetur. Illita cum Melle & sale, tam uulneribus, quam fistulis remedio sunt, enterocelicis auxilium prestant.

Quin

Quinquefolium ramulos fert surculaceos, tenues, dodrantaes, in quibus semen: folia Menthae, quina singulis pediculis, raro plura, in ambitu serrata: florem ex luteo pallescentem, auri emulum. Nasitur in riguis, & aquarijs ductibus: subrubram habet radicem, oblongam, Peratro nigro crassiore. Plurimis pollet remedijs. Ius radicis decoctae ad tertias, si in ore contineatur, dentium dolores sedat. Putrida oris ulcera, collutione sistit. Arteriae

Quinquesolium sanguinis profluua, & potu, et illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, & incantamenta inciditur.

V Nam nec amplius, Dioscorides *Quinquesolij* speciem facit, cum tamen quattuor eius species, à se in Italia perspectas, depingat *Matthiolus*. Harum maxima, ipsum est *Dioscoridis Quinquesolium*. Secunda, primæ nihil absimilis, præterquã quod folijs & flore candicat. Tertia, paruula, & vt plurimum per terram repit. Quarta, folijs est viteis, quinquesariam incisus, hancque Itali sua lingua, *Diapensia* & *Sannico* lo nominant. Profert hoc *Quinquesoliũ* tum in caulũ cacumine, tum in ramusculis gemmulas, & fructus, qui è viridi candescunt, fragis naturã consimiles. Primum radice constare subrubra (quod aliquibus nõ placet) ipsa experientia a se circum *Goritiæ* fossiam collecta, multifida, & *Helleboro* maioris, *Matthiolus* docuit. Et peraquẽ verum *Quinquesolium*, *Tormentillam* non esse. Nam *Tormentilla*, rarissimè minus, quàm septenis ex vno pediculo folijs: *Quinquesolium* infrequenter quina excedere reperitur. *Quinquesolium* radice, licet crassiori, refert *Helleborum*: *Tormentilla* breuissima est, crassiuscula, & nodosa. Nasçitur *Tormentilla* locis sterilibus, & editissimis montibus: *Quinquesolium* in planis, & iuxta aqueductus. Germani *Chirurgici*, quarta speciei *Quinquesoliũ*, in plagas intrinsecas, fistulas, & vbicumque consolidato est opus, potu ministrant. Verum id *Quinquesolium*, non illa est *Sannicula*, quã mirando natura artificio, connexis est in nodum radicibus, & longè ab illa differt. *Quinquesolij* radix valenter desiccat, nempe tertio ordine, sine morſu tamen, tenuium est partium, calida ad sensum vsque.

Phoenix. CAP. XXXV.

NOMENCLATURA.

Græ. φοίνιξ. Lat. Phoenix. Ita. Loglio saluatico.
Gal. Yuraye sauuage.

Phœnix folia habet *Hordei*, sed breuiora, & angustiora, spicam *Lolio* similem: calamos digitorum senũ, radici aduolutos

uolutos: septenas octonasue spicas. In aruis tectisq; recenter illitis nascitur, harum uirium compos, ut in uino austero pota, alui profluuium, & emanantem uulua sanguinem sistat, urinæ impetus infrenet. Sunt qui adalligatam in puniceo uellere & suspensam, sanguinem suppressere prodant.

PHenix quæ herbarijs, Avena sterilis, dicitur, cognita non perinde difficilis, Plinio, Murum Hordeum vocatur.

Idæa radix. CAP. XXXVI.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἰδαία ρίζα. Lat. Idea radix. Ita. Radice Idea.

Idæa radici folia sunt ea quæ Rusco: adherent his ueluti exigui pampini, in quibus flos. Radix spissandi naturam habet, his conueniens quibus adstrictione opus est. Pota, citam aluum, mensesq; & omnem abundantiam sanguinis sistit.

Idæa radix incognitarum plantarum ceteram subibit. Plinius Idæa herbam nominat: ei folia sunt Oxymyrina. Adherent q; ueluti pampini, in quibus flos.

Rhodia radix. CAP. XXXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. ῥοδία ρίζα. Lat. Rhodia radix. Ita.

Radice Rhodia.

Gignitur Rhodia radix in Macedonia, Costo similis, læuior, inæquabilis, quæ contrita, rosas redolet. Pulissima capitis doloribus, si madesacta fronti & temporibus cum Rosacei momento imponatur.

Rhodia radix, quantum è sobolis enascentia, quæ Goritia in orto suo profiliit, è misso Petri Saliceti medici, deprehendit Matthiolus, his notis quæ, ut Dioscorides, ita ceteri silentio præteriere, noscitari potest. Radix Rhodia, caules producit rotundos, quadantenus cœcanos, palmum

*Rhodia radix.*

terra intantum per ambitum exigua, ut vix affigenda satis sit. Cerebrum roborat odoris gratia, tenuium est partium: in digerendo & ex-
calfaciendo secundi ordinis est desinentis, aut tertij ineuntis. Ruellius li-
gni meminit, quod è nouo (quam vocant) orbe asportatum, tritum vel
in orbem derasum, rosarum suauolentiam exprimit, queis cum decer-
tat, & incunditate vincit. Hoc precarij orbiculi sunt.

palmum aut cubitum altos, è
queis folia prodeunt longiuscu-
la, acuminata, crassa ut Portu-
lacea, minutumq; per ambitum
incisa: enascitur in caulium cacu-
mine umbella viridis, ut Tithy-
mali, sed hac a flore rubescit. Ra-
dix est inæqualis, grossa ut Co-
sti, leuis, & que recens, splendi-
da est foris, intus candida, sicca
verò, leuis, intus rubes, & squa-
mosa foris. Cōmanducata aut
trita, Rosas odoris suauitate
prouocat, vnde ei Rhodia no-
men. Hac omnium radicum vi-
uacissima. Nam è terra educta,
si in locum non admodum siccu-
reponatur, a multis mensibus
denuo plantata, regerminat. In
editissimis montibus nascitur,
saxosis, & praruptis: precipuè
in Alpibus circa Saltzburgu,

Equisetum. CAP. XXXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. ἵππουρις. Lat. Equisetum. Ita. Coda di
caualo. Gal. Queue de cheual.
Off. Cauda equina.

Equi

Equisetum in riguis & scrobibus nascitur. Cauliculi prodeunt inanes, geniculati, in se sarcti, rubescentes, scabri, & iuncea circa eos folia, crebra, exilia. In sublime Equisetum attolitur, uicinos arborum caudices scādens, obuolutumq; dependet, comis multis, nigris, ut equorum cauda. Radix lignosa, dura. Vis herbe spissare: quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit. Prodest dysentericis in uino potus. Urinam cit. Sanguinolenta uulnera glutinantur, tritis folijs, & illitis. Radix cū sua herba tuſim, orthopnæam, ruptaq; adiuuat. Folijs in aqua potis, disseſtiones uesicæ & intestinorum, enterocelæq; in unum coalescere, cogiq; feruntur. Alterum Equisetum caulis est rectus cubitalis, aut maior, inanis, comis per interualla breuioribus, candidioribus, & mollioribus. Id cum aceto tritum, uulneribus remedio est, eademq; fungitur facultate.

Equiseti genera duo à Dioscoride descripta, non incognita sunt. Nā primò quod Itali Asprella nomināt, eius regionis mulieres, stagno splendorem & nitorem conciliant, hacq; materiarij fabri ligneam petlinum, & aliorum minutorum operum scabritiem eruderant & expoliunt. Ex altero quod cauda equina propriè dicitur, penè statim ut emergit, germen enascitur grossum & tenerum, à Senensibus maritimis palustri nuncupatum. Hoc quadragesima in cibos utuntur, primum elixo, post farina inducto, ac demum patella infriſto. Equisetum vim habet cum amaritudine aſtrictoriam: hacq; de causa valenter, & sine morſu deficcāt.

Coccum infectorium C A P.

XXXIX.

NOMENCLATURA.

Græ. κόκκος βαφικῆ. Lat. Coccus Baphica.

Ita. La grana. Gal. Vermillon.

Off. Grana tinctorum.

Coccum quo infectores utuntur, frutex est surculosus, paruus, cui grana ceu Lentesc adherent, quæ electa conge

congeruntur. Optimum gignitur in Galatia & Armenia, deinde Asia & Cilicia, ultimum ex omnibus Hispanicum. Vis huic spissandi, vulneribus nervisq; præcis, conuenienter ex aceto tritum illinitur. Nascitur quoque in Cilicia, è Quercubus, cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & Coccum uocitant.

Quamuis Coccum tinctorium, res sit non incognita, ipse tamen frutex, qui id producit, non satis perspectus. Nam quod habent seplasia, rotundum profert granum, & intrinsecus vacuum. Videri poterit genus illud, quod plinio in Asia & Attica nascens, celerrimè in vermiculum se mutans, quod ideò Scolecion vocabant, improbabantque, li maci parua simile. Rustici in Narbonensi prouincia, ubi frequens est, Vermilonum vocant. Falluntur qui Chermes Arabum, grana esse putant, quæ Pimpinella vulgaris radicibus affixa nascuntur. Siquidem Serapio per Chermes, grana quæ Græci Coccum vocant, intelligit, ut qui totū huius caput ex hoc Dioscoridis exscripserit. Et sanè nostri temporis Cremesinum, ex eo etiam sit grano, quod in pimpinella radice prouenit, verum id non concludit, Chermes Coccum esse tinctorium. Id facultatis est astricloriæ, & amara, neutriusq; mordicans.

Tragium. CAP. XL.

NOMENCLATURA.

Græ. Τράγιον. Lat. Tragium. Ita. Tragio.

Gal. Off. ignotum.

Tragium nascitur in Creta tantum insula, Lentisco semine, folio & ramis simile, singulis tamen minoribus: succus ei lacteus, gummi non dissimilis. Semen, folia, lachrymaq; illitu spicula è corpore eijciunt, omnia quoque corpori impacta euocant, pota stranguriæ medentur, calculos uesicæ frangunt, menses trahunt, Modus in sumptione est, drachma una. Fama est syluestres capras sagittis confossas, eius herba pabulo spicula excutere, Est & alterum Tragium, quod Tragoceros aliqui uocant, folia Scolopendrii habet, & radicem sylvestris Raphani, tenuem

tenuem, candidam, quam crudam uel coctam esse dysentericis prodest, folia autumnu hirci uirus olent: exinde sibi Tragij, nomen adoptauit. Prouenit in montibus & præcipitijs.

Cvm Tragium, quod hic primo loco à Dioscoride pingitur, in sola Creta nascatur, nullaque planta, a secundi generis Tragio, Scolopendrij folia proferat, amba non iniuria inter incognitas plantas referentur.

Tragum. CAP. XLI.

NOMENCLATURA.

Gr. Τράγος. La. Tragos. Of. Vermicularis. It. trago.

Est etiam herba Tragos, quam aliqui Scorpion aut Traganon uocant, maxime in maritimis nascens, palmū alta, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs, pusillis circa ramos acinis, rufis multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. Racemorum acini decem ex uino potu, cæliacis, & fæminis fluxione uulue laborantibus auxiliantur. Tunduntur à plerisque, & in pastillos digesti asseruantur, quibus utuntur cum opus est.

TRagos Plinio, quibusdam Scorpion dicitur, semipede alta, fruticosa, sine folijs, pusillis racemis, rubentibus, grano tritici, acuto cacumine, & ita in maritimis nascens. Hac indidem ab herbarijs eruitur iuncus marino similis, & ob id ab eis non aliter quàm Iuncus marinus appellatur. Cordo Italis, Pagnola dicitur, quod oblongi eius acini, quos pro folijs habet, Pineis nucleis similes sint. Huius vocabuli non meminit Matthiolus, attamen sub Argentæi montis radices, in maritimis Senensibus, nasci scribit iuncum pusillum, consentientibus cum plinio & Dioscoride omnibus notis.

Iuncus. CAP. XLII.

NOMENCLATURA.

Græ. Σχίνος.

Lat. Iuncus. Ital. Giunco.

Gal. Ionc.

k

Iunci

Iunci duo genera. Vnū leuis nominati, alterū acuti, qui in mucrone fastigiatur. Cuius etiā duo assignantur genera, unū sterile, reliquum fert semen nigrum, rotundū, & crassiore constat calamo, carnosioreq̃. Tertius est Iuncus qui uocatur Oloschænos, prioribus carnosior, asperiorq̃, is simile supradicto fructum in cacumine parit. Semen utriusque tostum, ex diluto uino potum, sistit aluum, & rubra fœminarū profluvia, urinam cit, capitisq̃ dolores facit. Quæ proxima sunt radici folia tenera, conuenienter illinuntur aduersus Phalangiorum morsus. Aethiopici Iunci semine somnus allicitur: sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

Triplex est Iuncus. Est Iuncus molli acumine, in aquosis nascens, hunc Græci, Schinou Lian, vocant. Alius in maritimis nascitur, fastigiato, & infligēdo vulneri aperto mucrone. Oxyshænos, dicitur. Tertius grandior, in lacubus & stagnis prouenit. Græci: Oloschænon: Latini, Mariscum nominant. Iunci temperamento constant, partim ex essentia terrena, modicè frigida, & partim ex aqua, leuiter calida. Oxyshæni secunda speciei semen somnum prouocat, minori tamen efficacia quàm Oligoschæni, nam id etiam mentem alienat.

Lichen. CAP. XLIII.

NOMENCLATURA.


Græ. Λειχην. Lat. Lichen. Ita. Pulmonaria.

Gal. Hepatique. Off. Hepatica.

Lichen qui saxis est familiaris, aliquibus Bryon appellatur: asperginosis petris adheret, ut muscus. Is illitus sanguinis profluvia sistit, inflammationes arcet, impetigini medetur. Inuat regio morbo correptos, cum Melle illitus: oris & linguae defluxiones inhibet.

Lichen inde nomine accepto, quod Lichenas & impetiginē sanat, Asperginosis hæret saxis, ut muscus, folio singulari, semper petris familiariter incumbente. Matthiolo cauliculos è saxis profert, unde pusilla quæpiam acetabula exeunt, & præcipuè mense Iunio: huic non admodum dissimilis quam Pulmonariam, & à similitudine quam ha-

bet

*Lichen.**Pulmonaria.*

bet cū humano pulmone, & è remedijs quæ huius vlceribus, & sanguineis reiectionibus affert, nominauere. hæc admodū sicca et astringentia est.

Paronychia. CAP. XLIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. παρωνύχια. Lat. Paronychia. Ita. Paronichia.

Paronychia exiguus frutex, in petris nascens, Peplo similis, minor longitudine, maioribus folijs. Illita paronychijs atque duritijs, remedio est.

Paronychia vidit Matthiolus, in ingenti illa sylua, quæ è Lubiana Goritiâ itur, saxi imminente, & siccis arborū truncis, Paronychia virtus. tenuium est partium desiccatque sine morfu.

Chrysocome. CAP. XLV.

NOMENCLATURA.

Græ. χρυσόκωμ. Lat. Chrysocome. Ita. Chrisocome.

k 2

Chry

Chrysocome palmi altitudine fruticat, coma specie corymborum, Hyssopo simili: radice hirsuta, Veratri nigri modo, tenui, Cyperum æquante: gustu non iniucundo, ex austero dulci. In petrosis opacisq; nascitur. Radix excalscit, & adstringit, his conueniens, quos iecur aut pulmonis inflammatio male habet. Contra purgationes uulue, decocta cum hydromelite assumitur.

Chrysocome in Natura hortum releganda, ne si nos opum suarum dominos effecerit, nihil sibi peculiare possideat. Cordus tamē Saraceniam Mentham, quam Graci recentiores, Costum herbam vocant, ut Chrysocome cognatam expromit, ob aureos, qui summis caulibus insident, corymbos, & accedentes ad veratrum nigrum radices, & odoratam cum planta radicem. Ruellio ad eam accedit Pulegium, quod herbarij montanum vocant. Sed è neutra, vera nobis Chrysocome patet.

Chrysogonum. CAP. XLVI.

NOMENCLATURA.

Græ. χρυσόγονον. Lat. Chrysogonū, Ita, Chrisogono.
Offic. Caryophyllata,

Chrysogonum dense fruticat, quernis folijs: flore coronarij Verbasci: radix ut Rapū extuberat, intus ruberrima, foris nigra. Quæ trita cum aceto, atque imposita, muris aranæ morsibus auxiliatur.

Hæc etiam planta, in secretissimo Natura horto, nostro sæculo delitescit, non secus ac alie complurimæ.

Elichrysium. CAP. XLVII.


NOMENCLATURA.

Græ. ἐλίχρυσον. Lat. Elichryson. Ita, Elichrifo,
Gal. Stichados citrin. Off. Suchas citrina.

Elichryson quidam Chrysanthemon, nonnulli & id Amaranthon uocant, quo deorum simulachra coronant. ramulum habet candidū, uirentem, rectum, firmum: folia intercedentibus spacijs angusta, abrotano similia: comā aurea lucis, in orbem,



Elichrysum. 1



Elichrysum. 2

hem, umbella rotunda ueluti fictis corymbis dependentibus. radice tenui. Nascitur in asperis, & torrentium alueis. Contra serpentium iclus, coxendicum dolores, urinæ stillicidia, ruptaq; comma è uino pota opitulatur. Ciet menses. Sanguinè concretu uentris ac uesicæ absunit, pota cū mulso, ieiunis, trium obolorū pondere, sistit destillationes, dato in uino albo diluto: uestibus in seritur, ut eas ab erodentium iniurijs tueatur.

H Elichryson Matthiolo in Thuscia nascitur, notis omnibus quas ei assignat Dioscorides, nihil euariantibus. Flos in longū tempus asseruatur, & ideo vere cū flores deficiūt, flore Helichrysi sicco utimur, ut Amaranthi, quem Fioreuelluto, Itali vocant, Porro Helichryson, Stechas est citrinum officinarum, & Paulo Amaranthus vocatur. Ruellia rusticis Gallis, Chamesum manus vocatur.


Chrysanthemum. CAP. XLVIII.

NOMENCLATURA.

k 3

Græ.

Græ. χρυσάνθεμον. Lat. *Chrysanthemum*.
Ital. *Chrisanthemo*.



Chrysanthemon aut Caltha (nonnullis Buphthalmos) herba est tenera, fruticosa, leues proferens caules, & multifida folia: flores supra modum splendentes: luteos (orbem oculi imitantes, unde Buphthalmi nomen traxit) Propter oppida nascitur. Cuius caules oleris uice manduntur. Flores cum cerato triti, steatomata discutere produuntur (Regio morbo correptis, colorem breui reddunt, si sequente longo balnei usu, post exitum ebibantur.)

* *Chrysanthemum*.

Valerius Cordus Chrysanthemon cum Buphthalmo confundit. Sed Matthiolo ambas eandem esse plantam non placet, hic rationibus. Dioscorides diuersis capitibus de Buphthalmo & Chrysanthemo non fuerat tractaturus, nisi diuersas censuisset esse plantas. Siquidem Buphthalmon, folia fert similia Feniculo, quae capillacea sunt: Chrysanthemon, multifida. Chrysanthemi caules, oleris vice manduntur, quod de Buphthalmo tacuit. Buphthalmon flores habet Anthemidis, non ideo tamen Chrysanthemo similes. Chrysanthemon herba est tenera & fruticosa, & id in Buphthalmi descriptione praeterit. Quantum vero ad virtutes & effectus attinet, flores dicit Buphthalmi, tumores & abscessus discutere (in genus & certum loquens) cum cera tumores & abscessus discutere: de Chrysanthemo vero, cum cerato tritos, steatomata discutere, particulatim & dubie perscribens. Id causa fuit ut veteres quidam Graeci, qui Buphthalmon & Chrysanthemon unam & eandem plantam existimarent, quicquid de Buphthalmo tertio libro scripsit Dioscorides in hoc caput transp

transportarint. Quod factū eodē est pacto, in Ruta sylvestri, & Hyperico: nec secus, in Asaro, & Bacchare. Ea de re id caput obelo distinxit, Matthioli censurā sequēs, Chrysanthemon copiosum idē vidit, in Montis nigri territorio, quod Illustrissima Senensiū est ditionis, in totū simile picturæ huius emēdati capitis. hac ab indigenis editur, ut Beta, Spinacia, Brassica, cum Bupthalthemon in Italia non viderit. At enim ex eo patet errare eos, qui Chrysanthemon eam Ranunculi speciem faciāt, quæ in pratis nascens, folia profert Apij, & luteos flores.

Ageratum. CAP. XLIX.

NOMENCLATURA.

Græ. Αγρίστον. Lat. Ageraton. Ita. Agerato.

Ageraton fruticosa herba est, palmari longitudine assurgens, simplex, humilis, Origano maxime similis: umbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, Elichryso minor. Nomen ei inditū est, quoniā diutissime flos in sua coloris specie conservetur. Vis decocti feruens. Huius uis & nidor urinam cit, & uulvæ duritias emollit.

Ageratum per totam Thusciam nascitur, caule & floribus Origani, umbella tamen minutis & aureis floribus referta. Inflammationes leniter concoquit & digerit.

Verbenaca. CAP. L.

NOMENCLATURA.

Græ. Περισπερώ ὑπὸ σῖτον.

Lat. Verbenaca recta. Ita. Verminacola.

Peristereon, siue Verbenaca, nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse uidetur, quod colubæ circa hanc perquam libenter uersari soleant: dodrantis altitudine, & interdum amplius adolescit: folia è caule prodeunt incisa & subalbida: ea singulari ramo, radiceq; sola consistare sæpius inuenitur. Folia cum sullo adipe recēti, aut Rosaceo imposita, uulvarū dolores finire putantur. Ignē sacrū illita ex aceto reprimat putrida ulcera cohibet, uulnera glutinat, ueteraq; ex Melle, ad cicatricem perducit.

k 4

Sacr

Sacra herba. CAP. LI.

NOMENCLATURA.

Gae. Ἰεγοβάς. Lat. Verbenaca supina. It. Berbena femina. Gal. Console. Off. Consolida media.



Sacra herba.

Sacra herba, quae & Peristereon nominatur ramulos emittit cubitales, aut maiusculos, angulosos, in quibus ex intervallis folia Quercus, sed minora angustioraq; eisdem divisuris in ambitu, colore aliquatenus caesio: radix longa, tenuis, flores purpurei, graciles. Folia cum radice in uino pota, illitae, aduersus serpentes pollet. Eadem drachma pondere cum Thuris obolis tribus, in uini ueteris hemina, quadragenis diebus, ieiuno ore, contra regium morbum bibuntur. Veteres tumores & inflammatio-

nes mitigant, sordida ulcera purgant. Tota in uino decocta, tonsillarum crustas abrumpit, oris nomas gargarizatu cohibet. Aiuunt si aqua spargatur triclinium, qua maduerit, latiores conuictus fieri. Datur potandum in tertianis febribus, tertium a terra geniculum cum folijs circulantibus: quartanis, quartum. ~~quintis, quintum. sextis, sextum. septimis, septimum. octis, octimum. nonis, nonimum. decis, decimum.~~

Inter Verbenacam rectam & spinam, nil aliud differentia est, nisi quod illa recto est caule, & rarioribus folijs: hac resupinata est caulis

bus, & foliosa: nec aliud soliorū aut florū est, discrimen quāuis quibusdam Verbenaca recta, florem croceū producat, quod nec Dioscorides dicit nec Plinius. Quin & hic in cōmuni vtriq; pictura, glauci floris meninit.

Astragalus. CAP. LII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ασράγαλός. Lat. Astragalus. Ita. Astragalo.
Gal. Cices sauuages.

Astragalus, paruus à terra frutex, folijs & ramis Ciceri similis: flore purpureo, paruo: radice rotunda, Raphani modo, grādi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, ueluti cornua inter se implicatas gustu adstringetes. Nasctur in uentosis, opacis, & in niualibus, eo Memphis Arcadiæ scatet. Aluum sistit radix in uino pota, urinam mouet, uetustis ulceribus, sicca efficaciter inspargitur, sanguinē suppressit, egrè, propter duritiam, tunditur.

Astragalus in vallis Ananiæ montibus nascitur, & in comitatu Goritiano, quo loci radicibus vtuntur ad promouendam urinam. Astragali radices astringunt, & valenter desiccant, Gallis è Ruellio, Rusticum est Cicer: quibusdam, syluestris Cerra.

Hyacinthus. CAP. LIII.

NOMENCLATURA.


Græ. Ὑάκινθος. Lat. Hyacinthus.
Ital. Cipolle canine.

Gal. Vaciet. Off. ignotus.


HYacinthus folia habet Bulbi: dodrantalē, minimo digito tenuiorē, herbacei coloris: comā procumbentē, florum purpureorū plenā, incuruā: radicē bulbaceam quæ, ut creditur, pueris cū uino albo illita, pubertatē coerces, & non patitur erūpere: sistit aluum pota & urinam impellit. phalangiorūque moribus auxiliatur. Semen adstringentiū est, theriacis expectum, Regium morbum emendat, cum uino potum.

k s

Hy



Hyacinthus. 1



Hyacinthus. 2

HYacinthus flore & radice bulbacea, in campestribus, inter segetes, & in memoribus nascitur, & ea causa fuit Gallis nemoralē aut agrestem cepam nuncupādi. Floret cum violis sub finem Martij, & Aprilis initium. Longiusculē perdurant flores, antequam emarcescant. Thuscis, Cipolle canine, aut, saluatiche dicuntur. Hic tamen Hyacinthus, non ille est poetarum, qui ē sanguine Aiadis editus, literis etiamnum huius nomen refert. Namq; (vt eorum habent fabula) rubente est flore, Lilio adsimili. Hyacinthi radix primo desiccantium est ordine, & infrigidantium secundo desinente, aut inchoante tertio. Fructus leniter abstergit & astringit, desiccātq; tertio ordine inter caliditatem & frigiditatem fere medius.

Papa



Hyacinthus. 3



Hyacinthus. 4

Papauer erraticum.

CAP. LIIII.


NOMENCLATURA.

Græ. μήνιον ἢ ῥοιῶς. Lat. Papauer erraticum.

Ita. Papauero saluatico.

Gal. Coquelourdes. Off. Papauer rubrum.

Papauer erraticum, quod Rhæada uocant, uere quidem in aruis cum hordeo nascitur, flore protinus deciduo, unde & nomē apud Græcos accepit. Folia Erucæ, aut Origano, aut Cichorio, aut Thymo similia spectantur, sed longiora, diuisa, scabra: iuncens ei caulis, rectus, cubitalis, asper: flos sylvestris Anemones, puniceus, interdum albus: oblongum
cap



Papauer erraticum.

caput, sed quam *Anemo-*
nes minus: semen rufum: ra-
 dix longa, subalbida, mino-
 ris digiti crassitudine, gustu
 amara. Huius capita quinq;
 aut sex, in uini cyathis tri-
 bus ad dimidias decocta, po-
 tui dabis quibus somnus ex-
 ercendus est. Semina aceta-
 buli mensura ex aqua malsa
 pota, aluum leniter emol-
 liunt. Ad idem praestandum
 mellitis placentulis, & dul-
 ciarys libis admiscuntur. Fo-
 lia cum calycibus illita, in-
 flammationes sanant. Eo-
 rundem sotu & perfusione,
 somnus allicitur.

Papauer satium. CAP. LV.

NOMENCLATURA.


Græ. μήκωρ ήμερ &.

Lat. *Papauer satium.*

Ital. *Papauere domestico.*

Gal. Pauot. Off. *Papauer.*

E satiui *Papaueris* genere, quod *hortense* est, semen in pa-
 nem densatur, qui sanis in usu sit. Eo etiam ex Melle pro
 sesama utuntur, *Thylacitin* uocant: capitulum habet longum,
 & semen candidum. Sylvestre uero, caput infidēs demissumq;
 &



Papauer sativum.

& nigrum semen, quod Pithitis nominatur, nonnullis tamen & ipsum, Rhæas dicitur, quoniam eius scapo lacteus succus emanat. Tertium magis sylvestre, & ad medicinas valentius, multò his longius, productiore capitulo. Omnium in commune natura refrigeratrix. Quare si capita ipsa & folia decoquantur in aqua, somnum fotu conciliabunt. Bibitur decoctum contra vigilias. Calyces cum polenta triti, & cataplasmatibus admisti, ignibus sacris, & inflammationibus prosunt. Tunduntur quoque virides, &

digeruntur in pastillos, qui siccati ad usum reconduntur. Capita quoque per se in aqua coquuntur ad dimidias, iterumq; adiecto Melle, dum humor coeat in eclegmatis lentorem. Id medicamentum in tussi, arteriæ fluxionibus, & cæliacorum affectu, doloris leuamentum præbet: efficacius tamen redditur, addito Hypocistidis succo & Acacia. Papaueris nigri semen tritum cum uino bibitur contra citam aluum, & fæminarum profluvia. In peruiigijs fronti temporibusq; illinitur, ex aqua. Opium eius magis refrigerat, inspissat, siccaturq;. Sumptus Erui magnitudine, dolorem finit, concoquit, & somnum allicit, tussi atque cæliacorum ualetudini auxiliatur. Verùm si copiosius hauriatur, nocet, cum lethargicos efficiens interimat. Ad dolo

dolores capitis cum Rosaceo perfusum efficax est. Aurium dolori, cum Amygdalino, Myrrha, & Croco instillatur. Inflammationibus oculorum cum torrefacto oui luteo proficit: igni sacro & uulneribus cum aceto: podagris, cum lacte mulieris & Croco. Somnum accersit, subditum sedi pro balano. Optimum habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferum, quod facile aqua diluitur, laue, candidum, neque asperum, neque grumosum, quod inter colandum non ut cera coeat, & in sole diffundatur: dein admotum lucernis, non atra luceat flamma: extinctum denique odoris uim conseruet. Sed Opion Glaucio, gummi, aut syluestris Lactucæ succo, adulterant. Verum Glaucio fucatum, in dilutione Croci colorem reddit: Lactucaceo succo fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur: gummi uitiatum, splendet, & infirmum est. Nec desunt qui eò dementia deuenerint, ut adipem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad oculorum medicamenta, dum mollius atque rufius appareat. Diagoras, ut Erasistratus autor est, usum eius damnauit, oculorum lippitudinibus & aurium uitijs infundi uetans. quoniam uisus aciem hebetaret, & soporem gigneret. Addidit Andreas, illitos eo protinus excacari, si non adulteraretur. Mnesidemus usum duntaxat olfactandi probauit, quoniam ad conciliandum somnum conueniret, alioqui nobis ut noxio interdicit. Quæ commentitia esse, experimento deprehenduntur: siquidem effectus, uirium huiusce medicamenti fidem faciunt: quare non alienum fuerit scriptis mandare, quonam modo is excipiat succus. Aliqui capita ipsa folia tundunt, & prælo exprimunt, terentesq; in mortario, digerunt in pastillos. Id Meconium uocatur, multum Opio ignauius, Porro Opij faciundi ratio hæc est: Cum ros in eo exaruerit, cultro decussatum in stellas, penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cutem

tem incidere oportet, lachrymam exeuntem digito in concha-
 astringere, nec, multò post redire, ut concreta inueniatur. Ete-
 nim quæ tum, aut postero die etiam offenditur, in uetere pila te-
 ri debet, & in pastillos cogi. Cum tamen inciditur, retroceden-
 dum est, ne uestibus succus deradatur.

Non ignotum est Papauer erraticum, in campis & segetibus inna-
 scens. huius flores siccæ in puluerem redacti, pectoris dolores sedant
 quos Pontia, Itali vocant. Probè succedens experientia, medicos Syrupi
 ex eo conficiendi rationem docuit, ex horum nunc succo, nunc in-
 fusione, quod bellissimè ægris cedit. Tridentina rustica herba Papaue-
 ris erratici in cibum abutuntur. Quod vsitatum fuit Theophrasti tem-
 pore. Enimvero hoc in capite deprauatus est locus, qui de foliorum pi-
 ctura agit. Nam Rhæadis folia, perperam Origani & Thymi conferun-
 tur. Habet enim Rhæas, Eruca siue Chicorij modo incisa, à quibus lon-
 gissimè absunt Thymi & Origani folia. Error eorum, qui id Papauer
 Papauer cornutum, & Glaucion existimant, satis, non respondentibus
 notis, apertus est. Papauer satium, in hortense & sylvestre, cuius duas fa-
 cit species, à Dioscoride diuiduntur. Tres tamen hæ species, domesticæ
 sunt. Siquidem & olim Plinij tempore serendo erant, & nunc album,
 quod ipsum est Papauer satium ingenti copia in Tuscia nascitur: duæq;
 nigri species, quas ille sylvestres vocat, in Lombardia & Tridentinis
 montibus, spaciosus aruis, fabis insertæ seminatur. Ex eorum semine pul-
 metaria ab incolis fiunt, quæ Pauere, nominant. Hæc cū ad saturita-
 tem ederint, nihilum somnolentiores euadunt. Quod Matthiolo, ut
 lacte, quod eis incisis manat, cum aqua hordei in ardentissimis feбри-
 bus quæ permolesta vigilia, rteretur, pauore defunctus, qui ei à medi-
 cis ingerebatur. Id lac, liquor est Papaueris, & Opium vocatur: succus
 vero, Meconium. Opium quamtunus quarta ordine frigidum statua-
 tur, si tamen è sapore temperamentum, & effectus agnoscuntur, Opi-
 um (quantum deprehendere potuit Matthiolus) gustu amarū est, &
 ore retentum, linguam exulcerat. Quod manifestè ostendit, non
 mediocrem illi caliditatem inesse, & id ipsum coarguit, qui ex eo pro-
 dit acris & grauissimus odor. Hac tamen in re quisque & suam alie-
 nam, tum eruditionem, tum iudicium consulat. Siquidem ea facultas
 magna

magna ex parte adulteratur cū Gaulcio, Opium, poterit accidere, quod è dilutione nascitur, nam tum in aqua croceum refert. Papauera omnia refrigerandi naturam habent.

Corniculatum papauer.

C A P. L V I.

N O M E N C L A T V R A.

Gr. Μήλον κεράτ'ις.

Lat. Papauer corniculatum.

Ital. Papauere cornuto.

Off. Papauer cornutum.

Ger. Veel Nagfamen Veel olmagen oder Moen.



Papauer Ceratites, id est, corniculatum, folia habet cādida, hirsuta, uerba sco similia, in ambitu syluestris Papaueris more serrata caule non dissimili, flore pallido: calyculo Fœnigraci, in corniculorum modum inflexo, unde nomen mutuatur: semine Papaueris, pusillo, nigroq; radice per summa cespitum nigra, crassa. Nascitur in maritimis & asperis. Radici ea uis in est, ut in aqua decocta ad dimidias, coxendicum & iocinoris affectus potu sanet. Prodest his qui crassa quadam, aspera, aut arenosa cum lotio reddunt. Alium leniter purgat semen, acetabulo in aqua mulsâ poto. Crustas emargi

Corniculatum papauer. potu sanet. Prodest his qui crassa quadam, aspera, aut arenosa cum lotio reddunt. Alium leniter purgat semen, acetabulo in aqua mulsâ poto. Crustas emargi

emarginant, illita ex oleo folia: floresq; Argema ac nubeculas iumentorum perunctas abstergunt. Sunt qui Glaucium, hoc Papaueris genere faciliari existimarunt, falsi quadam foliorum cognatione.

Spumeum papauer. C A P. L V I I.

NOMENCLATURA.

Græ. μήκωρ ῥοιῶς. Lat. Papauer spumeum.

Ita. Papauero spumeo.

Aliud papaueris genus Aphrodes, id est, spumeum uocatur, ab alijs Heracleum, caule dodrantali: folijs admodum paruis, Radicula similibus: fructu inter ea candido. Nam herbula alba est, & spumea tota: radice in summo cespite. Legitur æstate semen, cum integrè adoleuit, deciditq; exiccatum. Datum acetabuli mensura in aqua mulsa, uomitione expurgat: priuatim huiusmodi purgatio comitialibus prodest.

Papauer Cornutum magna copia in maritino Senarum tractu nascitur, nempe in territorio Grosseti, Orbetelli, & Herculis portu, & præcipuè in pluribus montis Argentæ locis, & sub Triestinam urbem, quæ non admodum à littore maris distat, vere magna abundantia saxis implantata cernitur. Seruntur in alijs Italiæ locis ad publicum spectaculum, ut in raris & non admodum vulgaribus simplicibus faciliari consuevit. Papauer Cornutum, virtutis est incisoria & abstersoria. Papauer spumeum nostro æuo incompertum, incognitarum plantarum centuriæ adscribetur. Plinius dum in Papauere spumeo Theophrastum reddit, è libri noni cap. 13. perperam Papaueris folia, speciem passerum representare describit, ac de suo addidit, quo ampliorem fidem faceret: Si procul intuearis. Nam Papauer id, Struthij herba folijs comparandum: liniisque per æstatem splendorem non addit, quod Struthij, seu Lanariæ proprium est. Error hinc fluxit, quod pro Struthio, quod Radiculam sonat, Struthon, qui passer est, intellexerit.

Hypecoum. C A P.

L V I I I.

L

Nomencla

NOMENCLATURA.

Gr. *υπνκοον*. Lat. *Hypecoon*. Ita. *Hipecoo*.

Hypecoon, alicui Hypopheon uocant. Nasctur in segetibus aruisq, folijs Ruta, exilibus ramis. Natura eadem quæ Papaueris succo.

Hypecoon Matthiolo ostensum, sub Ruta syluestris centuriam (nam non uni plantæ id nominis herbarij indidere) palmum alta panta, folijs serè Ruta, caule tenero & laui, croceis & pusillis floribus. Infrigidantium ordinis est tertij, paucillū a Papauere distans.

Apollinaris, siue Hyoscyamus.

CAP LIX.

NOMENCLATURA.

Græ. *υοσκυαμος*. Lat. *Hyoscyamos*. It.

Iusquiamæ. Gal. *Hanebanc*. Off.

Iusquiamum.

Hioscyamus, frutex est caules emittens crassos, folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta: flores è latere caulis ordine prodeunt, tanquam Punicorum cytini, scutulis septi seminū plenis, ut Papaueris. Tres eius differentia: una semine nigro, floribus penè purpureis, smilacis folijs, cytini præduris & spinosis: alterius semen subflauū, ut Irionis, flores lutei, folia & siliqua simpliciores. Ambo insaniam gignunt & soporem, ideo in communi usu damnantur. Tertium genus, ut quod mitissimū esset, medici recepere, pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminisq, in maritimis rudibusq, nascens. Cuius occasio si non adsit, rufum usurpari oportet. Niger, ut deterrimus, improbat. Recenti semine, caulibus folijsq, tuis, succus in sole exprimitur, & exiccato humore, usus ad annum usque prorogatur: nā facile corruptionem sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine se-

paratim



Hyoscyamus.

mationes placant. Semen eadem præbet. Tussi, destillationibus, oculorum fluxioni, & doloribus, efficax. Contra mensium abundantiam, & erumpentem aliunde sanguinem, oboli pondere cum Papaueris semine, & aqua mulsa, bibitur. Podagris subuenit. Testibus inflatis, mammisq; tumentibus à partu, tritum ex uino illinitur; alijs quoque cataplasmatibus, quæ doloris leuamentum præstant, admisceri solet. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta, utilissimè imponuntur. Recentia ad mitigandos omne genus dolores oblinuntur Cum uino terna, quaternaque pota, sanant algidas febres quas Epialos uocant. Cocta olerum modo folia, si acetabuli mensura manduntur, mediocrem insaniam gignunt. Idem efficere tradunt, si, colo-

L

2

ulcus

ulcus sentiente, infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

Rvellius sic Hioscyamum distinguit, ut qui in Dioscoride primi est generis, Iusquiamum nigrum vocetur herbarijs. Qui secundi, est generis, Iusquiamum flavum. Qui tertij, album. Is Cordo in rudibus, fossis, & circa oppida pagosque nascitur. Matthiolus in Italia, id solum genus repperit, quod secundo loco, à Dioscoride, sub flavo semine, & floribus luteis describitur, duo quæ restant, quantumvis solleter indagavit, qui ostenderet, neminem inuenit. Id in eo homine mirum, qui eruditus & diligens, nil veritus herbariorum impudentem & indoctam imperitiam, qui tria hæc genera sine delectu, ignavis & credulis ostentant.

Psyllium. CAP. LX.

NOMENCLATURA.

Gr. Ψύλλιον. Lat. Psyllium. Ita. Psilio.

Gal. Herbe a pulces.

Off. Pulicaris.

Psyllion folijs Coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus: sarmentosa sæni modo, in totum heburla: ramis dodrantalibus: coma à medio caule exoritur, duobus tribusve convolutis in cacumine capitulis: in his semine duro, nigro, pulicum simili: unde & nomen. In arvis & incultis nascitur. Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conveniens. Articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, uulsis, illitum auxiliatur. Imponitur in dolore capitis, cum Rosaceo, aqua, aut aceto. Enterocelis infantium, & promi



Psyllium.

prominenti umbilico, illitū
ex aceto medetur. Teritur
acetabuli mensura, & in a-
qua sextario madefactum,
ubi concreuit aqua, illinitur:
siquidem uehementer refri-
gerat, & in feruentem a-
quam deiectum calorem re-
primit. Contra ignes sacros
efficax est. Fama est, si uirēs
domum importetur, non si-
nere in ea pulices gigni. Cum
adipetum, sordida ulcera,
& quæ cacoëthe uocantur,
expurgat. Succus uermicu-
losus auribus, aut fluxione la-
borantibus, ex melle prodest.

Psyllium seu Pulicaris, ubique prouenit, & nota est planta, nomi-
ne à Latinis indito, è semine, cuius color & quantitas pulci si-
milia sint. Psyllium, ea lege sumptum, quam ei tribuit Mesue, proculdu-
bio venenum erit, nimirum quarto ordine calidum & siccum. Galeno,
summè proficuum est semen, secundi in frigidantium gradus, in hume-
tando & desiccando temperatum.

Hortense Solanum. C A P.

LXI.

NOMENCLATURA.

Græ. στρύχνος κήπιος. Lat. Hortense solanum. Ita.


Ita. Solatro Hortolano. Gal. Morelle. Off. Solatrum.

Hortense Solanum, frutex cibus idoneus, exilis, pusillus,
multis concavis alis: folio nigro, maiore quàm Ocimi,
& latiore: fructu rotundo, uiridi, qui post maturitatem nigri-

L

3

cat, aut



Solanum Vesicaria.

cat, aut fuluescit. Herba innocentis gustus. Natura ei refrigerandi. Quare folia ulceribus quæ serpūt, & ignibus sacris, conuenienter cum polline polenta illinuntur. Aegilopia, capitisq; dolores, trita & imposita per se sanant, æstuantis stomacho auxiliantur, parotidas, cum sale detrita, illitu discutiunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum atque ulcera quæ serpunt: cum cerussa, rosaceo & argenti spuma, ad aegilopas: cum pane, infantium adustioni, quam Syria sin uocant cum Rosaceo perfusus proficit. In collirijs, aqua uel oili uicem exhibet, contra acutas fluxiones illitus. Aurium dolori instillatus prodest. Mensium abundantiam sistit, in uellere subditus. Succus fuluo gallinarum cortalium fimo subactus, & linteo appositus, aegilopijs præsentaneo est remedio. Est & aliud Solanum, quod peculiari nomine Halicacabon, id est, Vesicariam, aut Physalida uocant, folijs antedicto latioribus: cuius caules, posteaquam adoleuerunt, prona terram spectant, folliculis orbiculatis, fuluo intus acino, uesiculis simili, rotundo, leui, quo coronarij utuntur, corollis intorquentes. Vim usumq; hortensis Solani habet, uerum cibus nequaquam expectatur. Regium morbum purgat, semine poto, & urinam pellit. Ex utraque herba succus extrahitur, qui siccatus in umbra, reconditur, ad eadem ualens.

Solanum

Solanum somniferum. C A P.

LXII.

NOMENCLATURA.

Gr. στρυχνου ὑπνοτικου. La. & Off. Salanum somni-
ferum. Ita. Solatro somnifero.

Solanum somnifarum, aliqui etiam Halicacabon appellant,
fruticat multis ramis, densis, caudicosis, fractu contumaci-
bus, pinguium foliorum, Cotoneæq; mali simulum plenis: flore
grandi, rubro: fructu in folliculis crocato: radice lingua, sub-
rubro cortice uestita. Nascitur in saxis, non procul a mari. Ra-
dicis cortex, in uino drachmæ pondere potus, somnificam uim
habet, Opio mitiorem. Semen uehementer urinam cit. Corym-
bi duodecim hydropicis dantur: si quid numero adijciatur, alie-
nationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsa, po-
tui data. Succus pastillis inseritur, & medicamentis quæ dolo-
ris leuamentum præbent. Decoctu in uino, si in ore contineatur,
dentium doloribus auxiliatur: radicis succus cum Melle illitus,
oculorum hebetudines tollit.

Manicum Solanum. C A P.

LXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. στρυχνου μανικου. Lat. Solanum furiosum.
Ita. Solato furioso.

Solanum manicon, aliqui Persion, alij Thryon appellauere.
Huic folium Erucæ simile, manus aliquanto, satis Acãtho,
quæ Paderota uocât, accedens. Caules à radice proceros emittit
L 4 decem

decem aut duodecim, ulnæ altitudine adolēcentes: caput in cacumine oliuæ figura, sed ut Platani pilula, hirsutius, uerum maius latiusq; florem nigrum. Postquàm eo exiit, racemus exit rotundus, niger, denis aut duodenis acinis constans, similibus Hederæ corymbis, ut uua mollibus. Radice firmatur cādida, crassa, caua, cubitali. Gignitur in montibus, uento perflatis, & Platanetis. Radix drachmæ unius pondere pota ex uino, facit species uanas, imaginesq; non inuicundas obseruari: sed duplicatus hic modus: ad treis usque dies mentis alienationem affert: quadruplicatus, interimit. Remedio est aqua mulsa copiosius pota, & uomitione reiecta.

EX his quatuor Solani generibus, duo prima tantum nempe hortense, & quod Halicacabon, seu Physalida vocant, nota sunt. Sor-nificū & furiosū incognita, nec magnoperè præstiterit illa cognosse, detri-mētī magis, quā utilitatis allatura. Herba Bella Dōna ob foliorum similitudinem, Solatri genus, antiquis incogniti. Est aliud itidem genus, in territorio Tridentino repperit Matthiolus, fruticosum, longum, fractu contumax, candidum, flexile, quod Perichlymeni in morem proximis se quibuslibet inuoluit, folijs est Solatri, minoribus tamen, contractioribus, lenioribus, & plus in mucronē desinentibus: flos est purpureus, ex his racemi generatur, longiusculi, rubentes, acetoso gustu, ciceris magnitudine: horum succus valenter infigidat & desiccāt, (quod expertus est Matthiolus) maligna ulcera, & plagarum inflammationes. Aliud est Halicacabi genus, quod hortorum cameras, & adium aprica conuestit, folijs longis & incis, flore candido, vesicis Halicacabi, in quib; semen candidum & rotundum includitur, quod vna ex parte cordis effigiem exprimit, coloris nigri. Hæc in cordis affectus valentem esse herbā cōmonstrat, ut Echion, in viperas, ob semen viperinis capitibus simile. Vulgata itidē hortis Stomonias. Solanum refert, fructu viridi, rotundo, circa medium aliquantum cōcano & spinoso, folijs Solatri, odore Opj, floribus cymbalorum forma, suauis odore lilium referentibus.

Dorycnium. CAP. LXIIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Δορύκνιον. Lat. Dorycnium. Ital. Dorycnio.

Doryc

Dorycnion Creteus Halicacabon, aut Caleā uocat. Frutex Oleæ prodeunti similis. Nascitur in petris, nō procul à mari, ramis cubito minoribus, folijs Oleæ similibus colore, minusculis, firmioribus, præter modum scabris, flore candido: siliquis in cacumine, ceu Ciceris, densis, rotundis, quinque intus aut senis seminibus, exigui Erui magnitudine, lauibus, firmis, uersicoloribus. Radix ad digiti crassitudinem & cubiti longitudinē adolefcit, id somniferum esse constat. Copiosius haustum mortē adfert. ~~Ad hæc præterea dicitur quod etiam in præteritis temporibus~~

Dorycnion Cordo, illa est halicacabi species, quæ superius, in semine cordis effigiem repræsentare diximus. Id tamen non nouit Matthiæus, non præteriturus, si ita putasset.

Mandragoras. CAP. LXV.

NOMENCLATURA.



Mandragoras.

Gr. Μαύδραγορας. La. Mādragoras. Off. Ital. Mandragora. Gal. Mandegloyre.

Mandragorā aliqui Antimaliū: alij Circæā uocāt, quoniā uideatur radix ad amatoria cōducere: Duo eius genera: niger, quæ semina existimat Thridacias appellatus, angustioribus folijs, ac minoribus quā Lactucæ, graueolentibus, in terra sparsis. Mala gerit Sorbis similia, pallida, odorata, in quibus semen ueluti Pyrorum. Radicibus inhæret be-

L S ne ma

ne magnis, binis, ternisue, inter se conuolutis, nigris foris, intus albis, crasso cortice uestitis: uerum is Mandragoras caule uiduus est. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis Morion uocatus. Huius folia magna, alba, lata, laxa ut Betæ: mala quam alterius duplo maiora, colore in Crocum inclinante, munde cum grauitate quadam olentia. Horum pomorum cibo, aliquantum opiliones soporantur. Radix, alterius similis, maior & candidior, orbata caule. Succus fit e cortice recentis radiceis tuso, & prælis subiecto: qui insolatus ubi concreuerit, fictili reconditur. Malis quoque succus depromitur, sed aliquanto ignauior. Delibratur radix, & traiectus lino cortex, ad usum suspenditur. Aliqui radices in uino ad tertias coquunt, & defecatum ius seruant: cyathosq; uno utuntur in perurgilijs, & doloribus, & ante sectiones uisionesq; ne sentiantur. Succus duobus obolis ex mulso potus, ut Veratrum, per uomitiones bilem atram pituitaq; extrahit, uerum potu largiore, uita adimitur. Medicamentis ocularibus, & his quæ dolores finiunt, pessis quoque emollientibus, admiscetur. Semioboli pondere inditus, per se menses & partus expellit. Subditus sedi pro balano, somnificus est. Radix Ebur emollire fertur, quæ senis horis cum eo decocta sit: & ad accipiendam, quam effingere optaueris, formam, ipsum facile præstat. Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus, & collectionibus quas ulcera citarunt, cum polenta illinuntur. Duritias omneis, suppuraciones, strumas & tubercula discutiunt, Stigmata sine exulceratione delent, si quinis senisue diebus sensim perfricentur. Folia seruantur in murijs eosdem ad usus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpentium iclibus ex Melle aut oleo, medetur: strumas atque tubercula, cum aqua dissipat: articulorum cruciatus, cum polenta sedat. Fit citra coctionem uinum e cortice radiceis, ad hunc modum: Ternæ minæ in uini dulcis metretam coniunguntur. Dantur ex eo terni cyathi, ijs qui se-

cari

ari aut amburi debent, ut antè dictum est: siquidem nullo tunc efficiuntur dolore, sed ueterno quodam pressu, torpescunt. Mala oporè afferunt olfactu, & etiam si mandantur itè expressus ex his succus: nimio tamè odore percussi, obmutescunt. Semen Malorum potum, uulnas purgat: appositumq; cum sulphure, ignem nò experto, rubra sœminarum profluvia sistit. Scarificata punctisq; nullifariâ aperta radice, erumpens lachryma cauo uase recipitur. Liquamentum aut succo lacteo præstantius est: sed non ubique, ut experientia docet, radices lacteu succum delachrymant. Alii tradunt esse Mandragoram, nomine Morion, in opacis iuxta specus enatû, folijs albi Mandragoræ, minoribus, albis, drantalibus, radice ambientibus: quæ mollis est & candida, paulo maior palmo, pollicemq; crassitudine æquat. Trandunt eam in pane, ossa obsoniõe, drachmæ pondere deuorata, usum rationis intercipere. Obdormiscit enim homo, eo ferè quo comederit habitu, sensus impos, ternis quaternisue, ex quo data est, horis. Hac medici utuntur, cum scindendi, urendiq; necessitas adest. Antidotum esse uolunt radicem, cum manico Solano potam.

Mandragoræ prima & secunda, sponte multis in locis Italicorû montiû nascuntur, & maximè in Apulia & monte Gargano, quod S. Angeli vocat, & inde herbarû cortices & poma in alias Italia regiones exportat. Visitur & in hortis Neapolitanis, Romanis, Venetis, & nunc etiam in Gallijs. Mandragora tertia species in umbrosis nascens, Morion vocant, nostrum seculum non agnoscit. Tertio ordine infrigidat Mandragora, caliditatis tamen & humiditatis particeps. Radicis cortex valentissima, non infrigidat tantum sed etiam desiccatur.

Aconitum. CAP. LXVI.

Græ. Ακόνιτον. Lat. Aconitum. Off. Vua versa.

Aconitum, aliqui Pardalianches, alij Cammoron, alij Thelyphonon, alij Myoelonon, alij Theriophonon uocat. Folia habet Cyclamini, aut Cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta. Caule palmo altû, radix Scorpij caudâ emula

tur,



* *Aconitum.*

stinis exilit, à priore distans, quoniam folia faciat effigie Platani, crebriore diuisura, longiora, & multò nigriora: caulem Filicis, leuem stylum, cubitali altitudine, aut ampliorem: semen in siliquis oblongis recondit. Radices in modum Squillæ marinæ cirrhorum nigrescunt, quibus ad uenationem luporum utuntur. Insertæ siquidem crudis carnibus, & deuoratae, lupos enecant.

Aconitum Pardalianches, quòd Leopardos & Pantheras perimat, vidit & collegit Matthiolus, in prominentibus Tridento locis, hocq; utuntur qui Romæ & Neapoli conficiendis lupis singularem operam nauāt, & in S. Angeli ponte non infrequenter radices vanales offerunt, quòd hæ radices lupos confestim perimant. Non tamen hæ radices, Lupariæ sunt, quæ tertia Aconiti est species, nempe Pontici, quæ & Tri-
den

lentinis, herba della Volpe, quod vulpes, qui hanc carnibus intritā guttarint, perimat. Hæc folia habet pluribus quàm Platanus incisuris liuisa, caulem Filicis, luteum florem, Ranunculi figura, radices nigras. At quæ prostant radices, è candido flauescunt. Verum enim uerò tertia Aconiti species, non ea est planta, quam vulgò, herba Paris, vocitant. quod ex huius herbe notis liquet, maximè cum hæc radice constet cæzilari, è candido flauescens, nullaq; caudæ scorpionis forma, aut Alabæ præplendor in ea visatur. Nam id in Aconito requirit Dioscorides. Ad hæc Aconiti folia, è Theophrasto, Cucumeri, & Pani porcino similia, non in medio caule euascentur, quod in herba Paris accidit, sed hirsuta statim à radice prodeunt. Semen tritico ad simile, nec spicis inclusum, plurimum ab herba Paris distat. Auicennæ itidem Napellus, Aconitum non est. Siquidem is author secundo libro de duobus Aconitis tractat, & horum vnum, strangulatorem Adip, alterum strangulatorem nominant Leopardi, eodem illi significato, quo Græcis, Lycōclonōs & Pardaliāches, & postea proprium caput Napello attribuit, ab illis diuersum. Et quod ad Napelli confectionem attinet, id adeò correctum esse potuit, vt extra detrimentum fuerit. Vel Napelli nomine murem intelligit, qui è radice Napelli vescitur, in altis Anania montibus non semel à Matthiolo perspectum, quiq; verum est antidotum non Napelli tantum, sed totius etiā veneni.


Cicuta. CAP. LXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. Κώνευος. Lat. Off. & Ita. Cicuta.

Gal. Cigue.

Cicuta caulem ædit geniculatum, ut Fœniculi, grandem, in cacumine ramosum: folia Ferulæ, angustiora, graui odora tu: rami, mox umbella: in summo prodeunt: flores quoque albicantes, & semen Aniso candidius: radice non alta, concava. Cicutæ letale uenenum est, suaq; ui refrigeratoria necat. Remedio est uini meraculi potus. Succus exprimitur contusis cacumini bus, priusquam semina & comæ siccescant: qui sole densatur in pastillos. Multus ad medendi rationem usus est aridi. Commode miscetur collyrijs, quæ leuandi doloris gratia temperantur. Ignēs sacros,



Cicuta.

mortifero edentium esu. Calidioribus & regionibus & locus nocentior, ut de Parthia, Asia, & Europa quibusdam tractibus, Candia, Athenis, & Megaris prodidit Plinius. Hæc asinus manducata, torporis intantum conciliat in Thufcia, ut mortuis similes, a se pellē detrahi, non sentiant, ac non raro excitentur, iam medij pelle erugati: frigidissima Cicuta temperatura, id genus alienationis mentis inducit, quod Conion Greci vocant, vel ipsis radicibus ab inscientibus, Pastinacæ loco, in cibum assumptis.

sacros, & ulcera quæ serpunt, illitu restinguit. Herba cum coma trita, & testibus circumlita, libidinum imaginationes in somno compefcit: sed genitale resoluit. Lac puerperarum mammis apposita extinguit: in uirginitate mammæ coercet, & incrementum non patitur. Pueris præstat, ut eorum testiculibû nō sentiētes, intabescant. Efficacissima uis Creticæ, et Magarensi, mox Atticæ, et in Chio et Cilicia nascenti.

Cicuta non ignota planta, tetro se prodit odore adulta, pubescens Apium mentitur,

Taxus. CAP.

LXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. σμίλαξ. Lat. Taxus. Ita. Nasso.

Gal. Yf.

smilax

Smilax à Græcis, Taxus à Latinis appellatur, arbor Abietis magnitudine, & foliorum eiusdem figura, in Italia & Narbonensi Gallia Hispaniæ contermina nascens. Auicula quæ talicæ Taxi baccas deuorant, denigrantur: & qui ederint eas, lem homines, alui profluuio corripiuntur. Narbone tam præsens est ueneni, ut si qui dormiant sub ea, aut in eius umbra subsileant, ledantur, & sexnumero moriatur. Quare de Taxo hæc raduntur, ut ab ea caueamus.

Taxus mortifera arbor, multum differt à Smilace aspera, & leui, de quibus superius diximus, hancq; ideo in venenatas plantas Dioscorides abegit, quo quæ eiusdem naturæ, suo more, etiã una pernisceret. Ex hac arbore materia fit in quotidianos vsus elegantissima. Frondium fumus mures enecat.

Apocynon. C A P.

L X I X.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀποκύνου. Lat. Apocynon.

Ita. Apocino.

Apocynon, siue Cynocrambe, Brassica canina, frutex est viticulis constans, male olentibus, lentis, utiliumq; modo obsequiosis, fractu fere inuictis: folio Hedera, molliore tamen, & per extremum acutius, lento, graui odore: id luteo succo turget. Siliqua, cœ Fabarum folliculari specie, digui longitudine protenduntur: semine intus albo, duro, paruo. Folia cum adipe in panes coacta, canes, lupos, uulpes, & pantheras enecant, in cibo data, & protinus eorum coxendices resolvunt.

Apocynon, Cynocrambe, aut Brassica canina, venenata, & iuxta incognita planta, Galeno, non canes tantum, sed etiam lupos, & homines tollit. Grauiusimum odorem spirat, & ob id admodum calida, attamen non per æquè sicca, quo fit ut summè maturet.

Nerium,


Nerium, seu Rhododendrum.

CAP. LXX.

NOMENCLATURA.

Græ. Νήριον. Lat. Nerium. Ita. Oleandro.

Gal. Rosagine. Off. Oleander.



Nerion.

nerion sunt: hominibus uerò contra serpentium morsus præsidia, è uino pota: eo magis Ruta addita. Imbecillæ etiam animantes, ut pecus & capræ, si aquam bibant in qua folia ea maduerint, moriuntur.

Nerion, Matthiolo in Laci Benaci ripis, inter Myrteta & Laureta nascitur, & in monte Argæteo circa maritimam Senensium orã. Planta visu admodum grata, tum maxime, suis onusta rosis. Nerion Galeno,

Galeno, extra illita, vim habet digerendi, per os sumpta, venenū est, nō homini tantum, sed etiam brutis. Id quod Dioscoridi & Plinio non con-
cinit, nisi dicamus Nerion, serpentium morsibus medicari, haud secus
ac Cantharides, canis rabiosi morsibus prosunt, Euphorbium scorpionis
iclibus, quin & pleraque venena, diuersi generis venenis medicandis
inseruiunt, ut in sexto libro patebit.

Fungi. CAP. LXXI.

NOMENCLATURA.

Gra. μύκητες. Lat. & Off. Fungus. It.

Fongho. Gal. Champignon.

Fungorum differentia duplex: aut enim manduntur, aut
perniciales sunt. Multis de causis uenenosi gignuntur, ubi
videlicet clauis ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcor ad-
fuerit: aut si iuxta serpentis cauernam, arborē sue, quæ priuatim
pariunt noxios fructus, erumpant. Continēt qui tales sunt, ne-
scio quod strigmentum, ocncretamq, pituitam, terraq, eruti, quā
celerrime computrescunt, atque marcere uitiuntur. Sed qui ue-
neno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam habent: lar-
gius tamen sumpti nocent, & agrius concocti strangulant, aut
cholera morbum citant. Remedio est Nitri potus, aut lixiuū
cum acidamuria, aut feruescētē saturia, aut Origani insculum.
debellantur etiam gallinacei fimi potu ex aceto, aut eiusdem de
linctū cum Melle multo. Corpus alunt, sed agrē dissoluuntur,
cum magna ex parte integri ipsi, cum recrementis alui re-
iciantur.

Fungorum non malus est cibus, sed si temerē mandantur, in discri-
mē adducunt: nā & nocentiū, & probatorū multa, & diuersa sunt
species. Horum plus præ tota Italia ferax est Thuscia. Siquidem annis
singulis à primo Aprilis imbre emergunt, odore eximio, gustui gratissi-
mi, & innocui. Hos Prignoli incola vocant. Suilli primo incoquuntur a-
quæ, post fruguntur. Venenati eo agnoscuntur, cum dilutus in eis rubor
apparet, rancidus aspectus, linidus intus color, rimosa stria, pallidum
per ambitum labrum. Tutissimi qui rubent callo, minus diluto quàm

M

Boletis

Boletis rubore, & qui è rubis & carduis vere nati, rotunditate clusili. Eos Spinulos, Prunulos, & Cardeolos appellant, Merulos, Fusios, Campestres, Crepitus lupi. Fungi innocetiores arborum ramis innascuntur. Inuenti Neapoli lapides, qui defossi, & terra aliquantum operti, tum superiecta aqua tepida, intra quatrduum fungos producerent. Ij eam ob causam summa diligentia asseruantur. Fungus vt potè frigidus & humidus, iunctam habet facultatem venenatam & mortiferam, præcipuè qui cariosus est.

Colchicum. CAP.

LXXII.

NOMENCLATURA.

Græ. κόλχικον. Lat. Colchicon. Ita.

Colchico. Gal. Tuechien. Off.

Hermodactylum.



* Colchicum. 1.



Colchicum. 2.

Colchi

Colchicon, aliqui Ephemerum, sunt qui agrestem Bulbum uocant, autumnu exitu florem adit Croci, candicantem: ab eo tempore folia Bulbi, sed pinguiora: caulem palmo altum, ferentem rufum semen: radicem foris è nigra rufescentem, quæ delibrata, candida & mollis spectatur, lacteo succo madet, atque gustatu dulcis inuenitur. Bulbus eius mediam habet rimam, fissuramq, qua flos erumpit. Plurimum in Messenia, & Colchis enascitur. Ea comesa, Fungorum more, strangulando enecat. Hanc autem depinximus, ne à quoquam imprudenter pro Bulbo deuoretur: mirum enim in modum saporis uoluptate imperitos allicit. Remedio sunt eadem quæ Fungis, bubulum etiam lac potum auxiliatur. Itaque cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

Ephemerum. CAP.

LXXIII.

NOMENCLATURA.

Græc. ἐφίμερον. Lat. Ephemerum. Ita. Iride.

saluatico. Gal. Lis sauuage.

Ephemerum, alicui syluestrem Irim appellant, folia habet Lilyj, sed tenuiora: caulem parem: florem candidum, amarum: semen molle: radicem unam, digitali crassitudine, longā, astringentem, odoratam. Nascitur in syluis & opacis. Huius radix dentibus præcipua, si decocto colluantur. Folia in uino cocta, discutunt tumores, & tubercula, quæ nihil adhuc humidi contraxerunt.

Ephemerum Colchiocum, è Coldide, Ephemerum inde nomen sumpsit, quod presentaneo adeo sit veneno, ut infra unius diei spatium hominem enecat. Porro Ephemerum Colchicum, ipsum est Officinarum Hermodactylum. Officinarum dixi, quoniam verum non sit Hermodactylum: quodque verum Colchicum, à vero Hermodactylo longissime desideat. Errori fundamētū præbuit Serapio, qui cōfusane de

M 2 Ephemero



Ephemerum.

Paritoire. Off. Parictaria.

Ephemerum & hermodactylo eodem capite pertractat, huicque titulum indit, de Hermodactylo. Contra Græci, è quibus extracta Ephemerum & Hermodactyli nomina, diuersis de eis capitibus tractauere.

Helxine, id est,
Muralis herba.
CA. LXXIIII.

NOMENCLATVRA.

Græc. ΕΛΞΙΝΗ. Lat.

Helxine. It. Vetricola. Gal.


Helxine nascitur in parietinis, sepibus & macerijs. Folia ei Mercurialis insunt, hirsuta: cauliculi subrubentes, & circa eos ueluti semina aspera, adhaerentia uestibus. Folia refrigerandi spissandiq; naturam habent, qua ex causa sanant illitu sacros ignes, adusta, condylomata, panos incipientes, tumores, inflammationesq;. Succus eius cum Cerussa, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt, commodè illinitur, imponiturq; podagris cum hircino adipe, aut cerato Cyprino. Veterem tussim emendat instar cyathi haustus. Tonsillis inflammationem sentientibus utiliter & gargarizatur, & oblitur: aurium dolorem cum Rosaceo instillatus leuat.

Alfine.

Alſine. CAP. LXXV.

NOMENCLATVRA.

Gra. Αλσίνη. Lat. & Off. *Alſine*. Ita.
Centone. Gal. Mouron.

*Alſine.**Alſine minor.*

Alſinem, aliqui Anthyllion, nonnulli Myosota uocant, quoniam muscutorum aures folia imitantur. Lucis opacisq̃ gaudet, unde Alſine dicta est. Hæc erat eadem quæ Helxine, nisi humilior esset, & folijs longioribus, nec hirsuta: cū teritur, odorem cucumis reddit. Vim refrigerandi adstringendiq̃ obtinet. Oculorum inflammationibus cum polenta illinitur. Succus aurium doloribus infunditur. Quin & emēdat omnia quæ

M

3

Helxine

Helxine, id est, muralis herba.

Differt hæc Helxine, que Muralis & Parietaria, ab Helxine, Cysampelo, atque ipsarum nomen differentiam produnt. Namque ambæ notæ sunt. Helxine Vitreolaria abstergendi astringendique virtutem habet, humiditati infrigidanti coniunctam. Alsine plures sunt species, licet vnius tantum mentionem faciat Dioscorides. Eiusdem est cum helxine facultatis.

Lens palustris. C A P.

LXXVI.

NOMENCLATURA.

Græ. φακὸς ἐπὶ τῷ τελευτῶν. Lat. Off. Lens. palustris. Ita. Lenticularia. Gal.

Lentille de mer.

Lens palustris inuenitur in aqua non fluente, muscus Lenticula similis, refrigeratoriæ naturæ. Propter quod conuenienter collectionibus, igni sacro, & podagris illinitur per se, & polenta. Glutinat & procidentia puerorum interanea.

Lens palustris aquis stagnantibus & resedibus innatat ceu muscus lupusillis & astrictus solijs, semine lentem referens, infrigidantium secundi est ordinis.

Semperuium, seu Sedum. C A P.

LXXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. Αἰζῶν μέγα. Lat. Off. Semperuium. maius. Ita. Sempreuino maggiore.

Gal. Ioubarbe.

Semperuium magnum ideo nominatur, quoniam perpetuò folia uireant: cuius caules cubiti altitudinem implent, interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, uirentes, Characiæ Tithymali modo infecti: folia pinguia, carposa, longitudine pollicari, in cacumine linguæ similia, alia in terram cō-

hexa,

*Semperuium.**Paruum.*

uexa, alia in capite stantia inuicem, ita, ut ambitu effigiem imitentur oculi. Nascitur in montibus, & testaceis. Supra aomicia etiam seritur, Eius uis refrigerare, & astringere: medentur igni sacro, nomis, ulceribus quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni, podagris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti, in doloribus, cum polenta aut Rosaceo perfunditur. Datur in potu contra phalangiorum iclus, dysenteriam, aluiq; profluvia. Teretes tineas potus in uino excutit. Subditus in uellere, mulierum abundantiam sistit. Succus oculorum lippitudinibus, sanguinis uitio conceptis, inungitur. *Semperuium paruum* in petris, parietinis, & maceris, necnon scrobibus opacis nascitur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, crebro foliatis: exilibus folijs, rotundis, pinguibus, mucronatis: caule à medio emicante, palmum alto, umbellam herbidosq; flores &

M 4 *tenuis*



Aizoon maius.



Minus.

tenues gerente. Folia eisdem cum priore uiribus prædita sunt. Tertium uidetur Sēperuini genus, quam aliqui Andrachnen agriam, aut Telephion uocauerunt, Romani Illecebram: pusillis, crassibusq; folijs, hirsutis, Portulacæ proximis. Nascitur in saxis. Vis ei excelsatoria, acris, exulcerans. Illita cum axungia, strumas discutit.

Semperuium maius & minus omnibus nota sunt. Maius tamen, Speculariter Semperuium vocatur: minus, Vermicularis. Huius duæ sunt species: Vna, quæ florem præfert luteum, folia pusilliora & duriora: hæc pro mare habetur. Altera, folijs constat longiusculis, rariusculis, & crassiusculis, flore candido, hæc semina ducetur. Tertia Semperuini species non omnibus cognita. Hæc cognouisse videtur Cordus, quæ & solæ ex omnibus Aizoi generibus, calidum habere tēperamentū nec esse Vermicularē asseuerat. Matthiolo nondū in Italia demonstrata, quæ nus Sēperuinū maius & duas Vermicularis species nullibi nō perspexerit.

Vmbilicæ

Vmbilicus Veneris. CAP.

LXXVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Κοτυληδόν. Lat. & Off. *Vmbilicus Veneris.*Ital. *Ombilico di Venere.* Gal. la Rondellete.

Cotyledon, siue *Vmbilicus Veneris*, folio est in acetabuli formam tornato, ineuidenter concauo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest: radice Oliuæ modo rotunda. Succus cum uino circumlitus, instillatusque, contacta genitalia nudat: inflammationibus, sacris ignibus, strumis, pernionibus, illitus iuuiliatur. Stomachi ardorem refrigerat. Folia cum radice comesa, calcalos frangunt, urinam cient, hydropicis ex Melle dantur. Herba utuntur ad amatoria. Est & alterum genus eiusdem, *Cymbalion* aliqui uocant, pinguibus folijs, latioribus, ligulari modo densis, circa radicem medium oculi ambitum describentibus, ut in maiore *Semperuino*, adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores & semina *Hyperici*: radice maiuscula. ~~Herba~~

Vmbilicus Veneris copiose per omnem Thusciam muris vetustis & saxis innascitur, huius folia, quod operculis vasculorum similia sint incole Cupertionole uocant. Hæc docti quipiam *Cymbalariæ* putant, sed falso. Namque hæc comæ modo è parietibus dependet, caule tenui, folio hederaceo, plurimum per ambitum mucronato. Cotyledonis alterum genus, *Cordus Crassulam* maiorem putat, crassius & carnosius est folijs, Aizoë maioribus, quæ per hyemem simul cum caule exarescunt. *Vmbilicus Veneris* infigidat, repercutit, abstergit, & discutit.

Vrtica. CAP. LXXIX.

NOMENCLATURA.

Gr. Ακάλιφν. Rat. *Vrtica.* Ital. *Ortica.*Gal. *Ortie griesche.*

M s

Duo



Urtica. 1.



Urtica. 2.


Duo Urtica genera: Sylvestris, asperior, latioribus, nigrioribusq; folijs: semine Lini, sed minore: altera non æquè aspera, minuto semine. Folia utriusque illita, canis morsibus, addito sale, medentur. Gangrænas, carcinomata, sordida ulcera, & quæ cacoëthe uocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesq; sanant. Lienosis cum cerato imponuntur. Faciunt ad profluvia narium, cum succo trita, & naribus indita. Menses ciunt eadem, detrita cum myrrha, & imposita, prociuentes uulvas, recentia contactu resilire cogunt. Semen potum ex passio, uenerem stimulat, uulvæ ora patefacit. Cum Melle delinctum, orthopnææ, lateris & pulmonum inflammationibus prodest, thoracem expurgat. Erodentibus medicamentis admiscetur. Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt, urinas mo-

nent

ent, inflammationes discutiunt, decocta cum ptisana, vitia pectō
is extrahunt, Mulierum menses euocant, cum Myrrha modico
ota. Inflammatione turgentem uuam, gargarizatus succus ex-
rimit.

VRtica genera duo facit Dioscorides, quæ satis nota sunt. Præter
hæc in Italia nascitur & tertium genus, folijs pusillis, & caule
breui. Hæc, quam alie duæ, vehementius adurit. Est etiam inter Vrticæ
genera, quam Cardiacam vocant. Vrticæ semen excalfacit, & tenuius
est partium, concoquit, & expurgat.

Galiopsis. CAP.
LXXX.



Galiopsis.

NOMENCLA-
TVRA.

Græ. γαλίopsis. Lat.
Galiopsis. Ita. Ortica fetida.
Gal. Orties mortes. of.
Vrtica mortua.

Galiopsis frutex in to-
tum caulem & folia
habet Vrticæ, leniora, &
quæ grauem odorem trita
reddant: flore purpureo, te-
nui. Nascitur circa sepes, ædi-
ficiarũ areas, ac semitas ubi-
que. Folia, caules, semẽ, suc-
cusq̃, duritias et carcinomata
dissipât: strumas, panos, et pa-
rotidas discutiunt. Oportet bis
die

die tepidū ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fovere. Ad putrescentia, gangrenas, & nomas, cum sale efficaciter eliminantur.

CAliopsim Itali Vrticam fetidam vocant, siquidem attrectata putet mirum in modum, folijs & caule Vrticis similis, non adurentibus tamen. Errant qui Galiopsim, Scrofulariam, aut Millemorbiā existimant, quod florem habeat, hianti mustella persimilem. Siquidem folia non admodum ad Vrticam accedunt, nec odore est ingrato. Nodosa radix, qua maximè medicinam facit, praterita à Dioscoride, subindicat eum non de Scrofularia intellexisse. Natales etiam non conveniunt. Nam Scrofularia circa aquarum fossas, & riuulorum ripas nascitur, non circa sepes, & edificiorum areas, ac semitas. Ruellio, Galiopsis, Agripalma est, vteri suffocationis singulare remedium.



Gallion.

Gallion. C A P.
LXXXI.

NOMENCLAT-
TVRA.

Græ. γάμιον. Lat. Gal-
lion. Ita. Gallio. Gal. Petit-
muguet.

Gallion nomen ex eo
traxit, quòd in con-
trahendo lacte, coaguli vice
impleat: ramulum foliumq;
habet Aparinæ simillimu,
rectum: florem in cacumine
luteum,

ateum, tenuem, densum, copiosum, odoratum. Flos igni ambu-
is illinitur. Sanguinis profluvia sistit. Cerato Rosaceo Gallion
dmiscetur, in solatum usque dum albescat, lassitudines reficit.
Radix uenerem concitat. Nascitur in palustribus.

Gallion, A parine, aut Rubia minoris similis, vbique circa publicū
iter nascitur, flore nunc candido, nunc luteo. Lacti additum, pro
oagulo est. Hoc in locum herbe, quam, Presura, Itali vocāt, uti possunt
ui caseum dulce consciunt. Vim habet desiccandi, cum aliquanta acri-
tonia.

Senecio.

CAP.

LXXXII.

NOMENCLATURA.



Senecio.

Græ. Ἡριγέρων. Lat. Se-
necio. It. Cardoncello. Gal.
Senecon. Off. Scutū cæli.

Senecio cauliculo est cubi-
tali, subrubro: folijs con-
tinuis, diuisura Erucæ, sed mi-
noribus multo: luteis flori-
bus, qui celeriter dissecti na-
nescunt in pappos. Nomen ue-
rò sibi uendicauit, quoniam
flores capillorum ritu, uere
canescāt: radice supernacua.
Nascitur maxime in mace-
rijs, & circum oppida. Folia
cū floribus refrigerant. Qua-
re illita cum uini modico, uel
per sese, testium & sedis in-
flam

flammationes sanant. Quin & ex manna Thuris medentur cum reliquis uulneribus, tum ijs quæ nerui acceperunt. Illi per se cum aceto pappi, idem munus præstant: uerum recentes epoti strangulant. Totus caulis, si coctus in passo potui detur, stomachi dolores à bili contractos persanat.

SEnecio, ubique etiam in veteribus muris nascitur, nec cognitu difficultis. Nomen ei Græci indidere, quod uere canescat. facultatis est mixtæ, refrigerantis, & per æquè quadantenus digerentis.

Thaliætrum. CAP. LXXXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. θαλίκτρον. Lat. Thaliætrum. It. Argentina.

Gal. Argentine. Off. Cotula fetida.

Thaliætron folia Coriædri habet, pinguiora paulo, caulem Rutæ, in quo folia. Quæ trita, illitu antiqua ulcera ad cicatricem perducunt. Nascitur maxime in campestribus.

Thaliætron Argentina ne sit, nec asseuerare, nec impugnare audeat Matthiolus, at Cordus herbam Germanis dictam, Heyleblat, asseueranter pronuntiat. Hac rustici in Saxonia maxima curant uulnera, nullo adiutore medico. Nascitur in campestribus & pratis non ita humentibus. Trium eius generis differentia, deprehensu faciles. Desiccatur Thaliætrum sine morfu.

Marinus muscus. CAP.

LXXXIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. βρυον θαλάσσιον. Lat. Muscus marinus. Ita. Corallina. Gal.

Coralline.

Marinus muscus nascitur in scopulis, testaceisq; haud procul à mari, gracilis, capillaceus, caulis expers. Præcipua ei spissandi uis, & collectiones cohibendi, & podagras, quas refrigerare opus sit.

Coralli

Orallina, qua ad conficiendos in infantibus vermes vtuntur, verus est Muscus marinus. Nam rupibus & testis adhaerens, & circumplexus corallo, haud aliter quam muscus cortici, & arborum ramis innexus, reperitur. E terrea & aquea substantia componitur, vtraque frigida, quod gustum in eo astringentium parit.

Fucus marinus. CAP.

LXXXV.

NOMENCLATURA.

Gr. φύκος θαλάσσιον. Lat. Phycus marinus. Ita.

Phuco marino. Gal. Fueillet de mer.

Phuci marini generibus, quoddam latum, & alterum sublongius, & rubens: tertium candidum, nascens in Creta, candidum valde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia enim habent refrigeratorem, non podagrae modo, sed etiam inflammationibus, in cataplasmatibus efficaciter utilem. Verum his humidis convenit, priusquam exarescant. Nicander, puniceum duersis serpentes dedit. Hoc fucus quidam putant mulieres suum colorem mentiri, cum tamen sit radícula eiusdem nominis, qua se fucant.

Phucus marinus, Alga nobis incognita genus. Nempe non illa est Alga, qua Venetis, vitris, ne rumpantur, interferitur. Phucus ita humidus est, e mari extractus, secundo ordine desiccatur & in frigidat, & acerbis aliquantum in se continet.

Potamogeton. CAP. LXXXVI.


NOMENCLATURA.

Græ. ποταμογείων. Lat. Fontalis.

Ita. Potamogeto.

Potamogeton, solum Betæ simile, hirsutum, paululum supereminens extra aquam. Refrigerat & inspissat: pruriginibus utile, & contra veterum ulcerum nomas. Nomen ex eo inditum est, quod palustribus & aquosis enascatur.

Potamo



* Potamogeton.

Semper uiuo similis, ni maiora haberet folia, quæ refrigerant: sanguinē qui defluit à retribus, pota sistunt: uulnera quæ inflammationem minantur, intumescere non sinunt: ignibus sacris & tumoribus ex aceto illinuntur.

Stratiotem aquaticum qui referente plinio Libri 24. cap. 18. in Aegypto tantum inundatione Nili nascitur, huius in locis perquirere superuacaneum fuerit. Aizoö similis planta, folijs licet maioribus.

Stratiotes millefolium. C A P.

LXXXVIII.

NOMENCLATVRA.

Græ.

Potamogeton lacis & paludibus innatans, folio Betae uisitur. Id in Ananiae uallibus lacubus, & uidit, & legit suis manibus Matthiolus. Restrigit & infigidat Polygoni modo, essentia tamen, quam polygonum, crassioris.

Stratiotes. C A.

LXXXVII.

NOMENCLATVRA.

Græ. στρατιώτης. Lat. Stratiotes. Ita. Stratiote.

Stratiotes in aquis nascens, isdem supernatat, & sine radice uiuit: unde cognomentum traxit, Herba

Græ. Στρατίωτης ὁ χιλιόφυλλος.

Lat. *Stratiotes Millefoliū*. Ita. *Stratiote Millefoglio*.

Gal. *Millefueille*. Off. *Millefolium*.

Stratiotes *Millefolium* exiguus frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit, folijs auicularum pennas imitantibus, breui admodum dissectoq; foliorum exortu. Folia sylvestre *Cuminum* simulant, præsertim breuitate atque scabritia, breuiora paulo, densiore umbella, & pleniore. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modum *Anethi*: flores paruos, candidos. Nasitur in asperis agris, præcipuè circa semitas. Eximij usus ad ulcera uetera, recentiaq; profluentem sanguinem, & fistulas.

Stratiotes *Millefolium*, incultis inuascens, dubiò procul ea planta, quam nullibi non *Millefolium* vocant, nimirum nulla est quæ refragetur nota. Nam *Asinum Daucum*, *Ferulacea* & *umbellifera* herba, nihilum ad *Stratiotem Millefolium* accedit. *Aquaticus Stratiotes*, frigidus est & humidus, terrestris leuiter astringit.

Verbasum. CAP. LXXXIX.

NOMENCLATURA.


Græ. φλόμ. Lat. *Verbasum*. Ital. *Tasso barbato*.

Gal. *Bouillon*. Offic. *Tassus barbatus*.

Verbasum differentias summas habet duas, hoc nigrum, illud album: in quo mas & fœmina intelligitur. Fœminæ igitur folia sunt *Brassica*, pilosiora multò, & latiora, candida: caulis albus, cubicalis, aut amplior, subhirsutus: flores albi, aut ex luteo pallecentes: semen nigrum: radix longa, gustu acerba, crassitudine digiti. Nasitur in campestribus. *Verbasum*, qui mas appellatur, oblongius, albis folijs, & angustioribus, tenui caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latioreq; cõstaret folio. Sylvestre folia fert *Saluia*, altas uirgas & lignosas, & circa eas ramulos quales *Marrubiū*: flores luteos,

N

auri



Verbascum. 1



Verbascum. 2

auri amulos. Sunt & Phlomidis duae, hirsutae, rotundis folijs, humiles. Tertia Lychmitis appellatur, ab alijs autem Thryallis, folijs ternis, aut quaternis, uel paulo pluribus, asperis, crassis, pinguibusq, apta ad lucernarum lumina. Radix priorum duarum adstringit: quare quod magnitudine ludicrum talum aequet, in alui profusio conuenienter ex uino datur. Decoctum ruptis, conuulsis, fractis, antiquae tussi, auxiliatur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbascum cui flos aureus, capillos tingit, & quocunque abijciatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, siderata ulcera, ex uino & Melle illinuntur, cum aceto quoque uulneribus medentur. Contra scorpionum ictus sunt auxilio. Syluestris folia ambustis igni sunt cataplasmata. Aunt in fo-
ly



Verbascum. 3



Verbascum. 4

lijs eius, quam scæminam dicimus, aridos ficos omnino non putrescere.

Verbasci genera tria: duo domestica, & vnum sylvestre, quod solijs constat Salvia, floribus aureis, omnibus nota sunt. Phlomidès duas, & Ichnitis in Italia haud dum à Matthiolo perspecta. Is Ruellij opinionem infirmit, censentis Phlomidès, duas illas esse plantas, quæ Brachæ cuculi, & Primulæ veris dicuntur. Nam solijs, quæ rotunda vni, alteri longa sunt, Verbascum non exprimunt: eorundem laor, cum hirsuta esse debuerint, Dioscoridis delineationi cōpugnat. Porrò de flore illo, herbæ Paralysis, aureo, verisque incuntis nuntio, nulla à veteribus metio facta est, nō praterituri si cognoscent. Verbasci astringunt, desiccant, & abstergunt. Tryallis Cordo hortulana est planta.

N 2

Aeth

Aethiopis. CAP. XC.

NOMENCLATURA.

Græ. Αἰθιοπίς. Lat. Aethiopis. Ital. Aethiopide.

Aethiopis folia habet Verbasco similia, perquam hirsuta, densa^q, in orbem circa radicem imam redacta: caulem quadrangulum, scabrum, similem Apiastro, aut Arctio, multis concavum alis: semen Erui magnitudine, geminum, in uno conceptaculo: radices ab eodem cespite numerosas, longas, glutinosas gustu, quæ sicca nigrescunt durantur^q, ut cornua possint uideri. Plurima nascitur in Ida monte Troadis, & in Messenia. Auxiliatur purulentis excreationibus, ischiadicis, pleuriticis, arteriæ scabritijs, decocta radix & pota: quin & cum Melle, eclegmatis uicem præbet.

Aethiopis nec apud nos enascitur, nec ex Aethiopia adfertur, nec ex Ida Troadis aut Messenia, ideoq; ignotam plantarum classem subitura.

Arction. CAP. XCI.

NOMENCLATURA.

Græ. Αρκτηιον. Lat. Arction. Ita. Arctio.

Gal. Bardane. Offi. Lappa.

Arction, aliqui potius Arcturon uocant, similis est Verbasco folijs, nisi quod hirsutiora & rotundiora sunt: caule longo, molli: semine Cumini, paruo: radice tenera, alba, dulci^q. Decocta cum semine radix in uino, dentium dolorem mulcet, si contineatur ore decoctum. Ambusta perniones^q fouentur eodem. Bibitur aduersus coxendicum dolores, & stranguriam, è uino.

Errant qui Lappam minorem (quæ verum Dioscoridis est Xanthion) pro Arctio accipiunt. Quò sit ut ignota sit planta, Arction. Arctij semen tenuium est partium, modicè desiccet & abstergit.

Perse

Personata, siue Lappa. CAP. XCII.

NOMECLATURA.

Græ. Αρκεύου. Lat. Personata. Ita. Lappa maggiore.
Gal. Gloteron. Off. Bardana maior.



Personata folia habet
Cucurbitæ, maiora
& hirsutiora, & crassio-
ra: caulem albicantē, quan-
quā & interdum uidua
caule reperiatur: radice in-
tus cādida, foris nigra. Hæc
drachmæ unius pondere po-
ta, cum pineis nucibus, puru-
lenta & cruenta extusien-
tibus auxiliatur: trita dolo-
res à cōtorsionibus artuum
contractos, illitu sedat. Folia
utiliter antiquis ulceribus il-
linuntur.

Personata, siue Lappa.

Arcion, Personata, & Bardana idē esse, ipse Dioscoridis cōtextus
indicat: hac tamen alia maior est, qua rustici Itali, cum sub ar-
dente canicula fruges aut demetunt, aut triturant: pileos quo astum-
fallant, mentiuntur. Aparinem herbam, Rubia (quam vocant) similē,
& qua Speronella vulgo Italico dicitur, ac inter lentes nascitur, Lappā
non esse, satis liquet. Arcion digerit & desiccet, & modicè astringit.

Petasites. CAP. XCIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Πετασίτης. Lat. Petasites. Ita. Petasite.

N 3

Peta



Petasites pediculus cubito maior, crassitudine pollicis, à quo prægrande folium, galeri modo amplum, ceu fungus dependet. Contra Phagedenas, & ulcera quæ cacoethe uocant efficaciter illinitur.

Petasites, non est ea Lappa maioris species, quæ in fossarum ripis nascitur, sicut nec in Italia à Matthiolo reperta, cū Ruellius dicat sibi in Gallia notam, & rusticis, Bardanum maiorem nominari.

* Petasites.

Epipactis. CAP.

XCIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. *Επιπакτις*.

Lat. *Epipactis*.

Ital. *Epipactide*.

Epipactis, ab alijs Helleborine, parua herba, fruticosa, exiguis folijs. Iocinoris uitij utilis, & contra uenena pota.

Histo

Historia Epipactidis, in Dioscoride, breuitas, ignotam penè hanc herbam facit. A tenim nō dubitat Matthiæus, quin in Goritia-
io comitatu copiose nascatur, quod inibi pusilla quapiam herba nasca-
tur, quæ omni sua effigie, Epipactidis historiam representet. Cate-
rum Plinio, Elleborina, quod Elleborum nigrum referat, dicitur.

Capnos, seu Fumaria.

CAP. XCV.

NOMENCLATURA.

Græ. καπνός. Lat. Fumaria. Ita. Capno.

Gal. Fumeterre.

Off. Fumus terre.



Capnos, seu Fumaria.

Fumaria fruticosa her-
bula est, pratenera, Co-
riandri similis: folis candi-
dioribus, undiq, numerosis,
cineracei coloris: flore pur-
pureo. Huius succus clarita-
tem facit oculis, delachry-
mationemq, : unde nomen
traxit. Illitus cum gummi,
euulsas palpebras renasci
prohibet. Commanducata
herba biliosam urinam tra-
hit.

Capnos, Fumaria nomen
accepit, quod huius suc-
cus claritatem oculis faciat. Ver
opportunitate legende Fumariae
tempus, & eliciendo succo. Ad
calidū temperamentū inclinat,

N 4 quod

quod tamen frigiditas infrenet, dominetur licet in exterioribus partibus frigiditas: verum in sicco, secundam classem subintrat. I. axat, confortat, & praparat. Qualitatis est amara, & pauxillum acris, & nulatenus acerba.

Lotus urbana. CAP. XCVI.

NOMENCLATURA.

Græ. Λωϊός ἡμερ.

Lat. Lotus urbana.

Ital. Loto domestico.

Gal. Trefle odoriferant.

Offic. Trifolium odoratum.

Lotum urbanam, alij Trifolium uocant. Nasclitur in hortis. Extractus succus, addito Melle, oculorum argema, nubeculas, ceterasq; caligines discutit.

Syluestris Lotus. CAP. XCVII.

NOMENCLATURA.


Græ. Λωϊός ἄγρι.

Lat. Syluestris Lotus.

Ital. Loto saluatico.

Syluestris Lotus, quam Trifolium minus appellant, plurimum in Lybia gignitur, caule bicubitali, & saepe maiore, alis multis: folijs Trifolij pratensis: semine Fœnigraci, multo minore, gustu medicato. Vim calfaciendi & leniter astringendi obtinet. Vitia cutis in facie, maculasq; cum Melle peruncta expurgat. Trita per sese aut cum Maluæ semine, in uino aut passo, bibitur aptissimè contra dolores, qui uesicam male habent.

Eloti satiuæ floribus, prastantissimum & iuxta expertissimum fit oleum in totius corporis & prapriè iuncturarum dolores, & callos veteres, quod Andacota sicut & herbam, Arabes uocant. Syluestre huius genus, hæctenus incognitum, siquidem exoticum est: nempe



* Sylvestris Lotus.

in Lybia nascens. Lotus satina modicè digerit, & desiccat, temperatè calida & frigida. Lybica semen, calidum est secundo gradu, & aliquantum absterforiū. Hac Lotus, Officinarum est Melilotus.

Cytisus. CAP. XCVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. ΚΥΤΙΣΟΣ.

Lat. Cytisus.

Ital. Trifoglio cauallino.

Cytisus, frutex est albus in totum, ut Rhamnus, ramos spargens cubito longiores, in quibus folia Fœnigraci, aut Loti trifolia, minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita Erucam olet, gustataq; Cicer sapiunt. Folia refrigerant. Tumores inter initia discutiunt, si cum pane trita illinantur. Decoctum potu urinam ciet. Nonnulli, quod apes alliciat, prope aluearia serunt.

Cytisus copiosissimè in Italia nascitur, effigiem referens pictura Dioscoridis & Plinij. Italarum quidam, Trifoglio cauallino: alij, Tribolo nominant. Surculos profert frutex cubitales aut maiores, quibus folia supereminent, veri Trifolij similitudine, dorsulo in medijs prominente. Is color candidus, & tritis Eruca odor subolet: & commandu-

N 3

catis

catis, sapor profilit cicerum recentium. Flores incani & muscosi propellunt racemorum forma, quibusdam lutei, alijs candidantes. Is in Galijs etiā prouenit, in segetibus præcipue hordaceis. Satio autumnæ vel vere fieri potest, semine subactō solo, & in areas digesto. Si desit, cacumina disponuntur, ita ut quoqueuersus quatuor pedum spatia distent. Terram stercoratam desiderat. Si pluuia non inceserit, rigandum erit.

Lotus Aegyptia. CAP. XCXI.

NOMENCLATURA.

Græ. Λωτὸς Αἰγυπτίῳ.

Lat. Lotus Aegyptia. Ita. Loto d'Egytto.

Est & in Aegypto Lotus, quæ in campis flumine inundatis prouenit, caule Fabæ flore paruo, candido, Lilio simili, quem tradunt occidente sole comprimi, occludi, ad ortum autem aperiri: adduntq; caput ipsum uespera aquis condi, & ad exortum solis emergere. Caput quale Papaueris, maximum: & intus grana ceu Milij, quæ Aegyptij exiccant, & in panes cogunt. Radicem Lotus hæc habet mali Cotonei similitudine, quæ cruda coctaq; manditur: decoctaq; lutei oui qualitatem exhibet.

Lotus Aegyptia peregrina & nostro cælo incognita planta, à Serapione cum duobus supra descriptis Lotis, Andacoca nominatur. Ex huius semine tuso oleum exprimitur, quo Arabum sectarj in dolores iuncturarum utuntur. Id tamen eius qui è floribus seu semine Loti urbana elicitur, virtutem non extenuat, probato hæcenus successu.

Millefolium. CAP. C.

NOMENCLATURA.

Græ. μυριόφυλλον

Lat. Millefolium. Ital. Millefoglio.

Gal. Millefeuille.

MYriophyllum, siue Millefolium, caulis est tener, singularis, unica nixus radice: plurimis folijs, lauibis, Fæniculo

ulo similibus: unde nomen accepit. Caulis flauescit uarius, ac elui ex industria deliniatus. Nascitur in palustribus. Vulnera ecentia ab inflammatione uindicat, siue uel uiride, uel siccum ex aceto oblinatur. Pracipitatis in potu, cū aqua & sale datur.

Millesfolium hoc, admodum a Stratiote Millesolio dissidet. Nam Millesfolium vulgare in asperis agris, & circa semitas nascitur, non in palustribus, ut Myriophyllum. Adde his, quod illius folia nihil ad seminum accedunt.

Myrrhis. CAP. CI.

NOMENCLATURA.

Græ. *Μυρρίς*. Lat. *Myrrhis*. Ita. & Offic. *Cicutaria*.

Gal. *Perfil d'Asne*.

MYrrhis simillima est *Cicuta*, caule, folijsq. Radix ei oblonga, mollis, rotunda, cibo non insuavis. Quæ pota in uino, *Phalangiorum* moribus auxiliatur. Cit menstrua, & partus secundos, purgatq. à puerperio fœminas. Subuenit & phthysicis cocta in sorbitione. Aiunt quoque eandem bis die tærue potam, ex uino, in pestilentia salutare esse, & ne morbi contagia sentiantur, obstare.

MYrrhis *Cicutarie* apud herbarios nomen sumpsit, quod figura proximè ad *cicutam* accendat. Nascitur inter arbusta, ideoq. summo perè cauendū, ne eius loco, palustris *Cicuta*, quæ mortifera est, accipiat. Atenim falluntur qui *Angelicam* uulgo dictā, plantam pro *Myrrhide* accipiunt. Siquidē *Angelica* folia fert *Pastinaca* domestica similia: *Myrrhis*, *Cicuta*. Nec uero simile est, si *Dioscoridi* *Myrrhis* *Angelica* fuisset. eximum illū & aromaticum, quem *Angelica* radix exhalat, odorem silentio præteriturum. Ceterum cum *Charephyllum* supra demonstrauerimus esse *Gingidion*, falluntur qui illud *Myrrhidem* existiment.

Myagrum. CAP. CII.

NOMENCLATURA.

Græ. *Μύαρον*. Lat. *Myagrum*. Ita. *Miagro*.

Gal. *Carmeline*.

Myag

MYagron, aliqui Melampyron uocant, herba est surculacea, folijs Rubiæ, pallidis, tripedanea. Semen oleosum, Fænogreco simile. Quod contusum igni torrent, perunctisq; uirgis ad lucernarum lumina utuntur. Hoc pingui, scabritias corporis leuigari, atque expoliri constat.

Quamuis Camelia aut Camamina Gallica quadantenus Myagrum referat, satius est tamen de hoc dubitare, quam precipitato iudicio sententiam proferre. Sitque oleo Camelia parando, non medicina, donec compertus quid obueniat.

Onagra. CAP. CIII.

NOMENCLATURA.

Græ. ονάρη. Lat. & Ital. Onagra.

Onagra, siue Onothera, aut Onuris, frutex est arboris instar, prægrandis, Amygdalino folio, sed latiore, Lilio non dissimili: flore Rosaceo, magno: radice candida, longa: cum siccata est, unum olente. Nascitur in montibus. Aqua in qua radix maduerit, in potu data, feras mitigat, & cicures facit. Ilitu quoque tetra ulcera mulcet.

Onagra quantumuis ad mitigandas & cicurandas feras summam utilitatem allatura fuerit, nullus est tamen qui commonstret.

Cirsium. CAP. CIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. κίρσιον. Lat. Cirsum. Ital. Cirsio.

Gal. La Buglosse.

Offic. Buglossa.

Cirsium, caulis est tener, duorum cubitorum, triangulo similis: ab imo foliola, Rosæ speciem referentia: anguli spinosi, per interualla molles: folia Buglosso similia, maiora, subcandida, modicè hirsuta, partibus extremis aculeata. Cacumen caulis orbiculatum, hispidum, in quo capitula purpurea, quæ soluantur in lanugines. Radicem huius, loco laboranti adalligatam

gatam, dolores uaricum sedare Andreas scripsit.



CYrsion, simpliciariorum bona pars, vulgarem Buglossam existimant, sed obstat, caulis rotundus, qui in Cirsio quadrangularis est: Sicut nec foliola ab imo, Rosarum specie, spinosis angulis producit, verum longa & continua: nec flores in lanuginem solvuntur, sed integri sere decidunt, succidaneo in folliculis semine. Prestabit igitur hanc aut ignotam, aut Seplasiam Buglossam ducere.

* Cirsium.

Aster Atticus, seu Inguinalis.

CAP. CV.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀστὴρ Ἀττικὸς.

Lat. Aster Atticus. Ital. Aster Attico.

Gal. La petite Aspergoutte.

Aster Atticus cauliculus lignosus, florem in cacumine habens purpureum, luteumque, & in ambitu diuisum, Anthemidis modo, capitulum: sed ea quæ caulem ambiunt folia, stellæ modo radiata, oblonga, hirsuta. Feruētī stomacho, oculorum



Aster Atticus Inguinalis.

uisura, folijs sit per ambitum stella more radiatis. Notissima est planta, nasciturque in aspera excultis. Porro Inguinalis dictus, quod non si illinatur tantum, sed et si gestetur, inguinis affectibus proffit. Mixta est, uti Rosa facultas. Si quidem refrigerat, non tamen vehementer, digerit, & exiccat. nempe quod ei sit amara qualitas. Cordus in contextu capitis legit, florem purpureum & luteum, quod pro locorum diversitate, nequaquam flores nunc purpureos, nunc luteos proserant, sed quod utrunque colorem simul eodem flores ostendant: medijs, luteis, radios exprimentibus, purpureis. Visa planta id discriminis auferet.

Isopyrum. CAP. CVI.

NOMENCLATURA.

Græ. ἰσοπύρον.

Lat. *Isopyrum.* Ital. *Isopyro.*

isopy

Isopyron aliqui Phasiolon ob similitudinem uocant, quoniam
 folium quod est Aniso simile in pampinos torquetur. Capitu-
 li sunt in summo caule tenuia, plena seminis, Melanthij gustum
 mitantis. Contra tussim, & cetera pectoris uitia seme ex aqua
 malsa bibitur: hepaticis, & sanguinem excreantibus utile.

[Sopyrum hodie incognitum, natura sui horti sepibus inclusit, hicque
 nisi ea prodente, acutum delutescet.]

Viola purpurea. C A P.

C V I I.

NOMENCLATURA.



Viola purpurea.

Græ. Ιοϋ. Lat. Viola.

Ital. Mammola. Gal.

Violletes.

Viola alba pupurea fo-
 liū habet Hedera mi-
 nus minus ac nigrius tene mul-
 to dissimile. Cauliculus à ra-
 dice medius p̄dit, in quo flo-
 sculus suauiter olēs purpureus
 opacis & asperis nascit. Re-
 frigi

frigerandi naturam habet. Folia per se & ex polenta illinuntur aptissimè stomacho æstuanti, & oculorum inflammationibusq; sedisq; procidenti.

E Violarum purpurearum sunt genere vt in totum persimiles, candidæ, quæ inodora, frigidis in locis proueniunt: & sub æstatem, Maio & Iulio mensibus, flores, supernè purpurei, in medio candidi, infernè lutei, plurimum ad Violas purpureas accedentes, nullo licet odore. folijs hac planta constat rotundis, & per ambitū serratis, longitudine tamen ab incremento contracta, caulibus triangularibus, quadantenus striatis, & intus concavis, quibus paribus spacijs nodi superimminēt, è quorū concavo cauliculi exeunt, qui flores producant. Hac laccea vocatur. Nec tamen idèò compertum, ea ne sit laccea, qua recentiores in intestinaliū rupturas vtuntur. Viola facultatis sunt, aquea & infigiditantis. Ex harum infusione sapius repetita, terrestri in eo separata substantia, laudatissimus fit syrupus, ad soluendam aluum. Dosis in pleuresi, & alijs pectoris affectibus, quatuor uncie.

Cacalia. CAP. CVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Κακάλια. Lat. Cacalia. Off. Liliū conuallium.

Gal. Muguet.

Cacalia, quæ Leontice uocatur, folia fert magna, alba: è quibus medius caulis emicat, reclus, albus, florem ferens Robori aut Oleæ similem. Nascitur in montibus. Radix in uino madefacta, aut Tragacantha, delinctu, aut manducatu, per se, tussibus, scabritijs arteria, medetur. Grana quæ post excussū florem innascuntur trita, & cum cerato illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

Cacaliā, vt apparet, eruditiorum nullus agnouit. Huic recentiores perperam, Agrestis Carui, nomen indidere.

Bunium. CAP. CXI.

NOMENCLATURA.

Gr. Βούνιον. Lat. Bunium. Ital. Nauone saluatico.

Gal. Herbe au charpentier.

Bunium

Bunion caulem edit quadrangulum, procerum, digiti crassitudine, in quo ramuli minutis folijs ac floribus scatent: folia proximè radicem, Apio similia, longè tenuiora, Coriandrinis proxima: flores Anethi: semen odoratum, Hyoscyaminus. Urinam ciet, excalfacit, secundas euocat, lieni, uesicæ, renibus utile. Tam humidi quàm sicci, expressi, succi caulibus, folijs, radicibusq, usus inualuit ex aqua mulsa. Pseudobunion palmi altitudine fruticat in Creta, folia ramulosq, Napi ferens, acri gustu. Tormina, atque stranguriam, laterumq, dolores, sanant quaterni rami eius poti in aqua: illiti quoque cum sale & uino, tepentes, strumas discutiunt.

Bunion in aruis incultis nascitur, præciq, in locis frigidis. Pseudobunion Cretæ peculiaris planta, nihil mirum si nobis ignota est.

Chamæcissus. CAP. CX.

NOMENCLATURA.

Græ. Χαμαίκισσος. La. Chamæcissus. Ita.

Chamecisso. Gal. Lierre terrestre.

Off. Hedera terrestris.

Chamæcissos folio est Hedera, tenuiore, longiusculo, ramulis à radice quinque senisue, dodrantalibus, foliosis: flore Violæ albæ simili, candidiore, ac tenuiore, gustu supra modum amaro: radice tenui, candida, inutili. Nascitur in cultis. Bibunt conuenientissimè ischiadici folia, tribus obolis in aquæ cyathis tribus, tricenis quadragenisue diebus. Eodem pota modo, senis aut septenis diebus, regium morbum purgant.

Chamæcissos aut humilis Hedera, nō ea est planta, quæ Seplasia eodem nomine, Hedera terrestris, appellatur, maxime cum de spica tauerit Dioscorides, & nota sibi inuicem non respondeant.

Chamæleuce. CAP. CXI.

o Nomenclatura

NOMENCLATURA.

Græ. χαμαιπέυκη. La. Chamapeuce.

Ita. Chamapeuca.

Chamapeuce lumborum doloribus propitia est, herba ui-
rens, incuruis folijs, surculisq³, flore Rosaceo.

Chamapeuce (nam ita, & doctè à Plinio legendum) & non Chama-
leuce, folio constat Piceæ simili, pusillo, inflexo, inflexis & ramulis,
flore rosæo, non temerè a quouis cognita, licet Cordus Germanicè Se-
nutammen, nominet. Proinde sustinendum parumper de ea pronuntian-
di iudicium.

Buglossum, seu Lingua bubula.

CAP. CXII.

NOMENCLATURA.

Græ. Βουγλωσσον. Lat. Buglossum. Ita. Bor-

ragine. Gal. Borrache.



Buglossum.

Buglossum nascitur in
campestribus, & sa-
bulosis. Iulio mense colligi-
tur. Aiunt eam quæ treis
thyrsos emittit: cum semine
& radice tritam, potamq³,
cōtra tertianos horrores pro-
desse: quæ quatuor, ad quar-
tanos. Ea in uino decoquitur.
Herbam abscessibus utilem
esse uolunt. Verbasco simile
est, folium in terra sparsum,
nigrius, asperum, bubulas i-
mitans linguas. Quod in ui-
num deiectum, animi uolu-
ptates auget.

Buglossum

Bvglossum per Apuleium Lucanis, Corrago dicebatur. B. in, C. me-
tathesi. Et id verum est, Borraginem vulgarem, ipsissimum esse Bvg-
glossum. Huius Borraginis species est, quam Officina Bvglossam vocat.
Seritur nostro hoc tempore in hortis Italicis, Bvglossi genus allatum ex
Hispania, quod Bvglossum domesticum vocant, magis ad Discoridis de-
scriptionem accedens, quam Borrago hortulana. Bvglossum tempera-
mento est calido & humido, & vino iniectum, animo letitiam & vo-
luptatem parit.

Cynoglossum. CAP.

CXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. κυνόγλωσσοῦ. Lat. Cynoglossum.

Ita. Cynoglossu. Gal. Langue de chien

Off. Lingua canina.

Cynoglosson folia latifolia Plantaginis habet, arctiora, mi-
nora, languinosa: caule racat, & humi sternitur. Proue-
nit in sabuleis. Folia Cum suillo adipe ueteri, medentur morfi-
bus canum, alopecijs, & ambustis. Emollit aluum, decoctum
herbæ ex uino potum.

Cynoglossam videre est in macris per Gallias, & arenosis locis, mul-
tum a Seplasia dissidentem, ramusculis bicubitalibus, flore purpu-
rea, semine in lappaceis umbilicis rufo & exili. Errant qui Lycopsin
& Cynoglossam, pro eadem planta accipiant.

Phyteuma. CAP. CXIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. φύτευμα. La. & Ita. Phyteuma.

Phyteuma folia habet Radiculæ, minora: copiosum semen,
perforatum: radicem paruum, tenuem, per summa terræ
nitentem: ~~quædam autem dicunt eam videri in montibus~~
~~et in rupibus.~~

0 2 Phyteu

Phyteuma amatoris apta lenocinis, à nobis ignorabitur, nisi hanc Venus quæpiam, vel Cupido promouerint.

Leontopodium. C A P.

C X V.

NOMENCLATURA.

Græ. λεοντόπودیον, Lat. Leontopodio,

Ita. Leontopodo. Gal. & Off. Cruciata.

Leontopodium diuim digitorum herbula est, folia ferens angusta, longitudine ternum quaternumue digitorum, hirsuta, quæ iuxta radicem lanosiore flocco canescunt, capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri: semen usque adeò spissa lanugine inuolutum est, ut saepe fallat: radice parua coheret, ~~quæ iuxta radicem lanosiore flocco canescunt, capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri: semen usque adeò spissa lanugine inuolutum est, ut saepe fallat: radice parua coheret,~~

Leontopodium, suis artibus sufficiens Cupido, ab hominis notione: sustulit. Siquidem cogi Cupidines nolunt, ducere assueti.

Hippoglossum. C A P.

C X V I.

NOMENCLATURA.

Græ. ιππόγλωσσον, La. Hippoglosson. Bislingua,

off. Vnularia. Gal. Langue

de villain,

Hippoglosson frutex est folia habens Rusci tenuis figura, & spinosam comam, & in summo, seu linguas & folijs exeuntes. Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit. Malagmatis radix succusq; admiscetur.

Satis id conuenit Hippoglosson, & Italarum Bonifaciam eandem esse plantam. At Bonifaciam & Alexandrinum Laurum diuersas esse plantas, in capitis de Lauro Alexandrina annotationibus commostrabitur. Hippoglosson valentissima in matricis affectus planta. Foliorum radicisve puluis coctearis mensura præbitus, matricis suffocationi præsentia



* Hippoglosson.

Gal. L'Oeil de chat.

sentaneum est remedium. Hæc hernia, intestino in scrotum de-
eidente, eximie subuenit, hausto
sub orientem solem, huius cum
carnium iure puluere, verum in-
testinum primis diebus ex hernia
erupturum videtur, sed postea
consolidatur, & in pristinum sta-
tum redit, ideoq; bracciis hæc ex-
terior eruptio coercenda. Blasie et-
iam auxiliatur.

Antirrhinum.

CAP. CXVII.

NOMENCLA-
TVRA.

Gr. ἀντίρρινον. Lat.
Antirrhinō. It. Antirrhino

Antirrhinon, alij Anarrhinon uocant, herbam caule &
folijs Anagallidi similem: flore albæ Violæ, purpureo:
deoq; sylvestris Anagallis nominata est: semine utuli narium
simili. Tradunt perunclos ea, cum oleo Lilino, uenustiores fieri:
nec ullo medicamento lædi posse, si quis appensum gestet.

Antirrhinon maioribus est quàm Anagallis folijs, cætera simile, in
campestribus & asperis nascitur. Facultate Asteri Attico, licet in-
ficaciori, propinquum.

Catanance. CAP.

CXVIII.

0 3

Nomenclatura

NOMENCLATURA.

Græ. κατανάγκη. Lat. & Ita. Catanance.

EX eo genere una, folia Coronopi habet, longa, radicem, Iunci modo, prætenuem: capitula sena, septenarie, in quibus Erui semen inest. Crescens in terram flectitur, & se contrahit ad speciem unguium milui exanimati. Altera Mali patua magnitudinem explet, radice exigua Oliuæ magnitudine: folijs quoque Oliuæ colore, & figura, mollibus, diuisis, humi inclinatis: semen, ut Cicer, minutum, in uirgulis dependet, punicei coloris, multis foraminibus pertusum. Vtramque narrant in amatoria expeti. Thessalica mulieres his uti traduntur.

THessalici, in amore, veneficijs usurpata Catanance vtraque species, nihil refert si a nobis non cognoscatur. Nam id iuris in homines Cupido exercet, ut herbariis nihil necessum habeat auxilijs vii.

Tripolium. CAP.

LCXIX.

NOMENCLATURA.

Græ. τριπόλιον. Lat. Tripolion. Ita. Tripolio.

Gal. & Off. Turbith.

TRipolion in marinis nascitur locis, quæ allidit unda, recedensq; dimittit, neque in mari, neque in sicco: folio Glafstii crassiore: palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius, ut tradunt, flores colorem ter die mutant, manè candidi, meridie purpurei, serò punicei conspiciuntur: radice alba, odorata, calidi gustus. Quæ drachmis duabus in uino pota, aquam, urinamq; per aluum extrahit. In medicamenta digeritur, quæ venena arcet.


Scrapio

Serapionis & Auicennæ Turbith: (quod ipsum est Tripolium) non est Turbith Officinarum. Nam licet hoc candidum sit & solutiuum, nullam tamen odori fragrantiam, nec gustui acrimoniam reddit. Mesue Turbith, ex Aëtuario, Alypi est radix, atque adeò ipsum Turbith, quod hodie Seplasia vtuntur. Quod verò ex S. Angeli monte Turbith asseritur, Thapsia, & per aëtuarium, Pityusa est radix. Proinde verum Dioscoridis Tripolium & perinde Serapionis & Auicennæ Tribith, nobis erunt incognita. Attamen Tripoly radix, temperamento est tertio ordine acri & calido.

Adiantum. CAP. CXX.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀδίαντον. Lat. Adiantum. Ita. Adianto.
Off. Capillus Veneris.



Adiantum



Politrychon.

0 4

Adian

A Dianton, Polytrichon, pusilla gerit folia: similia Coriandri, in summo incisuris diuisa: cauliculi, quibus exoritur nigro colore nitent, prætenues, palmum alti: radice supernacua, neq; caulem, neque fructum, neque florem profert. Decoctum herbae potum, prodest spirandi difficultati, suspiriosis, licni, & felle suffusus, & urinae difficili, calculos frangit, aluum sistit, serpentium morsibus auxilio est. Contra stomachi fluxiones in uino bibitur. Secundus ciet, & menstrua. Sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur, alopecias densat, strumas discutit, furfures, & manantia capitis ulcera, ex lixiuio emendat. Defluentes capillos continet, cum Ladano & Myrtino, & Susino, aut Hyssopo, uinoq; . Decoctum eius cum lixiuio, & uino infusum, idem praestat. Coturnices & gallinaeos pugnatiores facit, in cibos eorum additum. Seritur gratia utilitatis pecorum: circa ouilia. Umbrosis, & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

Filicula, seu Trichomanes.

CAP. CXXI.

NOMENCLATURA.

Gr. Τριχόμανες. Lat. Trichomanes. Ital.

Trichomane. Off. Polytrichon,

Trichomanes nascitur eisdem in locis, quibus Andianton Filici simile, sed exilius: folijs Lenticulae, tenuibus, in ordinem utrinque digestis, aduersis in se, in ramulis tenuibus, acerbis, fusco colore splendentibus. Eadem quae & Adianton praestare posse constat.

Qui Theophrasti caput decimum tertium, libri de historia plantarum septimi legerit: Plinij, in libri vicesimi secundi capite vicesimo primo, errorem deprehendet, qui Adianti, quod in eodem auctore est secundum genus, Trichomanem, seu Filiculam faciat, quae seplasis est Polytrichon. At enim Adiantum nigrum Theophrasti, illa est planta, quam seplasia pro Capillo Veneris, & usq;

et visu et nomine pducunt. Nigrū autē, quod nigro colore cauliculi splē
escāt, dicitur. Albū vero, quod cū Trichomane, et vulgari officinarū
polytricho, veteribus muris, et fluniorū cavernulis et humētibus tu-
culis innascitur, folijs in viridi obscuris, minutim incis, et per luteas
inferiori parte maculas distinctus, caule gracili, in viridicādicāte, fir-
io et flexili. Id quidā Rutā murariā, alij Saxifragiā vocāt. Nec ob id
imē ea erit Saxifragia, qua inter saxa crūpit. Siquidē Epithymo simi-
s, capillacea in totū est frōde, qd' multū a cādido Adiātō distat. Adiātū
medio est inter frigidū et calidū tēperamēto, desiccāt tamē discutit et di-
erit. Filicula, gustu est, ex acri, dulci, et amaro permixto, et in radice
cerbo.

Xanthium, siue Lappa. C A P.

C X X I I.

NOMENCLATURA.



Xanthium.

Gr. Ξάνθιον. Lat. Xan-
thion. Ital. Lappola
minore.

Gal. Glouteron. Off.
Lappa inuersa.

Xanthium nascitur
lato et pingui solo,
et lacubus exiccatis, caule
cubitali anguloso, pingui, pro-
deuntibus ex eo crebris alis.
Folia Atriplicis habet, inse-
la, Nasturtium odore imi-
tantia: fructum grandis Oli-
ue modo, rotundum, et ut
Platani pilula, spinosum, qui

O S con

contactu uestibus adhaerescit. Is antè collectus quàm perfectè siccescat, tunditur, & sicili vase reconditur. Flauos autem facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox caput, Nitro antè perfrictum, illinatur. Alij in uino tidunt, & ita asseruant. Semen aptissimè tumoribus imponitur.

X Anthion publicis vbique itineribus & lacubus exiccatis nascitur. Phasganion Galenus vocat, & eius semini vim digerendi tribuit.

Aegilops, siue Festuca. CAP.

CXXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Αἰγίλοψ. Lat. Aegilops.

Ita. Egilopa.

A Egilops herbula folia tritici habens, sed molliora, in summo capite semina bina ternaque rubra, quibus arista quasi capillacea exeunt. Illita cum farina herba, ægilops medetur: duritias discutit. Succus farinae admixtus siccatur, & eorundem gratia reponitur. Bromus herba Aegilopi similis, exiccatoria vim habens, decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, & iuricolato par modus Mellis adijcitur: rursus incoquitur, dum liquidi Mellis crassitudo fiat. Linteum eo humore imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam ulcerum efficax est. Aliqui tritam Aloen addunt, & eo modo utuntur. Cum siccis Rosis cocta in uino, grauem oris halitum emendat.

A Egilops hordeaceis & speltaceis campis innascitur. Atenim inter hanc, & Auenam, quauis longè spectantibus nihilum distare videantur, grandis est differentia. quod facile cuius, qui caput hoc, cum secundi libri cap. octogesimosexto contulerit, manifestum erit. Aegilops vim habet maturandi, quod è gustu, qui leniter acris est noscitur.

Glaux. CAP. CXXIIII.

NOMENCLATURA.

Græ.

Græ. γλαυξ. Lat. Glaux. Ita. Glauco.

Gallicum nomen non
habet.

Glaux Cytiso & Lenticula folijs similis, quæ supernè ui-
rent, auersaq; candidiora spectantur: ramuli à terra exi-
unt quini senue, tenues ab radice, dodrantem alti: flores ceu
iolæ albæ, purpurei exeunt, minores tamē. Nascitur iuxta ma-
r. Coquitur cum hordeacea farina, sale & oleo in sorbitione,
drenocandam extincti lactis ubertatem.

Glaux, Ruellio, ut apparet, & Cordo cognita, huicque non in ma-
ritimis tantum nasci, sed in siccis etiam, & apricis montibus, &
bruptis vjs inuenitur. Sed cum neuter vernaculum nomen proferat, è
uellio coniicit Matthiolus, illum de herba quam Itali, Galegam, &
utam caprariam vocant, intelligere. At flores obstant & ramuli, qui
on raro bicubitales sunt: & natales differunt: Glaux in maritimis na-
scitur, Galega abundè vbique prouenit.

Polygala. CAP. CXXV.

NOMENCLATURA.

Græ. πολυγᾶλον. Lat. & Ita. Polygala.

Polygala palmi altitudinem petit: folijs Lenticula, gustu ad-
stricto. Quæ pota, lactis abundantiam facit.

Polygala, nisi aliquo prodente Mercurio, incognita in Lacteo orbe
delitescet. Nā Dioscoridis & Plinij in ea describenda breuitas, omne
iudicium sustulit.

Otyris. CAP. CXXVI.

NOMENCLATURA.

Græ. οσυρίς. Lat. Osyris. Ita. &

Off. Linaria.

Osyris frutex est niger, ramulos ferens tenues, lentos, fra-
gilq; cōtumaces: et in his folia, quaternaria, quina, senariaue,
ceu Lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescentia. Decoctū
eius potum, inuat arquatos,

Osyris,

O Syris, quod caule & folijs Linum exprimat, Linaria vocatur, & quāvis floris nihil memnerit Dioscorides, is tamen aureus est. Oſyris amara est, aperit, & laxat.


Aspera Smilax. C A P.

CXXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. σμίλαξ τραχεῖα. Lat. Smilax aspera.

Ita. Rono cervino.



* Smilax aspera.

lexipharmaca, id est, ad ea medicamenta, quibus uenena arcentur.

Smilax aspera, folia habet Perichlymeni: sarmēta tenuia, multa, Rubi modo aut Paliuri aculeata, arbores scandit, ab imo ad summa perreptans, se conuoluens eis. Fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustumq; leniter mordent. Nascitur in palustribus & asperis: radice dura, crassaq;. Folia & acini, & ante & post epoti, uenenorum antidota sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lucem editis, quid ex his tritum propinetur, nulla postmodum uenena nocitura. Inciditur etiam ad alexipharmaca,

Læuis

Læuis Smilax. CAP.

CXXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. σμιλαξ λεία. Lat. Læuis Smilax. Ita. Vilucchio maggiore. Gal. Pommes de merueilles.



Smilax læuis.

Læuis Smilacis folia Hederæ similitudinē habent, molliora, læuiora, tenuiora. Huius sarmenta nullis horrent spinis. Conuoluitur arboribus, ut prior: fructum parit Lupini modo nigrum, exiguum, floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac Smilace, quadam topiariorum arte, tentoria contra æstus molestiam faciuntur. Folia per autumnum decidua. Semine cum Dorycnio poto, ternis singulorum obolis, uaria & tumultuosa in somnis obuersari traduntur.

Smilax aspera, Hederæ genus est, Cilicia cognomine, importata ex ea terra in Græciam. Abundè in Thuscia nascitur, & in syluis frequens arboribus circumplicata cernitur. Nec minori abundantia Smilax læuis in Thuscia prouenit. Hæc officinarum est Volubilis. Hic admonendi lectores, ne Dioscoridem & ex eo Galenum erroris insimulent, quod duas has diuersas cum vna sint, plantas faciant. Nec de temperamenti æqualitate contendant, aut Galenum in eo cæcutiisse existiment. Vt vero longius

longius rem repetam, Phasioli, Itali fagioli vocant, candidi sunt, rubentes, lutei, & diuersis variegati coloribus. Candidi, pusilliore quam ceteri grano, aliorum luminum more per campos seruntur. Rubentes, lutei, & variegati, seruntur in hortis, & ad fructum, & ad umbracula. Hortenses hi Phasioli, qui diuersis coloribus constant, & ab Italis, fagioli Turcheschi, nominantur, vera sunt, Smilax hortensis, quæ à Dioscoride sub secundi libri finem descripta, nec aliud à Dolichis Theophrasti & Galeni. Porro diuersa ab ea est, Smilax aspera, quæ Italis, Hedera spinosa, & Rouo ceruino. Et leuis, Viluchio maggiori. Hæc fructum ferens Lupini modo nigrum, flores candidos & orbiculatos, non admodum ad Smilacem hortensem accedit, quæ siliquas profert scnigræci, semine inæqualis coloris, magna tamen ex parte flauescens. Ceterum medicinae symmistis Dioscoridi & Galeno obloqui, num in ipsum Iouem tonantem cum Socrate opprobere est? Nec prudentioris modestia rem sibi non cognitam, alijs incompetam facere.

Ruscus. CAP. CXXIX.

NOMENCLATURA.

Græ. μυρσίν & γρία. Lat. Sylvestris Myrtus. Ita.
Pongi topi. Gal. Houx. Off. Bruscus.

Sylvestris Myrtus, aliquibus Oxymyrsine, aut Myrtacantha, Latinis Rusconi appellatur. Folium fert Myrti, latius in formam lanceæ mucronatum. Bacca per maturitatem rubescit, rotundæ, à medio folio dependentes, osseo intus nucleo. Cubitales ramuli ab radice exeunt, utiliū modo lenti, fractu contumaces, foliosi. radice Graminis simili, acerba, & subamara. Folia & bacca in uino potæ urinam cient, menses pellunt, uesicæ calculos frangunt, stillicidio urinæ medentur, dolores capitis sanant, et regium morbum. In asperis & precipitiis locis nascitur. Decoctum radice in uino potum, eosdem præbet effectus. Cauliculi recentes, Asparagorum iace, in cibo sumuntur: amari aut sunt, sed urinam mouent.

Ruscum

¶ Vscum spinosam plantam, Itali ab effectu, Pongii topi vocant, quod fibulis carni salsa circumpanfiliis, foliorum aculeato mucrone ea mures inhibeat. hac planta similem sui arborem habet, & Græcis uestris Myrtus, à foliorum similitudine dicitur. Iampridem is explorator, qui Cubebas, Oxymyrsinæ fructus putaret.

Laurus Alexandrina. C A P.

C X X X.

NOMENCLATURA.

Gr. δ' ἀφρη ἀλεξανδρείᾳ. Lat. *Laurus Alexandrina*. Ita. *Lauro Alexandrina*. Gal.

Laurier d'Alexandrie.

[*Laurus Alexandrina* folio est *Rusci*, maiore, molliore, et candidiore: semine inter folia rubro, *Ciceris* magnitudinis: ramos spargit in terra, dodrantes, interdum longiores: radii *Sylvestri Myrto* simili, maiore, molliore, odorata Inuenitur in *Ontosis*. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in uino dulci, & stillicidio urinæ auxiliatur: sed sanguinem extrahit.

¶ Iquidem *Laurus Alexandrina* & *Hippoglossum*, vnā & eandē plantam duxisset *Dioscorides*, nihil necesse fuerat secretis & ad eō propinquis capitibus tractasse. Adde his quod quamuis vtriusque folia *Rusco* maiora describat, *Hippoglossum* tamen pingit spinosa coma, & summo ceu ligulas è folijs emergentes. At in *Lauro Alexandrina* nul- lum ligularum è folijs prodeuntium mentionem facit, cum eam dicat fo- lis esse *Rusco* maioribus, mollioribus, & candidioribus, & ramos pter- um spargere dodrantes, interdum maiores. Porro priuatim *Lauro Alexandrina*, radice tribuit *Rusco* maiore, teneriore, & odorata, partui accelerando propitiā, quod diuersas esse plantas, *Hippoglossum* & *Lauro Alexandrinam*, ostendit. *Matthiolus* qui *Hippoglossum* in comita- bus *Goritæ* montibus viderit, *Laurū Alexandrinam* veram comon- rantem non inuenit. Hæc calida, gustu acris, & amara est.

Daphnoides. C A P. C X X X I.

Græ. δ' ἀφροειδὲς. La. *Daphnoides*. Ita. *Laurcola*.

Daphnoi

Daphnoides cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus obsequiosisq, multis, inde sursum uersus foliosis: cortex supra modum uiscosus ramos uestit: folia Lauri, graciliora, & molliora, fractu contumacia, quorum gustatu os, & fauces incenduntur: flores cādidi: bacca, cum ematuruit, nigra. Radix inutilis. Nasctur in montosis. Pituitas extrahit solum recens uel aridum in potu, menses ciet, & uomitus: caput inanit commanducatum, sternutamenta mouet. Bacca quindecim pota, aluum resoluunt.

Chamædaphne. C A P.

C X X X I I.

N O M E N C L A T V R A.

Græ. χαμαϊδ' ἀφύη. Lat. Chamedaphne.

Ita. Laureola maschio. Off. Laureola mas.

Chamadaphne uirgas emittit cubitales, singulari ramulo constantes, rectas, tenues, leues: folia Lauri similitudine, leuiora multo, ac uiridiora: semen rotundum, rubens, annexum folijs. Illinuntur capitis doloribus: trita folia, stomachi ardores mulcent: ad sedanda tormina, cum uino bibuntur. Potus cum uino succus, menses & urinam ciet. Idem facit pessa appositus.

Laureola notissima Italiae planta, in vallis Ananie montibus magna abundantia nascitur. Errant tamen qui Laureolam, Mezereon esse putant. Nam Mezereon Chamæsa est, qua de hoc in libro scribit Dioscorides. Chamadaphne, Laureola est non absimilis, praterquam quod illa singulari ramulo constat, cui folia per ambitum insident, & in cyma rotundam umbellam efficiunt, qua deinceps semen, Laureola simile, depromat. Et ob id eam nonnulli Laureola maschio nominant. Clematidem, primo libro à Dioscoride descriptam, qua & Prouenca est, Chamadaphne existimauit Plinius, quod plerosque induxit ut crederent, Prouencam, veram esse Dioscoridis Chamadaphnem. At virtutes qua

Vinea

incaperuincia tribuit Plinius libri 21. cap. 11. cum eis collata, quas
em, Dioscoridi concinens, libri. 24. cap. 15. vera Chamadaphna assi-
nat, diuersè de ijs sensisse reperiatur, nec foliorum Lauri similitudinem,
hilum de differentia detrahere.

Veratrum album. C A P. CXXXIII.

NOMENCLATURA.

Gr. ΕΜΕΒΟΡΟΣ. Lat. Veratrum album. Ita. Elle-
boro bianco. Gal. Veratre. Off. Elle-
borum album.



Helleborum album.

Helleborum album,
Latini Veratrum al-
bum uocant, fert folia Plan-
taginis, aut Beta Sylvestris
similia, sed breuiora, & ni-
griora, rubescentia: caulem
cauum, quadrantalem, tu-
nicis conuolutum cum are-
scere cœpit: radicibus niti-
tur multis, tenuibus, ab ob-
longo & exiguo capite ex-
euntibus, Ceparum modo fi-
bratis. Nasçitur in monti-
bus et asperis. Radices mes-
sibus colligenda. Optimum
habetur candidum, friabi-
le, carnosum, modicè ex-
P tentum,

tentum, nec tamen Iunci modo mucronatum, quod frangendo puluerem emittit, & tenuem habet medullam, gustu non ad modum feruens, neque saliuam subinde ciens, huiusmodi autem strangulat. Primatum Cyrenaicum tenet. Galaticum autem & Cappadocicum, candidiora, & pulvere quodam obsita, celerius strangulatus mouent. Vomitione autem uarios extrahit humores: collyrijs admiscetur, quæ caliginem oculorum discutiunt: partus impositum necat, menses pellit, sternutamenta excitat: mures interficit, cum Melle & pollenta subactum: absomit carnes, si coquatur unâ. Datur per se ieiunis, & cum Sesama, aut Ptisana succo, aut Halicæ, aut Lentis cremore, cum aqua mulsa, aut pulte, aut quauis alia sorbitione. Cogitur cum pane, & ita inassatur. Preparatio corporum, ac uictus ratio, diligenter tradita est, cum ab his quide medica eius potione scriptitarunt, tum maximè à Philonide Siculo Ennensi, cui nunc assentimur. Quippe longum nimis esset, in hac præsertim editione de materia, simul medicam curandi rationem exponere. Dant nonnulli in pultis sorbitione, aut copioso Halicæ cremore: aut paucum antea cibum dari præcipientes, statim Veratrum offerunt, ijs præsertim, quibus strangulationis suspicio imminet, aut ualetudo corpus infirmat. Hoc enim modo deiectio nihil periculi minatur, quod cibo munitis, non intempestiuè medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones concitant subditæ ex co balani, cum aceto.

Veratrum nigrum. C A P.

CXXXIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Εμέβορ & μέλας. Lat. Veratrum, nigrum.

Ita.



Veratrum nigrum.



Album.

Ita. Elleboro nero. Off. Elleborus niger.

Helleborum nigrum appellatur Melampodion, quoniam caprarum pastoris nomine Melampus, furentes in se Prætidæ, primus purgasse, & sanasse fertur. Folia ei virida, Platani similia, minora, folijs Sphondyli proxima, subaspera, nigriora, pluribus diuisuris incisa: caulis asper: flores purpurei, candidi, racematim coherentes: semen Cruci, quod in Anticyra sesamoides vocat, quo deiectiones moluntur. Radicibus coheret nigris, tenuibus, à capitulo Cephæ simili confibratis, quarum est usus. In collibus, asperis, & sitientibus locis enascitur. Optimum est quod ex huiusmodi petitur terris, ut ex Anticyra. Nigrum mihi probatissimū gignitur. Eligi debet corpulentū & plenū, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, seruēsque, cuiusmodi est in Heli-

P 2

cone,

usione) quemuis quaternarium, si non primum, at secundariè sanaret. Nec aliter in melancholicis, per albi infusionem successit, nullo tamen e-
 iergente incommodo. Quod Tridentini fortassis vt frigidi, cæli causa cõ-
 git, & quod probè correctum. florent tres hæ nigri species mense Mar-
 o, purpureus maximè, in sylua, qua e Goritia in Carniole Iubianã
 ur. Huius radices, nigriores, carnosiores, & solidiores, alijs quæ caru-
 a, & subalbida sunt. Veratrum nigrum quadrupedes conficit, albo
 s inuocuo. Veratrum statim è terra erutum, purgandum est primum,
 7 quicquid est caulium eradendum, tum in vmbra siccandum & sepo-
 endum. Pulvis valentior infusione, sed non nisi robustis offerendum.
 ossis, A Etuario, tres oboli, plus aut minus, pro agrotantium habitu.
 eratrum album & nigrum excafacientium & desiccantium tertij
 int ordinis, cum nigrum, gustu caliditatem ampliolem, album ama-
 vorem maiorem præferat.

Sesamoides magnum.

CXXXV.

NOMENCLATURA.

Græ. Σησαμοειδης. Lat. Sesamoides.

magnum. Ita. Sisamoide maggiore.

Sesamoides magnum, in Anticyra Helleborũ uocant, quo
 niam albo Veratro in purgationibus misceatur. simile est
 cencioni aut Ruta: longo folio: flore candido: radice gracili,
 gnaua: semen gustu amaro, cætera Sesamæ simile. Ventrem de-
 rahit datur tritum ad bilis pituitaq; deiectiones, quantum tri-
 us digitis capitur, addito Veratri albi sequiobolo, ex aqua mul-
 a. Sesamoidi paruo cauliculi sunt dodrantes: folia Coronopi.
 minora, hirsutiora: & in cauliculorum cacumine capitula, flo-
 rum penè purpureorum, medio eorum albo: semen Sesamæ, ful-
 um, amarum: radix tenuis. Detrahit bilem pituitasq; semen ex
 aqua mulsa potum dimidio acetabulo. illitum ex aqua, tumores
 ic tubercula discutit. Nascitur in asperis.

Cvm Sesamoidis utrũque genus in sola Autycira nascatur, nihil
 mirum si hoc careamus, ac ideo incognitorum simplicium ordine
 P 3 censebi

conferbitur. Quamvis Cordo, Sefamoidis minoris, vires, & radicum delineationem referre putet, quam seplafys Agrythæ, pro Veratro nigro venditant. At natales obstant.

Syluestris cucumer. C A P.

C X X X V I.


NOMENCLATURA.

Græ. Σίνυς ἄγριος. Lat. Cucumis syluestris.

Ita Cocomero saluatico. Gal. Cocombre.

fauuage. Off. Cucumis

Anguinus.



Cucumer syluestris.

Cucumis syluestris fructu solo distat à satiuo Cucumere, quem longe minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem. Folia atque sarmenta satiuæ refert: radice candida, magna. Nascentur in sabuletis, & rudibus, frutice in totum amaro. Instillatus foliorum succus, aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix, ueterem omnem tumorem discutit: imposita cum resina Terrebintina, tubercula rumpit: ischiadicis infunditur, podagras discutit, decocta ex aceto, & illita. Eius decocto dentes in dolore colluuntur. Arida farina impetiginē, lepras & uirilgines absterget, nigris cicatris colorē reddit, & in facie maculas expurgat. Radicis succus sesquib

ioboli pondere, & item cortex, acetabuli quarta parte, bi-
 m pituitamq; deiciunt, praesertim in hypropicis: (deiectiones
 item citra stomachi iniuriam mouet) radicis selibra, in uini
 praesertim Libyci hemina conteritur, danturq; ex eo terni cyathi
 iduo, dum tumor abunde deprimi cernatur. E fructu huiusce
 cucumeris, fit medicamentum quod Elaterium uocatur, ad hūc
 modum: Decerpti Cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, seruā-
 tur nocte una: post die impoſito supra craterem rariore cribro,
 trisque manibus prehēsi, sigillatim supino cultro, sursum uer-
 ſis aciem habente, finduntur: atque per cribrum humor in sub-
 iectum uas exprimitur: simulq; carnosum quod haesit, cribro,
 uo facilius excidat, eliditur: quod ita pressum est, residere ſini-
 ur, atque in uicinam peluim dimittitur: coacernata autem in cri-
 bro segmina, dulci aqua persunduntur, & denuo pressa abij-
 ciuntur: humor in pelui agitatur, & linteo opertus, soli exponi-
 ur, dumq; steterit, tota supernatans aqua cum humore concre-
 ſcit, effunditur: hoc uero identidem fieri solet, donec existens aqua
 coqueſcat: qua stillatim exhausta, sedimentum mortario suscipi-
 ur, & conterendo cogitur in paſtillos. Sunt qui ad hauriendam
 protinus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspargant,
 & medium cauantes, triplicatum linteum obtendant, per quod
 elaterium cum sua humilitate diffundunt, siccatumq; in pila, ut
 dictum est, conterunt. Aliqui pro dulci aqua marinam persun-
 dentes, ita eruunt. Alij in nouissima lotionē mulsam aquam re-
 spargunt. Elaterium optimum esse constat, leue, non pondero-
 sum, cum candore leniter humectum, gustu amarissimū, quod-
 que lucernarum luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum
 tamen scabrumq; si turbidum spectetur, atque Erui cinerisq; ple-
 num sit, graue & uitiosum esse solet. Nec desunt pui Cucumis
 succo Amylum immisceant, ut candorem ipsum & leuitatem
 imitentur. A bimatu ad decennium deiectionibus utile est.

Integer modus, obolus est: minimus, semiobolus: pueris, chalciduo: siquidem copiosius, periculum adfert. Bilem ac pituitam utrauis parte extrahit. Optima suspiriosis est purgatio. Quod si in animo sit deiectionem moliri, adiecto salis duplo, & stibij quod colorare sufficiat, ex aqua Erui magnitudine catapotia, dato, postea cyathus unus aquæ tepida sorbeatur. Ad citandas tamen uomitiones aqua diluens Elaterium, subiectas linguæ partes penitissimè pinna oblinito. Quod si quisquam difficilius euomat, oleo aut unguento Irino resoluto, somnum inhibeto. Porro his qui eximie uacuantur, continuè uinum & oleum dari cõuenit, etenim uomendo restituuntur. Quod si uomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Ciet Elaterium menses: partus enecat, in pecto subditum. Morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum, & diuturnis capitis doloribus liberat. Efficacissimè anginis illinitur, cū uetere oleo, Melle, aut felle taurino.

Cucumber Anginus Asininusue satis cognitus. Elaterium verò Cucumeris syluestris est succus exiccatus, & in pastillos redactus. Porro in textu, ubi in prastantioris Elaterij delectu legitur, Quodq; Lucernarum luminibus obiectum, facile flagret: legēdū, facile extinguat, idque è Theophrasti autoritate, Qui Elaterio tantum humoris inesse describit ut quinquaginta annorum lucernam cui admoneatur, extinguat. Quod ipsum & Plinius testatur. Elaterium tenuium cum caliditate est partiu, valentis amaroris, caloris imbecilli, eaque de causa digestoriū. Radicis & foliorum Cucumeris agrestis succus, quæ Elaterium, sed inuoluidius potest. Attamen radix proximius accedit, nempe abstersoria, digestoria, & emolliens. Cortex magis desiccatur.

Staphis agria. C A P. CXXXVII.

NOMENCLATURA.

Gr. Σταφίς ἀγρία. Lat. Staphis agria. Ital. Vna saluatica. Gal. l'Herbeau poulx. Off. Pituitaria.

Sta



Staphis agria.

Staphis agria, siue herba
pedicularis, folia habet
Labruscæ diuisa: & caulicu-
los rectos, molles nigrosq̃.
Fert florē Glasti: & follicu-
los uirides, similes Ciceri, &
in his nucleum triangulum,
scabrum: ex nigro subfulues-
centem, intus album, gustu
acrem. Grana quindecim, si
tritu in aqua mulsæ dentur,
crassum humorem per uomi-
tum purgant, sed qui hause-
runt, ambulare debent. Pru-
denter tamen attendere oportet,
& aquam mulsam con-
tinuò potui quoniam pericu-

strangulationis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex
leo illita, phthiriasi prodest: item prurigini & psoris. Cit plu-
rimam pituitam commenducata: cocta in aceto, dentium dolori
colluto ore, subuenit, rheumatismum gingiuarum sistit. Vlcera
oris manantia, cum Melle sanat. Vrenibus malagmatis impo-
nuntur.

Staphis agria, quæ & Pedicularis, & Pituitaria, in Apuleia Cala-
bria, Istria, & Sclauonia, nascitur. Hoc in apophlegmatismos & vn-
guenta pedicularia, vtuntur seplasia. Staphis agria è summa acrimonia
constat, & absterforia est, verum exulcerat.

Thapsia. CAP. CXXXVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Θάψια. Lat. Off. Ita. Thapsia.

P

3

Tha

Thapsia nomen ideo accepit, quòd in Thapso, eiusdem nominis insula, primum inuenta sit. Tota uerò natura Ferula similis est: graciliore caule: folijs Fœniculi: umbella Anethi in cacumine, à singulis surculis erumpente flore luteo: semen quale Ferula, latum, sed aliquanto minus. Radix foris nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro uestita. Lactis extrahendi ratio hæc est: Facto in ambitu scrobe, cortices inciduntur: aut radix in fornicis speciem in se excauata cooperitur, quòd merus succus confluat. Oportet illuc sequenti die se conferre, & congestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallum expressus, fictili crasso insolatur. Aliqui foliū unā terunt: sed inualidior huiusmodi succus. Hoc autem interest, quoniam qui ab radice manauit, grauius olet, & humidus permanet: è folijs autem extractus exiccatur, atque teredinum iniuriā sentit. Qui succum colligit, stare debet non obuersus vento: aut potius, cum dies apricus est, & à flatu silet: quoniam ob halitus acrimoniam facies uehementer intumescit, nudaq; corpora inuadunt pustula: ob id prius liquido cerato & adstringente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedunt. Tam cortex radice, quàm succus, purgandi uim habent. Lacteus succus in aqua mulsa potus, utrinque bilem extrahit. Radicis modus, quaterni oboli, cum tribus seminibus Anethi drachmis: succi, terni oboli, lactis, obolus unus. quod eo amplius assumitur, periculosum est. Huiusmodi purgatio conuenit suspensiosis, & diuturnis laterum doloribus, reiectionibusq; datur in cibis aut obsonio, quibus difficile sit uomere. Tam radix quàm succus omnium maximè, quæ pares cum eis uires adepta sunt, uim habent extractoriā ex alto, ubi ex imo aliquid euocandum est, aut meatuum laxitas aliò transferenda est: unde succus illitione, aut radix recens affrictu, alopecius explent. Radix succusq; cum æquis ceræ Thurisq; portionibus, sugillata liuoresq; tollunt: sed non plus binis horis dimit

mittantur: locus deinde aqua maris calida foueatur. Pitia cum in facie emendat, cum melle illitus succus, lepras tollit, tubercula discutit, perunctis cum sulphure, in diuturnis pulmonum, terum, pedum, articularumq; ualeitudinibus utiliter illinitur: ulet ad integendam colic glandem, ijs qui natura, non circumfione, curti sunt tumorem enim excitat, qui pinguium sotu euollitus, præputij iacturam refarcit.

Thapsia herba nomen indidit Thapsus insula, ubi primum reperia est. Hæc nostro tempore Italia non ignota, non in Apulia tantum, quo loci ferulacea planta nascitur, provenit, sed in maritimis etiam mensibus. Padua & Venetis in hortis uisitur, Ferula adsimilis. Qui uotannis ex Apulia veniunt herbarij, Thapsia radices elibrant, ac Ostea Turbith uice hos cortices euendunt. Si ad eadem quæ Turbith ualent. Thapsia acris & potenter calida, & perinde humida est, siquidem citò corrumpitur.

Spartium. CAP.

CXXXIX.


NOMENCLATURA.

Græ. σπάρτιον. Lat. Spartion. Ita.

Genestra. Gal. Genest.

Spartion frutex est longus, ferens uirgas, sine folijs, firmus, fractu contumaces, quibus uites uinciuntur: semē Lenticula, in folliculis Phasiolorum modo nascens: florem, ut alba Viola, luteum. Purgant per superna uehementer, Hellebori uice, citra periculū flores & semina, quinque obolis in aqua mulsā pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tuis, extractus succus, ischiadicis & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis clystere: strigmenta autem elicit cruenta.

Spartion



Sparton.

Sparton seu Genista notissima planta, duum est generum. Nam una in fuces torquetur, & hac corbes texuntur, Vitis passis & ficibus asseruanda. Altera validioribus constat virgulis, quam ut ex his simile quiddam facilius. Seminibus & virgularum Geneste succus, attractoriae virtutis est.

Silybū. C A P.
C X L.

NOMENCLATVRA.

Græ. σίλυβον. Lat. Silybon. Ita. Silibo.

Silybon lata spina est, folia ferens Chamæleonis albi. Hac recens cum sale oleoque cocta estur. Radicis succus drachma pondere potus, uomitiones ciet.

Incompertum Silybum in Natura hortum, cum sui similibus plantis ablegabitur, cum illa voluerit, noscitandum.

Glans unguentaria. C A P. C X L I.

NOMENCLATVRA.

Græ. βάλαν & μυρεψίκη. Lat. Glans unguentaria. Ita. Ghianda unguentaria.

Glans

Sans unguentaria, fructus est arboris Myricæ similis, magnitudine Auellanae nucis, cuius nucleus græcarum uicem more tritus, humorem reddit, quo ad preciosa unguentaria oleo utuntur. Nascitur in Æthiopia, Ægypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudeam. Præfertur plena, recens, candida, quæ facile delibretur. Ea drachmæ pondere pota, lienem abimit. Cum Lolij farina & aqua mulsa, podagricis illinitur. Foras leprasq; decocta in aceto: uutiligines & nigras cicatrices cum Nitro, emendat. & cum lotio, lentigines, uaros & papulas in facie, & cutis uitia tollit. Vomitiones mouet, aluum cum hyromelite resoluit: stomacho aduersatur. Oleum quod ea exprimitur, aluum potu ciet, Cortex eius magis adstringit, uerum tunc & expressæ succus abstergentibus medicamentis adijcitur, quæ aduersus pruriges & scabritias idonea sunt.

Nvx unguentaria, quam Græci Myrobalanon, & Balanon Myrsicon vocant, nostro tempore copiose in Hispania nascitur, apudq; unguentarios uisitur, Ben nomine. Fructus in totum Pistacijs similis, fragilior tamen, cortice candida, sarcto admodum nucleo, crasso, & oleo-
do, e quo oleum, quod Ben uocitant extrahitur, nulli senio aut mucori subditum. Id maximò ducitur ab unguentarijs, ad distemperandos odores. Ostenduntur nostro sæculo radices, Been rubentis, & candidi cognomine, quas seplasia in medicinas cordiales usurpant. Sed neutra, uera Been est radix. Nam Serapioni Been radices, Pastinacæ minoris similes, contorta, odorata, & commanducatu viscida, ex Armenia asseruntur. Nostra & cælo & vi distant.

Narcissus. CAP. CXLII.

NOMENCLATURA.

Græ. ναρκισσος. Lat. Narcissus.

Ita. Narcisso.

Narcissum sunt qui ut Liliū, Lirium appellarint, folia Porro similia, tenuia, multo minora, & angustiora: caulibus uacuis, & sine folijs, supra dodrantem attollitur: flos albus, intus

intus croceus, in quibusdam purpureus: radix intus alba, rotunda, bulbosa: semen uelut in tunica, nigrum, longum. Probatissimus nascitur in montibus, suauis odore. Cateri Porrum imitantur, atque herbaceum uirus olent. Radix cocta, siue estur, siue bibitur, uomitoria est. Ambustis igni prodest, cum exiguo Melle trita. Precisos nervos illitu glutinat. Luxatis malleolis, diuturnisq; articulorum doloribus trita ex Melle & imposita, subuenit. Vitia cutis in facie, uirilignesq; cum semine Vrticæ & aceto emaculat. Cum Eruo & Melle, ulcerum sordes expurgat. Abscessus rumpit concoctioni repugnantes. Infixa corpori extrahit, illita cum Lolij farina & Melle.

T Hespensium in Bæotia commentum est, adolescentem Narcissum suumet amore captum, in sui nominis florem conuersum. A narce, id est, torpore, dictum censet Plinius, quoniam caput grauet, non a sabuloso puero, floreque constare vel purpureo, vel herbaceo. Faciem alii aliter referunt. Et si uera Narcissi diuersa sunt specie, & coloribus in flore varijs. Albi Rosæ muscati similes, Venetijs spectandi in horto præcellentissimi medici D. Maphæi a Maphæo. Narcissi radix, desiccata abstergit, & attrahit.

Hippophaës.

CAP.

CXLIII.

NOMENCLATURA.

Græ. ἵπποφᾶες. Lat. Hippophaes.

Ita. Hippophae.

Hippophaës, quo fullones uestes interpolant, in sabulosis maritimisq; nascitur, surculaceo frutice, undique denso et largo: folijs Oleæ, longioribus, mollioribusq;: inter quæ candicantes spinæ emicant, siccæ, angulosæ, interstitio quodam distantes: flores Hederæ corymbis similes, racematim coherent, minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescentes. Radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustanti. Ex qua, perinde ac Thapsia,

rhapsia. succus eximitur, qui per se, & cū Erui farina subactus, iccatur, & ad usum reconditur. Syncerus pituitas, bilē, aquasq; letrahit, oboli pondere: Erui uerò farina subactus, quatuor obolis, cum aqua mulsa dimidia hemina tritus datur. Radice & herba liquamentum depromitur, uti in *Thapsia*. Huius in purgationibus modus est drachma.

D Væ hæ plantæ nobis incognitæ, ad Chironis centauri palingenesiam, remanebunt. Nam ipsum nomen, e quorum naturæ accommodatas ostendit.

Hippophæstū. CAP. CXLIII.

NOMENCLATURA.

Gr. *ἵπποφαιστος*. La. *Hippophæstō*. It. *Hippophesto*.

Hippophæston, id quod aliqui Hippophæes appellant, nascitur eisdem locis quibus Hippophæes, estq; spinæ fulloniæ genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore: inanibus tantum capitulis: folijs paruis, spinosis: radículas habens molles, crassas. Succus radice, folijs & capitulo exprimitur, & exiccatur. Datus, cui uoles, tribus obolis, in aqua mulsa, aquam pituitasq; detrahit. Priuatim comitialibus morbis, nervorum uitijs, & orthopnææ conuenit huiuscemodi purgatio.

Ricinus. CAP. CXLV.

Græ. *ῥιζω*. Lat. *Ricinus*. Ita. *Fagiuolo* *Turchesco*.

Gal. & Off. *Palma Christi*.

Cici, aut Croton, nomen accepit à Ricini animalis similitudine. Arbor prouenit parvæ Ficus altitudine, folio Platani, maiore, læuiore, & nigriore: ramis, caudicibusq; cauis, in Arundinis morem: semine in uuis asperis, quod corticibus exutum, Ricinum animal representat: ex quo oleum, nomine Cicinum, exprimitur, cibus sædum, lucernis emplastrisq; utile. Grana triginta numero purgata, trita potu, pituitas, bilem, aquam

que



Ricinus

boum, caprarum, equorum & ceterorum animalium dorso inhaerens, non prius à suctu secedit, quàm rumpatur. E semine oleum fit ad lucernarum lumina. Id purgat, mundat, & digerit. Quod ex eo exprimitur oleum, communi calidius & humilius est, eaq; de causa valenter digerit.

que per aluum extrahunt, uomitiones mouent, sed in iucunda admodum est, & molesta purgatio: siquidem stomachum uehementer subuertit. Tusa & imposita, vitia cutis in facie, uarósque expurgat. Folia cum polenta trita, inflammationes oculorum, tumoresq; leniunt, rigentes mammas cohibent: eadem ex aceto illita, ignes sacros restinguunt.


Ricinus inde dictus, quod semen habeat Ricino insecto simile. Id animalculi, canum,

Tithymali. CAP. CXLVI.


NOMENCLATURA.

Græ. τιθυμαλ & . Lat. Tithymallus.
Ita. & Off. Esula. Gal.
Herbe à lait.

Tithy




Tithymalus. 1



Tithymalus. 2

Tithymalli genera septem, quorū masculus, Characias ap-
pellatur, ab aliquibus Amygdaloides: alter, Myrtites,
qui femina existimatur, eumq; Myrsinitem aut Caryitem vo-
cant: tertius, Paralius, quem Tithymalida appellarunt: alius,
Helioscopius: quintus, Cyparissias: sextus, Dendroides: septi-
mus, Platyphyllos dicitur. Characia caules supra cubiti altitu-
dinem attolluntur, rubri, lacteo succo atque acri madentes: fo-
lijs Oleæ circum ramos, angustioribus, & longioribus: radice
rassa, lignosa: pendet in cacuminibus caulium, coma iunci, sub
qua caueola foliolis balnearum similes, in quibus semen conti-
netur. Nasctur in asperis & montibus. Succus aluum purgat:
rahit pituitam bilemq;, binis obolis in posca sumptis: & cum
qua mulsa, uomitiones mouet. Appetente uindemiæ tem-
pore,



Tithymalus. 3

pore, succus congestis ramu-
lis, mox dissectis, & uase
conclusis, excipitur. Ali-
qui adijciunt farinam Erui,
& in pastillos digerunt, qui
Erui magnitudine impleat.
Alij in aridas ficos, ternas
quaternasue guttas instil-
lant, ut cum his inarescant:
quis ad usus recondunt. Per
se etiam tusus in pila, & in
pastillos coactus reponitur.
Porro cum extrahitur lac,
neque quo uentus aspi-
ret, stare quenquam, neque ma-
nus oculis admonere conue-
nit: sed antequam colligas,
corpus, praesertim faciem,
collum, scrotumq; genita-

lis, adipe aut oleo cum uino perungere. Fauces autem exa-
sperat: quapropter catapotia cera aut decocto Melle oblini
par est, & hoc modo dari: binas tamen ternasue ficos, pur-
gationis gratia sumpsisse, satis est. Recens lac ex oleo, perun-
ctos in sole capillos euellit, renascentesq; flauos & exiles ef-
ficat: denique omnes perimit. Dentium cauernis inclusum,
leuat dolores: sed cera dentes oblinendi, ne suo delapsu, fau-
ces & linguam uiuet: tollit illitu impetigines, formicantes
uerrucas, pensiles, & quae Thymi florem representant. Va-
let aduersus pterygia, carbunculos phagedaenas ulcerum, gan-
grenas, fistulasq;. Legitur semen autumnino, & siccatum so-
le leuiter tunditur, seruesactumq; loco mundo reponitur. Fo-
lia

ha item siccantur. Semen & folia lactei succi effectum præbent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui inueterant, admisto cum lacte Lepidio, caseo contuso. Radix dragmæ pondere in hydromelite pota, per inferna trahit. Decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore. Tæmina, quam Myrsiten, aut Caryiten uocarunt, similis suapte natura Daphnoidi: folijs Myrti, sed maioribus, firmis, in cacumine acutis, & pungentibus: ramulos ab radice mittit dodrantes: fructum fert alternis annis, Nuci similem, mordaci gustu. Nascitur in asperis. Succus, radix, semen, folia, consimilem antedicto sortiuntur facultatem: sed ad citandis uomitiones inualidior hæc est. Aliud Tihymali genus dicitur Paralios, quem Tihymalida, aut Mecona aliqui appellauere. Nascitur in maritimis, ramis subrubentibus, palmum altis, quinis senisue à radice exeuntibus: folijs Lini, angustis, paruis, oblongis, in uersus quosdam digestis: capite in cacumine orbiculato, in quo semen ut Eruium, uario colore emicat. Flos albus. Frutex totus cum radice lacteo succo turget. Similes ad usus reconditur. Helioscopius dicitur, folijs Portulacæ, tenuioribus, rotundioribusq; ramulis prodeuntibus à radice, quatuor aut quinque, rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis: capite Anethi, semine uelut in capitulis incluso. Helioscopij nomen accepit, quoniam comas cum sole circumagat. Circa oppida nascitur, potissimum in ruderibus. Colligitur succus semenq; ut aliorum. Eadem quæ superioribus uires, non tamen usque adeò ualide. Cyparissius in caulem exit dodrantalem, uel maiorem, subrubrum: ex quo folia Piceæ similitudinè exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora. & in totum nascentem Piceam æmulatur, unde nomen traxit. candido succo madet, cui eadem uis quæ superioribus. In petris nascens, Dendroides cognominatur.

tur ampliter opacat: in cacumine frondosam spargens comam, succo lacteo pragāns, cauliculis rubentibus. Folijs Myrti tenuioris: fructu Characiæ. Eiusdem effectus, cuius superiores, similiq; modo reconditur Platyphyllos, Verbasco similis est. Radix, succus, & folia, per inferna trahant aquas. Pisces necat, tusus, & aqua inspersus. Reliqua Tithymalorum genera quæ supra scribuntur, idem efficiunt.

PEr pulchre ordine de Tithymalis scribit Dioscorides. Quod itidem Arabes non faciunt, nempe Mesue & Auicenna in nomine Alsebram. Atenim satius fuerit, dum suis oculis tenebras inuicem offundunt, ex illorum controuersis emergere, quam erroris aspergine, sese mutuum commaculare. Porro Tithymalus Characias, siue Vallaris, nostro saeculo non reperitur. Myrsinites item semina, pungentibus & Myrto similibus folijs, fructu nucis figura, nequiquam agnoscitur. Paralius seu maritinus (non ille tamen quo vulgo Seplasia vtuntur, nam hic est Cyparissias) in Sena maritima copiose nascitur. Thusc Herba mora, nominat. Huius radice receti & saccis immissa ad conficiendos pisces vtuntur. Paltiphyllus à foliorum latitudine, in eundem usum à Thuscis piscatoribus vsurpatur, huncque Tortumaglio vocant, eiusdem quibus Paralius locis prodeuntem. Helioscopius, quod solem suo rotatu consequatur, ubique nascitur. Cyparissias, planta est quam Esulam minorem officina vocant. Dendroidem, extra Terracinam vidit Matthioli, intra saxa antiqui spelai, marino littori incumbentis, arboreceti effigie, emergentem. Tithymali omnes acres sunt, calidi, & amari. In eis plus pollet liquor: fructus & flores, secundo sunt loco. huius facultatis est radix, sed non æquabiliter. Quarti excalfacientium sunt ordinis.

Pityusa. CAP. CXLVII.

NOMENCLATURA.

Gr. Πύσος. Lat. Pityusa. Ital. & off.

Esula maggiore.

Pityusam specie à Cyparissias differre constat, & si Tithymalorum generi assignetur. Caulis supra cubiti altitudine assurgit geniculatus: folijs Piceæ, acutis exilibus: flore parua
uelut

uelut purpureo: semine instar Lenticula, lato: radice crassa, candida, succo referta. Quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per aluum radix, drachmis duabus data in aqua mulsa: item seminis drachma. Succum cum farina subactis, cochleariū in catapotio datur. Modus foliorum drachmæ tres.

Pityusa nihil aliud est, quàm Officinarum Esula maior. Huius radices herbarij qui è monte Gargano prodeunt, pro Turbith venditant, nō aliter quam de Thapsia superius diximus. Ea causa fuit Aetuario scribendi, Turbith album, Alypi: nigrum vero, radicē esse Pityusæ. Quo intelligit interiorem omnē substantiam, & non tenuem & exteriorem illam pelliculam, quæ rufa, nigrorem siccando contrahit. Porro manifestum præbet argumentum Serapio, Pityusam, Esulam esse maiorem quæ Alsebram & Sebram Mesue & Auicennæ dicitur, ut qui integrum de Pityusa Dioscoridis, in Scebram caput transposuerit. Quare Alsebram maior Arabum, Tithymalus latifolius esse non potest. Nasctur in Italia Pityusa, Esula minori (hæc Cyparissias est Tithymalus) in totum similis, nisi quod longè maiorem profert caulem, ramos, folia umbellam, semen, & radicem. Multis in locis, ut in Apulia, arborefcit. Visitur ingenti copia in planitie Veronensi, in qua tamen quod macrum & aridum sit solum, non admodum excrescit. Pityusa vulgò vocatur, Turbith de monte S. Angeli, & à medicis vsu repudiatur, nisi in corpora vel rustica vel robusta. Ea ob succum cum Tithymalis parem, eorum generis ducitur. Et sanè purgat, & iisdem virtutibus est prædita.

Lathyris. CAP. CXLVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Λαθυρίς. Lat. Lathyris. Ita. Cataputia minore.

Gal. Expurge. Off. Cataputia minor.

Lathyris, quæ aliqui Tithymalū appellant, eamq̃ Tithymalorum numero adscribunt, caulem emittit cubiti altitudine, & digitali crassitudine, inanē. Gignuntur in cacumine alæ, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & leuiora. Quæ autē in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, Aristolochiæ, aut oblongæ Hedere figura. In cacumine fructum summis surculis gerit, triplici loculamēto insignem,

2 3 rotundus



Lathyrus.

ribus folia decoquuntur ad eisdem effectus.

Peplus.

CAP. CXLIX.

NOMENCLATURA.

Gr. $\pi\epsilon\pi\lambda\omicron$. Lat. Peplus. Ital. & Off. Esula rotunda.

Gal. Reueille matin de vigne.

Peplos frutex est lactei succi plenus, folijs parvis, ut Ruta, paulo latioribus: rotunda coma, fere dodratali, humi respersa: semine folijs rotundo, minore quam candidi Papaveris. pluribus sciatet auxilijs: unicam radicem habet, supernacua, ex qua fruticat. Nascit inter vites, & in hortis, colligitur mensibus. Siccatur in umbra, & continue versatur. Fructus iustus & feruescens recoditur. Bilis ac pituita detrahatur, acetabulo eius in hydromelitis cyatho poto. Obsonyis inspersa coturbat alium: muria coditur.

Peplus.

Peplis. CAP. CL.

NOMENCLATURA.

Græ. πεπλῖς. Lat. Peplis. Ital. Peplio. Ignota.

Peplis, quam aliqui Sylueſtrem Portulacā uocant, Hippocrates Peplion, in maritimis maximè nascitur, late opaco rutice, candidi succi pleno: folijs satiuæ Portulacæ, rotūdis, inferie rubentibus: semine sub folijs rotūdo, uti in Peplo, feruēte guttu: radice singulari, superuacua, tenui. Colligi, & reponi de da-
u, uti Peplos, & sale condiri solet. Easdem habet uires.

Chamaſice. CAP. CLI.

NOMENCLATURA.

Gr. χαμαῖςυκη. It. chamaſyce. Ignota.

Chamaſicē aliqui Syce nomināt. Ramos emittit quaternā digitorū, teretes, succosos, in terrā deiectos: folia Lētis, parua, Peplū planè referētia, tenuia, quæ à terra nō attollūtur: semine sub folijs rotundo, ut in Peplo: neq; caule, neq; florem promit, radice firmatur tenui, superuacanea. Rami ex uino triti uulnæ dolores sedant, in pecto appositi. Tollunt tumores ac uerrucas omnium generū illiti. Decoctorum cibo aluus resoluitur. Succus simili effectu prodest. Illitus cōtra scorpionis iclū auxiliatur, aduersus caligines oculorū utilis, & hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cū Melle inunctus. In squalidis petrosiq; nascitur.

Scammonia. CAP. CLII.

NOMENCLATURA.

Græ. Σκαμμονία. Lat. & Ital. Scammonia.

Scammonia ramos ab una radice emittit trium cubitorum, multos, pingues & qui nonnihil crassitudinis præ se ferāt: folijs Helxine, aut hederaceis, mollioribus tamen, hirsutis, & triangulis: flore candido, rotundo, in calathi modum cauo,

Q 4 gra

græueolente: radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus: Capite exempto, radix in testudinis speciem cultro excauatur, quo fit ut in cauum confluat succus, qui conchis denum excipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fodiunt, in quos, subiectis iuglandium folijs, profundunt succum, siccatumq; extrahunt. Laudatur autem Scammonium leue, nitidum, rarum, & colore quàm simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asia deportatur. Nec attendere solum par est: si lingua tactu albescat (hoc enim euenit adulterato, quod admisto fit Tithymali lacte) sed longè magis antea narratis. Item si non uehementer linguam exurat, id quod misti Tithymali argumentum est. Natione autem Syriacum & Iudaicum deterrima habentur, graua, densa, Erui farina & Tithymalo uitiata. Succus drachmæ unius aut quaternum obolorum pondere haustus, ex aqua pura uel mulsa, per inferna bilem & pituitam extrahit. Ad resoluendam aluum binos obolos cum Sesama, alioue semine, sumpsisse satis est. Dantur efficacioris purgationis causa, succi tres oboli, cum duobus Veratri nigri, & Aloes drachma una. Fiunt purgatorii sales, drachmis uiginti succi Scammonia, in senos salis cyathos adiectis: Horum proportionem uirium: integer quidem, tria cochlearia, medius duo, minimus unum. Radicis drachma una aut altera purgat, cum ijs quæ retulimus. Nonnulli decoctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cum hordeacea farina teritur, captaplasmate ischiadicis utili. Partus enecat succus, uulua in lana subditus, tubercula discutit, cum Melle aut oleo illitus. Decocto in aceto, peruncta lepra abiguntur: diuturni capitis dolores ex aceto & rosaceo perfunduntur.

Scammonia, quæ ex Alexandria, Venetijs & inde per omnes Europæ regiones exportatur, seligenda magna adhibenda diligentia: nam electa & approbata ingens penuria: adulterata, vel seacentorū (ut ita dicam)

came

nelorum onus. Nec mirum, cum hac quæ à mercatoribus emitur, Sy-
 aca, & Iudaica sit, grauis, densa, Erusarina, & Tithymalo vitia-
 , quam deterrimam Dioscorides asserit. Id parum animaduertentes
 armacopolæ, Scammoniam probatam existimant, quæ salua tempe-
 ra, confestim lactescit, Dioscoridi non concordēs, qui id genus è Tithy-
 ali lacte adulteratum existimat. eò deprehensum, quod vehementer
 guā exurat. Eapropter Medici si probè & sanctè sua functione vti-
 lit, pro viribus, suum quisque pharmacopolā perurgebit, vt selectio-
 n, & e Dioscoridis figura (quo planius dicam) qualificatam apud se
 beat. Nam cum Scammonia solutiuorum electuariorum basis sit &
 ndamentum, qui hanc perperam & adulteratam immittunt, multis
 itij causa sunt. Porro Scammoniam adulteratam & Tithymalo im-
 xtam hinc patet. Decem, aut ad maius quindecim grana, aluum sol-
 unt quàm sepius: cum sincera, eo operi, vix vna dragma sufficeret.
 metiam si, per Dioscoridem, ad vnicam purgationem, Veratri albi
 æ, & Aloes vna adderentur. Scammonia plantam Neapoli pharma-
 pola quissiam, sibi ex Apuliæ Gargano allatam, Matthiolo common-
 raui. Huius nullam mentionem facit Gallenus. Mesue solutinam me-
 cinam furiosam nominant, ac quinque eius nocumēta recenset, cuius
 medicina candidato non ignota. Porro cum Dioscorides, Scammoniam,
 elxines folijs depingat, non Parietaria, sed Cyssampeli, aut Conuol-
 uli folijs collatam, existimandum.

Chamelæa. CAP. CLIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Χάμελαία. Lat. Chamelæa. Ita, Chamelea.

Gal. Boys gentil. Off. Oliuella.

Chamelæa sirculosa fruticat, ramis dodrantalibus. Folia
 oleæ similitudinem habent, tenuiora & amara, quæ gu-
 ata linguam mordent, & arteriam deradunt. Detrahit pitui-
 am bilemq̃, folijs præsertim in catapotia deuoratis: namque
 lue Absinthij partes, adiecta Chamelæa una, hydromeli-
 e excipiuntur, & in catapotia coguntur: ea autem in uen-
 re non liquefunt: siquidem quotquot fuere deuorata, rege-
 untur. Folijs cum Melle tritis, sordida ulcera & crustosa
 repurgantur.

℞ s

Thy

Thymelæa. CAP. CLIIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Θυμελαία. Lat. Thymelæa. Ital. Pepe montano.
Gal. & herbarijs Lin sauuage. Off. Mezereon.

Thymelæa est, qua granum Gnidium, quod est semen ipsius, colligitur. Hoc Eubæi Aetolum uocant, alij uero Linum, quoniam satiuu Lini frutex suapte natura similitudinem referat: uirgas edit perpulchras, multas tenuës, triped. neas: folijs Chamelææ, angustioribus, & pinguioribus, uiscosis, gummosisq; si mordeantur: flore candido: fructu Myrti in modum rotundo, qui inter initia uret, & tandem rubescit: inuolucrum fructus durum, foris nigrum, intus album. Hoc per inferna bilem, putuitam, aquasq; detrahit, si uiginti granorum pars interna bibatur: uerum fauces adurit. Itaque cum farina aut polenta, aut in uua acino dari debet, aut Melle cocto obductum deuorari. Qui agere desulant, trito semine cum Nitro & aceto, iniunguntur. Folia quæ peculiariter Cneorum appellantur, per messes colligi debent, & siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & nervos eximere conuenit. Illius acetabuli modo cum diluta uini portione, aquam extrahit. Mediocrius purgat, adlita Lente cocta, aut contritis oleribus. Thymelææ farina uua acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta. Partus imposita necat. Nascitur in montibus & asperis. Hallucinantur qui Coccon Gnidii fructum esse Chamelææ existimant, decepti quadam foliorum similitudine.

Chamelæam & Thymelæam, Arabes confusane Mezereon uocant, duum generum. Horum unum Mezereon album: alterum, Mezereon nigrum. Ambabus Laureolam immiscet, distinctione tantum intricata, ut nisi a Delio natatore extricari non possit. Ambæ hæ plantæ validæ in euacuando atque adeo maniacæ operæ exercent, sic ut ab eis sumptis, præ nimia imbecillitate utentem cõficiant, excussum viscerum membranulis aper

etisque venarum oribus. Quod ad natales attinet, vtraque magna
 ndatia, in vallis Ananie quæ Tridentinae sunt iurisdictionis monti-
 enascitur, ambæque (id licet in Chamelæa præterierit Dioscorides)
 Tum Myrtino similem producunt, quamvis Thymelæa fructus, ali-
 entum longior, & magis ad Oliuæ figuram accedat. Fructus hi pri-
 exortu virides, rubentes dum maturescunt, postremum nigri sunt. In
 ena rustici, Piper montanum, vocant, quo sumpto dum medicis &
 iarejs negotium (vt putant) facessunt, è sua sibi, non illis, medicina
 eunt. Eo factum vt non abs re, Mezereon, venenis propinquum Me-
 iudicet quod præcipuis & vitalibus membris noceat. Quare ab hu-
 usu abstinendum, non infrenata, quæ supersluit acrimonia, & cali-
 ate, frigidiorum mixtione simplicium, quemadmodum opumè tra-
 Mesue.

Sambucus. CAP. CLV.

NOMENCLATURA.



Sambucus.

Gr. Ακτὺ. Lat. Sambu-
 cus. Ital. Sambuco.
 Gal. Suseau.

Sambuci duo genera.
 Primum in aborem assur-
 git, surculos spargens arundi-
 naceos, teretes, canos, candi-
 cates, præcisos folia in glan-
 dis terna quaternaria, ex in-
 ternallis circa ramos exeunt
 graui odore, minutim in
 ambitu secla: & in ramulo-
 rum cacuminibus cauliculis-
 que circinata umbellæ, quæ
 florem

florem candidum pariunt, mox acinum Terebintho similem, nigredine subpurpureum, racemosum, succo madentem, uino sumq. Alterum genus, Chamaeaele uocatur, Romanis Ebuli longe humilior est, magisq. herbaceo generi assignandum, caule quadrangulo, geniculato, folijs Amygdale, ex intervallo longioribus, geniculatim expensis, pinnatisq., graueolentibus, ambitu serratis: muscario Sambuci, flore & acino eiusdem: radice nititur longa, crassitudine digitali. Eadem utriusque uis, & usus exiccans, aluo detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia olerum more coquuntur, ad pituitam bilemque detrahenda. Canes teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix in uino decocta & in cibis data, hydropicos adiuuat. Prodest uiperarum moribus, eodem pota modo. Vulnus emollit insidentium decocto: patefacit earum spiracula, & uitia corrigit. Acini in uino potidem funguntur munere: denigrant capillos illiti. Folia, si praeterea ac mollia ex polenta illinantur, inflammationem mitigant: ambustis & canis moribus illitu prosunt. Ulcera quae dehiscent in fistulam, agglutinant: ijs qui podagra tentantur, cum senu taurino aut hircino prosunt illita folia.

Sambucus tum arbor, tum herba nulli non nota sunt. Aqua florum Sambuci, fronti applicata, dolorem capitis sedat, & caliditate prodeuntem. Succus e corticis radice elicitus, magna vi vomitum prouocat, & hydropicorum aquam expurgat. Idem praestat radice Ebuli succus, qui & crassos humores iuncturis eliciat. Ebuli seminis à nigro illo succo, eloti delibrati puluis, dragma potere, si in Iua decoctione offeratur, podagra iuncturarum: & Gallici morbi dolores mitigat. Exprimatur & ex Ebuli radicibus succus, qui siccatus digeritur in pastillos. Clysteribus inditur ad dolores frigidos, & ischiadicos. pedes ob febris diuturnitatem inflati, decocti radice fortius uiuantur, hocq. uicinis additis consentaneis roboratur. Sambucus & arbor & herba, desiccant, agglutinant, & aliquantum digerunt.

PICNOCOMUM. CAP. CLVI.

NOMENCLATURA.

Gra

Græ. πυκνόκομον.

Lat. Pycnocomon. Ital. Picnocomo. Ignota

Pycnocomon cōstat eruce folijs, acrioribus, scabris & cras-
 sis: caule quadrāgulo: flore Ocimi: semine Marrubij: radi-
 cibus nigra, aut pallida, rotunda, exigui mali figura, terram redo-
 re. Inueniatur in saxosis locis. Semen graui somnia & tu-
 mescitiosa facit, drachmæ instar potū. Tumores discutit, illitum
 polenta spicula, adaëtosq; corpori aculeos, extrahit. Folia
 u tubercula, panosq; discutiunt. Radix eius in aqua mulsā
 cum drachmarum pondere, aluum soluit & bilem extrahit.

Ignomum ignota planta, Nature horto colenda, & dignoscenda re-
 linquetur, quando & is eas cohibet quas perspectas arbitramur.



* Apios.

Apios. CAP. CLVII.

NOMENCLA- TVRA.

Græ. Απιος.

La. Apios. Ita. Apio.

Gal. nomine ignota.

Apios iuncos duos siue
 tres spargit, rubros,
 tenues, qui à terra parum
 attolluntur: folijs Rutæ, ob-
 longioribus tamen, & an-
 gusti

gustioribus, herbaceis: semine paruo, radice *Haustula* regiae formam *Pyri* turbinata, rotundiore tamen, succi secunda, intus habet corpus candidum, extra cortices nigros, Superior pars em vomitione bilem pituitasque extrahit: inferior per aluum. Totum utrinque purgationes mouet. Succum si libet eximere, tusa radix in fœtuli mergitur, & agitata aqua, quod supernatat pinna selectum, exiccatur. Purgat utraque parte is succus, sesquiboli potus.


Nascitur in Italia *Apios*, minutis folijs, *Hyperici* proximis, cum primo vere prodeunt, processu vero temporis è linea candida fistilibus: caule rubente, iunceo, & lacte candido turgenti. Porro radix tota, & vomitione stomachum, & purgatione aluum inaniens, profecti haud bene cum eis ageret, qui ea pro cibo vterentur.

Colocynthis. CAP. CLVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Κολοκυνθίς. Lat. *Colocynthis*. It. *Coloquintida*.
Gal. *Coloquinte*. Off. *Coloquintida*.

Colocynthis sarmenta foliaque satini cucumeris emittit, per terram repentia, diuisa, fructum in speciem mediocris pile conglomeratum, uehementer amarum: quem legere oportet, cum cœperit in pallidum colorem permutari. Medulla fructus purgatoriam vim habet, si quatuor oboli cum aqua mulsa, Melle cocto, Myrrha & Nitro excipiantur, & cogantur in catapotium. Aresactæ pile teruntur, & infusæ clysteribus prosunt neruorum resolutioni, coxædicum doloribus, & coli vitijs. ut quæ bilem, pituitam & strigmenta, interdum etiam cruorem eliciant. Fœtus ad motum enecant. Dentium dolorem tollit, si unâ repurgetur, & luto oblita cum aceto & nitro inferuescat, hocque iure decocti dentes coluantur. Si aqua mulsa aut passum in eadem decoquatur, & sub diuo refrigescat, potum crassum humorem & strigmenta alui detrahet. Stomacho supra modum



Colocynthis.

dum aduersatur. Subdita ex ea balano, alui excrementa eijciuntur. Virentis succo utilissimè ischiadici perfricantur.

Colocynthis, vulgaris noticie plāta quantūvis in diuersos morbos polleat, cordi tamē, iocinori, & stomacho aduersatur. Et sane gustu amara est, at epota, amarorem illum manifestō prodere non potest, ob purgatorie virtutis robur, quæ corpore ante humores secedit, Viridis succus ischiadicos iuuat.

Epithymum. CAP. CLIX.

NOMENCLATURA.

Græc. Επιθυμου. Lat. Epithymum. Ital. Epithimo.

Gal. Teigne de Thyn.

Epithymon, flos est e Thymo duriore Satureiæ simili, capitula habet tenuia: & lenia, & in eis caudiculas, quasi apillamenta. Potum cum Melle detrahit pituitā, bilem q̃, atrā, per inferna. Priuatim prodest melancholicis, & inflatis, acerbuli mensura, ad quatuor drachmas, cum Melle, sale, & aceto exiguo. Plurimum in Capadocia & Paniphilia gignitur.

Epithy

E Pithymum, non Thymi flos, siquidem is iam pridem detectus error sed Cuscuta Thymo innascens. Quæ Thymbræ adnascitur, Epithymbrum vocatur, Epithymum eiusdem cum Thymo virtutis, tertio classe desiccat & excalfacit.

Alypum. CAP. CLX.

NOMENCLATURA.

Græ. Αλυπον. Lat. Alypum. Ita. Alypo.

A Lypon surculosa herba est, subrubra, gracilibus ramulis tenuibus folijs: flore molli, leui, & copioso: radice Betæ tenui, referta, acri succo, semine Epithymi, Cignitur in maritimis, maximè Lybiæ, quam largissima: quanquam alibi quoque plurima provenit. Semen, atram bilem deijcit, si mensura Epithymo pari cum sale & aceto sumatur: uerum interanea leuiter exulcerat.

A Lypi ex Afluariio radix, Turbith est albū, quod ex oriente afferatur, quoq; vulgò vñtur officinæ. Iam superius descripsimus radicem cortices, quæ pro Turbith venduntur.

Empetrum, seu Calcifraga.

CAP. CLXI.

NOMENCLATURA.

Græ. Εμπετρον.

Lat. Empetron. Ital. Calcifraga.

E Mpetron aliqui Phacoides uocant. Nascitur in montibus & maritimis, salso gustu: sed quo propius terreno fuerit, amarius sentitur. Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur in iure aliquo, aut hydromelite.

E Mpetron herba effigiem non describens, Oedipi sciscitandi materiam præbuit. Hac se molestia exolunt, qui Empetron eam plantam arbitrantur, quam herbarij sceniculum marinum: & Itali, herba di S. Pietro nominant. Porro hac verū est Dioscoridis Crithamon, siquidē præter notas quæ concinunt, quantumvis copiose edatur, pituitam tamen & aquam non educet.

Vitis

Vitis sylvestris. CAP.

CLXII.

NOMENCLATURA.

Græ. ἀμπέλ & ἄγρια. La. vitis sylvestris.

Ita. vite saluatica. Gal. Vigne sauuage.



Vitis sylvestris.

Vitis sylvestris sarmē-
ta vitis modo praelon-
ga emittit, aspera, lignosa, ri-
moso cortice: folijs hortensis
solani, longioribus ac latio-
ribus muscoso flore, & capil-
laceo: fructu exiguis uuis si-
mili, post maturitatem rubē-
te: rotunda est acinorum fa-
cies. Feruescēta radix in a-
qua & in cyathis duobus
uini aqua marina diluti pota
humorem alui ciet, ideo hy-
dropicis datur. Vna eius, ui-
tia cutis in facie, & maculas
omneis expurgant. Enascen-
tes uiticula, cibi gratia, sale
condiuntur.

Comptulis mulieribus non ignota Vitis sylvestris, vt cuius uuis, quo
colorata appareant, faciei cutem confricent, nempē mordax & a-
ris, statim vt attigerit, adurit. Hanc in annum incorruptam asseruant,
nā etsi aliquantū flaccescat, tamē nec humor, nec color depereunt. Vitis
sylvestris vna, virtutis sunt absterforia, siquidem cutem emaculant, Vi-
ticula incipientes aliquantum astringunt, ac ideo muria in cibos anti-
quitus seruabantur.

R

Vitis

Vitis alba. CAP.

CLXIII.

NOMENCLATURA.

Gr. ἄμπελος λεύκη. Lat. *Vitis alba*. It. *Vite bianca*.
Gal. Couleuree. Off. Bryonia.



Vitis alba.

V Item albam aliqui Bryoniam uocant. Folijs uiticulis, pāpinisq³ satinā uitem imitatur, sed hirsutiora sunt omnia: ea quos prope se nata sit frutices, suis clauiculis complectitur: fructus rubens in uua dependet, quo coria pilis spoliatur. Ex ea Asparagi, qui prima germinatione exeunt, decocti in cibo, aluum & urinam cient. Folia, fructus, radix, acrem uim sortiuntur. Itaque ulcerum phagedenas, gangranis, chironys, putretium tibiārum tadio, efficaciter ex sale illinuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat. Vitia cutis in facie, uarosq³, lentigines & cicatrices nigras emendat, cum Eruo, creta Chia, & Fœnogræco. Eodem effectu prodest decocta in oleo, usquedum liquecat: sugillata tollit, reduuias committit: inflammationes discutit, illita ex uino: suppurationes

rationes rumpit, medicamento aptè immiscetur, quod carnem
 xest: infra cta ossa extrahit, trita & imposita. Datur comitia-
 libus in potu drachmæ pondere, quotidie, anno toto. Prodest at-
 onitis, & uertigine laborantibus, consimiliter assumpta. Con-
 tra uiperarum ielus pota drach. duabus, auxiliatur, partus ne-
 at, mentem interdum subturbat. scæminarum locis apposita, par-
 us secundasq; morantes trahit: cit urinam pota: eclegma ex ea
 fit cum Melle, difficile spirantibus, strangulatu oppressis, tussie-
 ribus, uulsi, rupis, & laterum doloribus: lienem ternis obolis
 pota ex aceto triginta diebus, consumit. illinitur ad eadem cum
 Ficco. Ad muliebres infessus decoquitur: siquidem uulvas pur-
 gat, sed abortum facit. Succus è radice uere exprimitur, qui tra-
 hit pituitari, cum aqua mulsâ potus. Ad psoras & lepras semè
 efficaciter illinitur. Lactis abundantiam facit succus eius, si cum
 tritico decocto sorbeatur.

Vitis alba, cognita satis planta, præter vires quas illi Dioscorides
 attribuit, præfocationi matricis diuinū quoddam remediū est. Vitis
 alba viticula amaroris aliquantū & acrimoniæ cum vi astringentia cō-
 tinent. Radix virtutis est absterforia, desiccatoria, & modicè calida.
 Candida radix, alba Viti nomen indidit.

Vitis nigra. CAP. CLXV.

NOMENCLATURA.

Gr. ἀμπέλ & μέλαινα. La. Vitis nigra. Ita. Tamaro.

Nigra uitis, quam alij nigram Bryoniam uocant, folia fert
 Hederæ, sed maiora, Smilaceis proxima: caules etiam co-
 gnatos, capreolis suis arbores, quasi adminicula, comprehendit:
 fructus racematim coherent, qui inter principia uirent, & post
 maturitatem nigrescunt. Radix foris nigra, intus buxæo colore
 nitet. Viticula quæ primo germinum partu erumpunt, Menses
 pellunt, urinas cient lienem absumunt, uertiginosis, comitialibus,
 neruorum resolutione tentatis, prosunt. Radix eadem, quæ Vitis
 R 2 alba

alba præstat, sed inefficacius. Folia cum uino exulceratis iumentorum ceruicibus commodissime illinuntur: luxatis itidem imponuntur.

Vitis nigra, ab accarum insigni nigrore, non à radice nomine desumpto, vna tamen Romanis dicitur. Viticula statim ut è terra prodeant, Asparagi similes, eorum more in acetaria veniunt, quanuis non pari qua Asparagi, in gustu gratia. Quam Vitalbam Thufci vocant, Clematidis secundum est genus, à Dioscoride in huius initio libri descriptum, planta summè aeris, & exulcerans, & non vitis nigra.

Filix. CAP. CLXV.

NOMENCLATURA.

Græ. πτερίς. Lat. Filix. Ita. Felce.

Gal. Feuchiere.

Filici folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex uno pediculo, cubitali longitudine, multifida, & lateribus pinnata, subgravi odore: radice per summa cespitum nigra, oblonga, filices multas fundente, substringente gustu. Nascur in montibus & saxosis. Radix laticineas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsæ, melius si cum scammonia aut Veratri nigri totidem obolis detur: sed qui sumunt, Allia prægustare debent: laborantes lienis incremento recreat. Radix & potu & illitu cum axungia vulneribus sagitta arundinea factis, est auxilio. Cuius rei probatio talis fertur: Peribit Filix, quam per ambitum lata copiosior Arundo coronet: & contra, euanescent abibit Arundo, quam obsepiens multa Filix in orbem cinxerit. Filix fœmina folijs est Filicis, surculosis, altioribusque, & quæ non singulari, ut illa, pediculo fulciantur: radicibus longis, pluribus, obliquis, quæ ex nigro in luteum flauescunt. Aliquæ etiamnum rubræ inueniuntur. Pellunt lata interaneorum animalia, cum Melle eclegmate sumpto. Potæ cum uino drachmis tribus, teretes tineas eijciunt. Datæ fœminis, sterilitatem faciunt, & prægnantibus abortum, si supergrediantur. Farina humidis ulceribus, & cica



Filix Mas.



Fœminæ.

Et cicatrici repugnantibus, inspargitur. Iumentorum cervicibus medetur. Folia recentia in oleribus cocta manduntur, ut ventrem emolliant.

Filix mas & fœmina è Dioscoridis descriptione, & ipsa facie noscitur. Mas ex unico pediculo multa folia educit, nullo caule. Fœmina longos habet caules, folia plurima, masculæ, latiora & breuiora. Filix gustu amara est aliquantum astringit.

Filicula, siue Polypodium CAP.

CLXVI.

NOMENCLATURA.

Græ. πολυπόδιον. Lat. Polypodium. It. Filicola.

Gal. Polypode.

Filicula nascitur in montosis petris, & uetustis arborum caudicibus, præsertim Quercuum, palmi altitudine, Filici simili

R 3

lis, sub

lis, subhirsuta, nō tenui perinde diuisura: radix pilosa, in qua continentur cirrhi, ceu polyporum, crassitudine digiti minimi, coloris intus herbacei, austera aliquantiū, & gustu subdulcis. Purgandi vim habet. coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluum soluendam. Arida farina aquae mulsae insparsa, detrahit bilem & pituitam: trita luxatis efficaciter illinitur, & aduersus rimas quae inter digitos fiunt.

Polypodii siue filicula duplex est. Vnū perspicuum seplasijs & vulgo, alterum non cuius cognitum: nec omnibus locis innascitur. hoc folijs constat Aspleni, longioribus tamen, viridioribus, & magis incis. Radix figura, gustu, colore prima nihilum dissimilis. Copiose hoc secundum, in quibusdam montibus provenit, nempe his quae e Goritia Carmiolam itur. Dulce & austerum, desiccatur siue morso.

Dryopteris. CAP. CLXVII.

NOMENCLATURA.

Gr. *δρυοπτέρις*. Lat. *Dryopteris*. It. Felce di quercia.

Dryopteris nascitur in ueterum Roborū musco, Filici similis, multo minore foliorum incisura, radicibus inuicē implexis, hirsutis, gustu acerbis, in dulcedinē uergentibus. Psilothrum est cum radicibus trita: illinitur enim primum usque dum sudorem erocet, mox sudor abluatur, & recens imponitur.

Dryopteris, inde nomine accepto, nascitur in annosarum Quercuum musco, Filici similis, tenui foliorum subdulcium incisura, radice hirsuta. Qualitatis est mixta, ē dulci, acri, & in radice acerba, incisoriāque vim obtinet.

Cnicus. CAP. CLXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. *κνίν* &. La. *Cnicus*. It. Zaffarano.

Saracinesco. Gal. Saffranbastard.

Off. Carthamus.

Cnicus folijs constat oblongis, per ambitum diuisis, asperis, spinosis, caule sesqui pedali: capitulo magnitudine grandis oli



Cnicus.

dis Oliuæ: flore Croci: semine candido, alioqui rufo, longo, anguloso. Huius flore in obsonijs utuntur. Seminis tusi & expressi succus, cum aqua mulsâ, uel iure gallinacei, aluum purgat: sed stomacho aduersatur. Ex eo autem fiunt offula, quas placentulas uocant, adiectis succo Amygdalis, Nitro, Aniso, & Melle decocto. quæ aluum emolliunt. Hæ in partes quatuor finduntur, quæ nucis iuglandis magnitudinem impleant: è quibus ante cœnam duas uel tres sumsis-

se satis est. Ratio temperandi hæc est: Cnici candidi sextarius, Amygdalorum testorum & delibratorum cyathi tres, Anisi sextarius unus, Aphronitri drachma una cum carnibus triginta caricatum. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluenda alui facultate donat.


Cnici flore quidam in cibis utuntur, Croci vice. Solius seminis usus est in medicina. Theophrastus duo Cnici facit genera. Vnum recto caule, fructu nigro, grandi, amaro, capite acanaceo, oliuari crassamenti, luteis crinibus capillato. Hunc officinæ, sylvestrem Cartamum, dicunt. Alterum hirsutius torosiori caule, foliorumque mollitia humi penè serpens, radice fulua, tenui, superuacua, tubere acanaceo, in quo lutea stamina prominent molli intus lanugine semen operient. Hunc Carduum benedictum Officinæ appellat. Cnici semen expurgat, sed foris applicitum, tertij est ex calsauentium ordinis.

Mercurialis. CAP. CLXIX.

R 4

Gra.

Græ. *Λιγώρις*. Lat. *Mercurialis*. Ital. *Mercorella*.
Gal. *Mercuriale*.



Mas.



Fœmina.

LYnozostis, aliqui Parthenion, alij Hermu Botanion appellat, folijs constat Ocimi, minoribus, Helxine cognatis ramulis duplici geniculorum nodo cinctis, alarum cauis multis, fructu fœmina, copioso, quandam racemorum speciem præbente: mari, è foliorum sinu dependente, paruo, rotundo, ceu binis testiculis unà coherentibus: frutice dodrantali aut maiore. Vtraque in oleribus manditur, ad aluum ciendā. Cocta in aqua, epoto iure, bilem aquamq; detrahit. Constat ut mares gignantur, hunc facere: ut fœmina, illam: si à purgatione bibantur, & tria folia genitalibus admoueantur.

Mer

Mercurialis genere sexūve distinguitur. Nam quæ duplicia, & testicularum effigie connexa habet semina, mascula vocatur, femina constat copioso semine, quod vuarum modo acinis dependeat. Iam superius ostendimus, Phyllon Herbam, & Mercurialem idem esse, & proinde Theophrasti Arrhegonon & Thelygonon, ipsum esse Phyllon & Mercurialem.

Cynocrambe. CAP. CLXX.

NOMENCLATURA.

Gr. Κυνόκραμβη. Lat. Cynocrambe.

Ital. Marcorella bastarda. Gal.

Mercuriale bastarde.



Cynocrambe.

CYna aut Cynocrambe, cauliculum binū dodrantum altitudine emit, mollem, subalbidum: folia Mercuriali aut hederæ similia, certis interstitijs subalbida: semē folijs adhæret paruum, rotundum. Folia cum caulibus pota, aluum ciunt: oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam: & bilem, aquamq; detrahit.

CYNOCrambe, herba, nisi quod maiora profert semina, Mercuriali mascula cetera similis campestribus, vijs publicis, & vineis prouenit, longè

R 5 ab A 111

ab Atriplice sylvestri herbariorum disidens, nam hæc non in binum d-
drantur, sed in binum non raro cubitorum altitudinem exurgit, huius
errorem agnovit Ruellius, & prodidit, non ipse impegit.

Heliotropium. CAP. CLXXI

NOMENCLATURA.

Gr. ἡλιοτρόπιον. Lat. *Heliotropium*. Ita.

Heliotropio. Gal. l'Herbe au Chancre.

Heliotropio magno flos est effigie scorpionis caudæ, unde
Scorpiuro ei nomen, & quoniam folia cum sole circum-
agat, *Heliotropion* dicitur. Folia Ocimi habet, hirsutiora, candi-
diora, et maiora. Ramuli a radice terni, quaterni, aut sæpe qui-
ni exiliunt, multis alis cōcaui: flos in cacumine candidus, aut sub-
fulvus, incurvatur ut scorpionis cauda. Radix tenuis est, & in-
utilis. Nasitur in asperis. Decoctum herbæ ex aqua, fasciculo
manus plenæ, potu pituitam bilemq; per alium extrahit. Contra
scorpionum ictus ex uino potum & illitum prodest. Ad alliga-
tur ad conceptus arcendos. Aiunt per horam unam ante acces-
siones, seminis grana quatuor cum uino, quartanas finire: tria
uero, tertianas. Illitum semen formicantes verrucas pensilesq; et
thymos, & epinyctidas exiccat. Folia infantium destillationi-
bus, quas syriaseis uocant, podagris, luxatisq; utilissime illinun-
tur, menses cient, partus trita & imposita pellunt. *Heliotropion*
paruum nascitur in palustribus, iuxta lacus, folijs ante dicto pro-
ximis, rotundioribus: semine, acrochordonum verrucarum mo-
do, pensili, rotundo. Herba cum suo semine pota, adiecto Nitro,
Hysopo, Nasturrio, & aqua, latus tineæ terretesq; excutit. Pen-
siles verrucas, quæ acrochordones uocantur, cum sale illita tollit.
Scorpioides herbula est, folijs paucis, semine caudæ scorpionis ef-
figie. Illita scorpionum ictibus præsentaneo est auxilio.

Helio

[Heliotropium maius, ea est planta quam Verrucariam seplasia nominant, quod verrucas & myrmecias affricta potenter tollat. Prole errant qui Calendulam vulgo vocatam, Heliotropium maius existunt. Siquidem Dioscoridi, flos, non semen Heliotropij, cauda scorpionis similitudinem refert. Vulgatum huius nomen, herba cancri, inde potius profert, quod carcinomata & phagedanas mirando successu percuret, quam eadem gammarorum similitudine. Heliotropium minus, non semel à Catthiolo deprehensum, & medicis & spectarijs ostensum, lacubus et ludibus adnascens, quæ Tridentinis angustis imminet. Enimvero Calendula, Scorpionides erat, si folio exiguo esset & breui, cum Calendis longo sit & arcto, semine non scorpionis cauda, sed scorpioni toto conuili. Caterum ipsum Heliotropij nomen latè apud Græcos patet, nemini omnes plantas, quæ suo circumactu solem affectentur, cuiusmodi sunt, Malua, Cichorium, Scopiuron, Lotos, Lupinus, attamen Verrucaria, peculiarem aufert Heliotropij nomenclationem.


Finis Quarti Libri.

PEDANII DIO

SCORIDIS ANAZAR-
bei, De medicinali materia, Li-
ber Quintus. Ioanne Ruel-
lio Suefsionensi
interprete.

*Ad puncta annotationes doctæ &
compendiosæ.*

PRAEFATIO.



VPERIORIBVS Quatuor libris,
amicissime Aree, tradidimus de aromati-
bus, oleis, unguentis, & eorundē lachrymis
ac fructibus: item Animalibus, Melle, Lacte,
Adipe, Cerealibus, Oleribus, necnō de omni
Radicum, Herbarum, Succorum, Seminūq; ratione. In hoc aut
totius operis Quinto, differemus de Vinis & metallicis, à Vite
nostram commentationem auspiciati.

Vitis uinifera. CAP. I.

NOMENCLATURA.

Gr. Αμπέλ & οινόφορος. Lat. Vitis vinifera.

Ita. Vite uinifera. Gal. Vigne.

Folia Vitium & triti capreoli, capitis dolores illitu mitigāt:
& inflammationem stomachi ardoremq; cū polenta: Fo-
lia etiā per se, ut quæ refrigerent & adstringant, imponi solent.

Potus



Vitis vinifera.

Potus eorū succus dysenteri-
cis, sanguinem excreantibus,
stomachicis, & grauidarū
malacia medetur. Eadē effi-
ciunt madefacti in aqua ca-
preoli & poti. Lachryma ui-
tium, quæ ueluti gummi in
caudicibus cōcreſcit, ex uino
pota calculos pellit. Illita li-
chenis et pſoras leprasq; Ni-
tro prius perfrictas sanat: ea-
dem cū oleo ſæpius pilis illi-
tis, Pſilothri effectū habet:
maximeq; ſanies, quā accen-
ſa ſarmenta Vitium uiridia
exudarunt: qua & perūclæ
uerrucarum inſormicationes

trahuntur. Cinis ſarmentorum & uinaceorum, detractis in
de cōdylomatis, & thymijs, illitus ex aceto medetur. Prodeſt
exatis, & uiperarum morſibus: contra lienis inflammationē
nititur, cum Roſaceo & Ruta & aceto. Labruſca duorum ge-
nerum eſt. Alterius uua non matureſcit, ſed flore tenuis Oenan-
the nominatam perducit. Altera ad frugem peruenit, paruis
gracilis, nigra, & adſtringens. Folia, caules, & clauicula quibus
pungunt, uim habent cultæ Viti ſimilem.

Vua. CAP. II.

NOMENCLATURA.

Græ. Σταφύλη. Lat. & Ita. Vua.
Gal. Raiſin.

Vua

Væ recentes aluum turbant, & stomachum inflant: in nocentiores, quæ decerptæ diu pependere, ideo quod in e copia humoris exiccatur, utilesq; sunt stomacho ægrisq;, atque cibi auiditatem excitant. In uinaceis & ollis seruata, ori & stomacho grata sunt. Aluum sistunt, sed uesicam & caput tentant, & sanguinem excreantibus conueniunt. Similesq;, quæ in musto suere. Sapa aut passo condita, stomachum magis infestant. At quæ solem prius passæ in aquæ cœlesti conditur, minus uino sæ sunt, siticulosi, ardentibus & longis febribus salubres. Reconditi Vinacei inflammatis mammis, rigentibus ac præduris, cum sale illinuntur. decoctura eorum dysentericos, cœliacos, & fæminas fluxione uulvæ laborantes uiuat insusa, ad dessestiones, ac fetus assumitur. Nuclei acinorum adstringendi uim obtinēt, stomacho utiles sunt, inspargitur farina tostorum, polenta modo, dysentericis, & cœliacis, & solutus stomacho. Vna passa, alba, adstringentior est. Prodest esitata caro earum tussi, faucibus, renibus, ac uesicæ. Estur in dysenteria per se cum nucleis, & decocta in patinis cū Melle, admista Milij ac Hordei farina & ouo. Valet ad purgandū caput, eiusdem gratia cum Pipere comman-ducatur. Testium inflammationes sedat, illita cum lomento Fabarum, aut Cumini farina. Fauos, epinyelidas, carbunculos, enatas in articulis putredines, & gangrenas, sine nucleis trita, & cum Ruta imposita sanat. Podagræ conuenienter cum Panacis succo illinuntur. Mobiles ungues illita, celerius extrahit.

Oenanthe. CAP. III.

NOMENCLATURA.

Gr. Οἰσάνθη. Lat. Labrusca. Ita. Lambrusca.

Gal. Grappe de vigne fauue.

Oenanthe. Vitis sylvestris fructus, cum floret. Recondi debet sic, non picato, collectaq; substrato linteo.

umbra siccatur. Laudatissima in Syria & Cilicia & Phœni-
 cis ei adstrictoria, quare pota stomacho ac ciunda urinæ uti-
 Aluum sistit, ac sanguinis excreationes. Contra fastidia &
 rem stomachi, sicca & illita efficax est. Capitis doloribus
 viridis quàm sicca, ex aceto & Rosacco perfunditur. San-
 inolenta uulnera cataplasmate, & incipientes agilopas, oris
 era, & genitalium nomas, trita cum Melle, Croco, Myrrha,
 Rosaceo, ab inflammatione vindicat: pessis miscetur, ad sisten-
 m sanguinem. Contra oculorum delachrymationem, & sto-
 chi ardores, cum polline polentæ & uino illinitur. Cinis cre-
 ta in testa, cādētibus prunis, facit ad oculorū medicamēta, re-
 uias et pterygia: abscedētes gingiuas, cruētāsq; cū Melle sanat.

Omphacium. CAP. IIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Ομφάκειον. Lat. Omphacium. Ita, Agresto.

Gal. Veriust. Off. Agresta.

Omphacion succus est acerba uua, nondum maturescētis,
 ē Thasia uite aut Aminea. Oportet aut ante canis ortū,
 pressam melliginem in rubro are, linteo cooperto, insolare,
 quedū cogatur, semperq; quod ceruici uasis cōcretū hāsīt, reli-
 o humori permiscere: noctu à subdialibus locis in lectū referre
 ando quidē nocturni rores ipsum cōcrescere nō sinūt. Eligen-
 m est flauū, friabile, uehemēter astringēs, & linguā mordēs.
 nt qui coquēdo melliginē cogāt. Prodest cōtra tonsillas, uua,
 era oris, humida ginginarū uitia, puruletas aureis, cū Melle
 t passo. Itē ad fistulas, uetera ulcera, nomasq; ex aceto: dysente-
 is, et mulieribus fluxione uulua laborētibus clystere infundit.
 ulorū claritati, et scabritia, et erosionibus angulorū cōuenit.
 bit ad recētē sanguinis excreationē, etiā si rupta parte aliqua
 ingat: sed pauco, et aquatiore est utēdū: ualde siquidē exurit.

Vini

Vini natura. CAP. V.

NOMENCLATURA.

Græ. CIVO. Lat. Vinum. Ita. Vino.

Gal. Vin.

Vino uetere nerui leduntur & reliqui sensus, quod tamen gustu suauius est. Quare cauendum ijs qui intestinae aliusque partis imbecillitatem sentiunt: attamen in secunda ualitudine paucum, aqua dilutum, innoxie sumitur. Nouum inflat, & coquitur, insomnia parit graua, & urinam ciet. Aetate rediit, utraque uitia fugit: quare ad uictus sanorum aegrorum usurpatur. Album, tenue, stomacho utile est, ac facile in membris distribuitur. Nigrum uero, crassum est, & concoctu difficile. Nemo alit, & ebrietatem creat. Giluum, utpote quod medium inter utrumque uires habet. In secunda tamen & singula ualitudine, cum primis laudatur album. Quin & uina sapientia distant. Siquidem dulce crassis partibus constat, & difficilius corpore expirat: stomachum inflat, aluum & interanea, utrumque turbat: sed minus inebriat, renibus, & uescica aptissimum. Austerum, per urinam celerius transit: sed capita dolore tentat, & temulentiam gignit. Acerbum, ad ciborum per membrorum digestionem accommodatissimum, aluum, & ceteras fluxiones cohibet, minusque urinam expellit. Nouum neruos minus tentat. Vinum aqua marina factum, stomacho aduersatur, sitim stimulat, neruos infestat: aluo aptum, à ualitudine se recolligentibus inutile. Passum, quod uuis sole siccatis in area, aut in sarmen- torrefactis exprimitur, Creticum cognomine, aut Pramnicum aut Protropon: & Sapa, quæ sit musto igni decocto, Græci rion aut Hepsēma appellant: nigra quidem, & quæ dicuntur Melampsithia, crassa sunt, & corpora multum alunt: candida tenuius: & Heluola inter hæc media, medias sortiuntur uir-

Omni

minia tamen adstringunt, & pulsus reuocant. Faciunt aduer-
 sus uenena quæ exulcerando necant, ex oleo pota, & uomitio-
 bus reddita. Contra cicutas, Meconium, Pharicon, Toxica,
 & concretum in grumos lac: Item contra renum, ac uesicæ pru-
 ritus, resiones, exulcerationesq; inflant tamē, & stomacho ad-
 versantur. Priuatim prodest Melampsinthiū: si uenter rheuma-
 tum sentiat: album, magis cæteris emollit aluum. Gypso cō-
 tritū, neruis officit, caput aggrauat, & incendit, ac uesicæ aduer-
 tur: contra uenena cæteris aptius. Picata, aut resinata, excal-
 ciunt, concoquunt, sanguinem excreantibus inimica. Quæ ue-
 l Aparachyta uocant, ut quæ admistam Sapam recipiunt, ca-
 rit implent, temulentiam gignunt, ægrius in halitum expirant,
 stomachum malè habent. Inter Italica uina Falernum princi-
 palem locum obtinet, quod inueteratum perquàm facile coquitur:
 alius exuscitat, aluum adstringit, stomacho utile. sed uesicæ no-
 t, atque ijs qui uisus hebetudinem sentiunt: & ad potus cre-
 ros minimè idoneum. Albana crassioribus constant partibus,
 uiscia, stomachum inflant, uentrem emolliunt (sed concoctio-
 nem non æquè adiuvant) & nervosa minus infestant: uetusta-
 eadem austerum saporem concipiunt. Cecubum, cum sit dul-
 ce, est & Albano crassius. Corpus & colorem alit: agrè ta-
 men coquitur. Surrentinum, ualde austerum est: quare intesti-
 norum & stomachi fluxiones cohibet, & cum tenue sit, caput
 unus tētat: inueteratum suauius redditur, & stomacho utile.
 Adrianum & Mamertinum in Sicilia æquè crassis partibus
 gignuntur. Modicè adstringunt, & ocysimè inueterantur,
 inusq; ob suam tenuitatem, nervos tentant. Paratypianum,
 quod ex Adriatico sinu defertur, odoratum ac tenue est: qua-
 libet liberaliter epotum fallit: diu seruat ebrietatem & soporem
 infert. Istricum Paratypiano simile est, sed urinam uehemen-
 ter pellit. Chium tamen antedictis mollius, & aptum potui est:

S

Bene

Bene alit, & minus inebriat fluxiones cohibet oculorum m-
dicamentis utile. Lesbium facile membra subit, Chio leuius, &
alio idoneum. Ephesium eandem uim habet, quod Phygeli
nominatur. Verum Asianum è Tmolo monte, Mesogites app-
latum, capitis dolores ciet, & nervos lædit. Coum uerò & C-
zomenium, quoniam multam sibi maris aquam uendicant, fa-
cile corrumpuntur: flatus mouent, aluum turbant, neruis off-
ciunt. Vinum omne (ut reliqua in commune dicantur) merui-
ac sincerum, & sua natura austerum, excalfacit, facile in mē-
bra distribuitur: stomachum adiuuat, appetentiam ciborum in-
uitat, uires alit, ac robur auget, somnum conciliat, & commē-
dat colorem. Potum liberalius auxilio est contra assumptam C-
cutam, Coriandrum, Pharicum, Ixiam, Meconiam, Argem-
spumam, Taxum, Aconita, Fungosue: contra serpentium mor-
sus, & omnium iēlus quæ refrigerando necant, aut stomachi
in uomitiones effundunt. Facit ad longas inflationes, rosionesq;
præcordiorum, ac distentiones, stomachi resolutionem, & si ue-
ter aut interanea rheumatismum sentiant. Conueniunt sudato-
ribus, & quibus corpus immodico sudore digeritur, maxime
alba, uetera, & odorata. Quæ tamen uetustate dulcescunt, re-
nibus ac uesicæ accommodatiora redduntur. Vulneribus, inflam-
mationibusq; in succida lana imponuntur. Tetra ulcera & pha-
gedænica, & fluxionibus obnoxia, commodè perfunduntur.
Quæ marinam non receperunt, austera & alba, ad sanorum
uictus usurpantur. In his, præstant Italica, Falernum, Surrenti-
num, Cecubum, Signinum, & permulta Campaniæ, & Pa-
rætypianum ab Adriatico sinu, & Siculum quod Mamerti-
num appellatur. Ex Græcis Chium, Lesbium, & Phygelites ex
Epheso. Crassa uerò & nigra, stomacho negocium exhibent,
inflationem pariunt, corpus augent. Tenuia tamen & austera
stomacho prosunt, & minus carnes alunt. Vetera ualde tenuia,
& can

Et candida uehementius urinam ciunt, Et dolores capitis mo-
uent, neruosq; largius pota tentant. In media etate, ut à septimo
anno, potui saluberrima sunt. Modus autem pro etate, Et tem-
ore anni, Et consuetudine, Et qualitate uini definiatur. Non
ire, Et modicè cibos prolui, optimum est præceptum. Nocet e-
rietas omnis, Et maximè assidua, siquidem obsessos neruos
uotidie remittit: largiorq; potus, acutorum morborum adfert
utia. Mediocris tamen uinolentia, aliquot diebus, maximè post
quæ potus, utilis: namque modo quodam ex alto euocat, sensi-
sq; expurgat excretus, Et per cæca corporis ducit spiracula:
ad aquam post uinolentiam bibere oportet: siquidem ualetudi-
is alicuius gratia facta temulentia, remedium affert frigida.
Omphacites nomine peculiariter fit in Lesbo, siccata sole acri V-
a, paulò ante maturitatem decerpta, triduo aut quatruiduo, do-
ec racemi in rugas contrahantur, expressumq; Vinum cadis in-
ilatur. Vinum adstringendi habet. Prodest dissolutis, stomacho,
Et ilei dolore laborantibus. Item prægnantium malacia, Et
rudis. In pestilentia quoque sorptum auxiliari dicitur. Huiusmo-
di Vina non nisi post multos annos bibi possunt. Lora, quam
deuteriam, alij Potimon appellant, fieri solet, adiectis metretis
ribus aqua, in uinacea, quibus triginta Vini metretæ extractæ
uerint, calcatis uinaceis, expressoq; decocto ad tertias parteis,
dditis in singulos congios modi eius qui remansit, binis salis
xtarijs. post hyemem transfunditur in uasa. Lora intra an-
num utendum: etenim celeriter exolefcit. Conuenit ægris qui-
us timemus noxam Vini, coacti sepe desiderijs eorum obtem-
erare. Itam à longa ualetudine se recolligentibus. Fit Et ui-
um quod Adynamon uocant, Lora uires habens hoc modo: Pa-
es aquæ Et musti mensuræ coquuntur molli igne, donec absu-
atur aqua: quod, ubi refrixerit, elutriatū, picatonase recoditur.
Alj marina Et cælestis aqua, mellis Et musti pares miscet por-
S 2 tiones

tiones, decapulant, & quadraginta diebus insolant, quo ad annum utuntur ad omnia eadem. Vinum è sylvestri Vua nigrum adstringit. Prodest aluo & stomachi fluxionibus: & ceteri quibus constrictione & contractione opus est.

Vinum melitides. CAP. VI.

NOMENCLATURA.

Græ. μελιτίτης, Lat. Melitites. Ita. Vino

Meliide, Gal. Vin fait du moust

de gros vin, & de Miel.

Melitites datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarunt. Nanque aluum leuiter emollit, urinam ciet, stomachum expurgat. Prodest articulario morbo, renum vitij, imbecillo capiti, & mulieribus abstemijs. Odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat à Mulso quod sit è Vino uetere, austero, & Melle exiguo. Melitites autem adiecto ad quinque congios austeri Musti, Mellis congio, & salis cyatho, cortinis magis, quò magis ad efferuescendum locus pateat, fieri oportet, sensim asperso sale: cumq; efferuere desierit, in alia uasa transfunditur.

Mulsum. CAP. VII.

NOMENCLATURA.

Græ. δινόμελι. Lat. Mulsum. Ita. Vino Mulso.

Gal. Mixtion de gros vin vieulx

& de Miel.

Mulsum è uetere Vino austeroq; & bono Melle factum, præfertur: minus enim inflat, ac celeriter id genus in usum uenit. Vetus, corpus alit: media ætate, aluo prodest, urinam pellit, à summo cibo sumptum nocet: & inter initia potum, implet, dein appetendi auaritatem renocat. Fit Mulsum duabus Vini metretis, admixta una Mellis. Aliqui, quò celerius præbe-

ri pos

i, Mel cum Vino coquunt, & ita transfundunt. Alij utilitatis
ratia, ad sextarios sex musti feruentis, unum Mellis adijciunt,
& ubi ferbuerit, uase recondunt: dulce autem permanet.

Aqua mulsā. C A P. V I I I.

NOMENCLATURA.

Græ. μελίκρατον. Lat. Aqua mulsā.

Gal. Mixtion deau & de Miel.

Aqua mulsā easdem quas Mulsū vires possidet. Cruda
utimur, cum molli deiectionem, aut uomitionem inci-
re uolumus: ut ijs qui uenena hauserunt, ex oleo. Decocta da-
tur imbecillis, & hominibus elanguescentis pulsus, quos illi di-
cere microsphyctos: tussientibus, peripneumonicis, & ijs qui
immodico sudore digeruntur. Iam paratum cōdituumq̃, quod
liqui Hydromeli propriè uocant, media etate Adynamo Vi-
no, aut Loræ in recreandis uiribus respondet, & similem uim
dipiscitur. Quare inflammationibus alicuius membri plus quā
ora prodest. Inueterati tamen usus damnatur inflammatis, aut
constrictis, sed laboranti stomacho, aut cibum fastidienti, suda-
toribusue conuenit. Fit duabus pluuiæ aquæ ueteris ad unā Mel-
lis partem additis, & insolatis. Alij fontanam aquam adijciunt,
& ad tertias parteis decoquunt, & ita recondunt. Nec desunt
qui Hydromeli appellent, quod à Melle elutis aqua sanis confici
ut seruari soleat: sed meracius confieri conuenit. Aliqui id co-
quunt. Agrotantibus noxium est, quoniam plurimum ceragi-
nis sibi uendicat.

Aqua. C A P. I X.

NOMENCLATURA.

Græ. ὕδωρ. Lat. Aquā. Ita. Acqua.

Gal. Eau.

DE Aquis in uniuersum decernere, propter locorum proprietates, & peculiare naturas, cœlum, & alia pleraque, difficile est. Magna tamen ex parte optima est dulcis, syncera, nullius omnino qualitatis particeps, & quæ ne minimo quidem tempore in præcordijs commoratur. Ad hæc, quæ & facili uia fertur, & citra molestiam. nec inflationes creat, & minimè computrescit. Aqua maris calida est, & acris. Stomacho aduersatur, aluum enim conturbat. Pituitam expellit: si uerò calida ad fots adhibeatur, elicit & discutit. Nervorum uitij, & perionibus, ante ulcera prodest. Miscetur cataplasmatibus ex hordeacea farina, & emplastris, & discutientibus malagmatis. Ad mouendas deiectiones tepesacta infunditur, ad tormina: calida, psoras, pruritus, impetigines, lendes, & mammas rigentes, foueri utile est. Liures fots discutit. Ad uenenatos ictus, qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur, maximè scorpionum, phalangiorum, aspidumq̃. Etiam si quis in calidam descendat, auxiliatur: & malo habitu confectis iamdiu corporibus, neruisq̃, balnea ex ea utiles: hydro picos, capitis dolores, aurium grauitates, feruentis uapor leuat. Syncera, & sine potabilis aquæ mistione reposita, uitus deponit. Sunt qui etiam præcoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per sese, aut ex posca, aut cum Vino, aut Melle. uerum post deiectionem, dant gallinæ aut piscium iuscula, ad domandam morsus acrimoniam.

Thalassomeli. CAP. X.

NOMENCLATURA.

Græ. θαλασσώμελι. La. Thalassomeli. Ita. Thalassomele. Gal. Mixtion deau de mer & de Miel.

Quod Thalassomeli uocatur, uehementer purgare constat. Temperatur autem æquis portionibus, maris, Mellis, &

, & imbris ex alto, defecatis, & picato uase per canis aestus solatis. Alij ad binas marinae coelae singulas Mellis adijciunt, se cōdūt. Huiusmodi moderatius est aqua marina, & mitius.

Acetum. CAP. XI.

NOMENCLATURA.

Græ. $\omicron\Xi\Theta$. Lat. Acetum. Ita. Aceto.

Gal. Vinaigre.

Acetum refrigerat, & adstringit. Stomacho utile, appetentiam excitat. Erumpentem undecunque sanguinem, ut in se sive sistit. Prodest alui fluxionibus coelum cum cibis. Feruentis uulneribus inditur. Inflammationes arcet, in succidis laui aut sponsia impositum. Reprimit procidentia sedis, uuluaq; em abscondentes gingiuas, & sanguine manantes. Ad nomas, & ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, lepras, impetigines, erygia, cum aliquo conuenienti efficax est. Phagedænas ulcerum, nomasq; fotu continuo cohibet. Podagricis calido fotu, cū lfire auxiliatur. Sugillationes rapit, cum Melle illitum. Contra capitis ardores cum Rosaceo in succidis uelleribus, aut sponsia imponitur. Ad aquam intercutem, grauitatem aurium, & pruritus, sibilosq; feruentis uapor proficit. Instillatum quoque aurum uermes necat. Panos coërcet tepidi fotus, aut si imbuta acetum spongia admoueat. Pruritus permulcet. Contra uenenas serpentium ictus, qui refrigerando nocent, calidum commouet fouetur: & frigidum, ijs quæ exurens uirus eiaculantur. Cadum potum atque uomitionibus redditum, aduersus omnia uenena efficax est, præsertim contra Meconium, & haustam Citatā, cōglobatū in uentre sanguine, lac coagulatū, Fūgos, Ixiā, Taūq; cū sale haustu uoratus Hirudines, si sorbeatur, eijcit, tussim eterē mitigat, & recetē lacepsit. In ortopnæa calidū cōmodè sortetur. Gutturis fluxiones gargariatum inhibet. Anginis &

uæ procidenti conuenit. Contra dentium dolorem, calidum colluitur.

Acetum mulsum. CAP. XII.

NOMENCLATURA.

Gr. ὀξύμελι. Lat. Acetum mulsum.

Ital. Aceto melato.

A cetum mulsum: quod Oxymel uocant, hoc modo temperatur: Aceti heminas quinque salis marini pondo, mellis minas decem, aquæ sextarios quinque pariter coquito, decies efferuescente cortina: atque ubi resfixerit, diffundito. Sumptum crassos homores extrahere, & ischiadicis, comitialibus, & articulorum morbo conflatis prodesse creditur. Contra morsum eius Viperæ, quam Seps uocant, haustum metonium, ixiámue, auxilio est. Anginis utiliter gargarizatur.

Acida muria. CAP. XIII.

NOMENCLATURA.

Gr. ὀξύλη. Lat. Acida muria.

Ital. Salamonia acetosa.

A cida muria, quam Græci Oxalmen uocant, contra nomas fotu, putrida ulcera, canum morsus, & uenenatos ictus auxiliatur. Sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, si statim calida in uulnus injiciatur. Prociduam sedem reprimat. Dysentericis, si nomas sentiant, infunditur. Oportet autem ex lacte instillare. Hirudines sorbitione aut gargarizatu necat. Fursures & manantia capitis ulcera exterget.

Thymoxalme. CAP. XIII.

NOMENCLATURA.

Gr. θυμοξύλη. Lat. Thymoxalme.

Ital. Thimoxalme.

thy

[Hymoxalme ueteres utebantur, dabantq; laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quateruó sue cyathos, aqua ida dilutos, in articularibus morbis, & inflationibus. Cras- humores, atrosq; trahit. Hoc modo faciliatur: Thymi triti tabulum, salis idem modus, Ruta, pulegi, polenta, singulo- exiguae portiones in uas conijciuntur, aqua terni sextarii, & eti terni funduntur, & circumposito linteo sub dio madescent.

Scillinum acetum. C A P. XV.

NOMENCLATURA.

Gr. Σκιλλῖνικον ὄξος. Lat. Acetum scillinum.

Ital. Aceto Scillino.

[Cillicum acetum hoc modo fit: Scilla, quæ candida fuerit, expurgata conciditur, traiecta q; lino segmēta modicis inter- allis ne se contingant, siccantur in umbra quadraginta diebus. Una corum in aceti boni sextarios duodecim immergitur, & se diligenter operto septenis diebus in sole madescit. Post eum merum dierum, Scilla eximitur, & expressa abijcitur. De se acetum transfunditur, & reponitur. Aliqui Scille minā, inque aceti sextarijs miscent. Alij citra exiccationem repur- antes, parem mensuram adijciunt, & senis mensibus macera- tiuntur. Id multo magis humorum lentitias digerit, gni- uas humore prægnātes collutione stringit firmatq;, & motos- ntes stabilis, putredines oris, & graues halitus tollit, du- fauces sorbitione, & callosas facit, nocem expedit, & lym- lam canoramq; reddit. Datur stomachicis, agrè cibum con- sequentibus, melancholicis, comitialibus uertiginosis, mente ca- sis: item uuluarum strangulationibus, lienis incremento la- rantibus, ischiadicisq;. Imbecillos admodum recreat, cor-

S S pus

pus sanum reddit, & bonum colorem præstat. Oculorum aciem exacuit, tarditatem quoque aurium infusione purgat. In summa, ad omnia efficax. Cauendum tamen intestinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut nervorum vitis. Datur quotidie ieiunis sorbendum, inter initia exiguum, paulatim adaugendo, ad cyathum usque. Nonnulli binos dant, cyathos, aut largius.

Scillinum. CAP. XVI.

NOMENCLATURA.

Gr. Σκίλλινον & οἶνον. Lat. Vinum Scillinum.

Ita. Vino Scillino.

Scillinum uinum fit hoc modo: Dissectam, uti dictum est, Scillam, & sole siccata contundito, minam eius tenui cribro incernito, & linteo raro illigatam, in uicenos sextarios musti recentis ac boni demergito. Vbi trimestri spacio maduerit, elutriatum uinum, obstructo diligenter uase, recondito. Licet quoque sic humida Scilla uti. In orbiculos, Rapi modo, dissectam duplicato pondere, quadraginta diebus insolari oportet, & ualde inueterascere. Alia parandi ratio. Scillæ dissecæ & repurgatæ tres minas, in Italicam metretam musti demittito, & senos menses in uase obstructo macerari finito: post id tempus defecatum & excolatum uinum recondito. Vtile est contra cruditates, & ciborum corruptiones: item is qui reuomunt cibum, & si pituita in uentre, aut stomacho coierit. Prodest lienosis, male habitis corporibus, aquæ intercutem, regio morbo, difficili urina, torminosis, inflationibus, resolutioni nervorum, horroribus longis, uertiginosis, & uulsis, menses pellit, minimè nervos infestat. Hoc uinum uetustate fit melius. Cauendus in febre usus, aut si interanea ulcus sentiant.

Marina. CAP. XVII.

NOMENCLATURA.

Græ.

Gr. θαλαττίο ἰοῖνοι. Lat. Vinea marina. It. Vini
misturati con acqua marina.

Marina uariè faciuntur. Aliqui enim statim quā de-
cerptæ sunt uinæ, aquam maris admiscunt. Alij in area
sole siccant: quibus calcatis, marinam adijciunt. Alij passas
in uuas in dolijs marina aqua macerant, mox calcatas expri-
munt. Id magis passi generibus adscribitur. Quæ tamen austerio
gusto temperantur, contra februm aduentantium indicia ua-
lent, si modò meliora non adsint. Alium subducunt, profunt pie-
ta extuscentibus, aut si dura alius exerceat. Quæ ex A-
næis uinis fiunt, caput tentat, stomacho aduersantur, flatu cre-
ant. Verum quo plenior habeatur historia, ijs qui huius studio te-
rentur, non inutile existimamus uarias uinorum compositio-
nes adferre, non quod frequens eorum aut necessarius existat
usus, sed ne quid omisisse uideremur, quod ad eorum rationē atti-
neret. Sunt autem quædam ex ijs factitia, minoris curæ ac impen-
sæ, quæ cadunt in usus: uti quæ ex Cotoneis malis, Pyris, Sili-
is, item Myrti baccis componuntur.

Cydonites. CAP. XVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. κυδωνίτης. Lat. Cydonites. Ita. Vino
delle Mella Cotogne.

CYdonites, nomine alio Melites appellatur, & ita fieri con-
suevit: Mala Cotonea exemptis seminibus, frustatim Rapi-
do scinduntur, & duodecim minarum pondo, in musti me-
tam, triginta diebus macerantur, postea defecatum unum
componitur. Alia faciendi ratio: Oportet ad singulos Mellis sexta
partis, denos succi Cotoneorum tusorum pressorumque adycere,

Et ita recondere. Vinum hoc adstringit, prodest stomacho, d
senteriae, hepaticis, renum vitijs. Et urinæ difficultati. Melom
li, quod Et Cydonomeli nominant, sic fit: Cotonea mala sem
nibus suis castrata, in quā plurimum Mellis, quo penitus deme
sa contegantur, coniunguntur. Id post annum mutescit, multo no
disimile. Præstat eadem quæ superior compositio.

Hydromelum. CAP

XIX.

NOMENCLATURA.

Gr. υδρόμηλον. Lat. Hydromelum.

Ita. Hydromelo.

Fit Hydromelon duabus mensuris aquæ coctæ, Et sub can
cula sydus insolata, additis ad unam Melomelitis, facti ex
Cotoneis. Vis huius eadem est.

Omphacomelites. CAP. XX.

NOMENCLATURA.

Gr. Omphacomeli. Lat. Omphacomelites.

Ita. Omphacomole.

Omphacomelitis faciendi ratio hæc est: Acerbæ uua ad
huc immatura, Et tribus diebus insolata exprimuntur,
Et ad ternas succi partes, Mellis optimi despumati singulæ par
tes adijciuntur: Et insolatur in uase transfusum. Vim reprimen
di ac refrigerandi habet. Stomachicis cæliacisq, conuenit. Vis
post annum est.

Apītes. CAP. XXI.

NOMENCLATURA.

Græ. Απίτης. Lat. Apītes.

Ita. Apīte.

Fin

It & è Pyris, perinde atque Cotoneis, uinum, Apijtes nomine, sed ita ut Pyra non magnoperè maturescant. Ex Siliis etiam, Messilis, Sorbis, simili modo tēperatur. Omnia hæc uera acerbata sunt, & adstringunt. Stomacho utilia sunt, atq; pestinas fluxiones cohibent.

Oenanthinum. CAP. XXII.

NOMENCLATURA.

Gr. Οἰκάνθινον. La. Oenanthium. It. Enanthino.

It è feraci uite syluestri, quod uocatur Oenanthinum: Sicci flores minis duabus musti cado macerati, post triginta dies mutantur, mox colatum uinum reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, cæliacos & dysentericos.

Rhoites. CAP. XXIII.

NOMENCLATURA.

Gr. ῥοίτης. Lat. Rhoites. Ita. Vino de Melagrani.

It è Puniceis malis maturis, quod Rhoiten nominant, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, apyrena uocant, ac decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluuio extant. Stomacho utile. Adstringit aluum, & urinam mouet.

Rhodites. CAP.

XXIIII.

NOMENCLATURA.

Gr. ῥοδίτης. Lat. Rhodites. Ita. Vino Rosado.

Rhodites sic fit: Rosarum siccarum tusarumq; minam linteolo deligatam, in sextarios octo musti demergito, & post tres menses, defecatum uinum transfundens recondito. Utis qui febricarent, & ad stomachi coctiones, & dolores à cibo

bo potum, & contra humidus aluos, & dysenterias. Fit quoque ex succo Rosarum, addito Melle, quod Rhodomeli uocant, quae arteriae scabritijs conuenit.

Myrtites. C A P. XXV.

NOMENCLATURA.

Gr. *μυρτίτης*. Lat. *Myrtites*. Ita. *Vino delle bacche del Mirto.*

MYrtites fit, baccis nigris, quae maturitatem excefferint, tuis, & organo expressis. Aliqui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole torrent, & quaternis sextarijs contusarum, ternas aquae heminas adiiciunt, & uini ueteris parem modum postea exprimunt, & seruant. Magnopere astringit: stomacho utile: fluxionibus uentris ac stomachi prodest: & contra intestinas ulcerationes, & profluvia. Denigrat capillos.

Myrsinites. C A P. XXVI.

NOMENCLATURA.

Gr. *μυρσινίτης*. Lat. *Myrsinites*. Ita. *Vino Mirteo.*

MYrsinites sic temperatur: Rami nigrae Myrti cum suis Baccis & folijs tuis, decem minarum pondo, in tribus musti congijs feruescunt, donec duo supersint, aut certe dimidium. Id uinum colatum ad usus reconditur. Contra furfures, ulcera in capite manantia, eruptiones papularum, gingiuas, tonsillas, & purulentas aureis efficax est. Sudores sistit.

Lentiscinum & terebinthinum.

C A P. XXVII.

NOMENCLATURA.

Gr. *σχίνιν & καὶ ὁ τερμινθιν &*. Lat. *Lentiscinum & Terebinthinum*. It. *Vino del Lentisco, & del Terebintho.*

Len

Entiscinum similiter ut Myrsinites temperatur, nec secus
Terebinthinum. Nanque bacciferi eorum rami sumi de-
nt. Similes insunt uires. Adstringunt, stomacho accommodā-
, & defluxionibus intestinorum, uesica, & stomachi, et san-
guinis profluuiio. Vlcera omnia fluxionibus obnoxia, fotu ad ci-
ricem perducunt. Fluxiones uulua ac sedis, in seſſione cohibēt.

Palmeum. CAP. XXVIII.

NOMENCLATURA.

ῥ. φοινικίτης. Lat. Palmeum. It. Vino de i Dattoli.

Almulus maturas, quas uocant Chydeas, in urceolū imo
pertusum, & obſtructum picata arundine, demittito: lino
tamen sit obturatum, & quadragenis sextarijs ternos aquæ
congios infundito. Quod si ipsum ita dulce eſſe non libeat, quin-
que congios infudiſſe ſatis eſt. Poſt decem dies detracto ab arun-
dine linteo, aſſumito uinum craſſum & dulce, & reponito. Sua
illud quidem, ſed capiti noxiū. Contra fluxiones, propter ad-
ictoriam uim, efficax. Stomachicis, cæliacis, ſanguine expue-
tus cōuenit. Aliqui idē addita aqua iterum capiunt, & tertio,
quarto, quinto, ſextoſue faciunt, quod tandem acore uitiatur.

Catorchites. CAP. XXIX.

Græ. κατορχίτης. Lat. Catorchites. Ita. Vino
de Ficchi ſecchi.

Catorchites, aliquibus Sycites uocatur, in Cypro ſit. ita ut
Palmeum. Sed hoc intereſt, quoniam pro aqua tantundē
amoris adijciunt, in quo recenter preſſa uinacea maduerint. Ca-
ce quæ Chelidoniæ aut Phæniceæ appellantur, præſertim
græ macerantur, uti diximus, & poſt decem dies humor
recipitur: atque iterum aut tertio, idem modis aquæ in qua ui-
acea maduerint infunditur. Simili modo intercedente ſpacio,
quarto aut quinto aſſumitur. Demaceratarum liquor, non ſecus
aco

acorem contrahit, & aceti usum prabet. Id tenue est. Flatus gignit, stomacho aduersatur, fastidium parit, aluo tamen prodeurinam ciet, menses trahit, lactis ubertatem facit, uitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, ut potio quem Xytho appellamus. Aliqui sex amphoris, decem salis sextarios adijciunt. Alij niuriae amphoram, quod non facile uitiatur, & aluo idoneum fore censent. Alij Thymum et Fœniculum imo subijciunt & Caricas superponunt. & ita uicissim, donec uas expleuerint. Fit & Sycomoris eodem modo uinum, sed in acetum acre degenerat, quoniam non ita praeualet uis eorum, ut fluentis liquoris dulcedinem retinere possit.

Resinatum. CAP. XXX.

NOMENCLATURA.

Gr. ρητινίτης. Lat. Resinatum. It. Vino resinato.

Resinatum uinum populatim faciliari solet. Copiosum in Galatia: quoniam uinum illic coacescat, uua non maturiscente, ob caeli algorem, nisi Picea resina temperetur. Resina autem cum cortice tunditur, & amphorae dimidiata hemina permiscetur. Aliqui ubi efferbuit, excolant, separantes resina: alij relinquunt. Hac uina uetustate dulcescunt. Omnia capitis dolorem, & uertigines faciunt. Concoctionem tamen adiuvant, urinam ciet, tuſſientibus, ac destillatione uexatis conueniunt. Item caeliacis, dysentericis, & hydropicis, & feminis fluxione uuluae laborantibus. Altis exulcerationibus infunditur. In hoc autem genere nigricans, magis albo constringit.

Strobilites. CAP. XXXI.

NOMENCLATURA.

Gr. στρόβιλίτης. Lat. Strobilites,
Ita. Vino delle Pine.

strobili

Trobilites fit maceratis in musto nucibus pineis, recentibus, fractis, prabetq; resinati effectus. Si quis madesactas nuces in musto decoquat, potum assalim conuenit ijs qui tabitudine afficiuntur.

Cedrinum. CAP. XXXII.

NOMENCLATURA.

Ῥε, Κεδρίν. Lat. Cedrinum. Ita. Vino del Cedro.

Cedrinum, Iuniperinum, Cupressinum, Laurinum, Pineum aut, Abiegnum, simili ratione fiunt. Diuisos recenter ramos, cum fructum adunt, aut soli, aut balneo, aut igni, admoueoportet, uti consudent, congiorq; uini minam unam permisceant, & post duos menses transfundere, & antequam recondant, insolare. Facilitiorum uinorum uasa impleri debent: namque in plenis uasis, uina in acorem corrumpuntur. Medicata autem uina, recte ualentibus insalubria. Omnia excalfaciunt. Vriam cient, & substringunt. Laurinum tamen uehemētius excalfacit. Fit quoque e fructu Cedri maioris uinum, congio musti liecla tusarum baccarum selibra, diebus quadraginta insolari debet, & desecatum in uasa transferri. Fit etiam uinum e baccis Iuniperi, non aliter quam Cedrites, & ad eadem uales. Cedrites hoc modo fit. Cedriam dulci aqua lauant, & singulas amphoras singulis cyathis diluunt, & ita musto replent. Hoc uinum uini excalfacit, extenuat. Tussi antiqua utile sine febre, & floris laterumq; doloribus, torminibus, uentris & interaneo m ulceribus, purulentis excreationibus, mulieribus uulua cancrijs, hydropicisq;. Facit aduersus uentris tineas & horrores. Contra uenenatos ictus auxiliatur. Serpentes necat. Aurium doloribus instillatum medetur.

Picatum. CAP. XXXIII.

NOMENCLATURA.

T

Græ.

Græ. ΠΙΣΣΙΤΗΣ. Lat. Picatum. Ital. Vino impeciato

Picatum ex liquida pice & musto temperatur. Picem autem primum marina aut muria tantisper eluere oportet dum inalbuerit, & syncera maris aqua defluat, mox aqua duci proluenda. Congijs octo musti, uncia picis una aut altera adijcitur. Vbi efferbuerit & constiterit, in uasa diffunditur. Hoc genus uini exalfacit, concoquit, purgat, abstergit. Vtile doloribus pectoris, alui, iecinoris, lienis & uulua, si sine febre sint, ueteri rheumatismo, exulcerationibus in altum recedentibus, tussibus, spirijs, concoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, praesertim in succida lana impositum.

Absinthites. CAP. XXXIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. ΑΨΙΘΙΤΗΣ.

Lat. Absinthites. Ita. Vino d' Assenzo.

Absinthitæ faciundæ ratio euariat. Aliqui enim duodequinguaaginta sextarijs Italicarum amphorarum, admixtam Absinthij Pontici libram decoquunt ad tertias: & ubi infuderint sex aceti sextarios, & Absinthij selibram, ac diligenter permiscuerint, diffundunt in uas: dumq; conqueuerit, defecant. Alij Absinthij minam in amphoram demittunt, tussamq; & raro linteo deligatam, in cado musti macerant, binis mensibus. Alij Absinthij quadrantem, & Nardi Syriacæ, Cinnamomi, Casia, floris Iunci odorati, Calami, Elatæ, Palmarum, singulos sextantes iniiciunt in metretam musti, & tundentes prius pila, obstrueto uasis spiraculo, binis ternisue mensibus dimittunt: postea defecatum uinum transfundunt ad usus. Alij addunt in musti cadum, Celticæ Nardi drachmas quatuordecim, & Absinthij drachmas quadraginta, linteo inuolutis, & post quadragesimum diem elutriant, Alij in senos sexta-

riat

is musti, Absinthij libram, & sicca Pini resina sextantem
mittunt, & post decem dies excolat, & recodunt. Vtile est
macho. Vrinam cui, tardam concoctionem accelerat, hepati-
regio morbo, & renum vitijs auxiliatur, fastidia discutit. Ijs
prodest quibus stomachus negotium exhibet. Valet contra lon-
gum prae cordiorum distentionem, & inflationes, teretesq; uen-
is tineas, & remoratos menses. Contra hausta Ixia uenena
amplurimum potum, & uomitionibus redditum, auxiliatur.

Hyssopites. CAP. XXXV.

NOMENCLATURA.

Græ. Ὑσσωπίτης.

Lat. Hyssopites. Ita. Vino d' Hissopo.

Hysopites è Cilicio hyssopo maximè laudatur. fitq; simili-
ter, foliorum Hyssopi tusorum libra in amphoram musti
iniecta, linteolo raro, cum quibusdam lapillis, folia inuoluun-
tur, ut de grauatius pondusculo fasciculus sidat. Vinum post qua-
raginta dies defecatum elutriatur. Contra pectoris, laterum,
& pulmonis vitia, ueterem tussim, & suspiria prodest. Vrinam
Torminibus & horribus febrium circuitu repetentibus
auxiliatur. Menses mouet.

Ex diuersis plātis facta. Ca. XXXVI.

NOMENCLATURA.

Græ. οἶνοι ἐξ ποικίλων φύτων πεποιημένοι.

Lat. Vina ex diuersis Plantis facta.

Ital. Vini fatti di diuerse piante.

Simili modo Chamadrytes fieri solet. Excalfacit, discutit.
Convulsis, regio morbo, uulnæ inflationibus, tardæ conco-
ctioni, incipienti aquæ inter cutem, subuenit. Inueterascens me-
ns redditur. Stæchadites non secus temperatur. Congijs sex

T 2

Stæch

Stæchadis minam addere oportet. *Craſſitiem*, inflationem, laterum, neruorumq; cruciatus, & perfrictiones discutit. Comitibus commodè datur, cum *Pyrethro* & *Sagapeno*. Fit ad ead acetum è *Stæchade* herba, ut paulo antiè diximus, aceto macerato, quod eosdem implet effectus. Fit uinum è *Betonica*, quã *Cestron* *Psychotrophon* appellant. Herbam semine maturo prægnantem, cum suis ramulis minæ pondo, congijs duobus uini macerant, & post septimū mensem transfundit. Ad multa interancorum uitia, ut frutex ipse, pollet. Et ut in uniuersum dicatur, factitia uina sibi misturarum uires adsciscunt. Quare non difficile fuerit, is qui illarum naturas norint, uinorum uires coniectura quadam consequi. Veruntamen uinorum usus sebricantibus abdicandus. Fit etiamni è *Betonica* acetum ad eadē uitia utile. *Tragoriganites* fit quaternis *Tragorigani* drachmis linteolo colligatis, in quaternos musti sextarios coniectis, & post tertium mensem transfusis. Prodest torminibus, uulsis, ruptis, laterum doloribus, spirituum discursationi, agris concoctionibus. E *Napis* fit uinū, nomine *Bunites*, drachmis duabus tusi *Napi* in sextarios duos musti additis, & ceteris eodem modo factis. Prodest stomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis, *Dictāni* drachmas quatuor, macerato, quaternis musti sextarijs. Facit aduersus stomachi fastidia: menses, & purgamentū à partu subducit. *Marrubij* adulii folia tundito: & sextarios octo in musti metretam demittito, & reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc uinum pectoris uitijs, & omnibus quibus *Marrubium*. *Thymi* tusi & cribrati uncias centū linteo colligatas, in amphoram musti adycito. Valet contra agras coctiones, fastidia, dysenteriam, neruorum & præcordiorū dolores, hybernos algores, & uenenata animalia, quorum morsus frigus insequitur, aut putrescit locus. Simili modo è *Satureia* uinum fit, quod eadem quæ *Thymites* præstat. Sic quoq; *Organites* ex

Her

eracleotico Origano conficitur similiter cum supradicto. Facit de qua Thymites. E Calamintha, Pulegio, & Abrotono ui fiunt eodem quo Thymites modo. Prosunt stomachicis, cibū stidentibus, & regio morbo, quod urinam moueant. Fit itē e onyza uinum, contra uenenata ante alia efficax.

Aromatites. CAP. XXXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀρωματῖτις. Lat. Aromatitis. Ita. Aromatite.

Aromatites ita fit: Palma, Asspalati, Calami, Nardi Galli ci, singulorum quatuor sextarios sumito, postquam con iueris, passo subigito: coactis ingentibus offis, & in sextarios iodecim austeri musti deiectis, operculato uase, quadragin diebus quiescere finito: deinde ubi fece expurgatum fuerit, condito. Alia eius ratio: Calami uncia, Phu drachma septē, osti drachma due, Nardi Syriaci drachma sex, Casia uncia, roci drachma quatuor, Amomi drachma quinque, Asari rachma quatuor: omnia simul trita & linteo colligata in ca am musti demerguntur, & postquam uinū deferbuerit, trans nditur. Facit ad pectoris, & laterum, & pulmonis dolores. ifficili urina, horroribus, retardatis mēsis, atque ijs qui per igora iter faciunt, potum cōuenit, pituita crassitiem extenuat. olorem alit, somnum conciliat, dolorem finit, renum & ue æ utijs auxiliatur.

Ex diuersis odoramentis facta.

CAP. XXXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. οἶνοι ἐξ ποικίλων αρωμασδωρ.

Lat. Vina ex diuersis odoramentis.

Ital. Vini di diuersi odoramenti.

T 3

Fit

Fit & unum ad destillationes, cruditates, tuſſim, inflat-
 nes, & ſi humor in ſtomacho coijt. Myrrha dua drachm
 Piperis candidi drachma una, Iridis drachma ſex, Aniſi dra-
 chma tres, omnia plenius tuſa & linteolo inuoluta in ſex un-
 ſextarios conijciuntur: unum poſt triduum colatur, & in lagna
 reconditur. Datur poſt deambulationem, meraculum, cya-
 thi unius menſura. Fit quoque Neclarites ex Helenio herba, ri-
 dice ſicca pondo quinque drachmarũ linteolo colligata, & u-
 cõgios ſex muſti addita, & poſt tres menſes effuſa. Facit ad ſto-
 machi & pectoris uitia. Urinam pellit. E Syriaca Nardo, &
 Celtica, Malabathroq; unum ſaſtitatur, hac ratione: Singulo-
 rum ſelibram in binos muſti congios mittito, poſt menſes duo
 colato. Datur cyathus unus cum tribus aqua. Hoc unũ effica-
 eſt contra uitia renum, hepaticos, regium morbum, & urinæ
 difficultatem. Prodeſt ſtomachicis, atq; ijs quos pallor decolo-
 rat. Alij uncia aut ſextantem Acori, & Celtica Nardi qua-
 drantem, in muſti amphoram adijciunt. Aſari quadrantem in
 ſenos muſti ſextarios itidem demittito. Id vini genus urinã ciet.
 Hydropicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis, iſchiadi-
 cisq; conuenit. Radicis Sylueſtris Nardi recentis & trita cribra-
 taq; beſſem in congiũ muſti cõjcitito, duos mēſes quieſcere ſinito.
 Vtile eſt hepaticis, difficili urinæ, inflationibus ſtomachicis.

Ex diuerſis herbis facta. Ca. XXXIX.

NOMENCLATURA.

Græ. οἶναι ἐξ ποικίλων βοτάνων.

Lat. Vina ex diuerſis herbis.

Ita. Vini di diuerſi ſorti d'herbe.

Radicis Dauci contuſæ drachmas ſex, in muſti amphorã
 imponito, & ſimiliter trãſfundito. Facit ad dolores tho-
 racis præcordiorum, & uulnũ. Menſes pellit, ruſtus ciet, &

κτλ

inā. Prodest tussi, ruptis, uulsisq; Saluie uncia in musti ampho-
 m, quod idem cum ceramio est, mittito. Valet contra renum,
 sica, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta,
 lsa, & suppressos menses. Panacis uncia in musti congiū mitti-
 , & transfundito. Prodest ruptis, uulsis, cōtusis, orthopnæa, lie-
 s crassitiem extenuat. Cōtra tormina, coxendicū dolores, effi-
 x est tardas concoctiones accelerat. Menses & partus extra-
 t. Aquæ inter cutē, & serpentū icibus auxiliatur. Vina ex
 eto & Dulci radice cōsimili modo fiūt. Oportet enim singulo
 uncias octo in senos cōgios mittere. tribus mēsis macerare,
 ox in uas trāsferre. Faciūt ad pectus, & latera, & urinā mo-
 nt. Seminis Apij recentis, maturi & cribrati uncia nouē in
 teo colligatæ in musti amphorā demittātur. Appetitum exci-
 t. Stomachicis, & difficili urinæ auxiliatur. Faciles spiritus fa-
 t. Ex Fœniculo, Anetho & Petroselino, uina eodē modo fiūt
 & ad eadē efficacia. Fit & è flore salis uinū, multo ad purgan-
 ū efficacius, quā uinū aqua marina tēperatū. Fauces uesticam-
 nes & stomachū infestat: quare neq; in secunda, neq; aduersa
 aletudine prodest. Fit etiā uinū quod Phthoriū uocat, quoniā
 artus necat, & abortus facit, Veratro aut Scāmonia, aut sylue-
 ri Cucumere, iuxta radices uitiū sato: siquidē uites sibi illorum
 res adsciscunt. Id uinū partus enecat. Datur ieiunis mulieribus
 uæ antē uouerūt, cyathorū octo mēsurā dilutū. Ramorū Ty-
 relæ cū suis folijs & fructu triginta drachmas mittito in con-
 ios tres musti, & leui igne coquito, donec cōgi duo supersint,
 efecatuq; recōdito. Aquosa purgat excremēta, & lienē absu-
 uit. Chamelea dū floret, cū folijs tusa & cribrata decē drach-
 iarū pōdere in musti cōgiū addit. Post duos mēses, uinū in uas
 rāsferitur. Aquæ inter cutē hepaticis: & lassitudine cōfractis:
 fficax est. Iterū mulieribus: quæ à partu egre purgantur. Cha-
 napitynum simili modo fit, ad eadem conueniens: urinam

T 4 quoq;

quoque ciet. Libram radicis Mandragoræ concidito, segment
 Lino trajcito, quod selibram æquat in musti cadum dimittito.
 ibiq; esse finito ad mēses treis, deinde transfundito. Media potio
 hemina dimidium. Bibitur, passo in duplum addito. Aiunt he
 minam uini congio mistam, potu soporē adferre. Cyathus unu
 cum sextario uini potus, enecat: Mediocris usus eius, doloris sen
 sum adfert. Fluxiones incrassat. Olfactu, potuq;, & cum indi
 tur, idem præstat. In congium musti aqua marina diluti, drach
 mas duodecim nigri Veratri triti in linteo mundo, mittito: dūq;
 efferbuerit, in marina aqua congios quatuordecim aut quindec
 im, ubi pleniuscule fregeris, inycito. Post aliquot dies colato,
 & utitor. Dato cyathum unū ex aqua balnei in potu, ad aliu
 soluendam ijs qui euomuerunt à cæna. Alia ratio: Veratri dra
 chmas uiginti, Iunci odorati uncias duodecim, spica Syriacæ un
 cias tredecim, cribratas & linteo colligatas, in septem uini Co
 sextarios, diebus quadraginta macerandas indito, postmodum
 colato. Dabis in potu sesquiheminam. Aliter: Decocta marina
 aqua ex alto petita sextarios duodecim, Veratri candidi libras
 sex, in musti amphora quadragesimo die quā madefeceris,
 colato, & utitor. Alia ratio: Veratri drachmas duodenas, &
 aphronitri quaternas in senis musti sextarijs, diebus quinisdenis
 macerato, mox colato: & semestri exacto, utitor. Id uini genus
 abortus facit, & partus necat. Aut uuas in sole siccatas, imponi
 to in musti metretam (implet autē metreta congios duodecim)
 & gypsum, in uinum mittito, pondo drachmarum uiginti, &
 biduo residere finito, conycito Veratri nigri drachmas trigin
 ta, Iunci odorati, Calami singulorum drachmas trīginta, bac
 carum Iumperi sextarios duos & trientem, Myrrhæ & Cro
 ci singulorum drachmam, inuoluens lincolo diebus quadra
 ginta appendito, postea colato. Dabis heminas treis aut duas
 dilutas. Purgat à partu & abortu faminas. Fœtus extrahit.

Con

contra strangulatus uulua efficax. Scammonites sic fit, Radi-
scamoniae per messes effossae, tritae, & linteo colligatae drach-
mae quinque in musti cogium mittito: ad dies triginta. Aluum
ergat, bilem & pituitam extrahit.

Suersa pro celi & soli ratione Vitis differentia. Has receſſe nō
admodum ad rem fecerit, & ex Plinio & Theophrasto poterit
usus lector haurire, quo vel morosa cupiditati satisfiat. Labrusca ea
cum Vite est, nisi quod non colatur. solo hoc discerniculo ab illa dis-
tans. Vuas passas, Galenus & veteres omnes, non pusillas has tantū
intelligit, quae ex Oriente & gracia Venetijs afferuntur, sed om-
nes pusillas aut grandes, quotquot insolatae, farina, ficum more con-
tinentur. Siquidem solus eidem gustus differentiam prodit. & ibi Dam-
num, Candiacum, Cyprium Vuae passae numerum subibit. Vuae pas-
sae cum acino astringit: his priuata, lenit, & iis quae nil penē
ter corticem & acinum habet idonea tantum restringendo corpori
roborando stomacho. Quod si lenitudo ex his mollienda, agris sua-
dum ut acinos expuat, quin & huius Vuae passae praescribendus usus,
et sine acinis nascitur. Hoc tamen in negotio cauedum, ne Vuae passae
tuba aut austera, sit, quod ex, & cum, & sine acinis, frigidiores sunt,
astringunt, stomachum roborant, & parum nutriunt. Oenan-
thes, secundi Labruscae generis, flos, pulchrè & absolute à Dioscoride des-
cribitur. Thasia aut Aminea loco, nunc vuis immaturis od Omphacium
sciendi utimur. Vini natura, & usus tū cōmodus, tū incōmodus satis
hoc authore & alijs multis descriptus. Hoc tātū dixisse sufficiat, Ga-
lum Vini per astatē arte profrigescit, & usum reprobare. Nam quam-
in iuuenum corporibus lasio manifesta non appareat, atatis tamen
cessu, sub ineuntem senectutem se prodit malum, ac inde nerui, iun-
tae, & interiora lasionem sentiunt, quae aut nullatenus, aut agrè ad-
dum curetur. Vinum Melitites, & Mulsum raro & paucis in locis
natur. Melicraton, seu Aqua mulsa, ex tempore fit, ex melle & aqua
mulsa, ex tempore fit, ex melle & aqua simpliciter. Hydromeli ultra
uam & mel, adduntur quae diuturnitatem concilient. Aquarum
tura cuius patet, è celi, soli, fluxus, bonitate vel malitia concepta.
etiam indigenarum vultus coarguit. Qui supersunt capitum contex-
us, de Aceti & Vini varia confectio, clari sunt, & sanè magna pars
astro tempore non paratur, quae tamē si pararentur aut priuatis in-
mibus aut seplasis, id maximū in modū agris proficeret. Quapropter
Matthioli opinio est, Vinum è ligno sancto frigidis morbis magna sa-
cilita

cilitate agros exoluere, per pello in compluribus sanitati redditis successus argumento.

Metallica omnia, & primum cadmia.

C A P. X L.

N O M E N C L A T V R A.

Græ. πᾶς λίθος μεταλλικός, καὶ πρῶτον καδμία.

Lat. Metallica omnia, & primum Cadmia. *Ital.* Tutte le Pietre Metalliche & prima della Cadmia.

Ex Cadmia generibus optima est Cypria, Botritis nomine densa, modicè grauis, & in leuitatem magis declinans racemosa facie, colore Spodij, quæ fracta cinerulenta est, & arginosa. Proxima habetur foris carulea, intus candidior, internatis uenarum discursibus, Onychitæ lapidi similis, cuiusmodi sunt quæ è ueteribus metallis effodiuntur. Quædã etiam Placodes, id est, crustosa, dicitur, segmentis quibusdam perinde quasi zonis cinctæ, ob quod eam zonitin appellauere. Alia Ostracitis nominatur. gracilis, & magna ex parte nigra. Sed quæ testaceam faciem habet terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis Botrytis nomine, & Onychitis, utilis: reliquæ ad emplastra, & farinas quæ cicatricibus inducendis insparguntur. Ad eadem Cypria prodest. Ex Macedonia uerò, Thracia & Hispania delata, improbantur. Cadmia effectus astringere, caua explere, sordes expurgare, exiccare, corporis meatus inficere, excrecentia in carne coercere, crustas creare, & ulcera quæ cacoethe uocantur, ad cicatricem perducere. Gignitur Cadmia ex ære in fornacibus candente, fuligine egesta flatu, & lateribus cameris fornacum inherente. Prægrandes autem ac ferreæ sunt rudes, ab officinis appellatæ Acestides, per summa fastigia connexæ & concameratæ, ut quæ ab ære iactantur sursum corpuscula cohæreant, & inibi detineantur.

Quæ

& cum spissius insident, in corpus concreſcunt, & modo ge-
 unū eius: modo duo, modo omnia perficiūt. Extrahitur &
 Cadmia in Cypro è monte qui Solis incumbit, cremato lapide
 Pyritæ cognomen eſt, in quo etiam monte quadam quaſi
 & Chalcitis, Aſſyos, Soreos, Melanteriæ, Cærulei, Chryſo-
 le, Atramenti ſutorij Diphrygiſq; inueniuntur. Nec deſunt
 Cadmiam in lapidum fodinis inueniri tradant, falſi quada-
 m idum cognatione. Qualis inuenitur & apud Cumas lapis,
 illam ſui uim oſtendens. It eo deprehendūtur, quòd ſunt Cad-
 mia leuioreſ, nullumq; aliorum mādentibus ſaporem exhibent.
 manducatus item lapis, dentes offendit. Cadmia, utpote cum
 ſtat, eſum non reſpuit. Alio autem diſcerni poſſunt argumēto:
 Cadmia in farinā detrita, & aceto ſubaſta, atque in ſole ſicca-
 coit: quod in lapide non accidit. Item tritus & igni appoſitus
 ſis, proſilit, & ſumum igni ſimilem ei aculatur: Cadmia uerò
 uicta manet, fuliginemq; luteo colore aut arceo ſplendentem
 ſpuit, uario zonarum diſcurſu. Inſuper lapis ignem expertus,
 que refrigeratus colorem mutabit, ac leuior multò fiet: ſed
 Cadmia nihil euariat, niſi quis eam multis diebus cremauerit.
 & in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderoſa. ſed
 tribus nequaquam comparanda ærariæ. Vritur Cadmia ſupe-
 or carbonibus obruta, donec translucida ſpectetur, & ferrei
 ercoris modo bullet. Mox extinguitur uino Aminæo, quæ ad
 nplaſtra præparatur: ſed quæ ad pſorarum medicamenta præ-
 tratur, aceto. Alij hoc modo exuſtam conterunt in uino,
 & ſumq; ſictili crudo torrent, donec pumicoſa uideatur: ite-
 umq; tritam ex uino, tertio urunt, donec prorſus in cinerē re-
 igatur, nihil ſcabritiæ retinens. Hac Spodij uice utuntur. La-
 tur autem in mortario trita, effuſa ſubinde aqua, dum
 ordidum nihil emergat. Dein coacta in paſtillos reponi-
 ur.

Cad

Cadmia duplex. Facilita, & natura fodinis innascens. Facilita in fornacium, ubi as eliquatur, summo, in massas nunc racen-
sas, nunc crustaceas, alias lineares, aut testaceas, eo quo Dioscorides per-
scribit artificio & lapide, inspessatur. Quo verò, hinc Cadmia, inde
conficitur, nihil interest terram an lapidem voces. Fit & ex Argenti-
dini, secretis materiarum partibus. Nativa sine fornace, olim in Cyp-
re periebatur, hacque impunè vocari lapis potest. Id lapidis genus, a C-
lno Cypri tum agente, in montibus & torrentibus inuentū, peritio-
nū temporis iudicio, præ ceteris Cadmijs palmā tulit. Cremata Cadmi-
vna Botrytis, quæ tenuioribus, Alte. a Placites, ponderosioribus parti-
bus constat. Tridentina fornaces in Peræne sic locum fusorium vocant
& in Sboxzo Germania, ubi ingens aris copia, excolatur. Hac eadē e-
cum Thutia Alexandrina, quæ falso pro vera Thutia habita, ipsissimū
Dioscoridis est Cadmia. Nec mirum si nomen illi suū deperijt, cum Dio-
scoridis sæculo Spodij vicem suppleverit, quod & ipsum Thutia est im-
perfecta, & præterea nihil.

Pompholyx. CAP. XLI.

NOMENCLATURA.

Græ. πωμφολυξ. Lat. Pompholix. It. Pompholige.

Pompholyx specie sola, non genere, à spodio distat. Siqui-
dem spodos nigricat, & plerunque ponderosior est, pi-
lorumq; plena, quasi purgamentum quoddā, quod ab ærariarū
offinarum pavimentis & fornacibus cuerritur: Pompholyx
verò pinguis est, & candida, usque adeo levis, ut in auras euola-
re possit. Cuius duo fluxerunt genera: Unum ad aeris colorem
vergens: subpingue: Alterum magnoperè candidum, summāq;
leuitatem nactum. Candida sit Pompholyx, quoties in perficiun-
do ære, fabri præstantiorem facere uolentes, detritam Cadmiam
cumulatis insparserint: nanque tenuissima fauilla, quæ effertur,
in Pompholygē coit. Ceterum Pompholyx non ex æris mo-
do materia & fabrilī industria facitatur, sed ex Cadmia quo-
que, ad gignendam ipsam, eximie follibus proflata. Cuius faci-
unda ratio hæc est: In domo, gemina contignatione operta, for-
nax extruitur, iuxta quam mediocris fenestra ad tabulatum a
supe

nis partibus pateat. Domicilij paries fornaci proximus, tenui
 mine ad fornacem usque perforetur, ad excipiendam solis
 em. Ostium mediocre habeat pro exitu ingressuq; artificis fa-
 ratum. Domuncula altera huic coniuncta sit, in qua &
 es & flator suo munere fungantur. Deinde carbonibus in
 uino succensis, assidens artifex Cadmiam particulatim fra-
 m inspargit, à locis supra infurnibulum extructis. Idem nego-
 n obit inferne artificis minister, simulq; carbones adijcit, usq;
 n indita Cadmiæ copia prorsus absumat. Itaque egesta sus-
 tenuis pars & levis materia, in summam domum euolat,
 parietibus, tectis, fornicique adhaerescit: conflatum autē inde
 pus, inter initia erumpentibus aquarum bullis simile prodit,
 tea minus incrementum capeffens, glomusculis uellerum simi-
 redditur, ponderosius autem in ima loca se recipit. Sed hoc for-
 ibus offunditur, illud domus pauimento coheret: quod tenui-
 deterius existimandum est, ideo quod multum terræ colle-
 it, & spurcitia in acervatione reseruiatur. Sunt qui hoc mo-
 tantum fieri Spodium arbitrantur, de qua antedictum est.
 tima creditur Cypria, quæ accepto aceto halitum æris præstat
 ore aliquantum piceo, sapore cæni horrido, & si fraudem nō
 erta flagranti carbone inferuescit, aereum colorem contra-
 . Antedictis autem notis diligenter attendendum est, si qui-
 n à nōnullis adulteratur, taurino glutine, ouillo pulmone, aut
 urino, aut crematis grossis, & quibusdam cōsimilibus. Quod
 ile cognitu fuerit: quippe nihil in ijs probandis inuenietur eo-
 m quæ ante dicta sunt. Pompholygem in commune ita lina-
 portet: Ligatam linteo mundo modiceq; raro, aut siccam, aut
 ua respersam, in labellum demittito, quod imbrem cōtineat,
 huc atque illuc facisculum deferens, immergito. ita enim li-
 sa pars eius ac utilis effluet, & omne sedimentum in linteolo-
 manebit. Postea residere sinens, aquam cum cinere colis incer-
 nito,

nito, & nouam infundens, agitato: & effundito: mutata tan-
 riſper aqua, & colata, dum arenofi nihil ſidat. Demum aqua
 exprimito, & ſiccatum cinerem recondito. Alij quantum ma-
 ximè fieri poteſt ſiccant, & manibus in aqua conterunt, dum
 Mellis craſſamentum imitetur. Deinde linteo ſaucibus exceptu-
 ri uas obteto, aut laxius illigato, colant, & quo facilius tran-
 ſeat, infuſa per linteum largiore aqua, cinerem conturbant. Mo-
 ſpumoſum, quod traiectum eſt: & ſupernatat uas, concha ex-
 cipiunt: & fictili nouo ad uſus recondunt. Quod uerò reſedis-
 ſenſim cribratum, in aliud uas tranſfundunt, relicto arenoso quo
 peſſum ierat. Rurſus lapidosa ſidere patiuntur, & in uas aliud
 excolant. Hoc identidem faciunt, donec cinis merus & arena
 expers inueniatur. Alij paulatim integram in aqua reſpergunt,
 arbitrati arenas lapidoſas ſuo pōduſculo deſtratos, peſſum ire,
 pilos autem & paleas leuitate ſua in ſublime attolli. Ceterum
 cinerem medium ſeparāt, & in pilam coniectum, ut Cadmiā,
 eluunt. Quinetiam lauatur uino Chio aqua marina diluto, mo-
 dis quos ſuprà diximus: & ita redditur adſtringentior, quā
 aquis elota. Viſ Pōpholygis aſtringere, refrigerare, explere pur-
 gare, obſtruere, & aliquantū exiccare: inter medicamēta nume-
 ratur, quā leniter cruſtas obducūt. Quod ſi ſpodio torrere libet,
 diligenter tritam & irrigatam aqua colliges in paſtillos, ficti-
 liq; nouo, ſubiectis leuib; prunis, orbiculos continuo uerſabu-
 dum aſſiccati fulueſcant. Neque ignorandum, ex auro, argen-
 to, plumboq; fieri ſpodion: uerū poſt Cyprium plumbeum ma-
 ximè commendatur. Quoniā ſpodios ſæpenumero deſideratur:
 neceſſe eſt oſtendere, quā ſimili uirtute polleant, ut in ſpodij lo-
 cum ſuffici poſſint. Antiſpodia uocāt, quoq; modo ſumi debeāt.
 Folia itaque Myrti cum floribus & baccis immaturis, in ficti-
 le crudum coniecta, indito operculo continua foramina habē-
 te, uruntur fornacibus, donec figlinum percoquatur. Iterum in
 fictile

le aliud crudum transferuntur: quod ubi perassatum fuerit, impta lauantur ad usus. Idem quoque fit è termitè sylvestris, si habeatur: sin secus satina cum suis floribus, aut malis, conis dissectis, & detractis ossibus, aut Gallis, aut laceratis uolis: item ex Moris immaturis, id est candidis, in sole prius factis, aut Terebintho, aut Lentisco, Oenanthe, aut mollibus, si folijs, uel è Buxi coma, uel Pseudocypere cum flore. Alij lineas frondes in sole antea siccatas, eodem modo parant. Alij taurinū gluten. Alij succidas lanas asperas, pice aut Melle gatas, Quæ omnia in Spodij uicem usurpantur.

[Thutia vulgaris, quæ eadem cum Cadmia est, Lapidis duritiem contrahit: pompholyx leuissima fauilla est. porro in ipsis Aeris conibus atque adeo Cadmia fornaci iniecta, bullæ emergentes tenuissimum ac leuissimariū fauillarum effigie, quæ summis fornacum caminis adheret, pompholygem faciunt. Spodiū verò, pompholygis extincta, nulla est, quæ pondere denuò decedit, & circa fornacē pauimentūque legitur. Ceterum vera Thutia, Quod antispodium vocamus, vim paucum Spodio obtinet, neutrum tamen intra corpus sumitur, & per se arabum Spodium, hepatis non est confortando. Elota pompholyx lentissimum, inter ea quæ sine morfu desiccant, remedium est, & ideo gadanis & malignis vlcibus conuenit. Collyrijs inditur, in oculorū ciculis & pustulas. Sedis & genitalium vlcibus summè prodest.

Aes ustum. CAP. XLIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Κεκαύμενον & χαλκόν.

Lat. Aes ustum. Ita. Rame abbrusciato.

AEs ustū probatur rubrū, & quod cōtritu colore Cinna-
barim imitetur. Nigrū uerò plusquā deceat exustū est.
autē è clauis solutarū nauū, fictili crudo cōpositis: subperso-
phure cum sale pari, omnibus uicissim insparsis: fictile, cir-
culito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec
linum percoquatur. Quidam pro sulphure & sale Alumen
inspa

inspargunt. Alij sine sulphure ac sale, fictili multos die urunt. Alij sulphure solo utuntur. Fuliginem tamen excutunt. A oblitos scissili Alumine clauos, cū sulphure & aceto, fictili co do cremat. Alij in aenea olla aceto respersos urunt, & iterū tertio idem efficiunt, postea recondunt. Principem locum tenet in Memphide combustum: proximum, in Cypro. Adstringit, exiccat, reprimat, extenuat, attrahit, ulcera purgat, & ad cicatricem perducit, uitia oculorum emendat, ex crescentia in carne consumit, nomas cohibet. uomitus ciet, Cū hidromelite potū, ac cū Melle delinctū, illitū mue. Lauatur ut Cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat. Aeris recrementum, stercūsue, quam Scoriam uocant, eodem modo lauatur, & eandem uim, sed imbecillio rem, habet.

Improbatur duci poterit Aes rustū officinarum, quod nigrore nimio rustionem representet, sitq; non rubens, ut postulat Dioscorides. At u erroris emendabit diligentia, quæ Dioscoridis præscriptionem sequetur. Et huic consiciendo, vetus quodlibet Aes, cuprumue sufficerint. Nam nostro æuo nauium clauis, quo longius perdurent, è ferro consciuntur. Aes rustum acre est, & astringit: at elotum, perpulchrè cicatrices inducit, quòd etiam ante lotionem maximè in carnibus duris efficiet: elotum tamen in carne molli præstantius operabitur.

Flos. CAP. XLIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Αὔρεος καλκός. Lat. Flos æris. It. Fiore del Rame.

Flos æris, quem nonnulli clauorum ueterum psegma, quasi resegmen aut segmentum, nominarunt, optimus est friabilis, in atritu fuluescens, Miliæ effigie, & numero, breuis, ponderosus, modice splendens, atque constringens, qui delimatam æris scobem non recepit, qua sæpe adulteratur. Sed id facile deprehenditur, cū dentium illisu, dilatantur ramenta. Fit autem, cū æs fornacibus fusum, in receptacula dilabatur: per cola fistularum ad ea pertinetium. Tum huic negotio addicti ministri, sordes ex

s expurgantes, aquam clarissimam infundunt, refrigerandi proposito. Itaque repentino concretu, ac addensatione, uelut exitur & erumpit antedictus flos. Adstringit, & ex crescentia ercet. Offusam oculis caliginem emendat, sed magnoperè morit. Quaternum obolorum pondere datus, crassum humorem trahit. Carnosa narium & sedis uitia absunit. eruptiones palmarum cum uino cohibet. Candidus contra diuturnas aurium auitates tritus, in eas per fistulam flatu impellitur. Vnam, tonlasq; reprimat, farina eius cum melle admota.

¶ Loris Aeris à se coll. Eli, hanc rationem tradit Matthiolus. Statim à percolato Aere, in receptacula illi excipiendo preparata, priusquam se coalesceret, lympida & gelidissima aqua situlam ingentem superijciebat, ac inde confestim ingenti cum fragore ex Aere prodeūti præciso fumo, tantisper dum hic vapor & fumus perdurant, palam super Aes, aqua affusum, continebat. Hæc cum defuissent, palam supernè tam minutissimis & rubentibus granis, Aes colore cum quodam splendore referentibus factum comperit. Id eò factum est, quòd per vaporem extracta in sublime tenuiore metalli parte, cum ob aeris frigiditatem minutissima grana cōgelasceret, in inferiora decidens, pala ferrea perincumbebat. Hoc semper apud se retinuit: quòd se plasis eius vice erugo, & non flos Aeris ueneant. Aeris flos subtilioris, quam Aes uum, aut Aeris squamma, essentia est.

Squamma æris. C A P.

XLIIII.

NOMENCLATURA.

Gr. λείπτις. La. Squamma æris. It. Squama del Rame.

Squamma æris, excussa ex Cypris Officinarum clauis, crassa quidem ipsa, præstantior, quæ Helitis, id est clauaris, nominatur: sed ex uili promiscuoq; ære, aut candido, uitiosa intelligitur: quam, ut potè tenuem & inuolidam, damnamus, maxime approbantes crassam, ruffam, præsertim si aceti respersu, æruinem contrahat. Vim habet adstrictoriam, extenuantem, re-

V primen

primentem, & erodentem. Nomas coërcet. ulcera ad cicatricem perducit. Pota ex aqua mulsa, aquam trahit. Aliqui farina subactam, dant in catapotio. Additur ad oculorum medicamenta. Genarum scabritiam absument, & fluxiones exiccat. Lauatur hoc modo: Sicca aris squamma expurgata selibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter cōturbatur, quousque pessum ierit. Abijcitur quod subsidit, & effusa aqua, hemina cœlestis imbris adijcitur, & distenta manu, squamma quasi destringenda sit, uehementer confiricatur, dumq̃ lentorem emitte-
tere cœperit, aqua sensim ad sex heminas usque superinfunditur, terendo ualide. Squamma ad latus mortarij colligitur, ibiq̃ apprimitur. Quo factō, expressus humor pyxide, ex are rubro facta, excipitur. Hoc est enim uelut flos squammæ, ualens uiribus, & ad ocularia medicamenta cum primis efficax. Inutile imbecillumq̃, quod superest, lauatur donec nullam prorsus lenti-
tiam excernat, & linteo Opertum biduo conquiescere sinitur, effusaq̃ extante aqua, ubi siccatum erit, reconditur pyxidicula. Alij ut Cadmiam lauant, & reponunt. Squamma, ex acie, aut mucronibus decussa, quam uocāt stomoma, eadem uis. Lauatur modo simili, & reconditur: sed ad moliedam alui deiectionem, inefficacior est.

Squāma Aeris, quæ ex tuso & detrīto Aere profilit, medicina utilis est. Repperitur & ferri squāma, & Stomomatis. Omnes potenter desiccant, quanuis diuersè pro suo quæque modo. Squāma Aeris alijs potentius desiccet, quod essentia sit tenuioris, ac in se aliquantum aruginis contineat. At enim ferri squāma magis astringit, & ab ea Stomoma iusquāma. Eo fit ut duæ hæ posteriores in vlcera medicatu contumacia plus polleant, quam Aeris squāma. Hæ carnem consumit & eliquat, & maximè Helite. Squāma omnes, magna uehementia mordicant, Qui liquet qua constituntur essentiam, non tenuem esse, sed ponderosam. Stomoma non ex Aere aut ferro prodit, sed ex Chalybe, quem Acrem uocant, tum maxime cum malleo super incude tunditur, conficiendus armis bellicis, & rusticis instrumentis. Ex Aetio, & Actuario patet
Sto mo

Stomoma non ferrum, sed Chalybem sonare.

Aerugo rasilis. C A P. XL V.

NOMENCLATURA.

Gr. ἰοὺ ξύσου. Lat. *Aerugo rasilis. Erugine rasile.*

Aerugo rasa fit ijs modis: In cadum, aut aliud consimile uas acetum quam acerrimum infunditur. Superponitur inde inuersum aneum uas, praesertim concameratum: sin minus, planum: sitq; obstructum, nullumque habeat spiramentum, exempto, quo doliolum obturaueris operculo. Decimum post diem insidens Aerugo deraditur. Aut eris lamina in cadis super acetum ita suspenditur, ne ipsum attingat, & totidem post dies raditur. Aut massula eris, aut lamina una pluresue, uinaceis non recentibus, sed iam accipientibus conduntur, & simili modo uersantur. Quinetiam ex delinata eris scobe Aeruginem facere licet, necnon e laminis, quibus bractea auri conclusa malleo ducuntur, si quis eas aceto respergat, & ter aut quater uerset, donec Aeruginem contrahant. Tradunt Aeruginem in Cypris metallis gigni, lapidibus quibusdam nonnihil eris habentibus, quibus Aerugo efflorescit: adduntq; per canicula estus e quodam specu manare: sed illam paucam & optimam esse: hanc speluncis effluentem, copiosam quidem, & boni coloris, sed uiciosam, quod lapides multos collegerit. Pluribus autem modis adulterant aliqui Pumice admisto, alij Marmore, alij Atramento sutorio. Sed deprehendemus Pumicem aut Marmor, dum pollice sinistrae manus madefacto, Aeruginis portiunculam altero atterimus: siquidem eam diffundi constat. Marmoris autem pumicisq; partes coeunt non dissipatae, demumq; traelatione crebra & humoris complexu dealbescent, quin & dentium appressu: siquidem sincera cedit, lauis, & sine asperitate. Atramentum uero sutorium igne coarguitur. Namque si fictile, aut lamina adulterata Aerugine illinatur, & seruata cinere aut carbonibus

V

2

incale

incalescat alterutrum, mutabitur, rubescetque id quod A-
tramentum sutorium acceperit, quod id ustum, suapte natura
talem sortitur colorem. Aeruginis quam uocant Scoleciam,
duo sunt genera. Quaedam fossilis est, altera factitia ad hunc mo-
dum: In mortario Cyprij aeris dimidiam heminam aceti albi a-
crisq, pistillo cupreo conterito, donec strigmenti crassitudinem i-
mitetur: deinde aluminis rotundi drachmam unam, cum salis
fossit, translucentis, aut marini quam albisimi, solidiq, aut cer-
te cum Nitri pari pondere, terito in sole, astuosissimis diebus, sub
sydus canicula, donec colorem Aeruginis contrahat, & con-
cretu strigmentosum fiat. Vbi autem se in uerniculorum Rho-
diacis simulum speciem coegerit, recondito. Efficax, & ualde
boni coloris redditur, si duas partes urinae ueteris, cum una ace-
ti adiaceris, & alia quae dicta sunt, peregeris. Sunt qui Aeru-
ginem rasilem, quae in apparatu non respondit, gummi musto di-
gerant in formas, & ita uendant. Quod genus, ut uitiosum, im-
probatur. Fit & quaedam Aerugo ab aurificibus, mortario
& pistillo Cyprij aeris, cum urina pueri impubis, qua aurum fer-
ruminant. Antedicta Aeruginum genera, usto ari omnino
respondent, sed magis effectu ualent. Sciendum fossilis Scole-
ciam praestantissimam esse: derasam sequi, postremo loco facti-
tiam, mordacissima tamen est haec, & magis adstringens. Au-
rificum autem aerugo rasa respondet. Aerugines omnes adstrin-
gunt, extenuant, excalesciunt. Oculorum cicatrices emendant,
lachrymas cient, nomas sistunt, uulnera ab inflammatione tue-
tur, ulcera ex oleo ceraq, ad cicatricem perducunt, callos & sor-
dida ulcera purgant. Cum melle cocta, callum fistularum ero-
dunt, cum Ammoniaco, collyrij modo, in eas adactae. Ad gin-
giuarum autem excrescentias, & exuberantem utiles. Ma-
gnopere extenuant genarum crassitiem, cum Melle illitae. Ve-
rum post illitionem spongia ex aqua calida locus leniendus est.

Resina

Resina terebinthina excepta, cum are & nitro lepras abigunt. Vritur Aerugo, quacunque uelis minutissime fracta, comminutaq; in fictili patina, flagrantibus prunis superposita: uersaturq; donec se mutet, & colorem cinereum concipiat. Postea refrigerata reponitur ad usum. Sunt qui cruda olla eam urant, uti dictum est: sed non prorsus eundem colorem cremata reddit.

Rubigo ferri. CAP. XLVI.

Græc. ῥοσσις ἰσχυρῶς. Ia. Rubigo ferri. It. Ruggine del Ferro.

Rubigo ferri restringit. Sistit faminarum profluvia admota: potuq; præstat ne concipiant. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papularum eruptionibus medetur. Perquam utilis ad scabritias genarum, reduuias, & pterygia. Condylomatibus prodest, gingiuas firmat, podagras illita lenit, alopecias replet. Vinum aquaue, in qua candens ferrum sit restinctum, potu celiacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur. Stercus ferri, quam Scoriam uocant, eadem potest quæ Rubigo, sed inefficacius. Aconito, ex aceto mulso potum, opitulatur.

Aerugo, quæ Aeris rubigo est: ut in ferro ferrugo, seplasis & recentibus medicis, Viride Aeris, magna abundantia in omnibus pharmacopolijs habetur, licet sincera sit parum, adulterata ingens copia. Nam cum Aerugo, aut fossilis sit, aut factitia: fossilis quod fodinis innascatur, & quod non raro Vermilorum speciem contrahat, Græcis, ῥοσσις scolex nominatur. Hæc ex Cypro nostro tempore in Italiam non assertur. factitia præparanda multi sunt modi. Nam & è laminis arcis deraditur, & derafa in massas formatur, ac inde Græcis, ῥοσσις xiton dicitur. Hodie cum optimi copia non sit, mediocri utimur, quod cum aceto sit & rimaceis. Nam Scollecia nostro auro haud dum in usus recepta, sicut nec Germanica fossilis Aerugo. Errant qui Aerugine, pro squama Aeris utuntur, sed iam detectus error, & in totum tollendus. Ferrugo, seu ferri rubigo, & stercus ferri, seu scoria res notissima sunt, caueant tamen imperitiores, ne squammâ ferri, quæ tusione excussa, in massam unde

V 3 exilij

DIOSCORIDIS

It rursus indi potest, cum stercore seu recremento confundant, quia
est, è ferro ignito exiliens.

Plumbum elotum. CAP. XLVII.

NOMENCLATURA.

Gr. πεπλόμεν & μόλιβδ &. Lat. Plumbum
elotum. Ita. Plombo lauato.

Lotura Plumbi sic fit: In mortarium plumbeum aquā inij-
ciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & li-
mi modo crassescat, aut lutulenta reddatur. Linteolo deinde co-
lato, aquam superinfundens, quo facilius quicquid est resolutū
incerni possit. Hoc iterum facito, usque dum satis tibi habuisse ui-
deatur. Vbi consederit, priore aqua affusa, nouam adijciens, ut
Cadmiam lauato, donec nulla extet nigriria. Postea in pastillos
cogens, reponito. Quidam scobem mundi Plumbi lima quasi-
tam, mortario pistilloq; lapideis terunt, aut manibus cum aqua
paulatim adiecta fricant, donec nigrescat. mox ubi id pessum ie-
rit, effusa aqua, colligunt in pastillos. Nam trium uehementer,
Ceruse simile redditur. Alij elimata scobi modicam Plumba-
ginem adijciunt, affirmantes ita elotum Plumbum prestan-
tius esse. Potest refrigerare, adstringere, inducere, mollire, ex-
plere cana, sistere oculorum fluxiones, & ulcerum excrescen-
tia. Sanguinem supprimit, prodest contra sedis ulcera, condyloma-
mata, & hamorrhoidas, ex rosaceo. Item, ad ea que agre cica-
tricem ducunt: & in totum Spodij effectus prabet, nisi quod nō
obducit crustas. Syncerum Plumbum, astrictu, marini scorpio-
nis draconisq; plagis auxiliatur.

Plumbum vstum. CAP. XLVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. μόλιβδ & κεκαύμεν &. La. Plumbum vstum.
Ita. Plombo abbruciato.

Fritur

Vritur Plumbum sic: Super quàm tenuissimas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur inspargito: additisq; alijs rursus laminis, interiecto semper sulphure, usque dum uas expleueris, succendito. Flagrante autem Plumbo, ferrea rude uersato, donec perfecte redigatur in cinerem, nihilq; è Plumbo nonustum hæserit: tum demum, obstructis naribus, eximito: alioquin halitus plumbi noxius sentitur. Aut elimatam plumbi scobem in olla sulphure urito. Alij laminas in fictili crudo, ut dictum est, imponunt fornaci, aut foco, & circumlinentes operculum, dato exili spiramento, urunt. Alij pro sulphure Cerusam aut Hordeum inspargunt. Alij integras laminas imponentes, acrigine utuntur, & rudicula ferrea continue movent, dum in cinerem soluantur. Sed difficilis huiusmodi ustio, & si uehementius uratur, contrahit spumæ argenti colorem, Magis tamē nobis placet prima urendi ratio. Plumbū ustum lauatur ut Cadmia, & reconditur. Eosdem effectus habet, quos Plumbum e-lotum, sed multò acriores. Recrementum Plumbi, quod Scoriam uocāt, optimum est, densum, fractu contumax, Cerusam planè representans, nihil plumbo si habens, quod ad luteum colorem accedit, & uiri splendorem imitatur. Eadem quæ Plumbum exustum potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infusa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ luteum colorem duxit: idq; sæpius, dum recrementum absumatur. Dein ubi conserit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos. Molybdoites lapis à Plumbi similitudine dictus, respondentem recremento uim habet, & eodem modo lauatur.

Stibium. C A P.

XLIX.

NOMENCLATURA.

Græ. στίμμι. Lat. Stibium. Ita. Stibio.

R 4

Stim

S Timmi optimum, quod splendidissimum est, modoq; nitedu-
larum emicat, confractu crustosum, nihil terræ aut sordidi
habens, friabile, quod Stibi appellant, alij Platyophthalmon.
Vis eius astringere, meatus obstruere, refrigerare, ex crescentia
in carne cohibere, ulcera ad cicatricem perducere: sordes & ul-
cera oculorum expurgare. Sistit & sanguinem e cerebri mem-
brana profluentem. Et ut in uniuersum dicatur, uis usto plumbo
similis est priuatim, ambusta igni, in pustulas erumpere non pati-
tur, cum adipe recenti illitum, crustosas exulcerationes ad cicatri-
cem perducit, cum cera & exigua Cerusa. Torretur pinsita sa-
rina circumlitum, & carbonibus obrutum, donec carbuncule-
tur crusta, exemptumq; restinguitur mulieris lacte, quæ marem
peperit, aut uetere uino. Vritur etiam carbonibus succensis effla-
tum, quoad igni deslagret. Si enim paulo magis concremetur,
Plumbum fit. Lauatur, ut Cadmia & es. Sunt qui ut Plumbi
recrementum eluant.

Molybdæne, seu Plumbago.

C A P. L.

NOMENCLATURA.

Gr. Μολιβδαίνω. Lat. Plumbago.

Ital. Piombagine.

Molybdæna optima est flaua, argentea spuma amula, mo-
dicè splendens: cum teritur, rufa. Decocta cum oleo ioci-
noris colorem trahit. Vitiosa est, quæ acrem aut colorem Plum-
beum refert. Gignitur ex Auro & Argento. Est etiam quæ-
dam fossilis, ad Sebastiam & Corycū inuenta. Quo in genere
probat, quæ lapidosa non sit, aut recrementosa, sed nitens &
flaua. Vim habet spumæ Argenti, aut recremento Plumbi si-
milem. Vritur lauaturq; eodem modo. Miscetur conuenientis-
sime medicamentis quæ Liparas uocant, atque emplastris minime
mor

mordentibus. Carnem recreat, & ulcera ad cicatricem perducit. Glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non conuenit.

Plumbum nigrum est, & candidum. At elotum Plumbum, è nigro fit tantum. Porro Plumbi recrementum seu scoria, non id est quod cū liquefit plumbū, imo vasis insidit cū mihit aliud sit quā Plumbū, qđ (vt ita dicā) calcinari incipit, & facile in plumbi naturā rediret, vt mīsto Lithargyrio fit: sed spuma illa, quæ supernè expuitur, tum cum in fornace ingens fossilis Plumbi massa percolatur. Hæc densa est, dura, rubescens, vitri transparentia, visiturque è Tridentinis & Germanicis fornacibus magnis acerbis à metallicis eiecta. Plumbarius lapis, si Marquestita vulgaris nō est lapis est profectō, vt bona simpliciariorum parti videtur, è quo Plumbum excoquitur. Est etiam argenti simul & plumbi ferax vena. Stibium, quod Arabum sectarijs Antimonium in Germanicis maximè fodinis, in Italicis & Gallis etiam reperitur. Stibium cum quo lubuerit metallo in vasculo fusorio permixtum, etiamsi ferrum sit aut chalibis, celerius eliquandi materiam prabet. Laudatur scintillans, fragile, quod in longas fissuras rumpitur, non in rotundas particulas. Id fermina vocatur. Mas verò, aridius & magis est scabrum, minusque ponderosum & scintillās, & arenosius. Plumbago factitia est, & natua. Factitia in fornacibus procreatur, in quæis Aurū & Argentum eliquantur, nempe cum fodina non tantum in se Plumbi contineant, quantum eis percolandis sufficiat, vbi eis vena Plumbi, aut Plumbum purum adijcitur, nunquam non in fornacis fundo Plumbum calcinatum, simile Lithargyrio reperitur. Natua, ea planè est vena, quæ Argentum simul & plumbum continet.

Argenti recrementum. C A P. L I.

NOMENCLATURA.

Græ. Αργυρος σκόρια. Lat. Argentum recrementum.

Ital. Scoria d'argento.

Recrementum Argenti, quod Scoriam uocant, aut Helcysma, aut Encauma, Molybdæna uim habet. Quare emplastris quas phæas appellant, additur, ac medicamentis quæ cicatricem obducunt, ut potè cūm adstringat, extrahâtque.

P s spu

Argenti scoria seu recrementum, scilicet, ē. smalto ē vitro (sic dicitur) simile, ac diuersorum est colorum. Quod euenit ubi argentifodina adiacentes habeat aliorum metallorū fodinas, maxima tamen ex parte nigra est, ceruleis & viridibus lineis distincta, quāuis & quadam in totum cerulea, quadam virides sint, ut Esmaltum, perlucida.

Spuma argenti. CAP. LII.

NOMENCLATURA.

Gr. Ἀργυρῶς. Lat. Spuma Argenti.

Ita. Lithargirio.

Spuma Argēti quadam gignitur ex arena, quam Molyb-
ditin uocant, in sornacibus conflata, donec perfecte igni in-
candescat. Altera ex argento, Tertia ex Plumbo. Probatissima
est Attica. Secunda Hispaniensis. Huc sequitur quæ sit Dicæar-
chia, id est Puteolis, Baijs, in Cāpania, & Sicilia: plurima enim
hiscē locis ē flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo
colore splendet, Chrysis appellatur, omnium optima: quæ in
Sicilia, Argyritis: quæ ex argento, Calabritis. Vis autem ad-
stringere, mollire, explere caua, excreſcentia in carne reprime-
re, ad cicatricem ducere, refrigerare, & ocludere. Vritur argē-
ti spuma, confractis partibus ad magnitudinē iuglandiū, prunæ
superpositis: ita accensa folliibus, ut coſlagret, abstergitur infidēs
ſpurcitia, & reconditur. Aliqui ter aceto aut uino reſtinguen-
tes, rursus urunt, & eadem proſequuti, reponunt. Lauatur ut
Cadmia. Vt Argyritidi nominata, aut ſi deſideretur, alteri can-
dor detur, ea in parteis magnitudine fabarum confracta, chœni-
cis attica menſura, ſicili nouo ſuperſuſa aqua, addito cādidi Tri-
tici pari pondere, priuatimq; pugillo Hordei, linteolo puro, raro,
anſulis uasis alligato, coquitur, donec Hordeum fractum diſſili-
at: deinde omnia in nouum craterem oris ampli transfunditur.
Triticum abicitur. ſpuma Argenti uehementer manibus affri-
cando inſuſa aqua lauatur, aſſiccataq; in Thebaico mortario te-
ritur

itur, affusa feruente aqua, donec soluta fatiscat. Excolata aqua, terū tota die teritur, & uesperī infusa calida aqua finit. Manē olis excernitur, alia infunditur, atque ter die excolatur. Id se- te diebus fieri solet. Postea additis ad singulas minas spuma Argēti, quinis salis fossilis drachmis, infusaq; calida aqua, ter- lie teritur, & addita aqua excolat: cumq; malbuerit, calida in- usa, ide facito, dum nullā proisus salsedine resipiat. Demū ardē- issimo sole siccata, cieto prius humore, recondit. Sin minus, mi- na spuma Argyrutidis diligēter teritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile nouū conijcitur, aqua infunditur, ita ut superemineat. Mouetur quotidie manē & uesperī, aquaq; su- perfundit, priore nequaquā effusa. Hoc fit triginta diebus: naq; nisi moueatur, crassescit, usque in duritiem testæ. Post hac effusa leniter muria, in Thebaico mortario spuma Argēti teritur, con- iecta q; in fictile aquā continens, manibus diligēter agitāt, muta- ta subinde aqua, donec nullū salsuginis indicium præbeat. Deinde quod ex argēti spuma candidū apparet, in uas aliud transfert, & redactū in pastillos, plūbea pyxide condit. Alij spumā Ar- genti in fabarū magnitudines cofractā, in uentre suillo crudo ex aqua coquūt, dum viscus eliquesces cōtabescat. Exemptamq; cū sale pari terūt, & ut suprā dictū est, lauāt. Sunt qui salis libram unā, & spuma Argēti tantandē, in sole terāt, aqua cōtinuē mu- tata, dū cādor ei detur. Alia ratio: Sumito quātūuis Argēti spu- mā: ubi lana cādida inuolueris, fictili nouo indita aqua, cū pugil- lo fabarū recētū repurgatarūq; decoquito. Cūq; faba disrupta dehiscēt, lanaq; nō demigret, exceptā Argēti spumā, et altera la- na inuolutā, iterū coquito, cyathū aquæ & parē fabarū modū adijciēs. Eadē tertio, q; suprā, facito. In summa, tantisper, dum la- na iam nō inficiatur. Insuper transfundes in mortariū, ad singulas salis fossitij libras, adijcito octogenas spuma Argenti drachmas Atticas, et terito: intermittēs q; Nutri quā albijsimi cū aqua di- luti

luti drachmas quadraginta septem indito: iterum terito, donec satis candoris contraxisse uideatur. Ita autem fundens eam ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi cōsidere desierit, colato. Tum nouam superadiiciens aquam, manibus probe uersatam, finito ut confidat, ac rursus per colum adycito. Alter-
nis eadem prosequere, dum pura aqua dulcisq̃, effluat, & nullā
salsedinem præ se ferat. Postremò in fictile nouum translata,
colato sensim omni humore, soli quadraginta diebus sub canicu-
le hydus exponito, & siccata utitor. Elotam autem constat ad
oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum scēditates tollen-
das, ad rugosas facies, & cicatricosus, laceratasq̃, & macula-
rum plenas.

Argenti spuma aut Lithargyrium fit in fornacibus ubi Argētum
depuratur, è plumbo nigro, a coctionis diuturnitate, & metallo-
rum aliorum ex halatione ea formæ concepta. Porro color quo obducitur
aureus vel argenteus, non ex Auri vel Argenti spuma proficit, ut sepla-
sij visum est, sed ut plus, minus ve Aeris, defacando Argento, immitta-
tur. Nam si maxima pars Aes sit, aureo colore Lithargyrium imbuetur,
si modicum, aut nihilum sit Aeris, argenteo inducetur. Et reuera Li-
thargyrium, nihil aliud est, quam Plumbum Aeri, aut aliquando Ar-
gento, depurantium indiligentia permixtum.

Cerusa. CAP. LIII.

NOMENCLATURA.

Gr. *ῥιμυθίου*. Lat. & Ita. Cerusa.

Cerusa fit hoc modo: Infuso in urceum oris lati, aut fictile
labellum quàm acerrimo aceto, laminam plumbeam su-
pra fictilis spiraculum, subiecta prius arundinea tegete, firmato:
superiectisq̃, uelaminibus, ne halitum expiret acetum, ubi resolu-
ta fuerit, defluensq̃, deciderit, humorem purum ad summa dela-
tum colato, crassamentumq̃, transfundito. Debet quoque siccari
in sole, mox trusatili mola teri, aut aliàs tritum cibrari. Postea
quod superest duri, in tenues partes redigendum cribrandumq̃.

Vicij

Vicissim eadem tertio quartoq³ facienda. Melior, quæ primò cribrata est, & medicamentis oculorum assumenda. Secundum locum tenet sequēs, & reliquæ suo ordine. Nec desunt qui ligneas rudes in medio uase appendant, & derafo ceu situ imposito, ita ut acetum non contingat, inditoq³ operculo circumlinentes dimittunt. Post dies decem, laxato obturamento uisunt. Cumq³ resoluta materia fuerit, reliqua, ut supra diximus, exeuntur. Si aut quis in pastillos uelit digerere, aceto acri subacta, diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Aestate tamen supradictum opus ob-eundum est: ita enim candida atque efficax redditur. Quinetiā hyeme paratur, urceis supra furnos, balnea, aut fornaces impositis: ascendens enim calor, idem quod sol præstat. Laudatissimam fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut Lacedamone, proximam Puteolis. Torretur hoc modo: Flagentibus igni carbonibus, si-
Et ilino uo, maximè Attico tritam Cersam imposito, & assidue uersato, cūq³ cinereum colorem traxit, eximens refrigerato, & utitor. Est & aliud urendi genus: Trita patinis nouis supra prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec colore similis Sandarachæ fiat: extractaq³ ad usus ministratur. Quæ uerò ita parata est, Sandyx à quibusdam dicitur. Lauatur Cersa Cadmiæ modo. Vis ei refrigerare, occludere, emollire, explere, extenuareq³: insuper excreſcentia leniter reprimere, & ad cicatricem perducere. Miscetur ceratis, & emplastris quæ Liparæ uocantur, pastillisq³. Est autem letalis eius potus.

Cersa, plumbum est acerrimi aceti halitu in crassamentum, post in trusatili mola tritum, denuò cribratum, in pollinem resolutū. Ea exusta, donec rursus colorem imbuat, Scandic. m. facit. Officinarum Minium, & Scandix, vna & eadem res sunt.

Chrysocolia. CAP. LIIII.

NOMENCLATURA.

Græ.

Græ. χρυσocolμα. Lat. Chrysocolta. Ita. Borracc.

Chrysocolta laudatissima Armeniaca, colorem Porri quæ simillimè reddens. Secundum locum sibi uendicat Macedonia, & proximum Cypria, quo in genere præfertur pura: dannatur, quæ terram, aut calculos collegerit. Ratio lauandi hæc est. Tusam infusa aqua, mortario expassa manu ad pilam uehementer fricato, & statim quàm confederit, colato. Alteram infundens aquam, rursum terito. Hæc uicissim prosequere, donec purissima speletur. Dein siccato in sole, & ad usus recondito. Quod si urere uolueris, ex ea terens quod satis esse uidebitur, putinis supra carbones adponito, & alia facito quæ supra diximus. Dos Chrysocoltæ ad purgandas cicatrices. Excrescentes carnes coercet. Adstringit, purgat, exarscit, & modice corpus mordendo exest. Inter medicamenta intelligitur, quæ uomitiones concitant, & necem inferre possunt.

Chrysocolta in fodinarum cauernis inuenitur, foras per auri venas exudans, limo per frigus hybernium, ad puniceam duritiem condensato. Laudatior quæ in Aëris fodinis: secundum ab ea locum obtinet, quæ in Argenti cauernis, reperitur. Quæ ex plumbi cauernis, improbatior illa est, quæ ex aurisodinis extillat. Facilita fit, aqua per totum ver tempus imbuta uena ad Iunium usque, ac postea Iunio & Iulio mensibus resiccata, in Chrysocoltam euadit, quæ profecto, nihil est aliud, quàm uenæ putrefacta. Officinarum Borrax, nam ita Chrysocoltam Officiæ uocant, magna ex parte sincera non est, colore in eo ut plurimum nigricante, non in viridi obscuro, ut par erat. Quæmetiam magna copia est facilitæ, & alumine rupeo, vi ignis, & armeniaco sale coalita. Id Borracem resacant uocant. Plus de vitore concipit, quæ ex arisodinis, nigrore quæ ex plumbi cauernis: albedinem, quæ ex Argenti fodinis condensatur. Auro ferrum nando lutea, quæ aurisodinis præstatio: medicina, viridis ex arisodinis.

Lapis Armenius. CAP. LV.

NOMENCLATURA.

Gr. Αρμένι λίθ. Lat. Lapis Armenius.

Ita. Pietra Armenia.

. Arm

Armenius lapis præfertur levis, colore cœruleo, perquam æquabilis, calculo carens, & friabilis. Eadem quæ Chrysocolla præstat, sed inefficacius. Quinetiam usum habet ad pilos in palpebris alendos.

Armenius Lapis colore Chrysocollæ refert. Selectissimus est qui summe viret, & propè ad casium accedit. Qui in pluribus Germanicis locis reperitur lapis, conficiendo colori quæ propriè, è viridi casium vocant, Matthiolo verus esse ducitur, Armenius lapis. Nec obstant natalis. Si quidem manifesto videre est, seplasijs Cadmiâ, Thutia: Spodij, diuersa Antispodia: & floris aris, viride aris vice referre: cum tamè hæc singula in fodinis reperiantur. Porro si is lapis in officinis non reperitur, non statim sequitur in metallicis fodinis non reperiri. Lapis armenius per Traliunæ humores melancholicos expurgat, impunè, nec dispari ab Elleboro albo virtute. Per Aetium pueris cõfert quibus strictum est pectus, prouocandoq; vomitui peculiaris. In epilepsia sine noxa ad tertia viciæ partem offertur, cum decocto Centaurij minoris. Galeno lapis armenius virtutis est abstersorie cum leui quadam acrimonia, & leuissima vi astrictoria.

Cœruleus.

CAP.

LVI.

NOMENCLATURA.

Græ. *κῡαῖν* &. Lat. *Ceruleus*. Ita. *Lapis Lazuli*.

Cerulei origo ex ærarijs metallis in Cypro, copiosior ex arena littorali: secundum quosdam sub cauatos specus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Virtur ut Chalcitis. Lauatur ut Cadmia. Vini habet reprimentem, & modicè erodentem. Crustis gignit, & exulcerat.

Ceruleus, siue Lapis Lazuli, probatissimus qui scintillis aliquot aureis emicet. Arabum sectarij Cæruleum, & armenium lapulæ quod quadantenus cognati sunt, viribus et specie confundunt. Et sanè in Germanicis fodinis inuicem & in vna sæpè numero massa adnati reperiuntur, ab eaq; coloris propinquitate, eandem & vim & pretium apud plerosque obtinere. Attamen Lapis Lazuli venenatus non est, sed per Maradum, diligenter elotus, purgat inuicem humore præcipuè melancholicum, quântum

quātumuis Auicēna putrefactorium dicat. Siquidem acrimonia putrefa-
cit, quā lotio commoda emendat. Porro Germanica fodina, auro notatū
non procreant, namq; sic distinctum in aurifodinis tantum, & ē quibus
argentum simul & as extrahuntur, & alibi nascitur nusquam. Quo-
circa bonitate & precio praecllentissimus Lapis Lazuli, qui ex aurifo-
dina educitur, quoq; vltamarinum (sic vocant) Azurum fit. Maritimi
littoribus innascens, inspissata arena non absimilis, vix, aut nullate-
nus, nostro auro reperitur.

Indicum. CAP. LVII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἰνδίκον & λίθον. Lat. Indicum. It. Indico.

INDICI duo genera. Vnum sua sponte nascitur, tanquam spu-
ma, germinatione Indicis arundinibus exiens. Alterum in-
sectoria dant officina: & est spuma purpurea innatans cortinis,
quam detraclam artifices siccant. Optimum existimatur, quoa-
cærulei speciem præbet, succum suum sorbet, & leue. Inter me-
dicamenta est quæ leuiter adstringunt, & inflammationes, tu-
moresq; rumpunt. Purgat & reprimat ulcera.

PLinianum Indicum, quod in insectorijs officinis ē Purpurea spuma
conferi scribit, aliud est a nostro, quod ex Isatide, seu Guado fit
quoq; pictores vtuntur inducendo (sic loquuntur) cælesti obscuro, alijsq;
coloribus, & quod Auripigmento permixtum, colorem viridem pulche-
rimum facit: & perinde à Dioscoridis Indico discrepans, quod spumantem
facit, ex Indicarum arundinum germinatione.

Ochra. CAP. LVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. ὀχρα. Lat. & Ita. Ochra.

OChram leuissimam, & omnino luteam eligere oportet
saturatam, non lapidosam, friabilem, natione Atticam
Vritur hæc, & lauatur Cadmiae modo. Vis eius adstringere, er-
dere, collectiones & tubercula dissipare. Excrecentia in carnem
reprimat

reprimat caua cum cerato explet, & articulorum tofos com-
minuit.

Ochra lutei coloris terra in pictorum vsus cadens, è cauernofo fo-
dinarum plumbi vapore, eiusmodi colorem imbuat. Nam Athe-
niensis Ochra memoria perijt.

Cinnabaris. CAP. LIX.

NOMENCLATURA.

Græ. κινναβάρη. Lat. Cinnabaris.

Ita. Cinabro.

Hallucinantur qui Cinnabarin Minio eandem esse exi-
stimant. Minium enim in Hispanijs ex lapide quodam
argenteæ arenæ permisto, temperari solet, alioquin non dignosci-
tur. Fornacibus autem in florentissimum flagrantissimumq; co-
lorem permutatur. In metallis uerò strangulantem halitum cru-
elat, Itaque facies incola uescis obuelant, ut per illas spectet, nec
respirando noxium aërem attrahant. Eo pictores ad sumptuosa
parietum ornamenta utuntur. Cinnabaris uerò ex Aphrica
desertur, & magno constat. Hactenus inuenitur, ut uix uersico-
loribus pictorum lineis satisfaciat. Intento colore nec diluto præ-
ditum: quare quidam sanguinem esse draconis existimauerunt.
Vim habet Cinnabaris Hamatitæ lapillo eandem. Conuenit ad
oculorum medicamenta, uerum efficacius, magis enim adstrin-
git & sanguinem cohibet. Ambustis igni, & papularum eru-
ptionibus cerato excepta, medetur.

Cinnabaris quo seplasia & pictores utuntur, longè distat à Diosco-
ridis Cinnabari. Nam noster & factitius est, & fossilis, venenatus,
& exitiosus. At Dioscoridis Cinnabaris ex Africa assertur, modica quã-
titate, vi eadem qua lapis Hamatitæ, non foris tantum applicitus, sed
etiam intra corpus sumptus. Quod vulgari nostro Cinnabari non con-
uenit, nempe erodenti, exulceranti, venenato, oculorum ac interiorum
inimico. Plinius sanguinem putat esse draconis in pugna cum elephante
contusi. Sed id falsum est. Per Cadamostrum in africana navigationis

X

historia

historia cap. 4. Sanguis Draconis, lachryma est gummosa & liquida, quæ ex Africana arbore distillat, colore purissimi & summè naturalis sanguinis. (Hic hodie Italis ducitur, Sangue di Drago in lagrime) Incola quo maior sit copia, corticem ferro incidunt, & collecto liquore, ahenis igni incoquant, & sanguinem Draconis vocant. Liqueor hic ex Africa allatus, pauca quantitate, in pictorum vsus inducendis umbris, & deliniendo rubro claro, (ut vocitant) adde his quod experientia cognitus est Hamatiti virtute consimilis, & astrictiorius, non dubiam fidem facit, Dioscoridis Cinnabarin, idem esse cum hoc Africano liquore. Cæterum Cinnabaris fossilis, rubens est lapis, non extrema duritie, at penderosissimus, & non rarò argento viuo intantum factus ut spõie extillet, haud aliter, quàm arte & vi ignis educitur. Facilius fit ex Argento viuo & sulphure per viam sublimitationis. Minium quod hoc capite scribit Dioscorides, noster est Cinnabaris fossilis. Minium vulgare, nihil aliud est, quam Sandix.

Argentum viuum. CAP. LX.

NOMENCLATURA.

Græ. υδράργυρος & . Lat. Argentum uiuum.

Ita. Argento uiuo.

Argentum uiuum fit ex Minio, quod abusiue Cinnabaris dicitur, patinis fictilibus, imposita ferrea concha Cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt. Siquidem deterfa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in Argentum uiuum coit. Quinetiam inuenitur in argentifodinarum tectis, stillatim concretum. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in uitreis, aut plumbeis, aut stagnæis, aut argenteis uasis: siquidem aliam materiam omnem exedit, & defluere facit. Potum uim perniciousam habet: suo enim pondere interna exest. Remedio est lac multum subinde potum, & uomitionibus reiectum, aut uinum cum Absinthio, aut Apij decoctum, aut semen Ormini, aut Origanum, uel Hyssopum cum uino, Auri limati scobs, id est, ramentum quàm tenuissimum, epotum, mirabili est auxilio.

Argenti

Argenti viui vena, & sola, & cum marmore repperitur. Montes aliquot qui à Goritia vnius diei interuallo distant, caueas habēt minerales, vbi abundantissima copia repperitur. Huius conficiendi facili est ratio. Cinnabaris fossilis, longè amplius Argentum viuum exudat. Id philosophi alchymistæ metallorum omnium semen & originem fecere, eamquæ causam esse cur condensari non possit. Attamen contra eorum opinionem, argento & auro, quàm omni alio metallo citius vnitur. Siquidem metalla omnia quæ Argento viuo immittuntur, innatant, præter aurū quod ilicò fundū petit, quod ei ceteris citius implicetur.

Rubrica Sinopica. CAP. LXI.

Gr. *μίλτ & σινοπικὴ*. La. & It. Rubrica Sinopica.

Rubrica Sinopis maximè probatur grauis, densa, ad iocinoris imaginem uergens, calculorum expers, concolor, cum diluitur impendit fusilis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibusdam, expurgataq; desertur in Sinopem urbem, in qua uenditur: unde cognomentum accepit. Vim habet exiccatoriā, quasi inducendo obstruentem & adstrictoriam. Quapropter vulnerarijs emplastris, & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs commisceri solet. Alium sistit, in ouo sumpta aut chystere infusa. Datur iocinoris uitio laborantibus.

Rubrica fabrilis. CAP. LXII.

Gr. *μίλτ & τεκτονικὴ*. Lat. Rubrica fabrilis.

Ita. Rubrica fabrilis.

Rubrica fabrilis, ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegyptia & Carthaginensis, lapidum expers, friabilis. Gignitur etiam in Iberia, quæ ad occidentem spectat, Ochra exusta, & degenerante in Rubricam.

Rubrica Sinopica, vt ex Dioscoride apparet, olim è Cappadocia asferebatur, Nunc verò, eius vsus perijt. Rubrica fabrilis rufa est gleba, quam Bolus nostro æuo nuncupant.

Lemniam terra. CAP. LXIII.

Græ. *λημνία γῆ*. La. & It. Terra Lemnia.

V 2

Lemnia

Lemnia terra, cuniculoso in specu nata, è Lemno insula, palustri loco desertur, inibi electa, & caprino sanguini permista: quam incolæ cogunt in pastillos, & imagine capræ signant unde & Sphragida ægos, hoc est, sigillum capræ, appellauere. Vim antidoti habet contra perniciofa uenena singularem. Pota cum uino, & præsumpta, euomi uenena cogit. Contra ictus morusq; animalium, quæ exitiale uirus ei aculantur, prodest. Antidotis familiaris. Sunt qui hac ad sacrificia utantur. Est & dysenteria utilis.

Lemnus insula, unde terra Lemnia olim exportabatur, vulgo hodie Stalimene dicitur. Quæ nostro tempore sigillo impressa Turcico, Terra sigillata ad nos assertur, vera non est & impermixta terra Lemnia, cum hæc supramodum sit rubens, terra vero sigillata dilutius rubeat, quod cum alia terra mistonem coarguit. Porro è doctorum hominum censura, quem Bolus armenium Orientalem vocant, insucata & inadulterata est, Lēnia terra. Non enim ex armenia, ubi verus & sincerus Bolus repperitur, is Bolus assertur, sed ex Lēno insula. Siquidē Bolus armenius Ochra in more palli scit, nō rubet. Id Lemniensiu mercatorū fit dolo, qui quo res diuersas mentiantur, ex vna & eadem Lēnia terra cum pura est, in armenium Bolum quæstum faciunt: hac vero mista & adulterata, in terram Lemniam compendium faciunt.

Atramentum sutorium. C A P .

LXIIII.

NOMENCLATURA.

Gr. χαλκάνθοϋ. La. Chalcanthum. Ita. Vetriolo.

Atramentum sutorium genere quidem, unum & idem est mole & concretum: sed in specie differentias treis habet. Vnum namque humoribus stillatim in cuniculos quosdam colatis, concreuit: quare ab ijs qui Cypria metalla perficiunt, stillatitium appellatur. Petesius ipsum Pinarion uocat, alij Stalacticon, id est, stillatitium. Alterum simplici ratione fit in speluncis: postea transfusum in excavatos scrobes, concrementum capessit

ssit, quod *Peclon*, id est, concretitium, propriè nominatur. Tertiū dicitur *coctile*, & in Hispania fieri solet: sed inutile ac inualidissimum esse constat. Ratio parandi hæc est, Aqua madefactum decoquunt, mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus coalescit, in complureis formulas digestū, tesserarum speciem reddentes, quæ racematim inter se cohærescunt. Optimum esse creditur, cæruleum, graue, concretum, trās-lucens: cuiusmodi stillatitium est, ab alijs *Lonchoton* nominatū. Proximum, concretitium. *Coctile* uerò ad insectus & denigra-tiones, aptius ceteris esse compertum est. Sed ad medicinæ usum inualidius esse, exprimēta docent. Valet adstringere, calfacere, & crustas inducere. *Latas uentris tineas* necat, drachmæ pondere decoratum, aut cum melle linclum. Vomitus ciet: aduersus hausta fungorum uenena, ex aqua potum auxiliatur. Purgat caput, aqua dilutum, & in uellere naribus instillatum. Vritur ut paulo post in mentione *Chalcitis* ostendemus.

Calcāthum, quod *Atramentum sutorium* est, & vulgò *Vitriolum*, duum est in Italia specierum. Vnum natuum, quod *Coppam ros-sam* vocant, id validius est. Alterum, factitium. Istud ē fodinis, & natiui loci natura, plus minusue robustius est. Romanum, quantumvis liuidius, factitiorum validissimum est. Secundum ab eo locum obtinet *Cypriacum*. Nam *Germanicum*, colore licet sit pulcherrimo cæruleo, oculisque magis adblandiatur, attamen cum ex eo, aut educenda aqua fortis, aut inficiendi panni, re ipsa inualidius proditur. *Vitriolum* essentia fossili cum alumine conuenit. Mordet gustu, asperum est, pungit, & astringit: operatione, alumen: acrimonia. *Salmutrum*, siccitate sal exprimens. Huius fodinæ non longè absunt à *Massa*, maritima *Senensium*, vrbe. Huius minera terram potius, quam lapidem refert, coloris in cæssio luuiscens, & maculis aliquādo æruginis, aliquando viridibus, viridis æris in morem. Ex hac subtertana, sctidissimus & acerrimus odor exhalat, sulphuri similis, ob idq; cauea aperta effoditur, alioqui breui perituris metallicis operarijs. Recens conficiendi *Vitrioli* ratio à *Galeno* ca differt. Ista ē *Galeno* patet, illa quotidie visitur. Id tamen sciendum, *Cyprium Galeni Calchanthum*, materiam esse coalitam, eaq; subtiliori-

bus Chalcitis, Misi, Pforici, & Aeris partibus compositam. Quod, ut cōuenit, intellectum, Galenum satis superque ab inaduerentia tuctur. Coppa rosa quam natium Chalcantum diximus, sæpenumero supra mōtes fodina Vitrioli congelata repperitur, corticis cristallina effigiem referens. Acerrimum, quod per alembicum à vitriolo, oleū extrahitur, & pariter Coppa rosa, præparata aut dissoluta in aqua rosata, colata, ter quaterne inspissamento repetito, valent in multos in medicina vsus, quos mystæ norunt. Nam amystis sacra prodere nefas.

Chalcitis. CAP. LXV.

NOMENCLATURA.

Græ. χαλκίτις. Lat. Chalcitis. Ita. Chalciti.

Chalcitis præfertur similis aeri, friabilis, nec lapidosa, nec inueterata, intercurfantibus oblongis uenis, splendentibusq̃. Huic abstersoria uis inest, & excalfaciens, & crustas ulceribus obducens. Purgat quæ oculis & eorundem angulis hærent. In genere leuiter exedentium est. Ad ignem sacrum, & uicera quæ serpunt, efficax est. Sanguinem è uulua & naribus erumpentem, cum succo Porri sistit. Gingiuarum uitia, de pascencia ulcera, tonsillasq̃, eius farina compefcit, usta, & cum melle trita, oculorum medicamentis longè utilior redditur. Callum genarum & scabritiam absomit, abstergetq̃. Fistulas tollit, collyrij modo in eas adacta. Fit ex Chalcite medicamentum, quoa Pforicon uocant, duabus eius partibus cum una Cadmia additis & ex aceto tritis. Oportet autem in fictili obruere sinistro, diebus quadraginta, per caniculæ ardores: sic enim fit acrius. Idē quoa Chalcitis potest. Alij pares utriusque portiones in uino terunt, & eadem prosequuntur. Vritur Chalcitis fictili nouo, uiuis carbonibus superposito. Modus autem ustionis in humidioribus est: dum ipsa Chalcitis bullas excitare desierit, & perfecte inaruerit: in reliquis uerò, dum mutata in floridum colorem fuerit, & sanguinem aut miniatum colorem contraxerit, tum demum ex menda est: insidens autem spurcitia, flatu expellenda, mox repōnenda

nenda. Torretur etiamnum perflatis carbonibus, usquedum luteo colore palleſcat: aut fictili ſubditis candentibus prunis, ſubinde uerſata, donec igni conflagret, & colorem mutet.

Miſy. CAP. LXVI.

NOMENCLATURA.

Græ. μιſυ. Lat. Miſy. Ita. Miſi.

Miſy aſſumendum natione Cyprium, Auri ſimile, durum, quod friando Auri colorem imitatur, & ſtella modo ſplendet. Vim habet & uſtionem cum Chalcitide eandem, præterquam quòd Pſoricum ex eo non conficitur, exceſſus deſectusq; ratione tantum differens. Aegyptium autem ceteris præſtat, utpotè quod efficacius habeatur, ſed ad ocularia medicamenta multò ſupradictò inferius.

Melanteria CAP. LXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. μελαντηρια. Lat. & Ita. Melanteria.

Melanteria gemina eſt originis. Quædam in ſaucibus cuniculorum, quibus æs eruitur, ſalis modo concreſcit. Alia uerò in ſumma facie ſupradictorum locorum coit, quæ terrena eſt. Quinetiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibusdam regionibus, foſſilis quædam. Præſtat, quæ ſulphuris colorem trahit, leuis, pura, æquabilis, & quæ contactu aquæ conſeſtim nigreſcit. Vim cauſticam eam obtinet, quam & Miſy.

Sory. CAP. LXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. σωρι. Lat. Sory. Ita. Sori.

Sory exiſtimarunt aliqui Melanteriã eſſe, aberrantes. Siqui de ſui generis eſt Sory, ei nō abſimile. uerū Sorci uirius ineſt

X 4 graue

grauē, & nauſeam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, & alijs quibuſdam regionibus, ut in Libya, Hiſpania, & Cypro. Præfertur Aegyptium, quòdque frianti nigrius apparet, in multa foramina dehincens, ſubpingue, in ſuper adſtringens, & olfactu deuorationēque magnum uirus olens, ita ut ſtomachus in uomitiones effundatur. Quod autem friatum ſcintillas Miſyos modo non emittit, & alterius generis eſſe, & inualidum cenſendum eſt. Vim & uſtionem ſupradictis ſimilem habet. Dolori dentium cauernis inditum medetur, eoſq; labantes firmat. Iſchiadicis ex uino inſuſum auxiliatur. Illitum cum aqua, uaros extinguit. Medicamentis admiscetur, quæ capillos denigrant. Hæc autem ſerè omnia & alia quæ uſtionem experta non ſunt peruſtis ualidiora eſſe exiſtimantur, præter ſalem & uini ſecem, Nitrum calcē, & conſimilia, quæ cruda remiſſiora ſunt. combuſta enim, uiribus efficaciora redduntur.

Chalcitis, Miſy, Sory, in Italiam, & proinde in Galliā nō aſſeruntur. Quin Matthiolus aſſerit, ſe in fodinis Germanicis vnde Aes effoditur, his repperiundis plurimum laboraſſe, ſed fruſtrata opera, non ſuccedente effectu, nulloque ſeſe promente veſtigio. Melanteriam verò in cuniculorum faucibus & cauernis ſapē vidiſſe, quam tamen metallici operarij non adinaduertent. Porro iam detectus eorum error, qui Miſy, Vitriolum Romanum putauere. Siquidem Vitriolum colore aureo non conſtat, nā friatum nam in aurum, ſed in vitrum ſcintillat. Porro è Galeni teſtimonio, Miſy minerale eſt, quod a ſeſe ſpontè terra viſceribus innaſcitur, nec factitium eſt. Idemq; de Chalciti & Miſy eſſe ex euſdem libri noni, De facultate ſimplicium, capite de Chalcanto, ſub finem, intelligitur. Item Chalcitim in Miſy transformari, non Miſy, in Chalcitim. Vitriolumque Romanum vetuſtate in Chalcitim tranſſere, ob idque Miſy eſſe non poſſe, ſed potius ad Sory naturam accedere: quod quēadmodum Chalcitis in Miſy transformatur, ita Sory in Chalcitim conuertitur. Tria hæc medicamenta Sory, Chalcitis, & Miſy, euſdem in genere facultatis & natura ſunt, eſſentia tamen tenuioris aut craſſioris differentiam ſortita. Sory omnium craſſiori eſt eſſentia, Miſy tenuiori, hæc inter mediat Chalcitis. Ad hæc Miſy in corporibus duris Chalciti (nempe ob ternitatē partium) plus mordet, cumque amba in decoctio

decoctionibus dissoluatur, magis tamen Chalcitis, quam Misy. Sori non eliquatur, ut quod compactius, plus ad saxi naturam accedat: Haud aliter quam Misy, per natium calorem extenuatum, ob idq; Chalciti siccius non facile liquefit.

Diphryges. C A P.

L X I X.

NOMENCLATURA.

Gr. Δίφρυγες. Lat. Diphryges Ital. Diphryge.

Diphrygis tria genera esse creduntur. Quoddam enim metallicum est, quod in Cypro sola gignitur. Lutosum namque extrahitur, ex luto cuiusdam inibi specus: extractum, sole siccatur, mox circumpositis sarmentis uritur. Diphryges ideo uocatum est, quod & à sole & à sarmentis uratur, are scat, et ferme torreatur. Alterum perfecti æris, quasi subsidens sax est. Siquidem post frigida aquæ offusione, ut supra retulimus, cum de flore æris differeremus, sublato ære, fornacum ima parte coherens id genus inuenitur, & adstrictionem & gustum æris habens. Tertiū sic fit: Lapidē Pyriten, ut calcem multos dies cremant in camino: cumq; colorem Rubricæ contraxerit, eximētes recondunt. Quidam tradunt hoc, ex sola materia, quæ lapidem æris gignit fieri quando in dictis arcis assata, & in scrobes translata peruritur: tunc enim ambientem scrobis locum comprehendit, & exemptis lapidibus nihilominus inuenitur. Prasertur quod saporem æris reddit, eruginisq; adstringens, & uehementer exiccans linguam. Quod sibi exusta Ochra non uendicat, quæ cremata Diphrygis uice uanit. Vis eius adstringere, siccare excrementia: consumere, ulcera serpentia, & quæ cacoethe uocant, ad cicatricem perducere. Suppurationes, Terebinthina aut cerato exceptum discutit.

Metallicum & Cyprinū Diphryges, nostro tēpore nec affertur, nec ostēditur. At secundū genus, quod perfecti æris in fornacibus ab eo

X S perco

percolato sedimentum est, in Italia in Perzene sodinis reperitur, & in pluribus per Germaniam locis. Quod ex lapide Pyrite fit, aut ex sola materia quæ Aeris lapidem procreat, nobis est incognitum. Goslaria per Cordum, Exilit è terræ cuniculis materia quæpiam luti amula, figulina cretæ effigie, lenta et glutinosa substantiæ, sed licet paulatim expuatur, eo tamen emergit impetu, ut etiam lapillos prodiens sursum attollat, natura & facultate Misy respondens. Hanc nativum & Cyprium illi Diphryges existimat.

Auripigmentum. CAP. LXX.

NOMENCLATURA.

Gr. Ἀρσενικόν. Lat. Auripigmentum.

Ita. Orpimento.

Auripigmentum in eisdem metallis, quibus Sandaracha, gignitur. Optimum existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli materiæ permixtum, in squammas fissile: quale in Mysia Hellesponti nascitur. Huius duo genera fluxerunt. Vnum supradictum est: alterum glandis effigie, pallidum & colore Sandaracham imitans, glebosum, ex Ponto & Cappadocia deferretur: quod etiam secundum locum tenet. Torretur in testâ novius carbonibus subiectis, assiduoque versatur, donec igne flagret, & mutet colorem: deinde refrigeratum, tritumque reconditur. Vim habet adstrictoriam, & erodentem. Crustas cum vehementi uredine, & violento morsu excitat. Reprimit quæ crescunt, & capillos euellit.

Sandaracha. CAP. LXXI.

NOMENCLATURA.

Græ. Σανδραχα. Lat. & Ita. Sandiracha.

Sandaracha probatur rufa, & saturatior, & aliena materia uacans, friabilis, Cinnabaris colore, sulphuris uirus dolens. Dos eadem & uestio, quæ Auripigmento. Explet alopecias, resina excepta. Scabros ungues cum pice eximit. Contr

phit

phthiriasin ex oleo efficax est. Tubercula cum adipe discutit. Prodest ad narium orisq; ulcera, & ceteras papularum eruptiones cum rosaceo: item condylomata. Datur ex mulso, purulenta extusientibus. Suffitur quoq; cum resina, aduersus ueterem tussim, raptio per fistulam nidore. Vocem expedit, cum Melle delincta, suspiriosis cum Resina in catapodio optimè datur.

Auripigmentum & Sandaracha mineralia, eiusdem virtutis et naturæ sunt, nec aliò differunt, quàm quod vnum magis excoctum est, alterum minus, per æquè ut facultate vnum altero subtilius. Proinde Sandaracha, nihil aliud est quàm Auripigmentum, quod in terrar visceribus ampliorem & coctionem & colorem contraxerit. Quod eo patet. Auripigmentum in testaceo vase super carbones incoctum, summè rubens & flammèu apparet, qualis reuerà est Sandaracha, eoq; magis, quò maiore artificio colorem imbuunt, quàm naturà, Sandaracha. Venetis inter Auripigmenti portiunculas, Sandaracha summè rubens inuenitur. Quàm Vernicem scriptorum vocant, gummi est Iuniperi, non Sandaracha. Errorè fecit, dictio Sandarax, quæ Arabibus istud est gummi. Eapropter ubi apud Arabes Sandaracha legitur, Vernix scriptorum intelligenda, ut in Græcis authoribus, id, quo de agimus, minerale. Sandaraca & Sandicis nomina, quidam pro Cerusa vsta, quòd admodum rubida sit, accipiunt, & hac nihilominus, ipsum est Serapionis Minium, & maxime eius pars, qua hodie seplasia vtuntur. Ceterum Arsenicum crystallinum & album, non ex Auripigmento fit, per sublimationem, ut aliqui opinantur, at eisdem ex sese quæis Auripigmentum & Sandaracha caneis innascitur. Risagallum per sublimationem fit, æquatis ex Arsenico & Auripigmento partibus.

Alumen. C A P. LXXII.

Græ. στυπτήρια. Lat. Alumen. Ita. Alume.

OMne Aluminis genus ferè in Aegypto, & in eisdem metallis inuenitur. Etenim scissile quoddam, quasi flos glebosus intelligit. Gignitur & in alijs quibusdā locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sardinia, Hierapoli Phrygiæ, Aphrica, Armenia, et plerisq; alijs regionibus, sicut et Rubrica. Plurimæ eius species. Verùm ad medendi usum, scissile, rotundum, et liquidum expetunt.

Opti

Optimū est sciſſile, præſertim recens, candidiſſimū, guſtu per quā adſtringēs, graue olens, calculorū expers, nec glebulosē aut aſſu-
loſe cōpactū, ſed ſigillatim in capillamēta quādā caneſcētia de-
hiſcens, quale eſt quod Trichites, quaſi capillare nominatur, in
Ægypto natum. Reperitur quoq; lapis huic Alumini perſimi-
lis, qui guſtus iudicio dignoſcitur, quōd non adſtringat. Damna-
tur in rotundi genere, quod manu conſectum eſt: ſed ex figura
deprehenditur. Aſſumendum autem ſuapte natura rotundum,
bullis turgens, albo propius, atque ualidius adſtringens, præter-
ea nonnihil palloris cum quada pinguitudine præ ſe ferens, ſine
arenis, friabile, natione Ægyptium, aut ex inſula Melo. Liqui-
di probatio, ut ſit lymphidum, lacteum, æquale, & ſemper ſucco
madens, ſine lapidibus, atque quendam coloris igniculum expi-
rans. Vim habent excalfaciendi, ſtringendi, & expurgandi, qua
caliginem pupillis oculorum offundunt: genarum carnem, cete-
raſq; excreſcentias extenuāt. Sciſſile rotundo efficacius intelli-
gitur. Vri & torrerī Chalcitidis modo debent. Patreſcentia ulce-
ra compoſcunt. Sanguinis fluxiones inhibent, gingiuas humore
prægnates comprimunt, motus dentium cum aceto et melle fir-
mant. Proſunt cum melle ulceribus oris, eruptionibus papularū,
& fluxionibus aurium, cum ſanguinalis herbe ſucco. Lepris cō-
ueniunt cum Braſſicæ folijs aut Melle cocta. Item pruritu, &
unguū ſcabritijs, pterygijs, & pernionibus, aſperſa cū aqua.
Valent cum aceti ſacce, & Galla, pari pondere cremata, ad pha-
gedenas ulcerum, & cum ſalis duabus partibus, ad uitia quæ
paſcunt. Furfures cum Eruo & pice illita abſtergunt. Ad len-
des, pediculos, ambuſta, cum aqua illita auxilio ſunt. Contra tu-
mores, & graue alarum inguinūq; uirus, illinuntur. Ex Me-
lo autem aduectum, mulieribus præſtat ne concipiat, ante coitū
ori uulue inditum. Partus quoq; extrahit. Gingiujs, ſi caro ex-
creuit, nuæ ac tonſillis accommodantur. Ori, auribus & ueren-
di.

dis cum Melle illinuntur.

Tria tantum Aluminis genera recenset Dioscorides, nostro verò tempore compluribus vtimur. Nempè alumine rupeo, alumine pluma, alumine facis, alumine catino, alumine squamoso, alumine Zucherino. Horum omnium nullum ad Dioscoridis descriptionē attingit, præter alumen pluma, quod ipsum est Dioscoridis, omnibus consentientibus notis, alumen scissile, nā alumen rupeum, id non est, quod alumen rupeum vulgò ducitur. Id enim non è terra fit liquida, sed praduero ex lapide, quique quo magis rubescat, eo durior sit. Quod ex eo fit alumen, plus alijs rubet, maiori acrimonia præditum. Fit etiam è lapide eximie candido, primo friabiliore & teneriore, quoque alumen fit candidum, crystallinum morem transparens, minori à priore acrimonia. Huius vsus ad intingenda serica, & subtilissimas lanas & pamos. Accedit ad hæc, alumen rupeum, succo Mali Punici imbutum, nigrorem non contrahit: at lucidior, clarior, & transparentior euadit, magisque crystallum refert. Alumen Zucherinum, fit ex alumine rupeo crudo, albumine oui, & aqua rosacea. alumen Catinum, cuius in vitreis fornacibus est vsus, quò perspicuum vitrum exeat, è cinere herba, quæ Thuscis, Soda, dicitur, & in Sena maritima nascitur, & loco qui extrà Venetias, Lio vocatur. Ex hac etiam fit Sal alchali, nam istiusmodi herbam Chali arabes vocant. alumen facis, è facie fit vini perusta, primum in globis, ad candorē vsque, insolata, desiccataque. alumen squamosum, è squamoso & transparente fit lapide, (Specchio D'asino Thusci nuncupant) ambusto igni, aut supra ignitas ferri laminas.

Sulphur. CAP. LXXIII.

NOMENCLATURA.

Gr. οἷον. Lat. Sulphur. Ita. Solfo.

Sulphur optimum existimatur uiuum, quod Apyron uocāt, Snitedula modo splendidum, perlucens, minime lapidosum. Probatum in genere Sulphuris ignem experti, quod uret, ac præpingue spectatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur. Supradictum Sulphur calfacit, discutit, & celeriter concoquit. Prodest tuſſibus, ſuſſuriſis, purulenta exuſſiſſetibus, in ouo ſumptū, aut ſuſſitum. Præterea partus, uſti uodore extrahit. Lepras, lichenas, ſcabros ungues, cum reſina Terebinthina miſtum, auferit.

Cum

cum autem illitum, ad lepras efficax est. Vitilignes tollit: scorpionis ictibus, addita resina, medetur. Cum aceto uero, draconis marini scorpionisq; plagas sanat. Pruritus toto corpore erumpentes, cum Nitro detersum, sedat. Regium morbum emendat, insparsum fronti cochlearis mensura, aut in sorbili ouo sumptum. Facit ad grauedinem, & destillationes. Sudores quoque conspersum inhibet. Podagricis, cum aqua & Nitro illitum, conducit. Grauitatem auditus, suffiti nidore raptim per fistulam hausto, sanat. Lethargicos suffitu excitat. Erumpentem undecunque sanguine sistit. Contusis auribus, cum uino aut melle illitum, medetur.

Sulphur, fossile est notissimum, ex essentia procreatum terrestri, uisus fofo, validè calida, igni adprime consimili. Natura sic in caliditate & siccitate prapotent, ut tamen in mistione alia humiditate nil ei sit opus. Sulphur vim habet attractoriam. Temperamento est calido, & tenuum partium essentia.

Pumex. CAP. LXXIIII.

NOMENCLATURA.

Gr. κίσσους. Lat. Pumex. Ita. Pumice.

Pumicis probatio, ut magnoperè leuis, spongiosus, scissilis nec arenosus, item teri facilis, & candidus. Crematur flagrantissimis carbonibus obrutus: & ubi canduerit, extractus, uino restinguitur odorato: iterumq; incensus extinguitur: et tertia uisione exemptus & per se refrigeratus, ad usus conditur. Vis eius adstringere, gingiuas abstergere. Purgat cum calfactione, quæ caliginem pupillis offundunt: explet ulcera, & ad cicatricem perducit. Excrescentia cohibet. Fit ex farina eius dentifricium. Corpori crustam obducit. Auellendis capillis aptus. Theophrastus autor est, si quisquam in bukkientem urceum uini, Pumicem iniecerit, feruorem statim sedari.

Pumex, nulli non notus, ambusus est lapis, è vapore flammæ à monte Aethna, & Vesunio Campania profiliens. Hic nunc nostro, non aliter

aliter quam Plinij tempore, totus arsit, ingenti Puteolanorum incom-
modo. Pumex mari propter substantiæ raritatem innatat, & à præter
nauigantibus, sed falsò, spuma maris creditur.

Sal. CAP. LXXV.

Græ. ΑΛς. Lat. Sal. Ita. Sale.

Sal fossilis efficacior est. Communiter, si est candidus, calcu-
lis uacans, & perspicuus, densus, æquali compage. Peculiari-
ter Ammoniacus natione laudatur, si modò findi facile possit,
& in recta segmenta diduci. In marino Sale eligendus est candi-
dus, æqualis, densus. Probatissimus in Cypro fit, & Salamine
Cypri, & Megaris, in Sicilia & Aphrica. Sed inter dicta Sa-
lis genera lacustris præfertur: sed multò ualidissimus est Phry-
gius, nomine Tapeus, aut Tritæus, aut Gantæus. Salis natura in
comune per quam utilis est. Adstringit, absterget, expurgat, dis-
sipat, reprimat, extenuat, & crustas inducit. Sed hoc interest,
quòd alius alio sit præstantior. Quin & à putredine uindicat.
Admiscetur medicamentis psoras abstergentibus, excrescentia
in oculis reprimat, & pterygia consumit, ceterasq; carnis extu-
berationes tollit. Clysteribus infunditur. Discutit lassitudines ex
oleo illitus. Contra hydropicorum tumores auxiliatur. Dolores
in saccis fotu mitigat, et pruritus sedat, ex oleo et aceto infrictus
ad ignē, donec sudent. Itē lichenas, lepras, psorasq;. Anginā ex
Melle, aceto, & oleo illitus leuat. Tonsillis uueq;, cum Melle to-
stus: ulceribus in ore manantibus, gingiuis quas humor uexat, et
phagadenis ulcerū, cum polenta crematus illinit. Aduersus scor-
pionū iectus, cū Lini semine: cōtra serpentū morsus, cū Origano,
Melle, Hyssopo: aduersus Ceraſten, cū pice, aut Cedria, aut Mel-
le auxiliatur: contra scolopendræ morsus, cum Melle & aceto:
aduersus uestparū iectus, & teredines, albidasq; capitis pustulas,
thymos & tubercula, cum seuo uitulino: furunculos cum uua
passa, aut suillo adipe, aut melle discutit. Testium tumo-

res

res cum Origano & fermento maturius concoquit. Crocodilorum moribus auxiliatur, tritus, in linteolo, & intinctus aceto, ita ut uinculis loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, sugillationes in facie, ex Melle. Contra haustum Opium & Fungos, cum aceto mulso bibitur. Luxatis imponitur cum farina & Melle. Ambustis igni cum oleo impositus, pustulas erumpere non patitur. Podagricis itidem imponitur, & aurium doloribus cum aceto. Ignis sacros, & ulcera quæ serpunt, cū aceto aut Hyssopo illitus sistit. Vritur fictili, diligenter opertus ne exiliat, cōditusq; prunis, usque dum effervescat. Aliqui fossilem subactis polline obliniunt, & carbonibus subijciunt, usque dum eius crusta exuratur. Solet & sal communis hoc modo uri: Aqua semel abluitur, & siccatus in ollam coopertam mittitur, subditi igne, moueturq; donec iam nō exiliat. spuma salis, spumosi maris lanugo siue ramentum est, in exilibus petris inuentum, cuius eadem quæ salis.

Muria. CAP. LXXVI.

NOMENCLATURA.

Gr. Ἀλμ. Lat. Muria. Ita. Salamuoia.

Muria effectus salis præbet, abstergitq;. Dysentericis infunditur, etiam si nome intestina corripit: & ischiadici veteribus. Ad fotus, aqua marinæ usus præstat.

Flos Salis. CAP. LXXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀλφ & ὕθ. Lat. Flos salis. Ita.

Fior del Sale.

Flos salis flumine Nilo defluit. Lacubus tamen quibusdam innatat. Assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato seu gari. Interdum longè magis uirus olet, gustuq; mordacior.

Et pinguius lentus. Fucatus autē Rubrica, aut scrupulosus, improbat. Præterea Sincerus non nisi oleo resoluitur: adulteratus nonnulla ex parte, etiā aqua, diluente facilius colorem. Ad ulcera quæ cacoethe uocantur, Et phagedænas, genitalium nomas, Et purulentas aureis, efficax est. Oculorum hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit. Emplastris unguentisq; coloris causa, ut Rosaceo, miscetur. Sudorē cit. Aluum turbat, in uino aut aqua sumptus. Stomachum male habet. Additur acopis Et smegmatis, quæ albandi capilli gratia componuntur. Et in uniuersum acris est, Et feruentis naturæ, ut Sal.

Nitrum. CAP. LXXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Νίτρον. Lat. Nitrum. Ital. Nitro.

PRæfertur Nitrum leue, roseo colore, aut candido, in foramina dehiscēs, perinde quasi spongiosum quiddā, quale ex Bunis affertur. Humores euocat, qui in alto cōcreuerunt. Spuma Nitri optima esse putatur leuissima, glebosa, friabilis, colore penē purpureo, aut spumosa, Et mordens, qualis ex Philadelphæa Lydia defertur: secunda est Aegyptia. Quin Et in Magnesia Caria gignitur. Vim Et uestionem Salis habet, tam Nitrum quā spuma eius: præterea Nitrum tormina sedat, si tritum cū Cumino bibatur, in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus quæ inflationes discutere possunt, uti Ruta, uel Anetho. Febris circū redeuntibus illinitur, ante suspectā accessionem. Miscetur emplastris, quæ extrahunt, Et discutiunt, extenuāt, Et lepras abstergunt. Cum aqua autem calida, aut uino infusum, inflationes, purulentas aureis, Et sonitus earundē sanat. Sordes expurgat, cum aceto instillatū, canum morsibus ex asinino adipe aut iuillo medetur. Resinæ Terebinthinæ admixtum furunculos aperit. Aquæ inter cutem cum fico illinitur: oculis ad claritatē ui-

T

sus

Sus cum Melle succurrit: & uenenis Fungorum, ex posca potum: aut si Buprestis momorderit, ex aqua: ijs uero qui taurinum sanguinem biberint, ex Laserpitio: ijsq; qui cibum non sentiunt, utiliter obducitur: opisthotonisq; iam remissioribus, & luxatis, cum cerato. In resolutione linguæ, pani commodè permiscetur. Aliqui supradicta carbonibus urunt, subiecta prius testa noua, donec incandescant.

Nitrum & spuma Nitri, quorum apud veteres amplissimus fuit in medicamentis vsus, nec agnoscuntur, nec afferuntur hodie. Salnitrum, quo in bombardarum pulueres, vtuntur, & conficiendam aquam fortem, ad disgregandum ab auro argentum, Nitrum non est, quod Theophrastus, Dioscorides, Galenus, & Plinius describere, vt ei qui hos diligenter legerit, facile clarescet. A tenim quod suis quibusdam partibus, Nitro sit simile, eò tamen audacia non procedendum, vt verè Nitri in medicina succedaneum faciamus.

Fæx. CAP. LXXIX.

NOMENCLATURA.

Græ. Τευξ. Lat. Fæx. Ital. Feccia.

Feligenda Fæx maximè à uino uetere, Italico: sin minus, ab alio consimili. Fæx aceti uiribus longè acrior est. Crematur ut Alcyonium, antè diligenter siccata. Sunt qui noua testa igni largo urant, usquedum penitus incendatur. Alij uiuis carbonibus Fæcis glebam obruunt, & idè opus prosequuntur. Ex perimentum est legitimæ uestionis, ut aërio nitore inalbescat, linguamq; tactu urere uideatur. Eadem urendæ Fæcis aceti ratio. Vis ei supra modum urens, & abstergens. Vlcera ad cicatricem perducit: adstringit, uehementer exest: siccataq;. Sed recentitendū est: quonia celeriter exanimatur. Proinde non nisi in reconditorio, & uase aliquo reponi debet. Lauatur, ut Pompholyx. Quæ uestionem experta non est, tumores & per sese, & cū Myrto colibet. Ventris stomachiq; fluxiones illita sistit. Muliebre profluuium, imo uentri aut genitalibus imposita, mitigat.

tigat. Panos discutit nondum exulceratos, & tubercula. Rigen-
tes mammas, suiq; lactis impatientes, cum aceto peruncta extin-
guunt. Cremata uero, ungues scabros cum Resina aufert, addito
Lentiscino oleo, illita nocte tota, rufat capillum. Elota oculorū
medicamentis, ut Spodos, adijcitur. Cicatrices eorum & caligi-
nes eadem abstergit.

FAex Vini, nulli non, cui Vinum, perspecta. Fit ex ea, quemadmodū
suprà commonstrauimus, Alumen Facis. Porro resina hac qua va-
sis vinaris adglutinatur, quam Itali Greppola vocant, soluit aluum.
Ea in puluerem redacta, cum modica quantitate Mastiches, & Saccha-
ri, iuri gallinæ insumpta leuē subductionem molitur. Potentius opera-
bitur Senæ infusio, si in eam, Facis puluis indatur.

Calx uiua. CAP. LXXX.

NOMENCLATURA.

Græ. Ασβες. Lat. Calx uiua. Ital. Calcina uiua.

Calx uiua hoc modo fit: Marinorum Buccinorum testas
igni condito, aut feruenti clibano, nocte dimittito: postera
die, si candidissimæ fuerint, extrahito: sin aliter, iterum urito,
usquedum uehementer inalbuerint. Dein ubi in aquam frigidā
immersæ fuerint, in fictile nouū conijcito, & exacte pannis ope-
riens, nocte unā conuiescere finito, manē eam extrahens. Vbi
perfecto omni opere elaborata fuerit Calx, recodito. Fit & è lit-
torabilibus calculis igne crematis, nec nō è uili & fusaneo mar-
more: quæ cæteris præfert. Vis omni Calci in cōmune ignea, mor-
dēs, adurēs, & crustas inducēs. Quibusdā alijs immista, ut adipi
oleo, concoquēdi uim assumit, mollit & dissipat. Vlcera ad cica-
tricem perducit. Efficacior existimatur recēs, nec aspersa aquis.

Calx vulgò agnita. Priuatim fit è Purpurarum, Buccinorum, Co-
chlearum, Ostraceorum, & Quorum testis, variante operationis
modo. Publica & priuata adificia, id genus Calce fiunt, in tota Germa-
niæ maritima. Quæ uero ex albo lapide fit, seu marmore quopiam
uiliore, primū extincta, post sepius aqua frigida elota, & postremū cū
cum aqua Rosacea, mirum in modum prodest immissa unguentis vlce-

rum malignorum, sine morfu, deficatorijs. Proinde Vnguenti de Calce
 vsus erit, in vlcera genitalium, & maximè Gallica, alijsq; ad eum mo-
 dum malignis.

Gypsum. CAP. LXXXI.

NOMENCLATURA.

Græ. γύψος. Lat. Gypsum. Ital. Gesso.

Gypsum uim habet adstringendi, obstruendi, sanguinis
 eruptiones sudoresq; cohibet. Sed potum, strangulationis
 modo iugulat.

CYpsum & Italie & Gallijs notissimū, trium est generū. Vnum
 in laminas fissile, quod non aliud plane est, quam Aphoselinus,
 qui ipse est, Specularis lapis. Alterū, in pectines oblongos fissile. Tertiū,
 in ingentes coalescens glebas. Huius minera lapis est albus, squamosus,
 conficiendique satis nota est ratio.

Sarmentitius cinis. CAP. LXXXII.

NOMENCLATURA.

Græ. τέφρα κληματίων.

Lat. Cinis Sarmentitius. Ital. Cenere de sarmenti.

Sarmentorum cinis urendi uim habet. Cum axungia autē
 uel oleo illitus, fractis nervis, articulorū collisionibus, &
 neruorum nodis prodest. Cum Nitro & aceto, excrescentias
 carnis in scroto reprimi. Serpentium canumq; morsibus illitus
 ex aceto medetur. Crustas obducentibus medicamentis admi-
 scetur. Fit ex eo lexinium contra præcipitationes, & Fungorū
 uenena, cum aceto, sale & Melle.

Sarmenta non ignota sunt. Horum lexinium & Cinis varij in me-
 dicina sunt vsus. Cinis ē contrarijs qualitatih; & substantijs con-
 sistit. Nam quædam eius partes terrea sunt, quadā fuliginosa. Ea tenui
 sunt essentia, siquid. in cinere aqua mad. factō postea colato, cum aqua
 sededunt, & restat in cinere terrestris essentia, cui facultas omnis calida,
 & subtilis dep. ryt. Cinis omnis, cetera inuicem similis, naturam sequi-
 tur materia e qua prodyt.

Alcyo

Alcyonium. CAP. LXXXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Αλκυόνιον. Lat. Alcyonium. Ital. Alcionio.

Alcyonij quinque esse genera compertum est. Vnum enim spissum, acerbis saporis, spongiosa facie. Item tetri odoris, ponderosum, & picē olens, quod plurimum in littoribus inuenitur. Alterum pinnulæ oculorum aut spongiæ simile, fistulosum, & leue, odorem algæ rescrens. Tertium uermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Milesium quidam uocant. Quartum succidis uelleribus non dissimile, multis inanitatibus hians, leue. Quintum figura Fungi, sine odore, asperum. parte interna quodam modo pumicosum, foris læue, acre, quod plurimum in Propontide iuxta insulam Besbicon appellatam gignitur. patrio nomine Halos achnen uocant. Duo priora in scaminarum smegmata assumuntur. Contra lentigines, lichenas, lepras, uuliginas, nigritias, & maculas in facie reliquoq; corpore. Tertium ijs qui difficili urina uexantur, aut arenulas in uesica colligunt, idoneum est. Item renibus affectis, aquæ inter cutem, lieni. vsti autem, & ex uino illitum alopecias replet. Postremum dealbâdis dentibus aptum est. In alia smegmata, psilotraq; assumitur, cum sale mistum. Si quisquam Alcyonium cremare uelit, cum sale in crudum fictile mittat, & oblinens uasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum siglinum percoctum fuerit, extrahens ad usus recondat. Lauatur ut Cadmia.

Alcyonium spuma marina genus, multiplex ut ex Dioscoride patet. Huius primum, & postremum tantum genus in Europam asportantur. Alcyonij omnes emundant & digerunt. Calidi sunt & acres, plus minusue, quatenus tenuioribus constant partibus.

Adarces. CAP. LXXXIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. Αδάρκης. Lat. Adarces. Ital. Adarce.

Y 3

Fib

Fit in Cappadocia quod Adarces appellatur. Est autem tanquam concreta salsilago, humidis & palustribus locis siccitate emergens: & arundinibus ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Asij similis, & omni forma molli Alcyonio, & aliquantum cano proxima, ut uideri possit lacustre Alcyonium. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & uitia cutis in facie, & similia, accommodatur. Et in summa, uis ei acris. Humorem euocat qui in alto concreuit, & ischiadicis prodest.

A Darces salsilaginis concreta genus, Cordo id esse ducitur, quod Itali Pallam marinam vocant, cum hanc doctissimus vir Matthiolus, & Italus, nullum qui in Italia Adarces demonstraret, repererit.

Spongiæ. CAP. LXXXV. NOMENCLATURA.

Græ. σπόγγος.

Lat. Spongia.

Ital. Spugna.

E Spongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas: quarum duriores Tragos nominarunt. Fæminas autem quæ contrarias dotes habent. Vruntur eæ ut Alcyonium. Recentes sine pinguitudine, uulnerariae sunt, & tumores reprimunt. Recencia uulnera ex aqua poscane conglutinant. Veteres sinus ex decocto Melle iungunt. Vetustæ autem inutiles. Arida ligata lino, si penicilli modo adigantur, occlusa ulcera, callosq; laxant. Sicca recentes & uacua senilia ulcera, quæ fluxione laborant, aut cuniculatim excedunt, impositu siccant. Sanguinis profluum sistunt. Crematarum cinis ex aceto, arida lippitudini auxiliatur: & ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius, in oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnium cinis cum pice crematarum, profluentem sanguinem sistit. Candida cura

cura fiunt, è molliſſimis recentes, per æſtus tinctæ ſalis ſpuma, quæ petris cohæret: inſolantur inuerſæ, hoc eſt, parte caua ſuſum ſpectante, & qua abſciſſæ, fuerunt, deorſum. Si uerò æſtiua ſerenitate ad lunam ſternantur, perfuſæ ſalis ſpuma, aut maris aqua, maximum candorem reſerent.

Spongia aut rara ſunt, aut denſæ & compactæ, aut quæ vocantur Achileæ. Lapis qui in Spongijs reperitur, renales lapillos cõminuit. Is diſſolutus, lacti ſimilem ſuccum emittit. Quo patet eum ſine calore manifeſtò extenuare.

Corallium. CAP. LXXXVI.

NOMENCLATURA.

Græ. Κοράλλιον. Lat. Corallium. Ita. Corallo.

Corallium, quod aliqui Lithodrendron appellarunt, marinum eſſe fruticem conſtat, qui alto extraëlus, duratur ſtatim atque emergit, tanquam offuſo aere protinus contreſcat. Plurimũ inuenitur ad Syracuſas, in promontorio cui Pachyno nomen eſt. Laudatiſſimum, rubens, colore Antherici aut Sandycis ſaturatæ, nec ſecus tereti facile cedens, æquabili uſquequaq; concremẽto, ruſus algæ aut fuci marini odore, quàm ramiſſiſſimum, forma fruticis, Cinnamomi æmulũ. Quod autẽ in lapidis duritiã coit, ſcrupuloſum, inane, & lacunoſum, uitioſum exiſtimatur. Adſtringit, & refrigerat mediocriter. Excreſcentia coeracet, oculorũ cicatrices abſtergit, ulcerũ caua, & cicatrices explet. Cõtra ſanguinis reiectiones magnoperẽ efficax eſt. Frixa difficultati auxiliatur, quin & potu ex aqua liene abſumit. Quod antipathes uocant, Coralliũ eſſe arbitrantur, ſpecie tantum diſtans. Eſt autẽ colore nigro, arboris figura, ramoſum magis. Vires ſupradicti habet.

Coralliũ marinus & lapideſcens frutex, piſcatur in quibuſdã maris thyrreni tractibus, nõ rubri tãtũ, & nigri, ſed etiã cãdiſſimi coloris

verumtamen quod tale est, rubro minus & ponderosum, & intus constipatum, spongiosum magis & leue, quinetiā. Id causa ut eo potius utatur medici, cum infigidandi sese offert occasio. Corallium cum ex aqua extrahitur muscosum est totum, nec rubrum cernitur, at artificum industria perpolitur & nitorem acquirit. Fragmenta innumera candidi & nigri Coralli Neapoli visuntur. Occulta quapiam vi epilepsia medetur, medicina est cordialis, siquidē ingentem in animis letitiam parit.

Phrygius lapis. CAP. LXXXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. λίθον φρύγιον.

Lat. Phrygius lapis. Ital. Pietra phrigia.

Phrygius lapis, quo insectores in Phrygia utuntur, à qua nomen accepit, nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè grauis, non solida corporis compage, intercedentibus albis segmentis, ut in Cadmia. Vritur autem uino optimo perfusus, uiuisq; carbonibus obrutus: perflatur assidue folliibus, donec mutato colore rufescat. Rursus extractus eodem uino restinguitur. Hoc iterum & trinis uicibus faciendum. Attendendum tamen, ne minutim confringatur, & in fuliginem euanescat. Vis crudo uisq; adstrictoria, expurgans. Ulceribus crustas quadantenus inducit. Ambustis cum cerato medetur. Lauatur ut Cadmia.

Lycnis lapidis nomine seplasijs duo lapides prostant. Primus longus est & teres, in mucronem desinens. Alter, effigie terra glebam refert, media inter lapidē & terrā essentia fusci in pallido coloris, notis ac si situm contraxisset, candidis distinctus. Hunc Phrygium lapidē Cordus existimat, Matthiolus vero, Italia testificatur incognitum.

Asius lapis. CAP. LXXXVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. ασιον λίθον.

Lat. Asius Lapis.

Ital. Pietra Asia.

Asius

Asius lapis assumi debet Pumicis colore, leuis, fungosus, itē friabilis, scissiles uenas lutei coloris ad imū aētas habens. Eius flos, salsugo subflaua est, summo lapide insidens, compage tenui, colore in aliquibus albo, in alijs Pumici simili, ad luteū uergente. Admotus linguae aliquantum mordet. Vim habet uterq, adstrictoriam, & modicē erodentem. Admixtus liquidaē piti, aut terebinthina, tubercula discutit. Lōgē ualidior flos existimatur. Decetero siccatus flos, uetera ulcera & cicatrici repugnantiā sanat. Excrescētia cohibet, tetra ulcera & fungis similia, cū Melle expurgat. Vlcera cana explet, & expurgat cū Melle: depascentiaq, cum cerato sistit. Fit cataplasma ex eo podagris, misto fabae lomēto: & lienosis, ex aceto & uina calce. Prodest flos ex Melle phthisicis linctus. Podagrici iuuantur, pedibus in folio ex eo lapide excanato inditis. Fiunt quoq, pulueres, qui corpora erodunt, & luxuriantem carnem, & corporum crassitiē absumunt, cum uice Nitri in balneo sparguntur. Si lauare libet Cadmiae modo lauatur.

Lapis Asius in Naturā minerā amandabitur, non prius agnoscendus, quam per Plutonem prodetur.

Pyrites. CAP. LXXXIX.

NOMENCLATURA.

Græce. πυρίτης. Lat. Pyritis. Ital. Pietra Pirite.

Pyrates lapidis genus est, à quo aes conflatur. Eligi debet æris similitudine, facile scintillas adens. Vritur sic: Melle irrigatus molli pruna continuo flatur folibus, donec rufescat. Alij in multos carbones igni candentes, lapidem copioso Melle perfusum deijciunt, & ubi ad fuluum colorem uergere cœperit, extrahunt: efflatoq, cinere, rursus madefactum cremant, donec æquabiliter assicatus, friabilis reddatur. Siquidem sæpe facies summa solum uritur. Ita crematus, siccatusq, reconditur. Si eloto opus sit, lauari debet ut Cadmia. Tam crudi quam usti uis

est, excalfacere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duritias concoquere, & concoctas discutere. Resina excreptius excrementia in carne cohibet, sed calorem quendam & adstrictionem parit. Ita ustum nonnulli Diphryges appellant.

PYrites lapis non alius est quam Marchesita vulgaris. In metallorum fodinis diuersa effigie & colore repperitur. Raro tamen, qua metalli magnam partem contineat, eaque causa est, ut è caueis fodinarum in Germania, res velut inutilis eiciatur, quātūnnis hac aris, illa auri, ista argenti quippiam in se contineat.

Hæmatites. CAP. XC.

NOMENCLATURA.

Græ. ΑΙΜΑΤΙΤΗΣ.

Lat. Hæmatites.

Ital. Pietra Hematite.

Hæmatites optimus habetur friabilis, saturato colore niger, durus & suo pte ingenio aqualis, nulla sorde admixta, nulloq; zonarū discursu. Vim habet adstringentem, & excalfactoriam aliquantum, extenuantemq;. Oculorum cicatrice. & scabritiam cum Melle purgat: cum lacte autem muliebri lippitudini, fractis, & oculis cruore suffusis conuenit. Bibitur contra difficultatem urinæ, & fluxiones mulierum in uino. Et ab ijs qui sanguinem reiecerunt, cum succo punici mali. Fiunt ex eo oticula & collyria, oculorum uitij apta. Vritur ut Phrygius, sine uino duntaxat. Modus uestionis est, ut modicè leuis fiat, & bullis quibusdā intumescat. Sunt qui Hæmatiten ita adulterant. Densam glebam rotundamq; Schisti lapidis, cuiusmodi sunt quæ eius radices uocantur, in urceum siglini operis, qui feruentem cinerem contineat, cōdunt, paucaq; interiecta mora eximunt, experianturq; si trita ad cotem Hæmatitæ colorem reddat. Quod si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterū obruunt, & subinde conspicientes, periculum faciunt. siquidē in cinere diu dimissus

lus, colore mutato diffunditur. Coarguitur malè confectus, primum scissilibus uenis: quippe in rectos uenarum discursus refringitur. At Hematites longè secus se in colore habet: namque hic floridum reddit: Hematites uerò saturatiore, atque Cinnabarin imitantem. Inuenitur in Sinopica Rubrica. Fit & è Magnete lapide, uehementer ambusto. In Aegypto sponte naturæ cum metallis enascitur.

Hematites lapis in Italia maximè & Germania, ubi nascitur agnitus. Siquidem Hematitis species omnes à plinio descriptæ: præter vnā (per Cordum) in Hercinia Saxonia montibus reperiuntur.

Schistus lapis. CAP. XCI.

NOMENCLATURA.

Græ. Σχίς &. Lat. Schistos. Ital. Pietra Sfeffa.

Schistos lapis in Iberia Hispaniæ gignitur. Probatur maximè qui Croci colorem emulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremento & alterno coherentium uenarum discursu, pectinum modo. Ammoniaco sali similis. Vim exhibet Hematitæ, sed ad omnia infirmiore. Quin & caua replet muliebri lacte perfusus. Ad procidentia, rupta, item genarū crassitiem, & uuas oculorum, magnoperè efficax est.

Cum Schistus hodie non habeatur: parisque cum Hematite sit virtutis: substitui eius loco sine noxa Hematites potest.

Gagates. CAP. XCII.

NOMENCLATURA.

Græ. γάγας.

Lat. Gagates.

Ital. Pietra Gagate.

IN Gagatarum lapidum genere, præferendus qui celeriter accenditur, & odorem Bituminis reddit. Niger est plerūq; & squalidus, crustosus, per quā leuis. Vis ei molliendi, & discutiendi. Deprehendit fonticum morbum suffitus, recreatq; uul-

ne,

uæ strangulationes. Fugat serpentes nidore. Podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, qua influens amnis in mare effunditur, proximè oppidum quod Plagiopolis dicitur. Vocatur autem & locus & amnis Gagas, in cuius facibus ij lapides inueniuntur.

Alij plures lapides. CAP. XCIII

NOMENCLATURA.

Græ. πολλοι ἄλλοι λίθοι. Lat. Plures alij Lapidēs.

Ital. Molte altre pietre.

Lapis Thracias dictus, nascitur in flumine quodam Scythia, cui Ponto nomen est. Vis ei Gagata. Traditur aqua accendi, & oleo restringi: quod in Bitumine accidit. Magni lapis optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad cæruleum uergente, densus, nec admodum grauis. Datur cū aqua mulsum obolorum pondere, ut crassos humores eliciat. Sunt qui Magnetem crematum pro Hematite uendant. Arabicus lapis maculoso ebori similis. Is tritus illitu hemorrhoidas exicca. Eius cinis dentifricio optimus. Galaetites appellatur, quod lacteū succū resudet: cinerei tamen est coloris, ac gustu dulcis. Ad oculorum fluxiones, ad ulcera conuenienter illinitur. Oportet etiam in aqua tritum, pixide plumbea recondere, propter uim glutini, quod ei obhæret. Melitites omnia Galaetite similis. Hoc tantum interest, quod dulciorem succum remittit. Eiusdem Galaetites effectus. Morochthus lapis, quem aliqui Galaxian aut Leucographida uocauerunt, in Aegypto nascitur: quo, uipotè molli, & facile liquecente, linteones dealbandis uestibuntur. Spiracula corporis obstruere uidetur, conueniēs ijs qui sanguinem expuunt, cœliacis, & uesicæ doloribus, cum aqua tritus. Itidem fluxionibus uulvæ, & impositus uelleri. Molli oculorum collyrijs miscetur. Explet enim cana, atque delachryma.

nationes sistit. Idem cerato exceptus, ulcera quæ sunt in tene-
 ris partibus corporis, ad cicatricem perducit. ~~Alabastrites~~ uo-
 catus Onyx, crematus, resina aut pice assumpta duritias discutit,
 stomachi dolores cum cerato leuat, gingiuas comprimit. Lapis
 romine Thytes, in Aethiopia gignitur. subuiridi colore Iaspide
 imitatus. Cum diuiditur tamen lacteum succum reddit. Veho-
 menter mordet: tenebras, quæ pupillis obuersantur, expurgat.
 Iudaicus lapis in Iudæa nascitur, glandis effigie, candidus, scita
 admodum configuratione, lineis æqualiter inter se distantibus quasi
 industria detornatis, solutus nullam qualitatem manifestam gu-
 sti repræsentat. Poteſt Ciccris magnitudine tritus ad cotem, ut
 collyrium, cum calidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati uri-
 næ auxiliari, & calculos in uesica comminuere. Amiantus la-
 pis in Cypro nascitur. scisso Alumini similis: quo, utpotè flexili,
 telas & uela tantum spectaculi gratia texunt, quæ ignibus in-
 iecta ardent quidem, sed flammis inuicta splendidiora exeunt.
 Sapphirus lapis, percussis à scorpione, potu prodesse existimatur.
 Contra intestinas exulcerationes bibitur. Excreſcentia in oculis
 uuasq; & pustulas inhibet, & ruptas membranas cogit. Mem-
 phites in Aegypto iuxta Memphin inuenitur, calculorum ma-
 gnitudine, pinguis, uersicolor. Tradunt trito & illito, quæ uren-
 da aut secanda sunt, sine periculo obſtupeſcere, ita ut non sen-
 tiant cruciatum. Selenites lapis, quem aliqui Aphroselenon ap-
 pellarunt, quoniam noctu inuenitur lunæ imaginem reddere,
 quæ cum ea quidem augetur & decreſcit. Nascitur in Ara-
 bia, candidus, traslucens, leuis. Huius ramenta comitialibus in
 potu dari iubent. Eo ceu gestamine ad amuleta mulieres utun-
 tur. Arbores adalligato eodem frugifera redduntur. Iaspidium
 quadam smaragdum imitatur, alia Crystallum, colore similis
 pituita: alia non dissimilis ari, ob id uocatur Aerizusa: alia
 ueluti fumo infecta, quæ Capnias ex argumento uocatur. Que-
 dam

dam lineis albis & resplendentibus praeingitur, Assyrios ap-
 pellata. ~~Assyrii quoque lineas albas et resplendentes~~
~~ut dicitur in libro de materia medica. Et dicitur~~
~~quod etiam in libro de materia medica. Et dicitur~~
 Aeti-
 tes lapis est ueluti praeagnans, cum quatitur, alio in utero sonan-
 te: Grauidis continet partus, cum lubrica sunt uulua & parum
 tenaces, sinistro brachio alligatus. Sed parturientibus è brachio
 amoveatur, & feminibus alligetur, ut sine doloribus pariant
~~et dicitur in libro de materia medica. Et dicitur~~
~~quod etiam in libro de materia medica. Et dicitur~~
~~quod etiam in libro de materia medica. Et dicitur~~
 Tritus
 & cerato exceptus. Cyprino, aut Gleucino, aut ex calfaciente
 comitiales magnifice iuuat. Ophite genera multa. Quidam por-
 derosus & niger. Alter cinereo colore spectatur, punctis distin-
 ctus. Tertius lineis quibusdam candidis intercinctus est. Omne
 alligati contra capitis dolores, & serpentium ictus prosunt. Fe-
 runtur qui lineas habent, lethargo, & capitis doloribus auxi-
 liari. Lapidem in spongijs inueniuntur, qui uesicae calculos rum-
 punt, in uino poti. Lithocolla glutinum, quo lapides coniungun-
 tur. Conflatur autem ex marmore, lapide Pario, & taurino glu-
 tine. Potest candente specillo admotum: incommodos oculis pi-
 los replicare. Ostracites testae similitudinem habet, crustosus, &
 in laminas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumi-
 ce utuntur. Menses drachmae pondere potus ex uino, sistit.
 quatuor diebus à purgatione bibitur sicilici pondere, faemin-
 praestat ne concipiant. cum Melle autem impositus, mamma-
 rum inflammationes lenit, & nomas cohibet. Smyris lapis est
 quo annularij scalptores lapides expurgant, ad erodendum &
 urendum utilis. Gingiuis, quas humor uexat, prodest. Dent-
 fricio comedatur. Arena è littoribus sole feruescens, hydropic-
 rum tumores exugit, si capite tenuis in ea obruant. Torreri solet a
 ar

aridos fatus, pro Milio aut sale. E cote Naxia, quod exacuendo ferro deteritur, illitum alopecias ad pilum reducit. Virginū māmās cohibet, nec increfcere patitur. Potum ex aceto, lienem absumit, & comitialibus prodest. Geodes lapis astringit, siccāt, caligines oculorum discutit. Illitus autem ex aqua, testium māmārumq; inflammationes sedat.

Gagates & Thracius lapis vi & essentia admodum cōsimiles, hoc inter se discrementum habent. Gagates, crustaceus: Thracius quaquauer sum sibi æqualis est. Germaniæ montes Gagatus speciem producunt, quo fabri ararij & ferrarij pro carbone vtuntur. Vires, odor, forma, essentia, Gagatem representant. Thracius lapis, ipsum est Succinum nigrum Magnes vi attrahendi ferri præditus, vulgo notus est, & in Germania nascitur, in Misnia montibus, & Hercinia Saxonia, propè Harziburgum, arcem miliare Germanicum à Gostaria distantem. Arabicus Galaclites, Melitites, Marochtus, ignoti nostro auro sunt lapides. Galaclites tamen, Cordo, Hildenhemij nascitur. Substantia, forma, & viribus nihil à Dioscoride discrepans. In eiusdem territorij montibus Arabicus inuenitur, maculis & cādore ebori persimilis. Alabastrites, hys notus est omnibus qui magnificis signis & adificis insuevere. Thyites nostro auro est incognitus. Iudaicus seplasis omnibus summè est familiaris scilicet ad cōminuendos in renibus lapillos. amiantus è Cypro assertur, alumini scissili similis (superius demonstrauimus ipsum esse alumen pluma) cādore tamè inferior. ab igne, quantumuis in eo persistat, integer exilit. Venosus est adiantus, ad ligni formā accedēs. Nec desunt qui flexilem producāt, nepe è quo fila & tela cōtexi queāt. Impostorū est pilos Salamadræ dicere. Nā motanus est lapis. Profertur & in laminas fissilis amiantus sed à Dioscoride præteritus. Sapphirus noster, nota gemma, notis aureis nō splendescit vt vult Plinius, nullūq; aliud discerniculū habet, quā azurini (vt sic loquar) coloris resplendentia, Porro cū vsitatū sit in medicinis cordialibus, instauratricibus prætiosisq; electuarijs, quæ in peste, uenena, & ad vigore cordi excitandū cōponūtur, nō Saphiros tantū, sed etiā Smeraldos, Rubinos, Granatos, & Hiacinthos immittere, & panca seplasia vera, apud se, gēmarū fragmēta habeāt, Medicorū hac in re negotiū erit suæ artis peritos, & probata fidei gēmarios cōsulere, ac dein in minutissimum puluerem super Porphyrio lapidē reducere. Siquidem eorum non toleranda ignorantia, seu potius stoliditas, qui Coralium in arcis mortarijs molitum, in vsus medicos transferunt, nescij

nesciū brutum hominum genus nihil esse quod aeris & ferri naturam & substantiam magis in se contrahat, quam Corallium, quod miserandis agris aut maturam, mortem, aut molestiam ampliore importat. Memphites, & Solenites, lapides nobis abstrusi, hic in Arabiam, ille in Memphim relegabitur, nisi dicamus hunc Specularem esse lapidem, ut Cordus sentit. Iaspidium diuersum colorati sunt. Quidam candidi, rubeis notis varietati quidam toti rubent, alij in maculis sanguineis viridescunt, alij diuersorum sunt colorum, ut apud gemarios videre est. Actites diuersorum hodie colorum inuenitur, magnitudine, modo singulari, modo exigua. In Aquila quidem nudo repperitur, non ibi nascens, sed in praecipuis montibus, & rupium aditissimarum commissuris. Ophites noster, durissimus est lapis, Porphyry penè modo, colore nequicquam nigricante & candido, quod in suo Ophite requirit Plinius, at totus in viridi obscurus, maculis discriminatus in viridi perspicuis. Quo patet nostrum, ab antiquorum Ophite discrepare. Spongiarum testacei lapides, renalibus lapillis effringendis idonei, in coloris lactei colorem resoluntur. Quocirca incidunt sine manifesta caliditate. Clarum quid sit Lithocolla. Nasceitur Ostracites apud Hildens hemium, testarum laterumque substantiam, & aspretudinem referens. Pulsus non dissimilem sonitum adit, plana, qua sibi ipsi interfertos ceu lateres habet, coagmētatione coalitus. Smyris mira cum Adamante proximitatis, siquidem utroque & gemma & arma poluntur. Vitrum etiam Smyris findit. Oculta nunc est Naxia. In Misnia gignitur, haud procul à Dresola, & in Saxonium Hildens hemina.

Terra. CAP. XCIII.

NOMENCLATURA.

Gr. γῆ. Lat. & Ita. Terra.

OMnis terra ad medendi usum recepta, summam & primam vim habet refrigerandi, meatusque obducendi, occludendi; sed specie distat: cum alia, adiunctis quibusdam, ad alia sit utilis. Eretriades duae sunt. Vna, uehementer alba est, altera Cinericia. Optima habetur ad cinereum colorem uergens perquam mollis, quae si per aramenta tractim ducatur, lineam violaceam refert. Lauatur ut Cerusa, aut hunc modum: Teritur seorsum, & cum aqua, & ubi pessum ierit, humor leniter excolatur sicca

siccata solibus, iterū teritur interdiu, adiecta aqua ut uespere
 confidat antelucanis colo excernitur, & demū in sole trita,
 si fieri potest, digerit in pastillos. Quod si tosta desideret, pastilli
 magnitudine Ciceris in fictile perforatū conijciuntur oreq; uasis
 diligenter obturato, supra carbones candentes continenter fol-
 libus perflantur. Vbi uero cinis in fauillas se conuertit, aut æ-
 reum colorem contraxit, exempti reconduntur. Vim habet ad-
 stringentem, & refrigeratorem, leuiter mollientem, caua ex-
 plet, & sanguinolenta conglutinat. Samia præfertur candida,
 leuis, tangenti linguae glutinis modo adhaerescens, mollis, succo-
 sa, friabilis, cuiusmodi est, quam aliqui Collyrion uocant. Duæ
 enim species eius: Vnam antè diximus: Altera Aster appella-
 tur, crustacea, & cotis modo prædensa. Vritur ac lauatur ut E-
 retria, uimq; consimilem habet. Sanguinis reiectiones sistit. Fæ-
 minis fluxione uulue laborantibus, cum flore syluestris Punice
 datur. Testium & mammarum inflammationes, illita ex Ro-
 faceo & aqua, refrigerat. Sudores arcet. Contra serpentium
 morsus & uenena, pota ex aqua auxiliatur. Samius lapis in Sa-
 mia terra inuenitur, quo aurifices utuntur poliendo auro, ut re-
 splendeat. Probaturn candore, & duritia. Vis ei adstrictoria, &
 refrigerans. Prodest stomachicis potus. Sensus habetat. Verum
 ad fluxiones oculorum & ulcera, cum lacte efficax est. Partus,
 ut tradunt, adligatus accelerat, & conceptus saminarum custo-
 dit. Chia eligi debet candida, uergens ad cinereum, Samia simi-
 lis. Est autem crustosa, albaq; sed fictilijs formis differens. Vis
 eadem quæ & Samie. Extendit faciem, & erugat, atque splē-
 didam reddit, colorem in facie & corpore toto commendat. In
 balneis pro Nitro deterget. Eadem præstat Selinusia: Maximè
 laudatur, quæ uehementer resplendet, candida, friabilis, & hu-
 more dilui celerrima. Cimolia duo genera, candida, & ad pur-
 pureum inclinans. Optima existimatur, quæ innatam habet pin-

Z

guitu

guitudinem, tactuq; frigida sentitur. Vtraque aceto diluta, parotidas, & alia tubercula discutit. Ambusta igni, si statim Cimolia oblinantur, pustulas non sentient. Testium duritias, & totius corporis collectiones cohibet. Igni sacro imponitur. In summa, utraque multum in medicina commendatur, si incorrupta originis, nec spuria assumatur. Quæ pinguis dicitur, colore serè Eretriæ similis est, grandioribus tantum glebis: manum si quis admoueat, refrigerabit. Tactu linguæ usque adeo glutinosa, ut pensilis hæreat. Cui effectus idem qui Cimoliæ: paulò tamen infirmior. Hanc aliqui pro Eretriæde uendunt. Fornacæ testæ uehementer tostæ, crustas ulceribus obducunt: quare prurigini & papularum eruptionibus medentur. Podagricis prosunt, struma discutit, cerato exceptæ. Fornacæ terra quæ retorrída fuluescit, eiusdem cum testæ effectus. Melia colore cineream Eretriæ imitatur, aspera tactu. Ea digitis friata, derasi pumicis modo crepitat. Vim habet aluminosam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur. Modicè linguam siccatur, purum corpus reddit & colorem commendat, pilos extenuat, uirilignes & lepra abstergit. Piæloribus usum præbet, ut colores diutius perennent. Emplastris uiridibus, quæ chloræ dicuntur, efficaciter inseritur. Ex omni Melia terra & omni alia in uniuersum, eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attigerit facile resoluatur. Ex Ampelitide terra, quæ Pharmacitis nomine, in Seleucia Syriæ nascitur, laudatur in primis nigra, Piceæ lîgos carbonem referens, modicè assulosa, æquabili splendore, quæ detríta, accepto oleo, statim eliquescit. Vtiosa censetur candida & cinerea, quæ in liquorem non resoluatur. Vim dissipandi & refrigerandi habet. Ad calliblephara additur, tingendis capillis idonea. Vsus eius ad illinendas uites sub germinationis tempus, utpotè cum in nascentes uermiculos enecet.

Fulig

Fuligo pictoria. CAP. XCV.

NOMENCLATURA.

Græ. Ασβόλη. La. Fuligo. Ita. Fuligine.

Fuligo qua pictores utuntur, ex vitrarijs officinis colligi solet: siquidem ei palma tribuitur. Vis ei ad adstringendum & erodendum efficax. Fracta cum Rosaceo cerato ad cicatricem perducit.

Atramentum librarium. CAP. XCVI.

NOMENCLATURA.

Græ. Μέλαν ὡ γράφομεν. La. Atramentum librarium. Ita. Atramento librario.

Atramentum quo scribimus, Fuligine & Tedis coacta colligitur. In singulas libras gummi, ternæ Fuliginis uncia adijciuntur. Fit etiam & resinarum & pictoria Fuligine, de qua paulo antè diximus. Assumitur autem Fuliginis mina, gummi sequilibra, glutinis taurini, Atramenti sutorij, singulorum sequiuncia. Additur conuenienter erodentibus medicamentis ambustis, ex aqua commodè crassius illinitur: sed non antè soluitur, quàm cicatricem induxerit. Sanatis siquidem ulceribus, sua sponte decidit. Caterum habes, amicissime Aree, serè qua tradenda duximus pro operis modo quem destinauerimus, & materia auxiliorumq; medicinalium copia.

Omnes hæ terrarum species, vt veteribus cognita, & in medicamentis usurpata, ita harum, à patrum nostrorum memoria, & usus, & notitia deperijt. Cordo tamen, Melia Hildenshemij inuenitur, forma & viribus cum Dioscoride conueniens. Itidem Ampelitis, Zuicania, in Misnia finibus, ex montibus eruitur, & in inferiori Germania Aquigrani, à fabris lignarijs, Nigra creta appellatur. Caput 95. & 96, è scripto Dioscoridis satis nota sunt.

Finis Quinti Libri.

Z z

Peda

PEDANI DIO-

SCORIDIS ANASARBEI,

De Venenis, Quoque modo ar-

ceantur, vitenturque, Liber

Sextus, Ioanne Ruel-

lio Suefsionensi

interprete.

*Ad puncta annotationes doctae &
compendiosae.*

PRAEFATIO.



VPERIORIBVS, amicissime Aree, libris,
tradidimus de Aromatibus, Oleis, Vnguentis,
Arboribus, & earundem fructibus, Lachry-
misq; item Animalibus, Melle, Lacte, Sapo, Fri-
mentis, Oleribus, Herbis, Radicibus, Liquamentis, Vinis, Me-
tallisq;. In hoc vero totius operis ultimo, facultates medicamen-
torum recensebimus, quae prodesse nobis, aut officere possunt. V-
tata igitur orationis prolixitate, opus institutum prosequamur
Huiusmodi autem tractatus, cum bisariam distributus sit: In
partem Venena praecauentem, ita ut ne fallant sumentes: Aut
quando per imprudentiam dentur, ut tum quoque innoxii-
fiant, irritaq;. Et in rationem ijs succurrendi, qui iam noxiam
sentiant: Primum differam de praecauendi modo, Quem esse dis-
ficillimum, pleriq; maiorum arbitrantur, quod dantes clam Ve-
nena

nena, ita insidias temperant, ut peritissimum quenque decipiant.
 Siquidem Venena, sua amaritudine, permixtis dulcibus spoliāt:
 & graue odoris uirus, mistura odoramentorum eximūt. Aut
 medicamenta immiscent, quæ tuenda sanitatis gratia dari pu-
 tantur: & præsertim in uale tudine, ut Absinthium, Tragori-
 ganum, Satureiam, aut Hyssopum, quinetiam Thymum, Irim,
 organum, Abrotonum, Castorium, Aut si quid medicamen-
 tis purgatorijs cognatam habere qualitatem uideatur: aut potio-
 nibus inserunt: ut uinis asperis, iuribus, passo, mulsa aqua, mu-
 sto, succis, ut in cremore lentis, polentis. Aut medicaminibus,
 aut alijs, quæ assumuntur, edulij speciem referentibus. Quare qui
 in ea suspitione sunt, conditos cibos uitare debent, omniq; inten-
 so sapore, dulcium, aut salforum, aut acidorum, abstinere: nec si-
 tibundi affatim bibere, aut esuriētes uoraciter comesse, semperq;
 ad saporem horum diligenter attendere, præsertimq; potu, fri-
 gidam aquā præsumere. Satiato enim appetitu, qualitates ager-
 rimē postea concoquantur. In agris quidem, facile cauemus po-
 tionces, auxilij pretextu dari solitas, quas offerunt improbi uene-
 ficiorum artifices: Itaque ob id, laborantes morbo, non perinde
 audentium iniurijs patent. Et hæc quidem, ne facile incauti se-
 ductiq; homines, capiantur dolis ueneficiorum, ratio est & fa-
 cultas. Sed alia superest expeditior, ut suspiciosi aliqua præsumāt,
 quæ Venenorum uires habetent, & inefficaces irritasq; reddant:
 Cuiusmodi Carica sunt cum inglandium nucibus maducata, &
 quæ Cedromela uocant, id est, Citria, seminisq; Napi drachma
 cum uino, itē folia Calamintha, aut Creta, quæ Lēma sphragis
 appellatur, pondere pari cū uino: Aut Ruta folia & nucis in-
 gladis nucleū, aut Caricas duas, & salis calli reium sumāt, &
 nullo Veneni genere ledetur. Antidota ex uino sumpta, eundē
 effectum præbent: inter quæ intelligitur magnum Adulteriatum:
 & quod Scinco, & quod sanguine temperatur. Quin & sæpe

Venenis obsistunt peculiares quidā corporū affectus, certo quodā modo constitutorū, cum quodā cibi potusq; qualitate, tū vini copia ita tēperatorum, ut cū *Venenis* dissentiant. Siquidē ingesti *Veneni* vires frangunt, atque iam priore alimento sacclis praeclusisq; meatibus, obstat ne mēbratim per digestionē insinuetur. Verū enimvero, quoniā fortuna necessitas interdū similia discrimina peregrē agētibus affert, absque ullis insidijs hominū, nonnihil differendū mihi, de hac re necessariū duco. Iam primū igitur, culinā apparare loco subdiali conuenit, cibosq; & potus in huiusmodi loco struere. Si id fieri commodē nequit, secunda erit conditio hac, apparandi apponendiq; sub tecto. Sed tum diligenter laquearia animaduertenda. Frequenter enim à superioribus contabulamētis animalia decidunt, exigua quidē, sed quæ nō modicā perniciē moliātur, ut *Phalangia*, *Stelliones*, & alia quædam reptilia. Porro uinaria uasa diligenter intueri oportet: Nanque reptilia odore vini illiciuntur, quæ interdū sorbedo, noxiū uirus eruclāt, interdū uerò delapsa immersaq; expirāt, & exitij causus, haurientibus attulerūt. Sed hac hælenus dicta sint, ne cauti & prouidi insidijs pateāt. Quod si qui sua sponte, aut quorundā insidijs sumpserunt, auxiliari primo quoque tempore oportebit. Siquidem dum comites singulorū uenenorū nota expectātur, immedicabile fit uenenū, & paulisper neglectum, medicamētis agrē cedit. Quare si qui pro comperto se uirus sumpsisse intelligant, & fateantur: aut eorū qui aderāt, testimonio constet, protinus ad idonea remedia trāseuntes, facile peculiaris naturæq; constitutioni restituemus. Neq; enim ijs assentimur, qui prorsus auxilia, in huiusmodi, frustra adhiberi cōtendūt. Qui enim modo morbi, quorum causa cæca, latentesq; corporibus insidet, medicinā admittūt, & quæ forinsecus incurrūt *Venena* medēdi rationē aspernātur? Aequē uerò omnes morbi, pro causarū ingruētū magnitudine, proq; antecedētibus adfectionibus qualitatibusq;, quibus sit opportunū corpus, uel medicabiles sunt uel nō

uel nullis cedūt medicamētis. Quod si qui forsan obmutescētes, aut temulenti, aut nolentes alioqui Venenum à se egeri, nullam nobis eius cognitionē praebeat, tū protinus accedendū ad ea, quae cōmuniter epotis q̄buscūque Venenis, opitulari cōsueuerūt. Alio qui nullū magis in omnia ualēs auxiliū dari potest, quā, ut proximo loco, Virus foras exhauriatur, priusquā inuale scat. Quare si ne mora, calidū oleū ex aqua, aut seorsum, ut uomitare cogatur, dari conuenit. Aut si oleū natura loci negat, butyrū cū aqua calida, aut Malua, aut Lini semine, aut Trago, Vrtica, Fænograceo, aut Halicæ decocto, uicē eius exhibebit. Hæc enim nō modo nomitionibus exigēt, ui illa sua laxatrice, aut nausēa ciente, sed aliū quoque subducēt & corporū inanitione, ita aduersabūtur, ut acrimonias Venenorū hebetēt. Id quod euidenter huiusmodi argumēto deprehēdere licet: Esto, ut quisquā uina calce, uel sæce, aut Cātharidibus, aut alio quouis acri, corpus exulcerare statuerit: is si ipsum oleo leniter illinat, exulcerationē non accipiet. Atqui neque uehemēter adstringi corpus, neque refrigerari poterit, si antea perūgatur. Quinetia uomitus, nō ob id modo quod uacuet, & noxiū humore excernat, iuuamētū adfert: sed quod assumptū Virus nonnūquā odore, coagulatis grumis, aut colore, prodāt: Quippe cū odore, & amaritudine, Meconii colore, Cerusam, Gypsumue: grumis, lac, aut sanguinē, animalis recēs iugulati, ostēdat. Nā grauis odor regestorū, Leporis marini, aut Rubetæ ueneficia deprehēdit, ita ut nōnulla ab ijs remedia peti possint, ad idonea singulorū auxilia trāsēntibus. Oleo etiā, Maluæ decoctū admiscetur, aut Glauciū, aut adeps anserinus, aut p̄guū carniū iura, lixiuiū lignorū cinere factū. Vbi uerò uomitus diligēter citatus fuerit, ne quid in uētre coierit, quæ hæserūt intestinis reliquiæ, chystere acri deuocētur. Facit & Nitrū tritū, & cū hydromelite suptū, uina uetera liberalius opota, gallinacea iura p̄p̄gues pisces, uetustæ carnes p̄guesq̄, & q̄ adipe aut recēti butyro parant: aliū nāq̄ subducūt, uti diximus: Et stomachū resolētia

proniorem ipsum ad uomitionē reddunt, & Venenorum acrimo-
 nias hebetant: Atque meatus obstruentia, celerem uirium pe-
 netrationem inhibent. Quinetiam medicamenta dantur, quæ
 cōmuni dote profunt: ut Lemnia terra, Agaricū, Abrotonum,
 Irio, radix Eriugy semē Pastinacæ & calaminthæ, Nardū Gal-
 licum, Castorium, Ferula uirentis medulla, flos Rhododendri,
 succus Marrubij, Laser aut Laserpitium, Sagapenum, Peuce-
 dani succus: aut panacis, & radix, quam Magudarim appella-
 runt, Aristolochia longa, syluestris Rutæ semen, & Betonica,
 quam Cestron nominant, folia. Singula cum uino, drachmæ pō-
 do sumi debent. Esseclum præbet Polij decoctum, & Seseli, &
 liquida pix linēta. Magnificē serunt opem antidota, quæ in cal-
 ce scripta operis reliquimus. Communis ratio præstandi auxiliij
 ita se habet. Caterum ab ijs, quæ consueuerunt euenire, com-
 munia remedia sumptitari possunt. Ferē enim, uires Venenorum
 quā plurimorum, in affectus consimiles corpustandem redi-
 gunt. Quā ob causam plerisque communia conducunt auxi-
 lia. Varia etenim sunt Venenorum genera: communes tamen,
 nec multi, ydem affectus oriuntur. Neque fieri potest, ut omnes
 concurrentesq; casus, quæ symptomata uocant, unum Venenum
 sequantur, alioquin supernacanea fuisset Venenorum singulo-
 rum traditio, cum suis remedijs ab authoribus descripta. Neque
 uerò in uno eodemq; promptum est inuenire, ut quis stomachi
 alui, intestinorum, iecoris, renum, & uesicæ dolore uehemente
 crucietur, ut singultiat, erodatur, contremiscat, refrigeretur
 obmute scat, cōuellatur, pulsus elanguescat, spiritus difficilis fia-
 ueterno prematur, uertigo obuersetur, caligent sensus, strāgul-
 tur, sitiāt, sanguis erumpat, febre confluetur, agrē lotium red-
 dat, torminibus uexetur, crebrò uomitet, nausea prematur, ru-
 bescat, liuore sugilletur, palle scat, desipiat, stertat, uiribus defi-
 ciat: & pleraq; alia faciat, patiaturq;. Singula enim in genera

les affectus deducta, pauca numero, & communia, ea demonstrat, quæ euenire cōsueuerūt. Quare in singulis quæ suprā diximus, non facile fuerit deuoratum Virus cognoscere. Nam oris & linguae erosio, stomachi uentris, uesicæ ac renum inflammatio uehementis urinae difficultas, & interdum cruoris cum eo exitus lancinatio, & in plurimis partibus quidam adustionis sensus, non in Cantharidibus modo potis reperiuntur, sed in Erucis quoq; Pinorū, & Bupreste, & Salamandra. Porro nō modo eos qui Meconium hauserunt, ueterno aut Iopore premi, stertere, luore sugillari, torpere, refrigerari, stupefcere, toto corpore pruritum sentire, sensu priuari constat, sed eos etiam qui mādragorā aut Cicutam deuorarunt. Delirium non Hyosciamus tātum insert, uerum etiam quæ Toxica appellantur. Itidē Aconitum, & Mel quod in Heraclea Pontica gignitur. Strangulatio non minus in Fungis, quā in sanguine taurino, lacte, Aconito, Cerusa, gypso conspicitur. In summa, difficile unū uni Veneno proprium inuenire signum, quod haustum gustatumq; Virus prodere possit; maximē, quod hæc cæterorum etiam uitiorum, quæ in corpore exoriuntur, communia sequi solent. Cæterum in his quæ celeriter enecant, noxam signis forsitan indicare possis, si ad ea respexeris quæ sumus dicturi. Sed in ijs qui ad longas ægritudines spectant, nihil ad medendi rationem difficile, duntaxat quod pertineat ad indicia noxæ, ut pote cū Venena, statim, atq; præsentaneam uim illam perdiderunt, transmutata in longos adfectus, communia reliquorū uitiorū remedia, cōpositionesq; flagitent, cū Venefica pprietas nō amplius in sit. Si uerò lōga sit affectio, in aliquod diuturnorū morborū genus recidet, a quibus facile fuerit medēdi rationē assumere. Sed de ijs quæ generaliter auxiliantur, hæc lenus. Cōsequēter quæ priuatim singulis prosunt, scriptis mandabimus, si prius sigillatim exposuerimus: quæ ex singulis ordinibus exitialem aut ma-

lesicam uim sortiuntur, ut medicina studiosi ea cautè obseruent, quæ ad rationem salutis scripta inueniuntur, quòd nonnulla eorum quibus utuntur, uenenis sint commista. Incuria enim magnas adfert noxas, & sæpe continuo usu eorum, homo in perniciem agitur. Proinde animalia quæ exitiosam uim habent, hæc sunt: Cantharides, Buprestis, Salamandra, Pinorum Eruca, Lepus marinus, Tubera, & Rana palustris muta, deuorata Hirudines. Semina sunt: Hyoscyamus, Coriandrum, Cicuta, Gith, Psyllion. Liquamenta: Meconiū, Opocarpason, Thapsie succus, Elaterium, Mādragoras. Radices, quas mittit Chamaleo, Aconitum, Thapsia, Veratrum, Ixia, Agaricum nigrum, Ephemerum, quod aliqui Colchicum uocāt, quod in Colchide nascitur. Herbe oleraq̃: Smilax, quam aliqui Tithymalum appellant, Romani Taxum, solanum manicum, quod & Dorzicium dicitur: Sardinia herba, quæ Ranunculi genus est: corniculatum Papauer, Pharicum, Toxicū, Ruta syluestris, Fungi. Ab animalibus taurinus sanguis recens, coagulatum lac, mel Heracleæ in Ponto genitum. Metalla, Gypsum, Cerusa, Calx, Auripigmentū, duo Sandaracha genera, spuma Argenti, Adarce, Plumbum, & quod Argentum uiuum dicitur. E liquoribus domesticis: uinū abunde post balneas potū, aut passum, et frigida aqua similiter.

Venenum omne aut per os sumitur, aut vi extrinseca noxiam adfert. Quod per os sumitur, omni sua operatione cibo alimentari contrarium est. Nam cibus, in sanguinem cōuertitur: partes suas omnes, membris quæ priuatim nutrit, similis efficit, locum subit essentie, quæ iugiter in nobis resoluitur. Contra venenum: corpus & membra omnia in quæ subintrat: in sibi peculiarem venenatam naturam trasmutat; quous loco sese indiderit, deperditam non supplet essentiam: sed eā quæ restat & integram, resoluit & corrumpit: haud aliter quam ignis, momento, omnem paleæ essentiam in se conuertit & conficit. Siquidem totius corporis coalitio, & consistentia veneno destruuntur. Porro venenum omne trium est generum. Aut enim è plantis, aut ex animalibus, aut ex mineralibus. Vnumquodque eorum ab ea, quam cum cibo habet, differe-
rentia

rentia discernitur. Id in plantis videmus, Elleboro, Aconito, Napello, Cicuta, Sardonias herba, Nerio. In animalibus, Viperis, Aspidibus, Basiliscis, Lepore marino, Scorpione, Phalangio, Tarentola: rabidis animalibus: piscibus & carne tostis: & statim in escario vase: præclusa exhalatione: suffocatis: morticinis: à fulgure: aut a venenatis & rabidis animalibus occisis. In mineralibus Argento viuo, Arsenico: Sandaracha: Auripigmento: Magnete: & similibus. Venenatorum animalium morsus: ictus: sibilus: contactus: visus: mortifera. Morsu & transfixu occidunt, Aspidēs: rabidi canes: Scorpiones: Phalangij: Tarentolæ: Pastinata marina: & consimilia. Visu & sibilo Basiliscus. Est & quod contactu perimat: vt ex Auicenna scriptis apparet: qui militem dicat: cū lancea strenuè bestiam transfixisset, proserpente per hastile veneno, congelata primum manu, deinde & toto perficito corpore: mortuum. Id per aquæ nostri sæculi experientia claruit in Tridentino ciue. Venena etiam odoratu perimunt. Venenorum & venenatorum variant effectus, pro cali & soli ratione: & quemadmodum sumentes icti aut percussi: in se totis: & in particularibus suis & affectibus & qualitatibus coaluerint: vtq; aut calida: aut frigida: aut sicca: aut humida fuerint. Calida duobus modis conficiunt. Aut enim sumpta per os: excalfaciunt & corrodunt ad ipsum cor: quod ex Euphorbio: & Veratro contingit: aut extrinsecus applicata: exadunt carnē: ad ossa vsque: quod in Lepore marmo fit. Frigida duplici itidem ratione necant. Nam aut ex nimia sua frigiditate: Rupidum ad eū modum corpus reddunt, vt cor etiam ab eis congelascat, quæ Opij operatio est: aut anhelitum comprimunt: suffocant: & stranguant, quod Plumbumustum, & Funghi malefici conficiunt. Sicca dupliciter mortifera. Aut enim quæ in corde est, humidam sanguinis qualitatem absument: quod calx viua conficit: aut partes corporis ab inuicem segregant & dispartiuntur: ad integrā omnium membrorum separationem, & insectilem diuisionem: ad cor vsque: quod Risagalli proprium est (Id per sublimationem fit: & quis partibus ex Arsenico & Auripigmento) Humida: quāuis persuasum sit temperamentum nullum esse: quarti in humido excessus: eius tamen exemplo: cui (referente Gilberto Anglico) brachio à familiari quopiā (quod plus insto dormientem excitaret) valentius peruulso: caro in terrā putrefacta cecidit: ossibus: interim: in totā carne nudatis: extremæ humiditatis venenū esse docebitur: qua natura præditus serpens ille nocturnus fuit: qui miserādū illū cōfecit. Dioscoridi, potius Salamādra puluis: idem operatur. Morsus item Ceneri serpentis. Quinetiam Argentum viuum: summa sua humiditate: naturalem non raro cordis humiditatem absument: vt in eis liquido conspicitur. qui
huius

huius vñtū vtuntur in morbum Gallicum percurandum. Atenim anti-
dota totam hominis consistentiam, in bonam habitudinem alterant, vt
venena in prauam & exitiosam. Sed praesumpta magis iuuant, quam si
à lue contracta sumantur. Siquidem venena quadam, & oculis suis &
manifestis qualitatibus nocent: haud aliter quam illorum quidā, vni
membro, alij alteri noxia sunt, & non omnia priua sua operatione no-
cent cordi, itidem vt inter medicamenta, alia cor speciatim confortant,
vt Crocum & Hyacinthus: alia cerebrum, & caput, vt Smaragdus,
Stachys, Betonica: alia stomachum, vt Corallium, Cinnamomum, Gingi-
ber, & alia etiam, alia corporis membra. Smaragdus, Hyacinthus, Ga-
gates, Sapphirus in tenuissimum puluerem moliti, à morte quidem, qui
venena hauserunt, tuentur, quod natura cordi subueniant, sed si gestan-
tur tantum, eadem vis non est. Arabes in venena valere scribunt, Casta-
neas, Mespila, Pistacia, Alium, Raphanum, Auellanas, optimam Theria-
con. Caterum quæ calidi excessus sunt venena, breui membra omnia in-
teriora inflammant feruentissimam sitim inducunt, flammeos oculos
reddūt, maniam perpetuam, & continuum sudor in excitant. Quod si
vltra illum caloris excessum, corrodant etiam & putresciant, vt est
Arsenicum, Auripigmentum, & Risagallum. punctiones & dolores in-
tolerandos, in stomacho & intestinis, cum totius corporis murmure pro-
creant. Hæc accidentia sequuntur supernumero vomitus, nausæ, sudores
modo frigidi, modo calidi, & variæ subindè colorum formæ. Quæ frigi-
da sunt, profundissimum somnum inducunt, vt vix excitentur: Alias
cerebrum ad eum stupefaciunt modum, vt agri sexcentos extraneos mo-
tus inducant, nunc toto corpore, nunc oculis, nunc ore, nunc alijs mēbris,
vt simpliciter insanire, aut ebrj videantur. Ab his summum toto corpo-
re frigus ex oritur, sudoresq; frigidi, faciei color liuidus & horrificus, to-
tius hominis stupor. E sicis venenis, ingens in lingua siccitas prouenit,
sitisq; quæ extingui non queat, guttur occupat, sit stipticum corpus,
siccitas in omnibus membris, & longissima vigilia excitantur. Humi-
da, sequuntur tandem profundissimi somni, corporis fluxus, luxantur
iuncturae, laxantur nerui, vt diductis aliquando oculorum musculis &
neruis, foras exiliant à seipsis pensiles, nec raro extrema corporis mēbra
putrescunt. Quod verò ad vñtus & medendi, in genere rationem atti-
net, e Dioscoridi patet. Antidotum tantum Matthioli, in omnia venena
praestantissimum & iuxta nobilissimum in medium producam, tum
Quintam essentiam, quæ ex eo componitur, postremo Oleum, mirande
in venena, maximè serpentium & animalium, virtutis. Porro Antido-
tum

tum

tum sic habet: Reubarbari, Cipèri, Quinquesolij, Tormentilla, Aristolochia rotunda, Pæonia, Reupontici veri, Radicis Valeriana, Acori (Calamum aromaticum vocant) Inula, Costi, Iridis, Chamaeleontis albi Singulorum. 3. 3. Galangæ, Imperatoria, Dictamni albi, Angelicæ, Millefolij, Filipendule, Doronici, Zedoaria, Zingiberis. Singulorum. 3. 2. Agarici. 3. 3. Seminis Cedri, Viticis, Iuniperi, Grani fini, Fraxini, Acetosæ, Pastinacæ sylvestris, Napi, Nigellæ, Pæonia, Basilici, Irionis, Thlaspi sceniculi, Ammi Singulorum. 3. 2. Baccarum lauri, Hedera, Smilacis asperæ, Iubebarum, Singulorum. 3. 1. 3. Frondium Scordij, Chamædrys, Chamæpytios, Centaurea minoris, Stachadis, Spica Celtica, Calamintha, Ruta, Mentha, Betonica, Verbana, Scabiosa, Cardui Benedicti, Milissæ, Singulorum. 3. 1. 3. Dictamni Candiaci, 3. 3. Majorana, Hyperici, Iunci odorati: Marrubij: Ruta capraria: Sabine: Pimpinella: Singulorum. 3. 2. Ficuum siccorum, Nucis communis: Pistatiorum Singulorum. 3. 3. Myrabalanorum embellicorum: 3. 4. Florum cordialium: Rosarum: Lauandula: Salvia: Rorismarini. Singulorum. 3. 4. Croci. 3. 3. Casia odorata (Cinnamomum hodie vocant) 3. 10. Caryophyllorum: Nucis muscata: Macis Singulorum. 3. 1. 3. Piperis nigri: Piperis longi: Santalorum omnium: ligni Aloes: Singulorum. 3. 1. 3. Cornu Cerui crudi. 3. 4. Unicornis. 3. 1. Ossis cordis Ceruini: Scrobis Eboris: Virgæ Cerui, Castorij: Singulorum. 3. 4. Terre Lemniæ. 3. 3. Opj. 3. 1. 3. Margaritarum Orientalium: fragmentorum Smaragdi, hyacinthi: Coralli rubri. 3. 1. 3. Camphoræ. 3. 2. Mastichis: Thuris: Styracis: Gummi Arabici: resine Terebinthina: Sagapeni: Opopanaci: Laserpitj. Singulorum. 3. 1. 3. Muschi odorati: Ambre griseæ. Singulorum. 3. 1. Olei Vitrioli. 3. 4. Specierum cordialium temperatarum: Diamargariti: Diamuschi: Diambræ: Electuarj gemmarum: Trochiscorum Camphoræ: Vipera: Scilla: Singulorum. 3. 2. 3. Succis Acetosæ: Cicerbitæ: Scordij: Echij: Boraginis: Melissæ. Singulorum. lib. 3. Hypocistidis, 3. 2. Theriaca electa: Mithridati optimi. Singulorum. 3. 6. Vini veteris odoriferi: lib. 3. Sacchari de Medera: aut selectissimi Mellis. lib. octo & dimidia. Omnibus his perquisitis & delectis ut quæ diligentissimè: artificio fiat electuarium: eo quo Theriaca & Mithridatum componuntur modo. Antidotum hoc, diuina quapiam operatione in venena confert quæ per os sumuntur: in mortiferos animalium morsus: & in pestem mirandè operatur, & præcipuè ad præseruandos sanos. Quod si cui in animo fuerit: ut præsentaneè operetur: sic agat. A sumpta libra vna superioris Antidoti. vna Syrupi corticum Citri: & quinque Aquæ vitis, cum electissimo vino confecta, & toties

alam

alambicata. vt Quinta essentia speciem inducat. omnia hac in vas vitreum indantur, capacitatis à rebus iniectis dupla, obturatoq; sedulo ore, summa dexteritate aqua cum electuario tandiu in vase agitur, donec totum id corpus simul confundatur, ac tum in mensem integrum vas seponetur, agitando tamen binis in ebdomada diebus, vt antea dictum est. Qui fiet vt electuarium persacile fundum petat, & exacto tempore, colorata aqua electuario supereminens inuenietur, vi illius omni in se contracta. Tum aperto vase, in vas aliud limpida aqua paulatim effundetur, cuius os cum cera & membrana accuratè obturabitur. Alioquin diu spacio apertum, omnis in sumum euanesceat. Habet hac aqua intantum virium, vt quattuor drachmarum pondere cum pari vini quantitate, aut cum stillaticia qualibet aqua, quæ huic negotio conueniat, aut per se sumpta, à demorso aut icto à summè venenato animali (quatumvis nihil sentiat aut loquatur) egrum à longo velut somno ingenti spectantium admiratione, suscitabit, ac vomitu ingentem insectorum humorum copiam educet. Si quidem momento in omnes corporis venas permeat, ad subtilis, efficax, & perueniens est. Valet & in alios morbos, quæ prudens medicorum doctrina censebit. Porro Oleo miscendo, istiusmodi temperamentum obseruabitur. Sub ineuntem mensem Maium, sumuntur Olei communis centum annorum, aut si minus sui saculi vetustissimi, lib. 3. Hyperici recentis in herba, M. 3. Oleum in vas vitreum indantur, duplè à contento capacitatis, in hanc Hypericum infundetur, paulum antea contusum, tum opertum vas medium in subtilissimam arenam condatur, loco aprito & diu totum insolato, ac inibi sinetur ad decem aut duodecim dies, hisq; transactis in Mariæ balneum ad viginti quattuor horas immittitur, quibus transactis oleum ab aqua exprimitur. Hoc facto, sumetur Hyperici, Chamædryos, Calaminthæ, Cardui benedicti, Singulorum Manipulum vnum. Tundantur, infundantur, & immittantur in balneum continuo triduo. extrahantur postea, colentur, & vt dictum est, exprimantur. Sumantur dein florum Hyperici manipuli tres hii à caulibus probè repurgati, & tusi infundantur in iam dictum oleum ac in idem balneum triduo continuo reponantur, postea extrahantur exprimantur, vt primum, ad eundemque modum ter aut quater fiet florum repetita infusio, quousque oleum rubidum euadat, vt sanguis. Hoc factò sumatur ex Hyperico quod iam defloruit, sublatisque à cyma granis illis viridibus, quæ Hordei grani similia, grana in se continent, manipuli ex eis tres conferti efficiendi, quæ tuis & vino albo aliquantum suffusis, in oleum prædictum infunduntur, & cum assucto vase insolanda

sep

sepeliuntur in arena diebus octo continuus, & ab his tridui spacio in balneum inmittuntur, post colantur, & exprimuntur, vt primum dictum est, tertium vel quartum reiterata simili cum dicto semine infusione, ad integrè imbutum colorem qui sanguineus est obscurus. Ab hoc sumenda, Scordij recentis, Calamintha Centaurij minoris, Cardui benedicti, Verbenace, Dictamni Candiaci, singulorum medium Manipulum. Tundantur, infundantur, immittantur in balneum per biduum continuum, dein colentur, & exprimantur vt supra. Post sumenda Zedoaria, radicis Dictamni albi, Gentiana, Tormentilla, Aristolochia rotunda. Singulorum. ʒ. ʒ. Scordij recentis Manipulum vnum. Tundantur, infundantur, immittantur in balneum per triduum continuum, colentur, & exprimantur. Infundantur denuo Styracis Calamita, Belgomi (Laserpitium Græci vocant) singulorum. ʒ. ʒ. Baccarum Iuniperi. ʒ. 4. Nigella. ʒ. 3. Cassia odorata. ʒ. 9. Santali albi. ʒ. 4. Squinanthi, Cyperi, Singulorum. ʒ. 1. ʒ. Tundantur, infundantur, per triduum continuum in balneum inmittantur, colentur, exprimantur, quo dictum est modo. Ab his sumantur trecenti scorpiones viui, diebus canicularibus collecti, calido cineri in vase vitreo superponantur, & cum è calore sudarint & contraxerint sese, superinijce omne iam dictum oleum, calidum, precauendū tamen ne nimio calore vas disrupatur, & confestim obturato vasis ore, in balneum per triduum continuum inmittatur, coletur, exprimatur, proyiciantur scorpiones cocti, ac iterato in oleum infundantur, Rheubarbari selectissimi, Myrrha communis, Aloës hepatica, Singulorum. ʒ. 3. Spicæ Nardi. ʒ. 2. Croci. ʒ. 1. Theriac electa, Mithridati perfecti. Singulorum. ʒ. ʒ. Tundantur, infundantur, in balneum inmittantur per continuum triduum, demum non colando deinceps, assuetur ac si esset Balsamum, nimirum mirandi in venena remedij. Antidota Mithridatium, è Stinco, & è Sanguine, ideò non ascripsimus, tum quòd è Galeno pateat, tum quòd quorundam & eorum selectissimorum simplicium penuria, exactè conficiendorum viam praeluserit, doctorumque in medicina hominum diligens industria ad nostri sæculi cautionem, modū, sympathian, & naturalem nexum attemperare poterit. Caterum noscendi veneni in genere, precauendi, ferendique auxilij rationem, satissuperque hæc Dioscoridis præfatio indicat. Proinde ad particularia prodeundum.

Can

Cantharydes. CAP. I.

NOMENCLATURA.

Græ. κανθαρίδες. Lat. Cantharides.

Ita. Cantarelle.

Quibus data sunt Cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad uesicam usque cuncta erodi sentiuntur. Picem, aut simile quiddam cedria resipiunt. Dextra præcordia inflammantur. Urinam ægrè reddunt, & subinde cum lotio sanguinem emittunt. Strigmenta non secus atque dysentericis, aluo deferuntur. Fastidia urgent, animo linquntur, abortaq; uertigine concidunt. Postremo mente abalienantur. Ergo antea quam tale nonnihil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, uomere cogantur. Mox ubi uomitione plurima reiecerunt, Halicæ aut Orizæ, Tragi aut Ptisanæ cremor, ad decoctum Maluæ, aut seminis Lini, aut Fœnigræci, aut radicem Althææ, quæ Latinus sermo Ibiscum appellat, clystere infundatur. Præterea Nitru eisdem dandum, ex hydromelite, ut quæ stomacho adhuc aut intestinis adherent, eluendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in aluum ex Nitro aqua mulsa, uacuari debent. Detur deinde uinum aut passum, in quo pineoli nuclei, aut Cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passo liquefactus. Inflammata aut partes, Hordei farina cum mulsa decocta perungantur. Ab initio admota cataplasmata nocent, quod citatus ab eis calor, illapsum uirus ita remoratur, ut in principes se partis insinuet. Ipsa tamen interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulatur, utpote quæ dolores & permulceant & leniant. Tum ubi corpus calfaciente oleo inunctum fuerit, in solum descendere oportet, ac lauare, ut per cutem summam, quæ corpori noxia inhaerunt, etiam excernantur, & deiectiones multifariâ moliri oportet.

tet

tet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capeſſat. Gallinaceis carnibus & hœdinis, aut ſuillis catulis maxime pinguibus & tenerrimis, ac cum Lini ſemine coctis uſci debent: ſiquidem aluum cient, atque uenenorum acrimonias hebetant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodeſt Thuris cortex, & Samia terra, quæ Aſter appellatur, ſi quaternæ ſingulorum drachmæ cum paſſo ſumantur. Item Pulegium ex aqua tritum. Irinum aut roſaceum, cum Rutæ decocto. Recentes uitis ramuli, cum paſſo detriti. Longè omnium potentiſſimè antidota auxiliantur, cum aqua mulſa, drachmis quatuor pota.

Pinorum Erucæ. CAP. II.

NOMENCLATURA.

Græ. *πιτροκαμται*. La. Pinorum Erucæ.

Ita. Brucho de pino.

Is qui Erucas pinorum hauſerunt, illico dolor in ore & palato exoritur. Vehemens alui lingue ac ſtomachi inflammatio torquet. Intestina dolor excruciat, ita ut pruriginem ſentire uideantur. Corpus totum exaſtuat, ſaſtidium urget. Quibus eſt ſuccurendum remedijs, quæ deuoratis Cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro ſimplici oleo & Irino, Melinum, quod è Cotoneis pomis & oleo temperatur, accipiemus.

Bupreſtis. CAP. III.

NOMENCLATURA.

Græ. *Βούπρεσις*. Lat. Bupreſtis.

Ita. Bupreſto.

Qui Bupreſtin biberunt, non diſſimile Nitro uirus ſapiunt. Stomachi uentrisque uehemens dolor inſequitur. Tam uenter quàm ſtomachus mirum in modum, ut in aqua inter cutem, diſſlatus inturgeſcit. Vniuerſa corporis facies contunditur, urina ſupprimitur. Quibus eadem quæ potus Cantharidibus an

bus auxiliatur. Priuatim post uomitus & uacutaiones, quas chyliferibus molimur, arida ficus profunt. Item earum decoctum, ex uino. Vbi uerò iam ferè pericula inclinatur, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum, in mulso, aut lactis potu, iuuatur. Pyrorum etiam omne genus esse, & lac humanum bibere conuenit.

Cantharides, quod excalfacientium quarti, & desiccantium secundi sunt ordinis, venenata, exulceratrices, & erodentis sunt natura. In speciem urinae nocent, & urinarum meatibus. Nec tantum cum per os sumuntur, sed etiam extrinsecus, partibus vesicae propinquis in vesicariis (sic nominant) ut in scyathica, applicata. Et quod ad primum accidentium attinet, quo perpetuam ab ore ad vesicam erosionem pariant, id eò sit, quod exulceratrices sint & venenata, qua vi malignante, exulcerant, pustulas inducunt, quacunque permeant, erosionem suscitant, qua sanguinem erosio uenis urina reldit, & subinde abscessus in uirga testiculis, imo ventre, vesica collo, subnascuntur, ac ex eo urina difficulter, nec nisi guttatim redditur, tormento & dolore non tolerando. Cedria odor, ex adustis, in stomacho & iocinore nimia caliditate, humoribus, prouenit. quorum confusio saporem primum, dein gustum & odoratum inficit. Dextera praecordiorum partis inflammatio, inde oritur quod in re cur, non in lienem operentur. Dysenterici affectus oboriuntur, quod è stomacho in intestina prolabentes, quacunque permeant, exulcerant, & erodunt. Fastidia & animi deliquia pariunt. Dolor, ardor, intoleranda inflammatio, qua facultate in eis venenata prodeunt, resoluti sunt, & infecto vitali spiritu, & proinde uicordis dilapsa. Vertigo & menti ab alienatio, ex venenatorum humorum abundantia, quorum summi dissolutis inferioribus membris, cerebrum inscendit, eoque pacto sensus intellectum, & rationem inficiunt. Iam è praefatione didicimus elicendum (venenatorum in genus remedio) uomitum, & acri chylistere deiectionem moliendum, quæ venenum è corpore elicitum, expeditiorem accidentium medicandi vim proferat. Porro exterioribus membris & maxime vesicae, exulceratis, inflammatis, & erosis, profunt frigida, viscosa & uiscuosa. Frigida inflammationes restingunt, & dolores sedant. Viscuosa, veneni acrimoniam obtundunt. Viscosa, quod interaneis agglutinentur, non remediorum tantum virtutem in locis affectis cohibent quin & tuentur membra, in quæ nondum vis veneni penetrant. Hoc in negotio lac humanum ex ipsis mammis suclum probatur, butyrum rubicundum deglutitum. Mucilagines seminis Psyllii, mali Cotonei, & Maluae Syrupi, Violatas, Nenupharinas, Papauerinas. Succi, Portulacæ, Cucurbit.

& Laſtucca, Citrij, Staſcles, Papauerini ſeminis, Meloni, Citrini, Cucur
 bertini, laſtucca extracti cum aqua Violarũ, radicisue Althææ, aut Ha-
 licacabi. Huius itidem ſemina numero decem aut duodecim, deuorata,
 præſentaneum remedium aſſeruntur, tantum ſi primum in aqua Portu-
 lace, aut Hordei macerentur. Oleum Amygdalurarum dulcium potum di-
 midia libra pondere. Eo potentius Oleum è Strobilis recentibus: potetiſ-
 ſimum, ſi duobus his permixtis, conficiatur. Nam hoc poſterius præter in-
 natam craſſitiem, ſpeciatiim inflammationes, & veneni crimina reſtri-
 mit, dolorem omnem acutum ſedat. Aqua radicis Althææ, florum Mal-
 uæ, Cucurbitæ, conſecta in balneo, vi propria vires ardorem infrenant,
 & interiores inflammationes tollunt. Dyſentericis aſſectibus medican-
 tur iura craſſa, ſenum hyrci & cerui, in clyſterem immiſſa, pari ratione
 oleum Omphacinum, elotum cum aqua Plantaginis, aut Portulacæ. At-
 enim Cordiales & Theriacales medicina, per os ſumpta, fumo cerebrum
 inſcendenti medicantur, ſiquidem ſua vi humorum putrefactionem co-
 hibent, ad eũque modum ſucci & emplaſtra frigida, commiſſura capitis,
 quem coronalem vocant, & fronti applicata. Ea, inſecus vero, peſcen
 inungere oportet, teſticulos, virgam, ſi quæ inflammatione vexantur,
 Nempe Roſaceo & Omphacino Oleis, Violato & Nenupharino, illoque
 qui è fructibus conficitur, quos Itali, Baſſamini, & Caranxi vocant.
 Prodeſt etiam cum ſyringa per virgæ canalem immittere quorum albu-
 gines multum ante rudicula agitataſ cum ſupradictis oleis, aut cum co-
 qui è ſemine Papaueris exprimitur, aut cum ſucco Portulacæ, aut Sèper-
 nui, aut laſtuccæ. Iuuat etiã agrũ immittere in balneũ decoctionis radi-
 cũ Althææ, foliorũ Maluæ, floriũ Violarũ, ſeminis mali Cotonei, Pſylli,
 Fœnigraci, Hordei, frondiũ Iuſquiami, huicque per tres horas inſident.
 Ceterũ quò penitus malũ id eradicetur, laſiſque mēbris priſtinũ robur
 & natiuus vigor ſubinſnuet ſeſe, hoc electuario utemur. Strobilorum e-
 mūdatorũ li. 3. Nucis Indicæ recētis, ʒ. 2. Piſtaciũ, ʒ. ʒ. ſ. ſemini Meloni,
 Cucurbitæ, Citrij, Cucumeris, Papaueris, Maluæ. Singulorũ, ʒ. 4. corti-
 cis Thuris, ʒ. 3. Margaritarũ, Coralij, Sātali albi. Singulorũ, ʒ. 1. ſ. Si e-
 ci liquiritiæ, ʒ. 2. Baccarũ Iumperi, ʒ. 1. Gũmi Arabici, ʒ. ʒ. Terra Iē-
 niæ, ʒ. 6. Succu haliacabi, Portulacæ. Singulorũ, ʒ. 6. inſuſionis Viola-
 rũ, ʒ. 8. Mucilaginis ſeminis Cotonei, cū aqua Violarũ coſecti, ʒ. 4. Si-
 rupi Violati, Nenupharini, Papauerini. Singulorũ, ʒ. 10. Ea hiſce omni-
 bus fiat electuariũ artiſicio diligētĩ & probato. Eo cū laſte muliebri Aſini-
 no, aut Caprino diſſoluto, in longum tempus ager vitetur, his quotidie,
 vnciæ in ſingularem vſum pondere. Pinorum & Bupreſtium venena,
 iſdem quibus Cantharides, remedia curantur.

Salamandra. CAP. II II.

NOMENCLATURA.

Græ. σαλαμάνδρα. Lat. & Ita. Salamandra.

Si Salamandram hauserunt, lingua inflammatio consequitur. Mens & sermo præpeditur. Tremor cum torpore, aut horrore quodam ac exolutione accedit. Partes nonnullæ corporis liuoribus circumquaque sugillantur: sæpeq; diutius immorâte ueneno, putrescentes defluunt. Quibus præstabimus cuncta, quæ potis Cātharidibus. Peculiaria uerò remedia, resina Pinus, aut Galbanum ex Melle linctum, & Aiugæ decoctum, in quo nuclei Pinei conterantur: Vrticæ quoque folia, cum Lilijs & oleo decocta. Prosunt etiam oua Testudinis marinæ aut terrestris, cocta: item Ranarum ius, cum quibus Eryngæ radix incocta sit.

Salamandra cibo morsu, salina, spuma, mucosum quod ei è toto corpore resudat, conficit. Siquidem & tota emortua familia, quæ panem extarint furuo incoctum, qui lignis ea infectus concaluisset. Aetio Salamandra, præter Dioscoridis signa, candidis maculis totum corpus inspergit quæ breui rubent, & demum nigra, integrum hominem deglabrant. Quod uero Dioscorides eadem facit Salamandra (quæ frigidissima & humidissima est) cum Cantharidibus, (quæ calidissima & sicca sunt) medicandi remedia, de generalibus intelligendum: Nempè de eliciendo è stomacho & intestinis, per vomitum, & acrem clysteram, ueneno, d Theriaca, Mithridatio, alijsque antidotis, quæ cor à lue illa timentur. Quin & generalis methodus in capite primo tradenda fuit, ne eadem traditio, singulatim tradita, fastidium pareret. Auicenna in Salamandram & Opium (nam eiusdem temperamenti sunt) præter supradicta laudat resinam Terebinthinam, Styracem, Cupressi frondes, & Vrticæ semen. Incedunt Salamandra in Germania, via, per syluas paludosas publica, superiori parte in Oloseric formam nigra, inferiori rubra, quæ admodum in quibusdam Italie lacubus Stinci uisuntur, parui & nigri, ab his admodum diuersi, qui ex Alexandria afferuntur, & lacerati in Arabia cubitum longæ, & in Indie monte Nisa, diuersicolores, & ginti quattuor pedum longitudine. Et in Fortunatarum insulis, eam quam Caprariam vocant, ingenti magnitudine & copia uisuntur.

Ephem

Ephemerum. CAP. V.

NOMENCLATURA.

Græ. ἐφμεροῦ. La. Ephemerum. Ita. Ephemero.

Sumpto Ephemero, quod aliqui Colchicon, aut sylvestrem Bulbum appellant, pruritus in toto corpore excitatur, non secus atque ijs qui Vrtica aut Scilla laceffuntur. Interna rosione sentiunt. Stomachus cum ingenti grauitate exæstuat. Caterum inualefcente morbo, cruor strigmentis admistus, per aluum exitur. Quibus, ut ijs qui Salamandram hauserint, uomitione aut clysteribus auxiliari conueniet. Sed antea quam uenenum inualefcat, dandum est decoctum frondium Quercus, aut glandium, aut Malicorij. Lac bibere prodest, in quo Serpyllum sit decoctum. Item succum Sanguinalis herbe, aut ramorum uitis, aut Rubi, aut medullæ recentis Ferulæ, aut Myrticum uino: Baccæ autem Myrti tusa tritaq, & aqua macerata, ut liquor inde sumatur, opem ferunt. Media Castanearum tumcula, similem effectum præbet, si cruda in aliquo supra dictorum succo sumptitetur. Organum quoque cum lixiuo epotum. Eximiè iuuantur asinini lactis aut bubuli calidi potu, etiam si in ore contineant: ita ut quibus copia lactis huius adsit, non aliud desideretur.

Ephemeræ remedia planè describit Dioscorides. Post vomitus itaque & clysteres, descriptis particularibus utendum, maxime asinino & vaccino lacte, generalibusque quæ iam tradita sunt antidotis.

Dorycnium. CAP. VI.

NOMENCLATURA.

Græ. δορύκνιον. Lat. Dorycnium.

Ita. Doricnio.

Dorycnion, quod aliqui manicon Solanum appellarunt, epotum, lactis saporem in gustu refert: continentes singulis

Ad 3

gulus

gultus ciet, humor linguam uexat, sanguis confertim reijcitur. Mucosa quædam perinde quasi dysentericis, aluo egeruntur. Itaque antequam aliquid ex ijs eueniat, auxilio sunt antedicta, uomitus, chyster, & quæcunque potum uenenum expellere possunt. Priuatim ijs opitulatur aqua mulsa, lac caprillum, aut asininum, dulce uinum, quod tepidum cum Aniso bibatur, Amygdale amara, gallinacea pectora decocta. quinetiam Conchyli omnia tam cruda quàm tosta esse salutare est. Conueniunt & Locusta marina, & Gammari, & pota eorundem in scula.

Ephemeri remedia planè describit Dioscorides. Post uomitus itaque & chysteres, descriptis particularibus utendum, maxime asinino & vaccino lacte, generalibusque quæ iam tradita sunt antidotis.

Aconitum. C A P. VII.

NOMENCLATURA.

Græ. ἀκόνιτον. Lat. Aconitum. Ita. Aconito.

Aconitum statim in lingua inter bibendum, cū astrictione quadam dulcescit, & subinde, potissimum cum exungere conantur, uertigines offendit. Lachrymas ciet. Grauitatem pectori, & præcordijs adfert, simulq; crebri spiritus deslantur. Quare Venenum uomitione abigi, aut chystere per aluum eger opus est. Vimur inter propinandum, Origano, Ruta, Marrubio uel Absinthij decocto, cum uino Absinthite, uel Semperuino uel Abrotono, uel Chamelæa, aut Aiuga. Prodest etiam nū Opobalsami drachma, cum Melle aut lacte, cum Castorio, Piper, & Ruta, æquis ponderibus ex uino. Coagulum hædi, leporis aut hinnuli, cū aceto. Ferri quoque stercus, item uinum in quo aurum, ferrum, argentumue candens restinguatur, potum. Lixuiq; cum gallina & uino decocta, aut carnum bubularum præpinguium iura, cum uino sumpta. Fertur & Aiuga priuatim ipsis subuenire.

Acon.

Aconiti, Pardaliæches, Licoctonos, & Cinoctonos speciem diuersa, idem tamen in genere remedium expostulant. Aetio prater Dioscoridem in signis, Potum Aconitum à dulcore & aspretudine, amaror pariter in lingua sensus oboritur, astringuntur postea maxilla, subsequuntur morsus & erosiones stomachi, hisque si non contestim succurratur, caliginosi fiunt oculi & sanguinei, tremores, inflationesque, hydropicis similes, toto corpore excitantur. Medicandi ratio in Dioscoride perbellè tradita. Prater hanc Petrus Abauus remedium proponit, Terram sigillatam, dragmarum duarum pondere, aqua calide impotam, dein curandum ut ager vomat. A vomitu, Theriacum dragmarum duarum pondere bibendum in vino, cui Gentianæ radix incoxerit. Atque adeo Aconiti praeipuum esse antidotum, longè Aristolochia radicem.

Mel Heracliae. CAP. VIII.

NOMENCLATURA.

Gr. μέλι τὸ ἐν Ἡρακλείᾳ. Lat. Mel Heracliae.

Ita. Mele heracliotico.

Mel in Heraclia Ponti ubi Aconitum gigni solet, inuenitur, quod qui edunt, bibuntue, non secus afficiantur, quàm qui Aconitum ebiberunt. Iis eadem quæ poto Aconito conueniunt. Adiuvantur in primis continuo uini mulsi potu, cui Rutæ folia sint adiecta.

Mel Heraclia ad nos hodie nõ assertur, & eo proinde medicandorum minimum impendendum, maximèque quod eandem cum Aconito venenatam naturam sortiatur.

Coriandrum. CAP. IX.

Græ. κόριον. Lat. Coriandrum.

Ita. Coriandro.

Coriandrum ob odorem latere non potest. Epotum autem uocem exasperat. Insaniam adfert, à temulentis non abhorrentem. Qui sumpserunt, pudenda dictu blaterant, totiusque corporis odore, uenenum fatentur. Quibus post uomitionem Irino oleo concitata, uti retulimus, merum & per sese, & ex Absinthio potum, auxiliatur, itè oleum. Nec secus oua in eodè

Ad 4 exina

exinanita, si liquefacta in muria sorbeantur. Et epota muria, & ius salsum ex gallina & ansere. Passum quoque cum lixivia sumptum.

A Ralum sectarum, magno errore, & à Dioscoridis opinione diverso Coriandri semen Saccharo conditum, ad inhibendum vaporum in cerebrum insenssum, idq; roborandum, deludi cupidis, miserando delectu obtrudunt. Siquidem nec siccum semini, viridis vires depereunt, quod in Papauerino, Iusquiamio, & Cicuta semine videre licet: nec itidem preparandi modus cum aceto Coriandri seminis virtutem eueruat. acrimonia quidem aliquantum & malignitatis deponunt, cum suam ipsorum immutare naturam non queant. Præter Dioscoridis præscripta, Theriaca cum vino optimo epota prodest, estque huius antidotum, cognitum & vulgare, Vincetoxicum: Ad raucedinem, gargarizatus proprius, & pectori proficua. Ad cerebri lationem, species Diamuschi, Diambra, aliæque capitalia, cordique conuenientia.

Psyllium. CAP. X.

NOMENCLATURA.

Gr. ψύλλιον. Lat. Psyllium. Ital. Psillio.

Psyllion epotum, corpori toti frigus & torporem cum exolutione & mœrore quodam affert, ita ut animum despondeant, Cui omnia quæ ex hausto coriano auxiliantur.

Praeter Dioscoridis in psyllio indicia, sit anhelitus compressior, & corpus in tumescit, ab his tanta cordis anxietas, ut non raro sudori frigido ægri commoriantur. Eadem quæ in Coriando medicandi ratio.

Cicuta. CAP. XI.

NOMENCLATURA.

Gr. Κικυλίου. Lat. & Ital. Cicuta.

Cicuta pota uertiginem excitat, oculisque caliginem offundit, ita ut ne minimum cernatur. Singultus ciet. Mentem turbat. Extremi artus gelantur. Denique conuulsi, suppresso arteriæ spiritu, strangulatur. Quare inter initia, uti in reliquis, Cicutam uomitu excutiemus. Postmodum deiectionem moliemur
ut quod

ut quod ad intestina prolapsum sit, excernamus. Tum demum in meracam potionem, quæ maximo est auxilio, deueniemus. Repetendum per intervalla: in quibus proderit lac asininum, aut bubulū potui datū, aut Absinthium cum Pipere & uino, castorio, Ruta, Mētha cum uino, aut Amomi, Cardamomi, aut Syracis uncia, aut Piperis cum semine Vrtica & uino, aut Lauri folia. Item Laser ex oleo & passo, & passum per sese largius potum proficit.

Petrus Abanus laudat in Cicutam Theriacam sumptam ad dragmarum duarum pondus, epotamque in Dictamni decoctione, aut in vino, in decoctione paris ponderis Gentiane.

Taxus. CAP. XII.

NOMENCLATURA.

Gr. Σμίλαξ. Lat. Smilax. Ital. Tasso.

Smilax, à quibusdam Tithymalum, à Latinis Taxus appellatur: frigus uniuerso corpori, strangulatus, & celere interitum infert. Cui eadem quæ Cicutæ conueniunt.

Dioscorides Taxum cum Cicutâ temperamento connit, nempe quæ eisdem remedijs curentur. at obstat frondium & corticis Taxi amaritudo, perpetuo virore frondescit, pinorum & abietum in morem ad quæ plurimum accedit. Tum baccarum in gustu is dulcor & acrimonia, ut aues ab eius esu nigrescant, proculdubio ostendit, Taxum calidi esse excessus. Idque conspicuum est qui Taxi fructus ederint, ob spiritus & sanguinis inflammationem, in febres & ventris profusum decidere. Quod sanè ex putrefactione prodire non potest, quemadmodum his accidit qui æstiuos aut autumnales fructus auidius esitarint. Porro auiū illa in nigrorem transmutatio, adustionem, ut in æthiopibus, designat, non frigus: quod proculdubio, nisi mortificatis membris, nigrore nō pareret. Hæc cū Matthiolo, academica disputatio alijs exentiedū relinquo.

Carpasi succus. CAP. XIII.

NOMENCLATURA.

Gr. Ὠπὸς καρπασυ. Lat. Carpasi succus. Ital.

Succhio del Carpasso.

Αα 5

Epotus

E Potus Carpasi succus soporem, citamq; strangulationem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epota Cicutæ remedys.

Carpasus Galeno, mortiferum venenum, unde & Opocarpasus, quo de hic agit Dioscorides, utrūq; tamen nobis incognitum, & eapropter nil remedio opus.

Sardonias herba. CAP. XIII.

NOMENCLATURA.

Gr. σαρδόνια & πρῶα. Lat. & Ita. Sardonias herba.

Sardonias Ranunculi herba generi assignatur, quæ uescentibus mentem adimit, & quadam neruorum distentione labia in rictum contrahit, ut risus speciem præbeant: à qua quidam affectione, de Sardinio risu adagium, in uulgu infaussto omine manauit. Post uonitum peculiariter conuenit, aqua mulsæ & lac, liberalius epota, irrigatio, perunctioq; à pinguibus medicamentis, totum corpus excalfaciunt. In calidam aquam, oleumq; descendant. Sed tum multum perfricare & inungere expedit. Et in summa, curam omnem, quæ conuulsioni neruorum adhibetur, exequi oportet.

Petro Abano Apij risus, seu Sardonias herba medicande ratio sic initur. Vinum dulce & potens agro, ad ebrietatem, bibendum offertur, quo prolixius dormiat. Porro verum & singulare Sardonias herba antidotum, Melissa in aceto epota. Quod ad neruorum in rictu (risum appellari) distentionem attinet, balneum recens, lignea in totum materia, paratum prodest, cum simplicium decoctione, quæ excalfaciunt & desiccantium sunt classis, & quæ prima facultate neruos & confortent & resocillent. Hæc istiusmodi sunt, Stæchas, Hyssopum, Saluia, Ruta, Betonica, Hypericum, Chamæpytis, Mariolana, Origanum, Calamentum, Pulegium, Dictamnium Candiacum, Camomilla, Thymbra, Acorus, Spica Celtica & Syriaca, Asarum, Valeriana, Cyperus, Rosmarinus. Ungenda etiam est posterior pars capitis & nucha (Latius est occiput) cum Liliorum oleo, è Castoreo, è lumbricis, è Costo, ex Hyperico, Vulpe: cum unguento Arragonio, Agrippio, & similibus.

Hy

Hyoscyamus. CAP. XV.

NOMENCLATURA.

Græ. υοσκύαμϙ. Lat. Hyoscyamus.

Ita. Hiosciamus.

HYoscyamum potum aut comesum, similem ebrijs abalicationem mouet, sed facile medicamenti cedit. Auxiliatur aqua mulsa copiose data, lacq̃, præsertim asininum. Si id desideratur, caprillum, uel bubulum, uel aridarum ficuum decoctum. Faciunt ad id etiam nuclei pinei, aut Cucumis semen ex passo sumptum, & uinum salsum cum adipe suillo recenti, passq̃, itidem Vrticæ semen, aut Nitrum ex aqua, & Intubus erraticus, & Sinapis, & Nasturtium, Radix, Cepa, & Alliu. Et hæc singula cum uino sumantur: postea sinendi quiescere, quemadmodum qui uinum biberunt, ut excoquant.

PRater Dioscoridis signa ex Actio, ab epoto, manducatore Hyoscyamo, sequitur membrorum erosio, cordis debilitas, oculorum rubor, pruritus & totius corporis tremor, sese lancinant agri, ac præ dolore pulsatos arbitrantur, siquidem emollescunt iuncturae, lingua in abscessus transit, spumat os, comprimitur anhelitus, hæcque ab Hyoscyamo albo noxia. A nigro, extrema perfrigescent, caligant oculi, ratio deperit, occluduntur anhelitus meatus, spasma, & suffocatio. In hunc, post vomitus & clysteres, prodest sapius meracum bibere, lac Vaccae, Thus, Piper, Castoreum, Ruta, Mentha, Belzuinum, Lauri folia & bacca, sapa, Vrticæ semen, Lasrpitij radix, Cardamomum: Styrax, sigillatim prabita cum uino. Prodest & decoctio corticis radices Mori, Balsamum cum lacte epotum, farina tritici uino informata: stomachoq̃ & ventri illita. Recetiores Piper longum bibendum præbent duarum dragmarum pondere, & in peculiare Hyoscyami Antidotum. Pistacia copiose esitanda.

Mandragora. CAP. XVI.

NOMENCLATURA.

Græ. μανδραγόρας. Lat. & Ita.

Mandragora.

Man

M Andragora si bibatur, confestim sopor insequitur, exolutio, ac uehemens ueternus, nihil temere distans a lethargo. Cui, antequam aliquid ex ijs accidat, uomitus & aqua mulsa proderit. Postea Nitrum & Absinthium, ex uino dulci aut passo sumantur. Caput rosaceo & aceto perfundatur. Proficit excitatio, & motus corporis, & olfactus Eupatory, & Piperis, Sinapis, Castorij, & Ruta, tritorum in aceto: & liquida picis, & odor e lucernarum exustione & extinctu. Quod si agere y reuocentur, sternutamenta mouere, alijsq; communibus auxilijs uti conueniet.

M Andragora vix fallere edentem aut bibentem potest, siquidem hac coarguitur odore grani supramodum & ingrato, gustu amaro & abhorrenti. Ad hac intolerande vexat, ut quæ non nisi temporis diuturnitate conficiat. In eam laudatur semen Coriandri aut Pulegij tritum, & in aqua epotum, laxare ve corpus cum medicinis conuenientibus. Quod si a vomitu ager non excitetur, offerendum in potu Origanum, cum aqua frigida. Acres clysteres, fricationes per totum corpus cum pannis grossis, cucurbitula occipiti, humeris, & natibus imposita, ligatura doloris in digitis manuum & pedum, puluis Veratri albi pro apophlegmatismo naribus inditus, emplastra pustulatrix, occipiti & auribus applicata. Diuertunt nempe hac omnia quæ cerebro nocent. Mandragora poma, matura, & sine semine, innocue eduntur: immatura, & cum semine, mortifera. Ardor intolerandus omnem corporis superficiem adurit, os, & linguam siccitas ingens obtinet: & ob id aperto ore, agri desident, frigidum interim aer m attrahentes, & nisi eis ilico succurratur, conuulsi pereunt. Eo mali valentissimum remedium Andromachi Theriaca, cum aqua epota, siquidem momento ab omni molestia liberat. Petrus Abanus, in radicem, poma, & sucum Mandragore laudat, si ager integrum diem sine cibo persistat, ac subinde bibat selectissimum vinum, odoretque acetum cum Castoreo. Cæterum horum verum antidotum esse, Rhaphanum domesticum (priuatim Radix vocatur) per triduum cum pane & sale manducatum. Sed ad id quod prescribit Dioscorides caput rosaceo & aceto perungendum, id non innoxie agitur Castoreo aut quouis alio calido medicamento non addito, maxime cum Galenus qui istiusmodi in Lethargo infusionem tolerat, ita censet, modo si cum humore frigido, aliquanta pars humoris biliosi tenuis reperiatur.

Meco

Meconium. CAP. XVII.

NOMENCLATURA.

Gr. *μικόνιον*. Lat. *Meconium*. Ita. *Meconio*.

E Poto Papaueris succo, quem Meconion uocant, consequitur ueternus cum perfrictione & pruritu uehementi: ita ut sæpe inualefcente ueneno, tanta erumpat prurigo, ut hominē excitet. Corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo uomitionem, acres clysteres auxiliantur, acetumq; mulsum cum sale potum, aut Mel cum Rosaceo calido, merum cum Absinthio aut Cinnamomo copiosum, aut calidum per sese acetum, Nitrum ex aqua, & Origanum cum lixiua aut passo, & Ruta sylvestris semen cum Pipere, uino, & Panace: Piperq; cum Castorio & aceto mulso, uel cum Satureiæ aut Origan decocto cum uino. Hi olfactilibus excitandi. Ob enatam pruriginem in balneas descendunt, & foueantur. Post lanacrum prodest iurium pinguius usus, cum uino aut passo. Medulla etiam ex oleo pota.

Corniculatum Papauer.

CAP. XVIII.

NOMENCLATURA.

Græ. *μικῶν κεράϊτις*. Lat. *Corniculatum Papauer*.

Ita. *Papauere cornuto*.

Quod corniculatum Papauer appellant, & potu & cibo eadem inferre consuevit, quæ Papaueris succus: nec alijs expugnatur auxilijs.

Odor ingratus Opium, peræquè ut Mandragoram prodit, ideoq; rarum ex eo solo venescium conficitur, ne maleficium pateat. Notæ præter eas quas ascribit Dioscorides, pallet facies, & tumescit, rubent labra, diducuntur inferiores maxilla, perpetuus singultus redditur, intorquetur nasus, pondus in lingua sentitur, liuent labra, præcordia contrahuntur, frigus oboritur, comprimatur anhelitus, visus impeditur, conuol-

nunt. r

nuntur oculi, ad extremum conuulsio mortifera subsequitur. In Opio, Auienna, Castoreum & Belzuinum prodest. Theriaca singulare remedium, Mithridatium cum vino: errhinorum vsus frequens: excitandi itidem agri barba & capillis pertractis: percellendiq; Musci: Castorei: Belzui: & Ambra odoratu: totumque eorum corpus inungendum cum oleo Lilino: Costino. Praterea Quinta essentia Theriacalis Matthioli supra descripta: huic negotio summe & Aesculapie proficit.

Pharicum. CAP. XIX.

NOMENCLATURA.

Græ. φάρικον. Lat. Pharicum.

Ita. Pharico.

Quod Pharicon uocant, sapore syluestre Nardum imitatur. Resolutionem neruorum potum affert, cum conuulsione & delirio. Oportet autem post uacuationes uinum Absinthiten potui dare, cum Cinnamomo, aut Myrrha, aut Nardo Gallico, quod Serinen aliqui uocauerunt: aut specie Nardi duas drachmas, & Myrrhe totidem obolos, cum passo, aut Irim cum Croco ex uino, dera sumq; caput illinire hordeacea farina cum aceto, & trita Ruta.

Incertum: sit ne planta Pharicum: an venenum diuersis è rebus compositum. Quidam id nominis a pharico scelestissimo venefico deriuant, alij ab Arcadia & Laconia pharide, alij a phara Thessalia. Verum consilium non est in re incerta diutius immorari.

Toxicum. CAP. XX.

NOMENCLATURA.

Gr. τοξικον. Lat. Toxicum. Ita. Tosico.

Toxicum ex eo nominari uidetur, quod barbarorum sagitta eo illinebantur. Qui biberint, labiorum & lingue inflammatione torquentur. Incoercitus furor uarias ipsi imagines obuersat. Quare uix medicine locus est: raroq; qui hauserunt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, ut uinum dulce cum Rosaceo bibe

bibere, & reuomere cogantur. Rapi semen bibendum cum uino. Priuatim ijs conuenit, Quinquesolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus. Roboris, Fagi, aut Ilicis cortex cum lacte tritus. Malaq; trita esse, aut cum Pulegio et aqua bibere, conueniet. Amomum & Balsami semen ex uino. Sed qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decumbunt, & ubi surrexere, stupidi reliquum tempus degunt.

Toxicum a Taxo aliqui deducunt putant, litterarum à τινος, metathesi, quasi Taxicum primigenia origine, post Toxicum dictum sit. Sed cum antiquorum Græcorum aut Latinorum nullus author id priuatim proferat: nihil causæ est: cur hinc opinioni assentiamur potius: quam refragemur. Enimuero multa sunt quæ eorum sententiam infirmant: qui Dioscoridis Toxicum cum Arabum Napello idem esse contendunt. Sed licet per Auicennam Napellum veneno sagittas inficiat: linguam & labra inflammatione discruciet: huicq; medicando Rapi semen cum vino: succiq; radices Roboris: Fagi: Ilicisque conueniant: sunt tamen alia indicia: & notæ: quæ Toxicum à Napello vehementer discriminant. Nam id experientia compertum: in his qui Napellum sumpserint: non incoercitas cū varijs imaginibus inesse furias: quæ Toxici propria sunt. Ad hæc Napellum: Auicenna: oculos à proprijs sedibus abstrahit: precipitem virium lapsum: vertiginem: & pedum imbecillitatē inducit: quorum symptomatum nullum in Dioscoridis Toxico reperitur. Deinde Auicenna: qui ex Napello reualefcunt: in hæticam: phthisim: aut epilepsiam desinere præscribit: Dioscorides stupidos reliquū vitæ tēpus degere. Differunt etiā Toxicū & Napellū in medicandi rōne. Nam Toxicū: Dioscoridi: curatur epoto cū vino dulci Rosaceo: Quinquesolij radice: hircino & caprino sanguine: malo Cotoneo: Amomo: & Carpobalsamo: At Auicenna Napello medicatur cū vino: butyro: muscho: Capparis radice: & cum eo Mure: qui ex ipsius Napelli radice vescitur. Hæc propalā euincūt diuersa esse Napellū & Toxicū: summaria hæc etiā præter supradicta ratione quod in venenorum remedijs Auicenna: Dioscoridē pene ad verbū reddiderit. Et eò fit vt ille Toxicū Dioscoridis: nō in Napello: sed in eo qd Tusam nominat expresserit: nepe in quo & notus et medicandi rōnem: nihil ab eis q de Toxico tradit Dioscorides. dissidentes: in mediū pducatur. In Toxicum: Napellum: quoduisque aliud venenum modo erodens non fit: in ictus: & animalium quantūvis venenatorum morsus summè efficax est Oleum de scorpionibus Matthioli in præfationis annotatione descriptū: si eo

si eo in acutissimis venenis horis singulis, & in minus acutis, semel ternis horis, non in regione tantum cordis, subius sinistram mammillam ungatur & ger, sed in temporum etiam, manuum & pedum pulsibus.

Ixia. CAP. XXI.

NOMENCLATURA.

Gr. Ἰξίς. Lat. Ixia. Ita. Iξία.

Ixia, quæ Vlophonon appellatur, inter potandū aliquid Oci-
mo simile gustu & odore redolet. Vehementem linguæ in-
flammationem excitat, mentem mouet, omnes excrementorum
exitus supprimit. Strepitum cum animi deliquio ciēt. Iis intestina
latrant, nec egeritur quicquam. Post uomitionem aluumq; reso-
lutam, auxilium præstat aqua, in qua Absinthium maduerit,
ex uino largiore, aut aceto mulso pota. Rutaq; syluestris semen,
aut Laseris radix. Item Tragorigani decoctum, cum aliqua su-
pradictorum, aut lacte, aut resina Terebinthina, aut Nardo, aut
Castorio, aut Laserpitio, quorum singuli oboli conueniunt. Quin
& nuces inglandes ex uino, cum resina, Castorio, & Ruta tri-
ta, ita ut singula drachmæ pondus æquent. Itidem Chamelææ
aut Thapsiæ aut Absinthij succi sicilicus cum aqua mulsa, &
acetum calidum potum.

Ixia, viscosus est humor, qui mortifer & perniciosus, in Chamaeleonis
nigri radice adglutinator reperitur. Huius remedia, præter ea quæ a
Dioscoride describuntur, Theriace vel Mithridatij potio cum Thuris
aut Santonici decoctione, cataplasmata cordialia, cordi regionis applicā-
da, Conseruæ Borraginis & Buglossi, cum margaritis, corallis, gemma-
rum fragmentis, speciebus cordialibus & muscho confecta, primisq; die-
bus epithema commissuræ capitis imponendum, ē Linteo, quod Rosaceo
& aceto simul agitalis, immaduērit.

Cerusa. CAP. XXII.

NOMENCLATURA.

Græ. Ἀργυρίδιον. Lat. & Ita. Cerusa.

Cerusa.

Cerusa suo colore proditur. Sumpta enim, mox palatum, gingiuæ, lingua, & cōmissuræ dentium, candore quodā inficiuntur. Singultus, tuſſim, ac linguæ ariditatem excitat. Ijs extrema frigeſcunt, mens labat, mēbra torpeſcunt. Quibus dare conuenit aquam muſſam, aut ficuum, aut Maluæ decoctum, aut lac calidum, aut Sesamam ex uino tritam, uel lixiuiam ex ſarmentis factam. Amaracinum oleum aut Irinum. Perſicorū oſſa cum Hordei decocto. Columbina oua cum Thure, aut Hordei decocto, aut Prunis, aut gummi quod Plinius plorauit, aut humor quem Plinea folia reddiderunt, cum tepida aqua. Sed tum quoque uomant. Conuenit etiam Thapſiæ ſuccus, aut Scammonia, cum aqua muſſa potus.

Cerusa præter Dioſcoridis ſigna, ſubitum virium lapſum inducit, lingua aſpretudinem, ſtomachi & corporis morſus, inflationem laterum, anhelitus compreſſionem, ſtrangulationem, totius corporis aldinem, vrinam modo nigram, modo ſanguineam. In id veneni prodeſt Scammonea cum Hydromele pota, vrinam prouocantia, ægrū a ſomno arcere, vomitum elicere cum aqua Mellincocta, cumq; Narcifſino & Lilino oleis. alijs magis probatur, vomitus cum atriplicis & Raporum decoctione elicitus, clyſteres è iure Braſſicæ & oleo, ſine ſale cōfecti. In vi no bibenda offerre, Mithridatium & Theriacam. Prodeſt & vini albi meraci liberalior potio.

Fungi. CAP. XXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. ΜΥΚΗΤΕΣ. Lat. Fungi. Ital. Fonghi.

Fungorum alij genere, alij copia ledunt. Omnes tamā ſtrangulatus ſuſpendio ſimiles concitant. Quibus conſeſſim ſuccurrendum. Communiter ex oleo uomere cogēdi. Mirifice iuuat lixiuia ex ſarmentis aut Pyraſtri ſurculis, epota cum ſale, poſca & Nitro. Fructus, aut folia Pyraſtri cū Fungis decocta, ſtrangulantem illam uim auferunt, eſitataq; eiſdem auxiliantur. Aduerſus Fungos gallinacea oua cum poſca proficiunt, ad-

B b

recta

iecta Aristolochia drachma. Item Absinthium cum uino mel-
leg³ sumptum, & ex aqua potum. Apiastrum ex Nitro. Pana-
cis radix & semē in uino. Fex uini cremata cum aqua. Atra-
mentum sutorium ex aceto. Radix, uel sinapis, aut nasturtium
esu profunt.

Fungi qui naturā sunt malefici, & venenati, intestina exulcerant,
singultus excitant, & morsus, totū corporis colorem in luteū permu-
tant, urinam cohibent. Ab his sequitur, frigus, tremor, pulsus deperdi-
tus, perfrigidus sudor, & postremum mors. Huic incommodo presenta-
neo est remedio vomitus, e potu succi Raphani, foliorum Ruta tritorū,
Origanū & Mellis. Vt deinde oportet Theriaca & Mithridatio cum for-
tissimo aceto, Oximelle Scillino, aut aqua vitis. Mirē etiamnum prode-
rit. Quinta essentia Theriacalis supra descripta. Vini optimi cui inco-
xerit Piper latior potio: & ab ea Allium crudum manducare.

Gypsum. CAP. XXIIII.

NOMENCLATURA.

Græ. γύψος. Lat. Gypsum. Ital. Gesso.

Lapidescens Gypsum strangulationem creat: quare eadē
proferenda sunt, quæ mansis fungis, auxilia. Ad hæc Mal-
uæ decoctum, quod etiam olei uicē pensat. Vt potē cum pingue
sit, euomendoq³ lubricas vias & faciles reddit, deradi corpora
non sinit. Quod, ubi duratur in lapidem, Gypsum efficit. Quin-
etiam prodest oleum ex aqua mulsa, aut ficorum decocto. Lixi-
uia ē ficulneo cinere, aut sarmentis facta, cum uino copiosiore
pota. Origanum aut Thymum cum lixiuia, aut aceto, aut passo.
Hiq³ decocto Maluæ proluendi.

AEger a sumpto Gypso, aqua calida cum butyro potandus, dein ad
vomitum prouocandus, denuo aqua calida cū melle offerenda, ac
iterum eliciendus vomitus, hoc peracto Mithridatij drachmas duas cum
optimo uino ebibat. Ducenda aluus cystere, ex anatis adipe & oleo. Cor-
pus oleo Ricini inungendum, peculiareq³ huius antidotum, muriū ster-
cus in puluere epotum, cum uino, drachmæ pondere. Auicenna purga-
tionem ē Scammonia laudat, cum alijs solutivis conuenientibus.

Sang

Sanguis taurinus. CAP. XXV.

NOMENCLATURA.

Græce. Αἷμα ταύρου.

Lat. Sanguis taurinus. Ital. Sangue del Toro.

Tauri recens iugulati sanguis, epotus, spirandi difficultatē strangulatumq; concitat. Fauciū tonsillarūq; meatus cū neruorū distentione præcludit. Lingua rubescit. Dentes inficiuntur. Quædā concreti sanguinis uestigia, inter eorū commissuras restant. Quare uomitū uitabimus. sanguinis enim globi attractu illo in sublime relati, magis gulæ inculcatur. Dari ergo opus est quæ concretū sanguinē discutiunt. aliū & subducunt. Grossi laeteo succo turgentes ex posca, & Nitrum per sese, auoluantur. Nec secus coagulum omne cum aceto & Laserpity radice, aut Lasere. Item & Brassicæ semen, & cinere ficulneo lixiua. Conyzæ folia cum Pipere, & Rubi succus ex aceto. Alius resoluenda. Ijs qui seruantur, stercorosa & fluida per sedem egeri cōsueuerunt. Stomachum aluumq; hordeacea farina ex aqua mulsā perungere oportet.

Taurinus sanguis nisi recens & ante coagulationem bibatur, non supramodū est nocuus, nec nisi à desperatis bibetur, siquidē crassioris essentia, quam ut nō perceptus hauriri vel offerri possit. Remedia ex authore patent.

Lac coagulatum. CAP. XXVI.

NOMENCLATURA.

Græ. Εμπυτιασθεν γάλα. Lat. Coagulatum Lac.

Ital. Latte meschiato col caglio.

Eos qui Coagulatum Lac hauerunt, frequens illico strangulatio inuadit, quòd in globulos quosdā lac coalescat. Quibus inuandis pro antidototo, coagulum ex aceto damus, & bibere sapius cogimus. Damus & Calaminthæ folia arida, item succum, aut Laserpity radice, aut Laser cū posca. Πλάσμιq; ex ui-

B b 2 no,

no, & cum luto suo lixiuiam. Sed nulla salsilago obijciatur, quoniam magis lac coiret, & in caseum densaretur. Neque illos uomere conuenit: siquidem concretum lac sese in gulæ angustias insinuans, strangulat.

IN coagulato lacte, Dioscorides, id solummodo Lac intelligit, quod cū ipso bibitur coagulo, tantisper dum temperetur: & antequam planè coalescat. porro quod iam coagulatum editur. separatur confectum: nec deinceps cōnuitur. Quod verò imperfectè coaluit, cum aliquantum in stomacho moram duxerit, indidem coagulatur, tum ea ratione impedita & inuersa cōcoctione hominē suffocat & strangulat, nō secus ac Tauri sanguis. Siquidē hic, non coagulatus, nullam noxiā parit nempè ē se non venenatus, sed ex coalitione, quam in stomacho efficit: haud aliter operatur Lac coagulascens, cum, aut sine coagulo ebibitū, aut alia quauis ratione sese conspissans. Quod non raro accidit, vbi Lac grossæ substantiæ, stomachum & iecur offendit naturæ supramodum calide & sicca. Nam membrorum illorum caliditas & siccitas, breui consumpta omni illa humiditate, quam in Lacte repererit, quod crassæ est substantiæ condensat & inspissat. Id etiam à membrorum illorum nimia frigiditate procreatur, nimirum compresso quod tenuium est partiū, quod restat crassioris essentia congelascit, haud secus quam de glacie & niue tradit Aristoteles, Ea de re sapiens est Galeni cōsiliū, Lac nō epotandū non immisso prius sale aut Melle, quo non in stomacho cōgelascit. Nec frustra Dioscorides præcipit, vt à Lacte nec sal, nec salsa edantur. Nam quemadmodum coagulo Lac primum coagmentatur, ita in iam coagulatum Lac immissum: diuersam rationem inibit. Eo pacto sal ante coagulationem inditum: coalitionem impedit, & ab hac iam confecta induritiem Lac conuertit. Quod in caseo recente videmus: cum salitur. Cæterum coagulascenti Lacti epoto medetur ipsamet coagula incisoria: acetum purum: & lixiuium.

Argenti spuma. CAP. XXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. Αἰδαργυρεῖ.

Lat. Argenti spuma. Ita. Spiuma de l' Argento.

Spuma Argenti pota, stomacho, uētri, & interaneis graui statē cū magnis torminibus adfert, & nōnūquā pōdere suo intesti

testina uulnerat, urinam supprimit. Corpus intumet, plumbeam
q̄ deformitatem concipit. Quibus subuenit, secundum uomitio-
nem, potum sylvestris Hormini semen, Myrrha drachma octo,
Absinthium, Hyssopum, Apij semen, aut Piper, aut Ligustri
flos ex uino, aridum palumbis finum, cum Nardo & uino.

Argentum uiuum. CAP. XXVIII.

NOMENCLATURA.

Gr. υδραργυρος & . Lat. Argentum uiuum.

Ital. Argento uiuo.

Argentum uiuū potum eadē quæ spuma Argenti insert,
eisdemq̄ utendum auxilijs. Lac copiosè potum auxiliar
constat. Sed postea euomant, qui auferunt.

Argenti spuma, præter supra descriptas, notæ sunt: Ardor, iunctu-
rarū incēdiū, vrina detētio, corporis cōpressio et oppilatio, corporis
ex accidei solutio coli exitus, suffocatio, stragulatio & mors. Porro Mir-
rrha drachmarū octo in Dioscoride præscriptū, cū Auctēna & Aetio nō cō-
uenit, quorū hic drachmas tres, ille tres obolos non excedit. A vomitu,
offerend: ysteres, cū hydromelite, & Gallina aut anatis adipe. Prodest
etiam oleum amygdalarum dulcium epotum, ficus recentes in cibo sum-
pti, stomachum cum succo Apij, & ventrem cum butyro perungere, pro-
priumq̄ huius mali antidotum Cherua semen, quæ Ricinus est, potum
drachmarum duarum pādere. Porro Argentum uiuum, excessu summè
frigido & humido, cordis naturalē humiditatē putrefacit, eoque sangui-
nem vitales species, ipsamq̄ cordis essentiā congelat. Enimuerō id in Ar-
gento uiuo animaduertendum, Sit ne Purum: Extinctum cum salina,
aut quouis alio liquore: Cum aqua forti, & sine: Sublimatum cū Arse-
nico, ut moris est, vel sine Arsenico. Nam vnum alio perniciosius, singu-
lare quodlibet remedium expostulant. Lethalius Sublimatum, ab hoc
Præcipitatū, tertium locum obtinet salina, aut alio liquore extinctum
omni in pestifero excessu innocentius simplex, & purum uiuum Argen-
tum est. Nam cum substantia sit fluidum & graue, non difficulter à
corpore per clysteres eruitur: quod in alijs veneni non accidit, qui ero-
dendi & dilacerandi virtute præditi sunt. Argentum uiuum Extin-
ctum, & Præcipitatum, eadem quæ argenti spuma accidentia pariunt,
cum intolerando anhelitus fetore, quemadmodum eo perunctis in mor-
bo Gallico contingit, siquidem frigiditatis excessu stomachum & vicina

membra putrescit. A Sublimato lingua & fauces extrema aspretudine torquentur, a quæ ac ab immaturi sorbi esu. Id mali lenitur auferiturq; absterforiorum gargarizatu. Quod si non ex prompto remedio, aut incuria, in stomachum descenderit, inibi agglutiuans sese exulcerabit, erodetq; cum inextinguibili siti, & interoleranda angustia. Assequetur lingue tumor, virium lapsus, urina retentio, compressio anhelitus magniq; in stomacho & visceribus dolores, tam vehementi erosione ut quandoque per intestina viam sibi ad exitum conficiat. Curatur ut Argenti spuma. Nam nisi magna quantitate non conficit, per inferiora profiliens (adeo fluidum & graue est), antequam longam in stomacho moram duxerit.

Calx, Sandaracha, Auripigmentum.

C A P. XXIX.

NOMENCLATURA.

Gr. Τίταν & σάνδαρχη, αργενίκου. Lat. Calx, Sandaracha, Auripigmentum. Ita. Calcina, Sandaraca, Orpimento.

Calx, Sandaracha, & Auripigmentum, pota aluum & intestina cum vehementi erosione excruciant. Præbenda cuncta, quæ suo admistu, illorum acrimoniam hebetant, ac soluiunt, & facilem lubricamq; aluum reddunt, cuiusmodi Ibis & Maluæ succus est. Natura enim utrinque perlubrica. Dandum decoctum seminis Limi, uel semen Tragi herbae, uel Orizæ lacq; cum aqua mulsa copiosum, iura pingua, & boni succi.

Pater Dioscoridis notas, a Calce, Sandaracha, & Auripigmento sumptis, situs ingens provenit, aspretudo in gutture, tussis, anhelitus & urina retinentur, fluxus oboriuntur dysenterici sanguinei. Huic malo vinctuosa medicantur & lenientia, è præscripto in Cantharidibus annotato.

Lepus marinus. C A P. XXX.

NOMENCLATURA.

Græ. Λαγω & θαλαῖτι. Lat. Lepus marinus. Ital. Lepre marina.

Q^{us}

Qui Leporē marinū biberūt, pisciū uirus olent: proceden-
te tempore, alius dolore afficitur. Urina sistitur. Et si
quādo eam reddere contingat, purpureū colorem referet. Omne
piscis genus aduersantur & odio habent. Fætido ac graui sudo-
re manant. Biliosus uomitus, interdū sanguini promiscuus, sub-
sequitur. His dandū lac asininū, uel passum cōtinuē, aut radicis
Maluæ foliorūq; decoctū. aut trita Cyclamini radix cum uino,
aut Veratri nigri, aut Scammonij succi drachma, cū aqua mulsā
Puniciq; mali acinis. Cedria contrita cum uino efficax est. An-
serinus sanguis, ut tepebit, potus. Sed cū pisces omnes respuant,
aspernenturq; solis fluuiatilibus crancris uesci possunt, bibuntq;
eos admisto uino, adiutiq; ab his, percoquūt: cumq; appetere &
comesse pisces cœperint, suæ salutis indicium habent.

Lepus marinus icterum inducit sumptus totiusq; corporis habitū
in luteum aut aureum cōmutat, vultum tumore distendit, pedū
bases incendit, pectus, pulmo, & status obsidentur oculis interim sub-
rubetibus. Hac affeclatur tussis arida, sputum sanguinis, renum dolor,
tumor genitalis, salus ab his in phthisim procedere. Urina potentia Le-
pus marinus pulmōi nocet. In id mali a quibusdā laudatur humanus
sanguis calide epotus. Lac muliebre ex ipsis succum rberibus, tosta vul-
pis caro, & Theriaca Diatesseron per triduum sumpta.

Rubeta & palustris rana.

CAP. XXXI.

NOMENCLATURA.

Græ. ρουβη. Lat. Rubeta. Ital. Botta

Rubeta aut Rana palustris assumpta, tumores ciet. Pallor
corpus uehementer decolorat, ut planè buccum specte-
tur. Spirandi difficultas torquet, & grauis habitus oritur, singul-
tusq;. Inuita interdum genitura profusio consequitur. Adiuua-
tur secundum uomitionē multo meri potu, & Arundinis radice

bb 4 bms

binis drachmis, aut Cyperi totidem. Breuiter, cogendi sunt ut ne hementi ambulationi & cursui se credant, ob torporē quo corripuntur. Quinetiam quotidie lauandi sunt.

R Vbeta Ranis sylvestribus nocentiores sunt: & inter eas magis: qua frigidioribus & plus opacis locis victitent. Ea morfu salina, sudore vel stercoreario vel vrinario vicina qua q; & deperdunt & inficiunt, eosque qui ab eis attacta gustarint, miserē interimunt. proinde nō mirum si earum puluis in cibo aut potu sumptus, remedium non admittit. ardorem nempe & siccitatem excitant in lingua, spasnum, dysenteriam, nauseam, vomitum: syncopin: mentis ablientionem, herba: fructusque ab eis infecta potusque earum sanguis. Medicamentum à vomitibus, Theriaca & Mithridatio qua per triduum in vino sumentur testudinum marinorum sanguis cum Cumino, capra coagulo, & vino. Quinta essentia Theriacalis Matthioli mirum in modum eo in negotio prodest. Smaragdi scrupulus in vino epotus. Intret ager in recens exenteratum mulum, ac inibi desideat ad cadaueris deferuescentiam: & toties sic praparatum mulū aut equum permutet: donec discussa senserit cum morbo accidentia. Vetus est prascriptū, clibano se credere qua tolerari poterit calidissimo. Balneum artificiale, vt hydropicis Reubarbarum: Diacurcuma: Dialacca: & maxime: lapis qui in Rubetarum capite reperitur.

Hirudo. CAP. XXXII.

NOMENCLATURA.

Græ. Βδελλα. Lat. Hirudo. Ital. Magnate.

DEuorate cum aqua Hirundines, si ori uentriculi adherent, tractione partiū nōnullā suctionis iamginē prabēt: eo enim argumento hausta Hirudo deprehenditur. Has muria sorbitione excutit, & Cyrenaicus succus, aut Laserpitiy folia, aut Beta, cum aceto, aut pota niuis glebula, cum posca. Nitru ex aqua gargarizatur, aut atramentum sutorium aceto dilutum. Si faucibus hereant, iniecta Lupinorum farina, aqua frigida ore contineatur, & ad eam Hirudines exilient. Prouidendum etiā ijs, qua etsi ferendi auxilij gratia tradantur, non minora tamen ceteris uenenis pericula sæpius adferunt. Qualia sunt album & rattr

ratrum, Thapsia, Elaterium, Agaricum nigrum: siquidem ea strangulatus concitant, aut immodicas deiectiones mouēt. Quibus ea medentur quæ in Fungorum mentione, & similibus retulimus. Nimios autem deiectionum impetus, medicamentis quæ excrementa supprimunt, coercebimus. Neque negligenda, quæ parum quidem nocere uidentur, interim uerò uitam in discrimina agunt. Quo in numero sunt syluestris ruta, nouæ glacies, Guth, pappi recentes: flores autem sunt eius spina quæ Cactos dicitur. Eos qui sumpserint, sola uomitio recreat.

Affixis in ore ventriculi Hirudinibus, muria conuenit leniter epota: assa fetida lexuium cum sale & aceto. Raphani succus cum aceto. Olei crudi cibus, qui solus eas conficit earumque rerum quæ vermes occidunt. Quod si guttur medium ab Hirudine obsideatur, proderit lexuiio forti gargarizare, aqua aluminis: aceto, modica Vitrioli portione aqua salsa: & sinapi. affixa Hirudo gutturis radici: sic ut os attingat: instrumento chirurgico: quod Rostrum gruis vocant: extrahi poterit: probatus modo & expertus sit artifex.

Domestica nobis. CAP.

XXXIII.

NOMENCLATURA.

Græ. οικεία ἡμῶν. Lat. Domestica nobis.

Ital. Cose que sono in uso cotidiano.

Aqua frigida abundè pota, aut meracum uinum liberius epotum, aut passum, præsertim à balneo, aut cursu, aut uehementi exercitatione, strangulatus & dolores insert. In quibus sanguinis missio protinus, & uacuatio, imminuentia soluunt pericula. Sed de notis ueneficiorum, ac remedijs, & cauendi modo, hætenus dicta sint. Subiungeremus etiam antidota necessaria, quæ præclare auxiliantur, quibus utimur, quale Mithridatum est præsertim, & quod sanguine, & quod

B b s

secinco

scinco temperatur: uerum quoniam alijs in locis diligentissime scripta sunt, hic ab eorum descriptione super sedemus.

Non aqua tantum & vinum, eo quo Dioscorides scribit modo, accidit mortifera pariunt, sed carnes etiam & pisces cocti, locisque frigidis & humidis diu asseruati, ipsa qua Fungi malefici lue cōficiunt, quantumvis suae noscitate labis in biduum argumenta proferant. Tosta etiam carnes venenatorum classē subeunt, si calida inter duo vasa suffocentur, ac linteo, ut exhalare non queant, obuoluantur: morticina, quae morbus, serpentes, rabidi canes aut fulgura exanimarint. Istiusmodi melancholicos in corpore humores, & animi maestitiam progenerant, ventris defluuium, phrenesim, lethargum, & mortem. Quinetiam vitanda oua Barbi (is piscis est vulgaris) nam venenata sunt & admodum mortifera. In pisces locis raris asseruatos, Pyra syluestria conueniunt. In suffocatas (ut diximus) carnes, vomitus, clysteres, optimum & odoratum vinum, cum Cotonei vino epotum. A vomitu terra Sigillata, cum Agallocho & Mastiche in vino epota.

Venenata. CAP. XXXIIII.

NOMENCLATURA.

Græce. ἰοβολα.

Lat. Venenata.

Ital. Velenosi animali.

DE bestijs quæ Virus eiaculantur, & exitialibus Venenis, ideo scribere aggredimur, ut tota curationis remediumque ratio ad umbilicum perducatur. Siquidem pars hæc non minus quam ceteræ aliæ, necessaria est ijs qui artem medicam exercet, utpote cum adminiculo eorum quæ inibi traduntur, doloribus, periculis, & cruciatibus, plurimisque alijs malis homines liberari conueniat. Hæc autem in summa fastigia duo, sicuti ab initio relatum est, distribuitur. Nam qui de feris Virus insipientibus sermo differit, Theriacus dici solet: qui uero de amolendis Veneficijs, Alexipharmacus: quo prius tradito, simul quæ sequi

quæ signa consueuerunt, præmonstrabimus: tum quæ nonnihil
auxilij ferūt. Omnia autem in promptu, & ad manum habere
artificem oportet, propter urgentem sæpenumero necessitatem.
Siquidem pauca è Venenis & Virulentis animantibus, tarda
& grassantia sensim pericula cient, ita ut dilationē admittant:
pleraq; uerò, præsentaneam perniciem afferunt. Hominum au-
tem partim male alijs cogitantes, ingenita prauitate maleficiū
ita temperant, ut spaciū curanti liberum non relinquunt: par-
tim scelcris admissi conscientia, aut tristi aliquo euentu oppressi,
hausto sponte ueneno, moriē sibi consciscere conantur, qui postea
deprehensi: aut resipientes, & uita cupidi, præsentaneam opem
poscūt. Non desunt qui hostiles sagittas illinentes fontes aquasq;
puteanas hac labe polluentes, certam & inenitabilem aduersa-
rijs perniciem moliuntur: in quibus ipsis etsi maleficiū non subi-
tò, sed aliquanto post grassari natura sua comparatum est, ta-
men nisi primo quoque tempore coerceatur, & remedijs sub-
inde excipiat, frustra tandem succurritur, occupatis iam cor-
poribus exitiali ui Veneni. Proinde non uulgari industria dili-
gentiaq; in ea re utendum est, ut quod in alijs incommodis ars
consueuit, in his quoque salutem mortalibus præbeat. Quin &
apud priscos genus hoc unum existimabatur esse eius partis, quæ
medicamentis pugnat: sed recentiores ad ipsum discreuerunt,
nominantes, præcautionem, & modum præcauentem, salu-
bris sanantisq; medium statuentes, parua & leui superno-
dum persasione decepti. Siquidem tres in humanis corporibus
constitutiones esse contendunt. Vnam, qua sani degimus: Alte-
ram, qua sinistra ualitudine corpora laborant: Tertiā, qua me-
diū inter utrasque locū sibi uendicat in qua positi, sanitatē specie
mentiūtur, facileq; in morbos & pericula cecidūt, ob uim corru-
pticē, quæ corporibus nostris incubit. Quæadmodū in ijs uidere
licet, quos excandescens rabie canis momorderit, necdū tamen
aquam

aquam horrent: in ijs quoque, qui *Cantharidas* hauserunt, sed nondum urinæ tormento cruciantur. *Triparitō* igitur artem digeri, tripliciq; corporis constitutioni, meritō respondere tradunt. Salubrem partem esse uolunt, quæ sanitatem tuetur. Præcauentem, eandēq; Prohibentem, quæ obstat quo minus in morbos incidunt: & Sanantem, quæ uitia discutiuntur. Quibus ita responderi potest, Quod primum, ex ista ratiocinatione, non treis corporis tantum, sed quatuor haberi constitutiones fatendum esset. Quippe ut aliqui, sunt, qui necdū morbo laborāt morbo tamen maximè ob impēdente causam sunt obnoxij: ita sunt qui iā priore morbo defuncti, nondū tamē secūda ualeitudini restituti sunt: id quod in ijs, qui à morbo proximè sese recolligunt, cernere licet, qui uirium recreationem & robur desiderant. Sed quemmodum Curandi ratio ad partem medicamentariam pertinet, ita Præcautionem eidem subijci par est. Ad arcendas enim ualeitudines uehemētibus utimur auxilijs, altiore scarificatu, ustionibus, amputatione, derodētibus epithematis, potionibus perniciiei occurrentibus, & plerisq; alijs. Verumenim uerò sunt usque eò rudes nonnulli, ut ne remedia quidem appellent, quæ morbos arceant. Cuius sententiæ inire rationem haud promptum est: etenim cum uerbum ipsum, Præcauere, tum agēdi modus, omnino auxiliārē remediariamq; uim præ se ferunt. Mirum uerò nisi etiam sua illa distributione partium, eos complectuntur, qui in pestilenti cæli statu morbo nondum correpti sunt, pesti tamen, propter obuersantis aeris occasionem, opportuni, & in morbū proni redduntur. Dicere forsitan quis posset, salubris institutionis præcepta non aliud esse, quàm arcendorum morborū rationem: Quippe cum firma reddere corpora, & minus uitjs obnoxio nitamur, ut inoffensa ualeitudine degant, nec morbis confluentur. Neq; id silentio prætereundū, quod maximè præcipiū, & tanquā caput rei est, non oportere medicinæ partium distributionem

butionem, totidem corporis constitutionibus respondere, sed na-
 turas singulorum suis notis seorsum scrutari ac explorare, ut suis
 locis ostendimus. Cum ijs igitur non pluribus agendū. Illud ma-
 gis adnotare conuenit, affectus qui à virulentis animalibus ue-
 nenisq; contrahuntur, uocari cecos, id est, quorum ratio mini-
 mē iniri potest. Quin & ea quæ eisdem auxiliantur, nulli pa-
 riter sunt addicta causæ. Quapropter quæstionibus obseruatoriæ
 artis, & eius quæ ratione fulciatur, annumerari solent. Neque
 prorsus uerū deprehenditur, affectus huiusmodi cecos esse. Nam
 quod semper se protrahit, & nullū in quibusdā necessarijs usum
 exhibet, haud facili coniectura colligi potest. Etsi naturæ pro-
 prietate prorsus cecos eos affectus cecedimus, qui ab exitialibus
 Venenis, & animantibus quæ Virulento morfu sæuiunt, con-
 trahuntur. Nam quod ad opus nonnullum usum præbet, datq;
 medendi occasionem, neq; imperceptibile, neque cecum, nullius
 causæ obnoxium reputatur. Sed magis ab ipso quis impulsus, de
 monstrationē se habere, & opinionem, de abditorum cognitio-
 ne, cōfirmare poterit. Nam etsi sæpe minora sunt, quàm ut sen-
 sibus percipiantur, euidenter tamen ex ipsi inter se collatis depre-
 henduntur. Diocles autem in eo commentario, quem Plistarcho
 dicauit satis modos perstrinxit, ad uerbū ita scribēs: Nosse quis
 hoc potest cum in alijs non paucis, tum in Viperis & Scorpioni-
 bus, & reliquis id genus, secum animo reputans, ut quāuis exi-
 guo sint corpore, uixq; conspectui subijciantur, magnorum tamē
 discriminum ac dolorum causas inferunt: quorum nihil præter
 quandam corporis exiguitatem, uimq; præ cæteris animantibus
 datam illis, facile fuerit spectare. Quanta enim ea moles corpo-
 ris est, quæ à Scorpj ictu, & aliorū id genus Venenatorū quæ
 nos morfu conficiunt, attingitur? quorum aliqua uehementes cru-
 ciatus excitant, alia erodūt, & putredines cient, nec desunt quæ
 præsentaneā pernitiē moliantur. Aut quantulū est quod à Pha-
 lang

langij morſu ingeritur, & uniuerſum corpus excruciat? Neque
 enim quis magnitudine ipſorum deprehendere poſſet, cū prorsus
 exigua mole conſtent. Ergo quòd hæc ad affeetus referantur,
 conſtituit inter omnes: Verum quòd exactè deprehenſum ſit, uim
 quandam ipſis inefſe, mortiferam, quæ inſinuata corporibus, mo-
 leſtiarum quæ exoriuntur, nobis cauſa ſit, in conſeſſo eſt, &
 omniū conſenſu perſuaſum. Nec quiſquā inuenietur uſque adeo
 contentioniſ ſtudio flagrans, qui aliunde exoriri moleſtias aſſe-
 ueret, quàm à materia mortifera, partem corporis attingente.
 Porro id erat, quòd inter utilia artis opera in omni opere dicere
 oportuit, Quanam res opus hoc efficiat, ut nihil prorsus nos læ-
 dat, in comprehenſa communis cauſæ, quæ proprijs ineſt, ratio:
 Quandoquidem tum euidenter indicari poſſit, cum deprehenſa
 eſt. Ideo Eſiſtratus Empiricorum pertinaciam graui cauillatione
 inceſſens, cæcis affeetibus cauſas aſſignauit, inſuſciatus hiſ, cõ-
 munem & ſupremam morborum cauſam, incomprehenſibile
 eſſe: & hanc in eo, quem de cauſis ſcripſit, commentario, aptiſ-
 ſimè prodidit, candido ſignatam lapillo. Nec ferendos eos eſſe
 cenſuit, qui ſe dicant in quibusdam, ut in Venenis, Serpentium
 icetibus, & cæteris id genus, trita medendi ratione cõtentos eſſe.
 Neque ſatiſfaetluram ſibi obſervationem eam, quæ, à cauſarum
 comprehensione, ſeparata eſt. Primum enim genere comprehen-
 di facile poſſunt. Quòd autem ſit letifera uis, corporaq; permuta-
 tans, ita ut perimat, ex ijs quæ per genus non per ſpeciem uagau-
 tur, curationem indicat, quæ hæc hebetare, & prorsus expugna-
 re liceat. Cum uero ſubiungit. Ad aquam dulcè & potui ido-
 neam uenit quis, & ante obſervationem, ad uomitum, ad uui-
 neris dilationē, ad demorſæ partis ſuclum, cucurbitulas adfixit,
 partem incidit, urentia medicamenta, aut ea quæ uim eandem
 adipiſcuntur admouit, poſtremo partem amputauit: ſecum repu-
 tauit medicamina, quæ per ſummā cutim ferre & applicari ſo-
 lita.

lita.

inmissa ad intima perniciæ repugnarēt. Hæc itaq; quæ dis-
 seruit Erasistratus, ueritati cōsentanea sunt, nec arti refragātur.
 Sed methodicos demirari licet, qui mortiferam uim, corporibus
 illapsam, negociorum, quæ ipsa faceſcit, esse causam diffiteantur.
 Verū rudiusculè nomini attendunt. Nam apud ipsos palam
 inmissa uis φθοροποιός, id est, mortifera nominatur: φθοροποιός
 autē nullius officij alius esse potest, quā causa. Aunt hæc nomi-
 na, μάρσιππος et ἀνακαλύπτειν, esse reliquis omnibus similia, in
 quibus partes quædā dictionū, nō pro uirtute, sed nuda enūciatio-
 ne cōprehenduntur. Enimuerō quemadmodum in his uocibus
 μάρσιππος et ἀναλύπτειν, partes neq; certos neq; principes reti-
 nēt significatus: sic in hoc uerbo, φθοροποιός partes productionis
 gratia, non pro uirtute coaluerūt. Hinc ad causarū differentias
 transcūt, affirmatq; causarū aliquas Euidētes esse, quæ dum ad-
 uersam ualeitudinē creant, separātur. Cuiusmodi sunt frigus,
 labor, æstus, & similia: quasdā Cōtinētes, quæ permanēt post-
 quā morbū excitarūt, hoc est, quibus præsentibus, & effecti-
 bus eorū adsunt: increſcentibus, affectus augetur: decreſcentibus,
 minūuntur: & cū desinūt, iḃe finiuntur: quibus solus ac per se
 manētibus, effectus quoq; ipsi manent. Talia quidē receptissima
 sunt causarū discrimina, quorū nulli Phithoropæō subijci potest.
 Euidēs enim causa nō est, quoniam morbus ipse permanet, nec
 ipsa à corpore separatur. Nec cōtinēs causa dici potest, cū ma-
 gna ex parte hic adsit. Quēadmodū accidit ijs, qui à rabioso ca-
 ne sunt demorſi. Quod si neq; Euidēs causa, neq; Cōtinēs fuerit,
 neq; per se, neq; alterius cōsortio causa erit qđ si à nulla causarū
 differētia Phithoropæon deducere possumus, cōsequitur, ut neq;
 causam esse fateamur. Quod autē asserūt, uocabula quædā in se
 nō habere partē rerū significatrices, sed nuda & simplicis pro-
 nunciatione ficta esse, fateri necesse est. Verū non omnia, sed
 per pauca talem nancisci conditionem existimandū est. Neque
 enim

enim ποιῶν, in hoc nomine, φθοροποιὸν, perinde atq; assumptum profertur, sed longè principem obtinet significationem. Quem admodum enim φθορᾶς, id est, corruptionis. nomen, mutationem in peius significat, sic hoc uerbum ποιῶν sumi debet, ut nihil amplius ex eo, quod hanc dictionem, φθορᾶ, secum habeat declaret, neque prorsus id significat, quod omnes palàm audiūt. Et huic simile redditur, ποιῶν δὲ χερσὶν ἀλφειῶ. Si dant, à corruptione sanis, fieri morbum, concedunt utiq; uim in huiusmodi uerbo ποιῶν subesse, siquidem aliquid est, quod corruptionem efficiat. Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur per singulas causas quæ corporibus subiiciuntur, idque tam in letalibus Venenis, quàm in ijs quæ corporibus ingerūtur. Verùm nō nihil subiacere causarum differentijs produnt. Quinetiam aberrarunt non exactam diuisionem assumentes. Qui uerò se Dogmatico profitentur, causam esse partim Preparantem, partim Continentem asserunt: ut inguinum ulcus, & inguinariam febrim & quæ effectui tum assistat, tum etiā separetur, ut à fractis precipitatio. In summa quoties quippiam suapte natura causa fuerit nec ulla diuisione comprehenditur, uitiosum est, neque causæ adscribitur, eorum quæ idem genus sortiuntur. Sed quod Phthoræon, causa sit, nomen ipsum argumēto est, & in ijs quæ contingunt apertius ostenditur. Quid aliud causæ arbitrantur esse post impressum à serpentibus ictum, quàm ex animante uim & illapsam in corpora uirus? Neque enim frigus, neq; æstus neq; sectionem corporis, neque cruditatē, neque aliud quicquam simile causari possunt. Verùm quoniam causarum differentijs gaudent, & aliquas Continentes, alias, Euidentes appellant ipsis dicendum, utroque istorum modorum Euidentem quidem causam esse, quod affectum præcedit, & quod corporis substantiam præoccupat: Continentem uerò, quod morbis presentibus adest, quæ separata, recedunt, quæ cum ipsa euenerant. Sed de y hæc

*hactenus. Statuendum itaque mortiferam uim intrinsecus mani-
 festissimam esse causam, ipsamq; principem facere scopum oportet. Et antequam ad ima decumbant morbi, uarijs modis est cer-
 tandum donec uis tota corporibus excutiat. Modò enim reuo-
 cari debet ea parte, qua pestis intrauerit, modò aliqua alia, præ-
 sertim principatum non obtinente, antè coërceatur, quàm altius
 irrepens uiscera tangat. Aut eius perniciēs eluatur, retūdaturq;
 cum iam membratim peruagatura est. Itaque Venena si hausta
 sunt, crebris uomitionibus: si morfu impressa, scarificatione, assi-
 xis cutibitalis, exuētu, carnis circumscriptiōe, nonnūquam
 amputatione extrema partis euocantur. Retinentur uero insu-
 sione: & impositu mendicamentorum acrimia, cohibentur. Hæc
 simul utique arcere uirus, & eluere possunt. Restinguuntur &
 euincuntur meraciore potu, aut passò nulla aqua diluto, uel con-
 trariorum esu, quæ acrimonia sint prædita. Postremò deiectio
 alui, euocatus sudor, & alia quadam in commune, quæ mem-
 bratim demonstrabimus, auxiliantur. Verum enim uero non le-
 tiferam modo materiam, sed & magnitudinem, & tempus,
 pro scopo considerare oportet: Etenim ab ijs remedia quàmplu-
 rimum discrimen capeffunt. A magnitudine quidem, Cum nō-
 nulla ex Venenis, & Virofis animalibus pericula minantur. A-
 lia, putredines alias, aut exteriores excitant. Alia, uehementis-
 simos dolores, aut cecos cient: Alia uix medicamentis cedunt,
 & magis minúsue molestias excitant. Oportet autem ea, quæ pe-
 ricula ferunt, peruicacioribus auxilijs expugnari: & minus in-
 festæ, mitioribus. Quippe absurdum fuerit in grauioribus, se-
 gnioribus medicamentis homines in discrimen adducere: in mi-
 noribus uero, uehementium auxiliorum iniuria corpus laceffe-
 re. Finitio à temporibus in promptu est: Hoc enim, subito in peri-
 cula & præsentēs molestias adducit: illud uero, sensim, & di-
 latat in diem, longam aut breuiorem, producit. Itaque in acu-
 tis qui*

is quidem confestim, multa simul auxilio representari oportet: reliquis, paulatim. Hæc quadam artis formula breuiter definita sint. Iam membratim rem prosequamur.

Signa rabiosi canis, & demorforum ab eo. CAP. XXXV.

NOMENCLATURA.

Gra. σημεῖα λυσσοδ' ηκτωρ Lat. Signa
rabiosi canis, & demorforum ab eo. Ita.
Segni del cane rabioso, & dico
loro, che sono stati morsi
da quello.

DE rabiosi Canis morſu ſermonem alijs præpoſuimus, quòd id animal domeſticum ac frequens eſſe conſuevit, & in rabiem ſæpius agitur, ac perit, ab eoq; caueri difficile. Inde periculum inuitabile hominem manet, niſi multis utatur auxilijs. Canis plerunq; flagrantiffimis æſtibus, in rabiem effertur: interdum, quoties frigora inceſſerunt. Rabioſus autem, potum & eſcam auerſatur. Largam, ſpumantemq; pituitam, naribus & ore projcit. Toruẽ & ſolito triſtius intuetur. In omnes paſſim ſine latratu irruit. Aequè ſeras hominesq;, tam familiares quàm ignotos mordet. Nec protinus infeſtum quidquam infligit, niſi, ut uulnus, dolorem. Exinde morbus ille, qui ab aqua metu, Hydrophobicus, graia eſt uoce appellatus, contrahitur. Euenit autem cum diſtentione neruorum, totiusq; corporis rubore, præſertim faciei, cum ſudore & languore quodam
Ali

Aliqui auræ splendorem fugiunt, alij sine ulla doloris interca-
pedine uexantur. Sunt etiam qui canum more latratus edant,
& obuiam factos, morsu adoriuntur, ac mordendo simili uitio
labefaciunt. Proinde ex ijs, qui hoc uitium senserint, neminem
seruatum uidimus, nisi forsitan ex historia, unum aut alterum,
euasisse audiamus. Siquidem Eudemus superasse quendam affir-
mat. Themisonem aliqui, demorsum in hunc furorem incidisse,
& euasisse fatentur. Alij ipsam, cum amico aquam ex paue-
scenti morem gereret, & officium exhiberet, quadam natura-
rum concordia, similem contraxisse affectum: sed post multos
tandem cruciatus, seruatum extitisse. Molestissimum itaque ge-
nus morbi, à quo multos, antequam ipsam experirentur, uindi-
cavimus, & complures, ab alijs medicis seruatos, nouimus.

Remedia demorsorum à cane rabioso. CAP. XXXVI.

NOMENCLATURA.

Græ. θεραπεΐα τῶν λυσσοδ'ηκτῶν. It. Re-
media demorsorum à cane rabioso. Ita. Ri-
medi con cui si curano i morsi del
cane rabbioso.

Ratio medendi duplex. Vna communis, qua utendum in
omnes morsus, quos Virulente animantes impresserunt.
Alia peculiaris priuataq̃, eorum duntaxat, quos rabiosi Canes
momorderint: quæ nonnullis quidem, summam opem ferre cō-
suevit: alijs uerò inutilis, maximè, qui ex multo iā tēpore, iſtū ac-
ceperūt. Quæ ad hāc pertinet, primū exponemus. deinde cursim
perstringemus, quæ ad cōmune medēdi rationē pertinet. Cancros
itaq̃, fluuiatiles, in sarmētis alba uitis, cremare oportet & cinerē
Cc 2 eorum

eorum, quàm minutissime tritum, habere reconditum. Itidem
Gentianæ radicem tusam cibratamq; reponere. Quoties autem
Canis rabiosus morsum intulerit, in quaternos cyathos meraci
 vini bina cineris cancrorum cochlearia, unumq; *Gentianæ* con-
 jiciantur. Hæc in polentæ dilutioris modum subacta, quatrinduo
 bibantur. Inter principia, medicamentum hoc modo detur. At-
 qui si ab illato morsu, bini ternive dies fluxerint, curationem
 auspicabimur à triplicato pondere, supra id quod ab initio retu-
 limus. Optimum hoc aduersus rabiosorum morsus auxilium,
 quod & plerisque, unum satis fecit, eoq; cum fiducia uti licet.
 Sed ut alijs etiamnum auxilijs, contra ineuitabile periculum mu-
 niamur, nihil cæteris uti prohibet. Satiùs autem multo fuerit, e-
 tiam si in unum recidat, medicamentorum inhumanos tolerare
 cruciatus, quàm per inertiam ac desidiam in discrimen adduci.
 Nec ita in demorsis à rabioso animali maiora uulnera uereri
 oportet, uti minora, & ulcusculis cutis similia. Quippe maiori
 uulnere confertim copiosus sanguis emanans, potest nonnihil uiru-
 lenti liquoris exhaurire: quod in minoribus non accidit: quin à
 minoribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scal-
 pelli circumscribere, & prehensam hamulo, aut uulsella, carnẽ
 amputare oportet. In utrisque circumstantia loca, altioribus ulcu-
 sculis sacrificanda, ut copiosior sanguinis uacuatio arceat, ne ue-
 nenum membratum insinuetur. Cucurbitule cum multa flam-
 ma agglutinata, id iuuamenti præstant, ut ueneni uis extraha-
 tur. Contra uirulentos ietus, ustio expeditissimum est auxilium,
 utpote cum ignis cætera uiribus præstet, simul quod uirus domet,
 & ferri penitus non patiatur: simul quod pars ignem experta,
 postea non uulgarè fundamentum curationi futuræ præbeat, ma-
 nente diutius exulceratione. Animaduertendum ex eo tempore
 cum crustæ decident, ne ulceris oræ coalescant, & cicatrice
 induantur, sed si fieri potest ad multum, idq; præstitutum iēpus,
 ulce

ulcerationes & sordidas adhuc & inflammationem minantes, prorogari conuenit. Quod inditum ijs salsamentum optime præstabit, & Syluestre Alliu detritum, item Cape, succusq, præsertim Cyrenaicus, aut qui Medicus, aut Parthicus appellatur. Tristici grana tam mansa, quam non mansa imponantur. Siquidem subacta pistæne à perfusione uulnera dilatant. Sunt qui à mædientium ieiunio, sibi aliquid asciscere arbitrentur, quod suapte natura resistat. Verum id certum non est: ceterum tempestiuus eorum usus, minimè est contemnendus: Si uero, quod per sepe accidit, ante dies præfinitos cicatrices coirent, committerenturq, manuum postulabunt: nanque eas diducere, carnemq, scalpello circumare, aut iterum inurere, expediet. Vbi uero propositum tempus præterijt, ulcus ad cicatricem ducendum, & emplastro, quod è salibus conficitur, locus comprehendendus, nec multo post Sinapismo utendum.

Ratio victus in morfu rabiosi canis.

C A P. XXXVII.

NOMENCLATURA.

Græ. διαίτη τῶν λιτσοδ'ήκτιον

Lat. Ratio uictus in morfu rabiosi canis. Ita.

Reggimento del uiuere di coloro, che
sono stati morsi del cane
rabbioso.

Quæ ad partem istam pertinent præsidia, ita se habent. Ceterum uictus rationem ex ijs quæ Veneno aduersantur, coniectura quadam colligere oportet, simul ut Veneni uires hebetet restinguatq, simul ut arceat, quo minus ad intima pernicies illabatur. Etenim assumpta, perniciosarum uirium penetrationi resistunt. Quorum utrunque præstare potest uini meracioris, passi, & lactis potus. Quippe qui hæc omnia capiunt ad

cc 3 curam

curam, nonnihil uero obijciunt, quod omnem eius acrimoniam obtundat. Simili modo Alliorum, Porrorum, Caparumque cibis, quod ea difficulter conficiantur, uixque aboleantur. Nam multos dies huius cibi qualitates remanent, quo tempore, nec euincuntur, nec permutantur à mortifera uis, sed contrariis illa uis expugnatur. Cui rei antidotorum usus accommodatur, & Theriaces, Mithridatij, & eius quod Eupatorio temperatur, denique omnium quæ magnam aromatum partem sibi uendicant. Quippe Aromata omnia uiribus & substantijs agrè permutantur: Quare in corporibus euincunt. Videlicet ratio hoc modo habet: Nosse conuenit, pauorem aquæ non statò definitoque tempore exoriri, plurimum tamen ad quadragesimum usque diem neglectis differri consuevit. Post semestre etiam nonnullos inuadit. Quendam post annum aquam horruisse constat, quæ nobis uisù comperta fuisse. Narrant & aliquos post septennium aquæ metu fuisse tentatos. Inter principia, demorsorum à cane rabioso, curandi ratio talis est. Verum enim uero si ea quæ retulimus auxilia, primis diebus prætermissa fuerint, nec scalp pro carnem circinare, nec uestionem experiri operæ precium est. Non enim quod iam pertransijt, satis euocare possent. Nulla utique istius rei occasio aut utilitas, sed incassum corpora doloribus sternentur. Alter uero curationis modus accedat. Deiectionis magnum præbet uisumentum, ut potè cum mouendo, corporis habitum transmutet. Et quæ Colocynthidem recipit Hiera, item lac Schistum, quod simul deiectionem moueat, & Venenum domare possit, cibi acres, & meraculi potus, quibus uis Veneni uehementer retunditur, quotidie sumi debent, Caterum sordes ante cibos, & post etiam ciendi. Dropacismi Sinapismi, alternatim per corpus totum adijciendi. Sed longè omnium efficacissimum auxilium Helleborismus cognoscitur, quo cum fiducia non semel atque iterum, sed frequentius ante quadragesimum diem, uel post hoc tempus, uis

pus uti licet. Tantam enim uehementiam hoc auxilium habere fertur, ut quidam qui iam aquæ metum sentirent, sumpto Helleboro simul ac primum morbi impetum experirentur, fuerint seruati. Nam & iam uitio tentatos, nemo unquam seruare potest. Itaque primum, curam contra rabiosi canis morsus breui sermone exposuimus. Iam ad alia, quæ Venenatis morsibus sauire consueuerunt, transeundum. notas uno contextu, deinde communem medendi modum, qui omnibus conuenire possit, exhibebimus. cursim deinceps subiungemus ea, quæ te nonnullis auxilium præstare possunt. Post e-
tiam uenenata, quæ nullis cedunt remedijs.

CAnes calidissima æstate, aut frigidissimo verno tempore agantur, nempe quod tum temporis æstus aut frigus intensum, supramodum exusto, quo abundant, melancholico humore, eum etiam obiter condensat & inspissat, qui sit ut melancholici & rabiosi euadant. Rabidi canes demissis auribus & lento passu incendunt, ea capitis forma ut stupidi videri possint, obuios quosque nullo delectu, non homines tantum, sed etiam animalia demordent. At enim non ob eam tantum causam in rabiem aguntur, sed etiam à putidarum esu carniū, a uenenatis beluis aut fulgure confectarum, quin & iusculorum exorbilatione, quæ acria aromata Piper Gingiber incocta sint. Porro in canis rabiosi demorsus effert Galenus, Cancrorum fluuiatiliū cinerem cum Thure, vel Gentiana inspissatam, & illitam, quāuis Gētiana efficacior sit. Prodest & Alisi puluis, continuis quadraginta diebus cum hidromelite epotus. Prodest & lapathi acuti decocto plagam eluere, illita postea herba huiusque puluere insparso. Iuuat & Potamogeton cum sale morsui impostum. Fici sylvestris cortex tritus, & in aqua epotus. At enim hæc relaxare venam, solutiusve medicinis uti non bonum. Proficiet plaga diducere, laniatamque per ambitum carnem auferre, scalpello suāde profundius immisso, unde postea sanguis humorque, cucurbitulis validis & hirudinibus detrahantur. Quinetiam summè salutiferum remedium est, cauterium ætiale, ignitum, ferreum, argenteū, vel aurum, ea effecta plaga, quæ breui committi non queat. Quod si timidus quispiā id ætiale cauteriū recuset, consilio morituo utendum: quo in negotio nō

Et

aliud

aliud prestantius Sublimato. cum unguento quopiam frigido, inspissato, siquidem ab hoc prodians crusta in biduum decedit, modo assidue butyrum supra teneatur. Quod nullum aliud canterium efficiat. Quod si cum actuali aut potenciali canterio obducatur, si non possit, diligenter providendum, ut plaga diducta perduret, applicatis supra emplastris & ceratis valde attractorijs, & resina gummi, & similibus materialibus compositis. Item ne crusta cito obducatur, quo & via fiat educendo venenum & ne obducta plaga crusta, detrimentum non mediocriter producat. Porro canterij actualis crusta decedit, illa cum Vernice liquida, cum ovitello, & butyro: aut si glomus integrum diem in butyro liquefacto temperetur, ab hoc solutissimo remedio, plaga quotidie superindueda. Precipit, ut si canterium, aut canterium preparata cum sepe sumi succo, stillatua Rosacea, num ad lentum ignem desiccati. Siquidem eximium in remedio, quod plagam diu ne occludatur cohibet, etiam est profundum ad pulcritudinem, utenti attrahit. Quod si vini suam in pulvere exercere non poterit, unguento indatur aut emplastro attractorio supraque plagam continetur. Siquidem nihil aque de profundo extrahit & quamvis diducende plagae tempus in quadregesimum (ex vso) nec amplius diem producat, non aberrabit tamen qui diutius reliquerit, quo consummate quicquid inest malignitatis id omne foras prosiliat. Quod ad victus rationem attinet fluminales Cancris peculiari natura vi praeda & coenas in id veneni parabunt Gammari & Hericij marini reliquique carnis tener in secula pisces. Extremitates animalium vinum aromatice ex Melle vel Saccharo Aacula montana que facile digeruntur & corpori laudabile alimentum subministrant. Vinum dulce in quo ferrum aut chalybs extincta sint. Praefixum tempus non habet aque timor. Oritur quandoque primo alias septimo aliquando quadregesimo in alijs etiam ab anno & in quibusdam non ante septimum se prodidit. Id mali non a canis tantum morfu contagiosum est sed ab hominis etiam rabidi consuetudine si ve canis spuma nudam canem. In agris saluti signum est sua in speculo effigies noscitur. Corvus & sanguinea manibus donec incalescant attrita in rabie agitur a cane demorsus. Quod superest remedium est practicum patet. Nam simplicia in Dioscoride perquisita & ingenium & sedulitatem exacuent.

Notæ eorum, qui à venatis demorfi sunt. C A P. XXXVIII.

NOMEN

